

1  
Ex. mo. Sr. Ex. mo.

So' o por mim muito reconhecida  
benevolencia de V. Ex. para comigo  
me podera desculpar da minha falta  
de lhe não ter escripto enviando-  
lhe a lista das plantas de Quindim-  
bo, mas o meu mau estado de  
saude n'aquelle occasião, e bastante  
tempo depois me impedio  
de escrever, qualquer grau de  
attenção que fosse exigido, ainda  
para copiar intelligivelmente  
o que já tinha feito: incapto  
para o mesmo acto de escre-  
ver symptoma notavel da aнемia  
tallurica.

As melhoras que tenho consegui-  
do são ainda poucas e taceas,

devidas ao tratamento, e sendo  
sempre em attença as boas condições  
es hygienicas, procurando as  
melhores possiveis, sem posem  
ceder a costume do solino.

Não perco a esperança de en-  
viar a V. Ex.<sup>ta</sup> o numero de ex-  
plices de cryptogamias que  
me for possivel obter; e que  
mai facil seria se tornasse para  
o interior, mas, por enquanto não  
devo confiar nas pequenas  
melhoras que a muito curto  
tempo conseguirei.

Incluo emiso a V. Ex.<sup>ta</sup> a lista  
das plantas de Luindumbó.

É muito provavel que si por  
o principio do anno seguinte  
vire a Portugal para passar  
alguns meses por cobran-  
ças e conseguir que me  
seja determinado meios




de transporte mais fazeis, o  
que decerto darão incomparavelmente  
melhores resultados do que os possíveis  
tendo em conta a dificuldade de carregada  
ser progressivamente crescente, por  
causa do grito cada vez mais se  
occupar do commercio do brrachho.

Terei sempre grande satisfação  
em oferecer a V. Ex.<sup>ta</sup> os resultados  
da exploração botânica, que  
me for possível. Creio na  
Sympathia e nos Respeitos de quem  
é de V. Ex.<sup>ta</sup>

Deves. Am. m. l. g. r. t. o

Catumbillo  
10 de Junho  
de 1889.

José Donchisto





## Plantas de Quindumbo

Quindumbo é um dos domínios do sobado de Quiaca, a oito dias de viagem ao nascente da Catumbello. Faz como todos os do planalto do interior de Benquetla, montuoso, accidentado, variado em aspectos topographicos, com altitude media approximada de 1400 metros, abundante em chuvas periodicas, que só em raras annos escaccia, mas que sempre o abastecem de numerosos cursos d'agua, abundante e variado em vegetação, sempre verde nas margens, despi-do nos altos durante o caciuto. Solo fertilissimo, abundante em mantimentos, ainda que diminutissimamente aproveitado, sendo tão uniformemente temperado, que no pino do verão é notavelmente fresco.

A salubridade de Quindumbo é

tradicionalmente conhecida por todos os  
indigenas deste Districto como asylo repe-  
tidas vezes certo em doenas incuraveis nos  
paizes de altitude menor, o qual e sem-  
pre decrescente de Quindumbo ao ~~litoral~~<sup>litoral</sup>,  
salubridade confirmada por  
todos os europeus que tem visitado  
este aprazivel paiz: e que se deduz a  
simples vista da numerosa populacao  
de mesticos em todos os graus de cruzamento,  
que por toda a parte se depura.  
Uma photographia tirada ao acaso de  
um grupo dos seus habitantes seria  
uma verdadeira demonstração da sua  
excellentissima aptidão para a colonização  
europea: e que junto a grande fertilidade  
de terreno, em Angola, se exclusivamente  
se encontra no vasto planalto do  
interior de Benguello.



*Polypodiaceae.*

34 *Polypodiaceae* Frequente em terrenos humidos ou alagados, que por partes occupa quasi exclusivamente *Liliaceae.*

35 *Meibomia* Dispersa em tozanos pedregosos, mas raramente em abundancia. Flores coccineas alguns dias depois da antese, até então esverdeadas muito claro levemente amarello.

36 *Hyacintheae* Dispersa em grupos de maior ou menor numero, mais abundante do que a antecedente.

*Irisdeae.*

37 *Geissarhyza* Na mesma proporção do que a antecedente em grupos de ordinario de pequeno numero.

*Amaryllidaceae.*

- 38 *Haemanthus* Pouco abundante, exclusivo dos rochedos d'onde nas cavidades nasce de um bulbo, que pode ter mais de trinta centímetros.  
Orchideae.
- 39 *Vanilleae* Frequente em grupos de pequeno numero.
- 40 *Arctoseae* Pouco abundante exclusivo dos lugares pedregosos e accidentados.
- 41 " Na mesma proporção e condições da antecedente.  
Urticaceae.
- 42 *Ficus* Pequeno arbusto de lugares pedregosos. Pouco abundante.  
Urticaceae.
- 43 *Pouzolzia* Arbusto que não excede a dois metros de altura com 5 centímetros de diâmetro. Vegeta em terreno húmido.



mido, ou debaixo d'agua.

Não abunda.

Santalaceae.

441

Pouco abundante. Des-  
campados herbosos.

Proteaceae.

45 Protea

Tem menos de um  
metro de altura. Abun-  
dante e geral. Os indige-  
nas ligam-lhe grande  
importancia em prati-  
cas supersticiosas, sendo  
a como um remedio  
certo contra o candundo  
(nevrose intellectual verda-  
deira ou simulada?  
Talvez por ultimo ver-  
dadeira) contrahida as-  
mais das vezes por  
imitação. Mais frequente  
na mulher do que no  
homem, determinada

por contrariedades amorosas.  
Se não encontrar esta planta  
proximas vão procura-la  
a todo a distancia até  
a encontrarem. Se o doente  
cui desmaiado ao pé deste  
cipungandembe (n.v.) está  
justificada a verdade  
da doença, de contrario  
o supposto doente é apupado.  
Compositae.

46 Vernonia Não é espontanea em  
Quindumbo. Abundante-  
mente semeada pelos  
escadros, que fesa com  
outras plantas semea-  
das para o mesmo fim.  
Florece quasi todo o anno,  
com curtas interrupções.

47 Vernoniaceae Frequente pelas planicies  
herbosas.

48 Bidens Abundante em terreno cultivado.



do ou que o foi.

- 49 *Bidentiferae* Não tão abundantes como a antecedente, que acompanha, é mais exclusivo do terreno cultivado.
- 50 *Artemisiaceae* Heron alastrando o chão junto das libatas.
- 51 *Leontoxia Perpetua*, que por partes é abundante em grupos de pequenos matos em mata mais ou menos distante da povoação.
- 52 *Emilia* Característica do terreno cultivado, onde abunda.
- 53 *Euphorbiaceae* Nos mesmos lugares mas, não tão abundante como a antecedente.
- 54 *Serroriaceae* Frequente no mato, mas não abundante. As folhas são adocicadas, de um gosto muito parecido

com o do alcaçuz, e  
um forte aphrodisíaco co-  
nhecido.

55 " Mais frequente do que  
a antecedente, dos mes-  
mos lugares.

### Rubiaceae

56 *Canthium* Arvore de folhagem muito  
densa e sempre verde, de  
4 ou 5 metros de altura  
e diâmetro proporcional.  
Frequente em terrenos pro-  
ximo d'água.

57 *Guettarda* Pequeno arbusto dos mes-  
mos lugares. Abundante.

58 " Abundante, geral.

59 *Guettardeae* Arbusto de 3 ou 4 me-  
tros sempre verde, ex-  
clusivo de borda, ao  
fundo d'água. Abundan-  
te, mas mais ou menos disperse.

60 *Rondeletiae* Pouco abundante, de



3 ou 4 metros. Terrenos  
úmidos ou proximida-  
des d'água. Florescimento  
pendente a prumo.

Apocynaceae,

61 Eupocynaeae Não abunda nem é rara.

Asclepiadeae,

62 Euasclepieae Trepudeira espontânea  
não abundante. É excellen-  
te como hortaliça, sobretudo  
do como esparregado, muito  
apreciada pelos indígenas,  
que ainda assim não  
se dão ao pequeno tra-  
balho de a demorear.

Verbenaceae,

63 Viter Arvore grande que  
começa a dar fructo logo  
que tem um decimetro  
de altura. Mais abundan-  
te nos terrenos incultos.

Produce drupas muito

parecidas com acertonas, que os colonos e viajantes têm tomado por acertonas bravas; mas este engano teve a utilidade de ser feito emprehender a cultura da oliveira.

*Bignoniaceae.*

65 . . . . .  
Árvore grande, pouco abundante. O fruto é uma capsula penduloiforme, de pouco mais de 5 centímetros de eixo.

*Impatioidae.*

66 *Lissus* De um metro quando muito. Durante o caimbo subsiste pelos rizomas, rebenta na estação das chuvas. Abundante, geral

67 " " . . . . .  
Igualmente abundante nos mesmos lugares, que a antecedente, como a seguinte



## Menispermaceae.

- 69 *Lardizabaleae* Poas abundante em  
Quindimbo.

## Sterculiaceae.

- 70 *Bombax* Não abundante nem  
raro. Das capsulas tira  
se sumamaço, empregado  
em colchões. Arvore mediana

## Hypericaceae.

- 71 *Passiflora* Pequeno arbusto abundan-  
te, recoberto de fructos  
carmezim de menos de  
um centimetro de dia-  
metro, adocicados. Pare-  
cem ser muito venenosos,  
comidos em quantidade  
pequena de uma mão-cheia.

## Rhamnaceae

- 72 *Lixyphas* Arvore mediana, abun-  
dante, geral. O fructo é  
espheroide de 3 centimetros

de diametro, pericarpo de  
muito pequena espessura,  
quasi secco; conhecido como  
narcotico comido em quanti-  
dade de decimas.

Euphorbiaceae

- 73 Euphorbia roxo de consistencia her-  
bacea. Naõ espontanea em  
Quindumbo, semeada pelos  
cocoos para os fechos, os  
ou junto com outras plan-  
tas para o mesmo fim.

- 74 Dryllanthus Pequeno arbusto pouco  
abundante

Myrtaceae

- 75 Lygizium Arvore sempre verde,  
abundante a borda d'agua  
ou em proximidades.

Papilionaceae

- 76 Trifolieae Pequeno arbusto de mata  
proxima ou distante  
da posicao de Quindumbo



77 " em partes abundantissimas  
Exclusivo das planicies her-  
bosas, onde em extensões  
é abundantissimas.

78 Cassia Arbusto de 3 metros sem-  
pre verde, por partes abun-  
dante. Cobre-se de flores  
no tempo das chuvas,  
que nunca deixa de as-  
dar mais ou menos  
todo o anno.

As sementes torradas  
são amargas, tomadas  
como café são empregadas  
contra as febres telluricas

79 Bauhinia Pequeno arbusto vulgar,  
geral; floresce durante  
o tempo das chuvas

80 " Tão abundante como  
a antecedente

81 Amherstia Arvore que pode attingir  
proporções colossaes. Formosa

por si extensas matas, abun-  
dantes em todo o interior  
de Benyuela.

82 *Berlinia* Abundante, mas de or-  
dinario dispersa.  
*Mimosaceae.*

83 *Adenantherae* Arvore elevada, de mo-  
deiro pouco consistente;  
vulgar.



