



Instituto Superior de Agronomia

Laboratorio de Pathologia vegetal



5
Ex^{ma} Sr. amigo e Lus.

Não obstante os picnidios, que observamos principalmente nos picidos das folhas de plátano, e apresentarem na sua maioria globoso - Deprimidos e por vezes agregados, apesar dos esporulos, além de ellipticos, terem alguns a forma de clava e se manifestarem ora rectos, ora ligeiramente curvos, granulados ou gutulados, cremos poder incluir o fungo na especie já

conhecida em Portugal - Macrophoma
petiolata (Eke.) Berl. et Tölz.

Estamos convencidos que o mal
ficusia atenuado com o emprego da
calda bordaleza, porém desconfiamos
não ser praticavel semelhante trata-
mento, attachingo ao poste da arvore
mesmo fazendo uso de pulverizadores
especiais.

Porta-nos portanto, como medida
preventiva, para reduzir a dissemina-
ção dos orgaos multiplicadores da
Tulipita, o mandar proceder á apauha
das folhas caídas sobre o solo e des-
truil-as pelo fogo.

Luisa Serculhos a Replicencia

de indicações úteis, a propósito da
destruição do presente miceta, mas
como pode calcular o laboratório de
patologia vegetal encontra-se em
condições de não poder realizar as mais
insignificantes experiências, por falta
de herba adequada, que propositadamente
se lhe tem negado.

Com a mais subida consideração,
elevado apreço e verdadeira estima, seu
licença para me subreunir
seu ^{meia} V. g. admirador,
amigo e obrigado amigo

Loz. 24-V-1910

Manuel de Souza Barreiros

