

1

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
BIBLIOTECA
CONSERVADOR

Andryala Ficalhoi Nob. (Sp. nov.)

(Voisine de *A. Andryala arenaria* B. & R.)

Plante \odot , Tiges dressées ramennes de 0,10 à 0,25 c.m. de hauteur
légèrement repliées à l'insertion des feuilles radicales
Feuilles fentées floconneuses; la radicale oblongue, lancéolée obtuse, sinuée
dentée, atténuée en pétiole; les caulinaires sessiles oblongues, acu-
minées, à base arrondie cordée. Calathides moyennes, pedoncules
disposés en corymbe spiciformes. Folioles du périchine lancéolées
aigues, disposées sur deux rangs; les externes fentées lacinées
au dehors, parsemées de poils glanduleux noirs; glabres papyracées
à la partie interne; folioles internes moins velues. Répoussoir
de poils glanduleux. Ligule orangee dépassant de beaucoup
le périchine. Akinés rayés de blanc, 4 fois plus courts que
l'aigrette, celle-ci dépassant par le périchine. ~~Racine légèrement~~
~~replée au collet, à l'insertion des feuilles radicales~~

Ile Berlenga - juillet aout. 1879. J. A. Azevedo

