





~~Revisita~~ In Lusitania hanc speciem
primus detexit cl. Bruno T. Carrero
prope ^(pagam?) Villa Franca hanc procul ab urbe
Conimbrica; ex Algeria misit cl. Trabut
prope Ain Tedela in prov. Oranensi lectam.



S. Pötte le 29/1/894



Cher Monsieur,

Je vous remercie chaleureusement et sincèrement
des ~~sermons~~ ^{vœux} que vous avez exprimés pour ma
santé dans votre lettre du 20; je me trouvais
avec mal les ans passés, mais maintenant
l'état de ma santé est satisfaisant. Mais ce
que je n'ai pas reconquis encore c'est l'activité
dans les travaux de botanique; je me suis
habitué à les négliger trop ayant trouvé
d'autres occupations qui m'intéressent beaucoup.

Je n'ai jamais publié mon *Proximus macranth-*
erus, la cause en était que je restais longtemps
indécis sur la valeur spécifique de cette
forme. Aujourd'hui je la crois une espèce

assez faible, plutôt du rang d'une
sous-espèce du *B. maximus* Desf.; mais
comme il n'y existe une monographie de
cette espèce polymorphe, il est difficile
d'évaluer sainement la valeur des
formes affines p.c. du *B. macrantherus*.
Pour la publication il faudra donc pourster
en faire une espèce, avec la réserve
qu'elle rentrera peut-être un jour
dans le cadre du *B. maximus*.

Je vous envoie ci-inclus la description
de l'espèce nouvelle et vous pouvez
la publier séparément ou dans le
nouveau catalogue des Graminées que vous
projetez.

Agitez, cher Monsieur, l'assurance de mes
sentiments dévoués et amicaux.

Votre
Raskel

Bromus macrantherus Glack. n. 790.



Stems; culms circ. 50 - 70 cm altus, teres,
sub panicula scaber v. puberulus. Vaginae
ad oras pilosae; ligula 2 - 3 mm longa, retusa,
glabra, ^{dentata,} demum lacera. Laminae lineares, longe
acutatae, utrinque scaberrimae, praeterea supra
pilis raris adpersae. Panicula ovata,
laxa v. densiuscula, subnuda, 12 - 20 cm
longa, rachis scaberrima, ramis inferioribus
2^{mis} - 5^{is}, superioribus saepius solitariis,
omnibus filiformibus, ~~sub~~ patulis v. plus
minus nutantibus, modo scaberrimis modo
hirtulis, plerumque unispiculatis. Spiculae
laterales extremae breviter pedicellatae, basales
pedicellis 2 - 4 cm longis fultae, omnes lineari -
oblongae, post anthesin apice parum distatatae,
multiflorae, absque aristis circ. 2 cm longae, virides
v. leviter violaceo-suffusae. Glumae steriles
parum inaequales (12:15 - 16:19 mm longae); I^{ma}
subulato-lanceolata uninervis, II^{da} lanceolata
2 nervis, in acumen tenuissimum protractae,
carinatae, carina scabra, II^{da} II^{am} (empta

arista) aequans. Glumae fertiles lanceolatae,
12 - 15 mm longae, 5-nerves, scabro-punctatae,
infra apicem subulato - bidenticulatum aristam
emittens rectam validam scaberrimam
45 - 60 mm longam, glumam suam ergo
quaduplo plusve superantem, basi callo
~~maturo~~ maturitatis tempore obtusiusculo cica-
triceq^{ue} oblongo-elliptica notata. Palea glumâ
 $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{4}$ brevior. Lodivulae pusillae, integrae.
Samina 3, antheris magnis (6 mm longis)
anguste linearibus aereis-flavis.

Proximus B. maximo Desf., cui forsan ^{insere} sub-
species scries, dum omnes hujus speciei poly-
morphae formae notae atque monographice
dispositae ~~amplius~~ ^{sint} habentur. Inter B. maximi
varietates v. subspecies praecipue B. Jussonei
Parl. nostro B. macranthero proximus, ~~et~~
differt tamen (ut reliquae) spiculis multo
majoribus (~~non longis~~) gluma fertili circ.
3 cm longa, arista suâ non nisi duplo
superata, praecipue vero antheris minimis,
vix ultra 1 mm longis.

Obs. Cultura ~~in hortis~~ constantissimus manet.