

l'écorce d'arbre, pour savoir s'il y a lieu
d'exploiter. De même pour les Kichuia
d'Angola qui ne sont peut-être pas de K.
aficana. En outre, il faut l'herbier de
Wulstsch? Vous devriez demander des échantillons
botaniques complets de K. d'Angola.

Je vous avais demandé, dans une de mes dernières
lettres, s'il existait, en Portugal, des collections de
plantes de Timor, pourriez-vous me répondre
à ce sujet.

P.S. Je vous, à l'instant, votre lettre et
l'échantillon de E. shipsaloides. Je vous
en remercie sincèrement.

Le Santiniopsis balsamifera Engl. existe dans l'herbier
de San-Thomé; mais serait-il possible d'en recevoir des
graines, susceptibles de germer en serre?

J'ai analysé un échantillon de caoutchouc, adressé
par M. Almeida Negreiros, et obtenu par pilonnage des racines
de l'arbre de Kikongo ou Katulula dans la région
de Ginga (Angola). Savez-vous quelle est l'Apocyné produite
trice? Ce nom est appliqué par Ficalha et dans les
documents que vous m'avez adressés à la plante d'effluents.
La question est intéressante, car c'est un caoutchouc
de valeur.

Votre dévoué

F. Heier

