



Kgl. botan. Garten

Breslau, 19/6.93.

Cher Monsieur,

Ayant reçu les échantillons des Euphorbiacées que vous avez eu la bonté de m'envoyer, je vous écris sur ce sujet le suivant.

N° 134. „Bridelia". — Peut-être une Euphorbiacée, mais les fruits ne sont pas développés. Les feuilles sont opposées (!) ce qui est très - rare chez cette famille!

N° 135. „Gen. nov. aff. Costognone" — Je ne trouve pas des fleurs femelles dans le matériel envoyé. L'apparence de la plante n'est pas celle de la famille des Euphorbiacées; particulièrement je trouve des „stipulac amplisicanæ".

N° 133. Une nouvelle espèce de Cyclotemon, dont vous trouvez la description au fin de cette lettre.

N° 162. „Excoecaria". — Ce n'est pas une Excoecaria. Je n'ai pas trouvé de fleurs femelles, et il



Theo
Cyclotinus

C. Henrignesii Pax, nov. sp. (frutesc vel arbor?)

Zamniis primoribus adpresso pubescens; foliis breviter petiolatis, glaberrimi; lamina lanceolata vel oblonga, basi acuta, paullo dantim obliqua, apice subcaudato acuminata, integerrima, coriacea, ruminarii, reticulato-venosa, nitida; floribus q fasciculatis, crame pedicellatis; stylis 2, apice dilatatis, bifurcatis; fructu adpresso cinereo-pubescente

Arbor vel frutesc. Petiolis ad 10 mm longis. Folii lamina ad 10-12 cm longa, 3-4 cm lata, valde nitida. Pedicelli crassi, 1-2 cm longi.

Insula St. Thomas (- - - n^o 133) Jan m 188

Affinis *C. stipulari* Mill. Arg. Africæ occidentalis tropicae, ab illa fructu pubescente valde ab ea diversa.

est impossible de déterminer la plante. Elle appartient peut-être au genre Baccaria ?

sine h^o, "Thearois stenospedala" - Le matériel n'est pas bon, mais il me semble que vous avez raison.

Après, hésitation et confirmation, l'expression de mes sentiments devoués.

Aux.