

- KRAISS, A. 1966. Hieraciumfunde, Schwarzwald und Oberrheintal, 2. Liste.
- KÜNKELE, S. 1970. Autogame *Epipactis*-Sippen.
- LITZELMANN, E. & M. LITZELMANN. 1963. Neue Fundberichte, Südbaden.
- LUDWIG, W. 1968. Funde am Schwarzwälder Belchen.
- MÜLLER, K. 1961. Östliche Altmoränen- und Deckenschotterlandschaft Oberschwaben.
- MÜLLER, K. 1965. *Ranunculus montanus*-Gruppe, Schwäbische Alb.
- MÜLLER, Th. 1961. Neufunde, Naturschutzgebiet Untereck.
- PHILIPPI, G. 1961. Neufunde, Badisches Oberrheingebiet.
- PHILIPPI, G. 1971. Nordbadische Rheinebene, Artenliste.
- PHILIPPI, G. & V. WIRTH, 1970. Neufunde aus Südbaden.
- REHDER, H. 1964. Wärmestufen, geologische Unterlage und Verbreitung einzelner Arten, Südostschwarzwald.
- SEBALD, O. 1965. *Carex strigosa*, mittleres Neckargebiet.
- SEBALD, O. 1966. *Carex hartmanni* und *C. buxbaumii*, Nordwürttemberg.
- SEBALD, O. & S. SEYBOLD. 1969. Beiträge Floristik Südwestdeutschland I.
- SEBALD, O., S. SEYBOLD & W. WREDE. 1966. *Carex caespitosa*.
- SEYBOLD, S. 1966. *Viscum*, Neufunde im mittleren Neckarland.
- SEYBOLD, S., O. SEBALD & C. P. HERRN. 1971. Beiträge Floristik SW-Deutschland II.
- WILLDER, K. H. 1970. Binnendünen und Kiefernheiden um Heidelberg (und Mannheim), Artenliste.
- WILMANN, O. & S. RUPP. 1966. *Silene rupestris*, Schwarzwald.
- WINTERHOFF, W. & M. HUBER. 1967. Bemerkenswerte Funde, Oberschwaben.

Bayern

- ARNTZENIUS, C. L., C. R. ARNTZENIUS, K. KRONBERGER, J. LANDGRAF & K. F. REHNELT. 1961/1963. Floristische Aufzeichnungen, Umgebung Bayreuths.
- AUVERA, H. 1962. Klosterforst (Würzburg) und Randgebiete, Artenliste.
- AUVERA, H. 1966. Rebhügel mittleres Maingebiet, Artenliste.
- BRESINSKY, A. 1965. Circumalpines Florenelement im Alpenvorland.

- BRESINSKY, A. & J. GRAU. 1963. *Myosotis rehsteineri* am Starnberger See.
- DAMBOLDT, J. 1962. *Lycopodium issleri*.
- DÖRR, E. 1963. *Geranium sibiricum*.
- DÖRR, E. 1966. *Erigeron atticus*.
- DÖRR, E. 1969. *Geranium phaeum* ssp. *lividum*.
- DÖRR, E. 1962. ff. Ergebnisse der Allgäu-Floristik.
- DÖRR, E., L. MÜLLER & A. SCHROPPEL. 1968. Moore südlich Sulzschneid, Artenliste.
- DOPPELBAUR, H. 1963. *Fragaria pennsylvanica*.
- EINHELLINGER, A. 1962. Ismaninger Speicherseen.
- ENGLERT, K. 1970. *Matteuccia* und *Equisetum pratense* in Südbayern.
- ERTL, U. 1968. Schönbusch (Aschaffenburg), Gehölze.
- ESCHELMÜLLER, A. 1966. Rundblättrige Enziane.
- ESCHELMÜLLER, A. 1968. *Dryopteris* × *tavelii*.
- ESCHELMÜLLER, A. 1970, 1971. *Polypodium interjectum*.
- ESCHELMÜLLER, A. 1971. *Polypodium* × *mantoniae*.
- FELDNER, R., W. GRÖBL & H. MAYER. 1965. *Juniperus sabina*, Ammergauer Berge.
- GAUCKLER, K. 1961/63. *Carex alba* und *Calamagrostis villosa*, nördliche Frankenalb.
- GAUCKLER, K. 1962. Flora des Börstig bei Hallstadt (Bamberg).
- GAUCKLER, K. 1962. *Astragalus arenarius* in Franken.
- GAUCKLER, K. 1964. *Linum anglicum*.
- GAUCKLER, K. 1964. *Arabis turrata* in Franken.
- GAUCKLER, K. 1965. *Coronilla emerus* in der Frankenalb.
- GAUCKLER, K. 1966. *Festuca amethystea*.
- GAUCKLER, K. 1970. Einstrahlungen der Alpenflora in der Fränkischen Alb.
- GRAU, J. 1964. *Myosotis decumbens* ssp. *decumbens*.
- HACKEL, H. 1970. *Peplis portula*.
- HERTEL, H. & K. P. BUTTLER. 1966. *Pulsatilla patens*, zweiter Fundort in Niederbayern.
- HIEMEYER, F. 1966. *Salvia glutinosa* um Augsburg.
- HIEMEYER, F. 1966. Um Lech und Wertach.
- HIEMEYER, F. 1967. *Epipactis sessilifolia* etc. um Augsburg.
- HIEMEYER, F. 1969. Floristische Mitteilungen, Umgebung Augsburgs.
- HIEMEYER, F. 1969. Heidefläche an der Wertach, Artenliste.
- HÖLLER, J. 1964. *Carex caespitosa*.
- HOFMANN, W. 1962. *Sorbus domestica* in Franken.

- KELLNER, K. 1966. *Glyceria declinata*, Bayerischer Wald.
- KÜNNE, H. 1969. Einige pflanzengeographische Leitpflanzen, Frankenalb.
- LANG, H. 1961/63. Seggen Hofs und der näheren Umgebung.
- LÜTTGE, M. 1964. *Pedicularis sceptrum-carolinum*, Augsburger Raum.
- LÜTTGE, M. 1966. Besonderheiten um Augsburg.
- LÜTTGE, M. 1967. Königsbrunner Heide.
- LUTZ, J. L. & H. SCHMEIDL. 1966. *Kalmia angustifolia*, südliche Chiemseemoore.
- MERGENTHALER, O. 1964. Serpentinfarne, mittlere Oberpfalz.
- MERGENTHALER, O. 1966. Serpentinfarne, Oberpfälzer Wald.
- MERXMÜLLER, H. 1970. *Danthonia alpina*, Garchinger Heide.
- MÜLLER, L. 1966. Kemptener Wald.
- NOWOTNY, E. 1964. Augsburger Raum.
- NOWOTNY, E. 1968. *Pedicularis sceptrum-carolinum*, Wertachauen.
- OBERWINKLER, F. & W. SAUER. 1970. *Vicia oroboides*, Chiemgauer Alpen.
- OBLINGER, H. 1969. *Stipa bavarica*, Finkenstein.
- OBLINGER, H. 1969. *Taxus baccata*, Bayerisch-Schwaben.
- PODLECH, D. & H. VOLLRATH. 1963. *Primula veris* ssp. *canescens*.
- POELT, J. 1963. *Asarum ibericum*.
- REINHARDT, R. 1966. Orchideen um Heiligenstadt.
- ROSSKOPF, G. 1964. *Stellaria crassifolia*.
- SCHIMMITAT, J. 1969. *Veronica fruticulosa*.
- SCHÖNFELDER, R. 1968. *Himantoglossum hircinum*, Nordbayern.
- SCHÖNFELDER, R. 1970. Südwestliche Einstrahlungen in die Flora Nordbayerns.
- SCHUSTER, E. 1961. Eschenloh (Buchloe), Artenliste.
- SCHUSTER, E. 1961. Wiedergeltinger Wäldchen, Artenliste.
- VOLLRATH, H. 1961/63. Vornbacher Enge.
- VOLLRATH, H. 1966. *Gentiana pneumonanthe*, *Serratula tinctoria*, Oberpfälzer Wald.
- VOLLRATH, H. & O. MERGENTHALER. 1966. *Carex buekii*.
- WALTER, H. 1966. Beiträge Flora von Bamberg. Raum Heiligenstadt.
- ZIELONKOWSKI, W. 1967/68. *Callitriche obtusangula*.

Berlin

- KONCZAK, P., H. SUKOPP & E. WEINERT, 1968. *Urtica kioviensis*.
- MEYER, D. E. 1966. *Botrychium lunaria*, *matricariifolium*, *multifidum*, *Ophioglossum vulgare*.

- SCHOLZ, H. 1966. *Oxalis dillenii*.
SUKOPP, H. 1966. Verluste der Berliner Flora, letzte hundert Jahre.
SUKOPP, H. 1970. *Sagittaria latifolia*.
SUKOPP, H. (mit W. KUNICK), 1968. Veränderungen des Röhrichbestandes der Berliner Havel 1962-1967.

Bremen

- KÜSEL, R. 1969. Bemerkenswerte Ergebnisse.

Hessen

- BUTTLER, K. P. 1964. *Orchis elegans*.
DERSCH, G. 1965. *Callitriche*, Nordhessen.
GRAFFMANN, F. 1964. Änderungen der Flora um Herborn seit dem 18. Jahrhundert.
GROSSMANN, A. 1969. Neue Beiträge zur Flora der Rhön und des Fuldaer Landes.
GROSSMANN, A. 1970. *Asplenium adiantum-nigrum*, Dörnigheim.
GROSSMANN, H. 1968. Frühlingsgeophyten, rheinhessische Weinberge.
GROSSMANN, H. 1969. *Iris*.
GRÜNEWALD, W. 1963. Neufunde, Nordosthessen.
HUPKE, H. 1960. Adventivpflanzen, Kreis Alsfeld 1946-1959.
JOST, O. 1969. «Zeller Loch» bei Fulda, Artenliste der Blütenpflanzen.
KALHEBER, H. & H. KALHEBER. 1966. *Scilla bifolia*, mittleres Lahntal.
KORNECK, D. 1966. *Orobanche amethystea*, Rheinhessen.
LÖTSCHERT, W. 1964. *Carex binervis*, Unterwesterwald.
LUDWIG, W. 1961. *Cochlearia officinalis* s. str. und *C. pyrenaica*.
LUDWIG, W. 1962. Neues Fundorts-Verzeichnis, Teil 1.
LUDWIG, W. 1963. Floristische Notizen, besonders Werratal.
LUDWIG, W. 1965. *Potamogeton panormitanus*.
LUDWIG, W. 1965. *Orchis pallens*, ältere Funde und Angaben.
LUDWIG, W. 1966. Neues Fundorts-Verzeichnis, Teil 2.
LUDWIG, W. 1967. *Ceratophyllum submersum*, besonders Nordhessen.
LUDWIG, W. 1968. *Lathyrus nissolia*.
LUDWIG, W. 1968. *Aphanes microcarpa*.
LUDWIG, W. 1969. *Allium narcissiflorum* hort. non Vill.
LUDWIG, W. 1970. *Callitriche obtusangula*.
LUDWIG, W. 1970. *Alyssum murale*.
LUDWIG, W. 1971. *Cardamine parviflora*.

- LUDWIG, W. & I. LENSKE. 1969. Zur Kenntnis der Hessischen Flora.
- MALENDE, B. 1961. Botanische Beiträge in den Berichten der Wetter-
auischen Gesellschaft und ergänzende Übersicht über neuere
floristische Beobachtungen.
- MARQUARDT, F. 1965. *Amaranthus blitoides*, Darmstadt.
- MARQUARDT, F. 1967. *Oxalis dillenii*, Darmstadt.
- MARQUARDT, F. 1971. Neuere Beobachtungen, insbesondere nördl.
Bergstrasse.
- MEYER, W. 1965. Lycopodien bei Rüscheld.
- NIESCHALK, A. & Ch. NIESCHALK, 1962. Neufunde, Nordhessen.
- NIESCHALK, A. & Ch. NIESCHALK. 1963. *Linum leonii*.
- NIESCHALK, A. & Ch. NIESCHALK, 1968. *Orobanche libanotidis*.
- NIESCHALK, A. & Ch. NIESCHALK. 1970. Autogame *Epipactis*-Arten.
- OESAU, A. 1970. *Lallemantia peltata* und *Parentucellia viscosa*, Mainz.
- PATZKE, E. 1969. *Festuca pallens* und *F. stricta* ssp. *duvalii*, Bestim-
mungsanleitung.
- POHL, K. 1966. *Phyllitis scolopendrium*, Wetzlar.
- RICHTER, H. 1966. Ergänzungen zur Flora des Dillkreises.
- RUBE, G. & K. HEISE. 1964. Neufunde, Kreis Rotenburg/F.
- RUBE, G. & K. HEISE. 1968. *Orchis tridentata*, Kreis Rotenburg/F.
- RUBE, G. & K. HEISE. 1970. Beiträge, Nordosthessen.
- SCHÄFER, A. 1963. Pflanzenwelt Ludwigshafen am Rhein.
- SCHÄFER, A. 1965. Adventivpflanzen, Ludwigshafen am Rhein.
- SCHÄFER, A. 1969. Offenbacher Güterbahnhof, Artenliste.
- SCHNEIDER, W. 1971. *Beta trigyna*, Kreis Wetzlar.
- SEIBIG, A. 1965. Lycopodien, Nordspessart, Südvogelsberg.
- SEIBIG, A. 1967. *Trifolium resupinatum*.
- SEIBIG, A. 1970. *Huperzia selago*, Nordspessart.
- STREITZ, H. 1968. *Carex pilosa*, Oberhessen.
- TRENTEPOHL, M. 1965. Wiesenpflanzen Staatsforst Kranichstein,
Artenliste.
- ULRICH, H. 1962. Floristische Notizen, Kreise Rotenburg/F.,
Eschwege, Melsungen, Hersfeld.
- WINTERHOFF, W. 1967. Werratal.
- WINTERHOFF, W. 1969. *Ranunculus nemorosus* ssp. *serpens*.
- WITTENBERGER, G. 1967/68. Floristische Notizen, Offenbach.
- WITTENBERGER, W. & G. WITTENBERGER. 1968. *Gagea pomorica*.
- WITTENBERGER, W. 1969, 1970. Bemerkenswerte Funde, Offenbach.
- WOIKE, S. 1963. *Coleanthus subtilis*.

- ZISCHKA, W. & T. ZISCHKA. 1966. *Physocaulis nodosus*.
ZISCHKA, W. & T. ZISCHKA. 1967. Mitteilungen aus dem Rheingau.

Niedersachsen

- FOERSTER, E. 1968. *Polygala*.
FOERSTER, E. 1969. Wasserehrenpreis-Gruppe.
FOERSTER, E. 1969. *Phleum pratense*-*P. nodosum*.
FOERSTER, E. 1969. *Carex otrubae*-*C. vulpina*.
FOERSTER, E. 1969. *Juncus bufonius*-Gruppe.
FOERSTER, E. 1970. *Carex muricata*-Gruppe.
FUCHS, H. 1966. Neufunde, Göttingen.
GERLACH, A. & K. WÖLDECKE. 1968. *Cotoneaster integerrimus*, Neufunde.
HAEUPLER, H. 1968. Kleinblütige Hornkräuter.
HAEUPLER, H. 1968. *Trifolium alpestre*-Gruppe (steril).
HAEUPLER, H. 1968. *Bidens frondosus*.
HAEUPLER, H. 1969. Neufunde etc., 1. Folge.
HAEUPLER, H. 1969. *Gagea*-Arten.
HAEUPLER, H. 1969. *Potentillae verna*les.
HAEUPLER, H. 1969. *Veronica agrestis*-Gruppe.
HAEUPLER, H. 1969. *Epilobium adenocaulon*, Südniedersachsen.
HAEUPLER, H. 1969. Zur Flora des südöstlichen Niedersachsen.
HAEUPLER, H. 1971. *Glyceria striata*.
HAEUPLER, H. & K. WÖLDECKE. 1971. Eilenriede, Gefäßpflanzen.
HELDT, E. 1961. *Trollius* bei Borgentreich und Körbecke.
HUNDT, R. 1961. *Conopodium denudatum*, Westharz.
KOSSEL, H. & K. STRASBURGER. 1966. Bemerkungen zur Flora, Kr. Fallingb. ostel.
KRAUSS, G. 1969. *Chenopodium bonus-henricus*.
KÜSEL, H. 1968. *Eragrostis poaeoides*.
LEWEJOHANN, K. 1968. *Carex aquatilis*-*Carex gracilis*.
LEWEJOHANN, K. 1968. *Glyceria*, besonders *G. declinata*.
LEWEJOHANN, K. 1969. *Linum leonii*.
LEWEJOHANN, K. 1971. *Orobanche* im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Gebieten.
LEWEJOHANN, K. & H. LIENENBECKER. 1969. *Pilularia globulifera* im Naturschutzgebiet Barrelpaule.
LOSERT, H. 1969. *Myrica gale*, Lüneburg.
MANG, F. 1964. *Rumex triangulivalvis*, Elbemündung.
PATZKE, E. 1968. *Festuca ovina* s. l.

- PRILOP, H. 1962. *Rhamnus cathartica*.
RÜHL, A. 1971. Weser-Leinebergland.
RUNGE, F. 1968. *Cotula coronopifolia*, Langeoog.
SCHERNER, E. R. 1967. Wolfsburg.
SCHIEFERDECKER, K. 1964. Hildesheim.
SCHNEDLER, W. 1971. Lüneburger Heide.
SCHOLZ, H. 1969. *Polygonum minus* f. *latifolium*-P. mite.
TÜXEN, R. & W. JAHNS. 1967. *Ranunculus hederaceus*-*Corydalis claviculata*, Mittelwesergebiet.
ULLRICH, H. 1964. *Botrychium matricariaefolium*.
WAGENITZ, G. 1971. *Filago*.
WEBER, H. E. 1970. *Rubus*.
WILLERDING, U. 1968. *Taxus baccata*, Plesswald bei Göttingen.
WILLERDING, U. 1969. *Salix*-Bestimmung nach Blättern, Südniedersachsen.
WÖLDECKE, K. 1968. *Equisetum variegatum*.-*E. pratense*.
WÖLDECKE, K. 1968. *Carex brizoides*, Südniedersachsen.
WÖLDECKE, K. 1969. *Ranunculus nemorosus* ssp. *serpens*.

Nordrhein-Westfalen

- ADRIAN, W. & F. KOPPE. 1965. Rötliche Sommerwurz, Bielefeld.
ANT, H. 1966. *Potamogeton zizii*.
ANT, H. 1970. *Vallisneria spiralis*.
ANT, H. & H. DIEKJOEST. 1970. *Elatine alsinastrum*.
BÖTTCHER, H. 1968. *Eragrostis poaeoides*, neuer Fundort.
BÖTTCHER, H. 1970. *Parietaria officinalis*.
BORNKAMM, R. 1968. *Epilobium dodonaei*, Köln.
BRINKMANN, D. & H. BRINKMANN. 1968. *Equisetum pratense*, Eggegebirge.
BURRICHTER, E. 1969. *Ranunculus hololeucus*, Naturschutzgebiet «Witte Venn».
DIEKJOEST, H. 1967. *Pulmonaria officinalis* und *P. obscura*.
DRÜKE, H. 1969. Orchideen, Naturschutzgebiete um Beckum.
FELLENBERG, W. O. 1967. *Calystegia sepium* ssp. *pulchra*, Sauerland.
FELLENBERG, W. O. 1970. *Helianthemum*, Sauerland.
FELLENBERG, W. O. 1970. *Calystegia sepium* ssp. *pulchra*, Verbreitung im Sauerland.
FOERSTER, E. 1968. *Dactylorhiza majalis*, *D. praetermissa*.
GRAEBNER, P. 1971. *Lathraea squamaria* im Paderborner Raum.
HORSTMAYER, C. & D. HORSTMAYER. 1967. Salzpflanzen am Huckberg.

- HÜLBUSCH, K. H. 1970. *Carex pulicaris* bei Eisbergen.
- HÜNERBEIN, K. 1968. *Calystegia sepium* ssp. *pulchra*, kritischer Beitrag.
- IMMEL, W. 1966. *Botrychium matricariaefolium* im Siegerland.
- KITLITZ, A. 1966. *Hepatica nobilis*, nordwestlichste Standorte.
- KOPPE, F. 1963. Halophyten, Salzkotten, 1912-1962.
- KOPPE, F. 1969. Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen.
- LANGE, H. 1961. *Rosa stylosa*.
- LANGE, H. 1962. Wildrosen.
- LEWEJOHANN, K. 1964. Neue Funde, Stockberg bei Ottbergen.
- NEIDHARDT, H. 1962. *Potentilla collina*.
- NIESCHALK, A. 1963. *Dryopteris* × *tavelii*.
- RUNGE, F. 1967. Florenänderung, Naturschutzgebiet «Heiliges Meer».
- RUNGE, F. 1969. *Veronica filiformis*.
- RÜTHER, F. 1970. *Phyllitis scolopendrium*, Schwalenberger Wald.
- SAKAUTZKY, H. 1965. *Stratiotes aloides*, obere Ems.
- SAVELSBERGH, E. 1970. Regierungsbezirk Aachen und angrenzende Gebiete.
- SCHOLZ, G. 1962. *Lycopodium complanatum* ssp. *anceps*, Kreis Lemgo.
- SCHOLZ, H. 1961. *Calystegia silvatica*, ergänzende Mitteilung.
- SCHRÖDER, E. 1965. *Huperzia selago*, Neufunde im Sauerland.
- SCHROEDER, F. G. 1966. *Tulipa silvestris* und *Staphylea pinnata* bei Nienberge.
- SCHUMACHER, A. 1971. Farnreiche Halde, Sauerland.
- SERAPHIM, E. T. 1967. *Equisetum telmateia*, Ravensberger und Lipper Land.
- STICHT, W. 1967. *Pulsatilla vulgaris*, südöstliches Westfalen.
- TÜXEN, R. & A. WIEMANN. 1970. *Lathraea squamaria*, Lippisches Bergland.
- WATTENDORFF, J. 1961. *Moldavica parviflora* adventiv in der Münsterschen Trümmerflora 1954.
- WIEFELSPÜTZ, W. 1962. *Ophrys apifera*, neue Funde.
- WIEFELSPÜTZ, W. 1964. *Orchis* × *vilmsii*, neuer Wuchsort.
- WIEFELSPÜTZ, W. 1968. *Dactylorhiza sphagnicola*.

Rheinland-Pfalz

- ANT, H. 1969. *Ceratophyllum submersum*, weiterer Fundpunkt.
- BERLIN, A. & H. HOFFMANN. 1970. Neu- und Wiederfunde, östliche Eifel.

- HARD, G. 1963. Neufunde im Bliesgau.
HARTL, D. & G. DUBITZKY. 1971. Mainzer Raum, bemerkenswerte Pflanzen.
LANG, W. 1969, 1970. *Castanea sativa*.
NÜCHEL, G. 1971. Umgebung von Koblenz, bemerkenswerte Funde.
SCHULZE, G. 1965. *Osmunda regalis*.
SCHULZE, G. 1967, 1970. *Asplenium billotii*.
SCHUMANN, F. 1968. Die letzten Wildreben.

Saarland

- HAFFNER, P. 1969. Orchideen.

Schleswig-Holstein

- AXT, K. 1970. *Claytonia perfoliata*, Kreis Rendsburg.
CHRISTENSEN, E. 1971. *Campanula glomerata*-*Viola hirta*.
CHRISTIANSEN, W., F. KAHL, H. ROGGE & A. STANGE. 1964. Floristischer Vergleich dreier Wälder.
EIGNER, J. & A. EIGNER. 1971. *Anemone nemorosa*-*A. ranunculoides*.
FOERSTER, E. 1971. *Senecio aquaticus*-*S. barbareaefolius*.
FRÖHNER, S. 1965. *Alchemilla*.
GLAHN, H. v. 1970. *Tussilago-Petasites*.
GRAFFMANN, F. & F. LEHMANN. 1963. Neufunde, Sylt.
JANSEN, W. 1971. *Asplenium ruta-muraria*.
JENSEN, J. 1969. Fabaceen mit dreiteilig zusammengesetzten Blättern, Bestimmung im blütenlosen Zustand.
KAHL, F. 1969. *Platanthera*.
KROLL, H. 1970. *Calystegia*.
KROLL, H. 1970. *Malva* und *Althaea*.
LANGER, G. 1966. *Carex reichenbachii* und *C. pendula*.
MÖLLER, H. 1971. Heuckenlock, Artenliste.
NIKOLEIZIG, K. 1964. Gefäßpflanzen des Oldesloer Kurparks.
NOTHDURFT, H. 1970. Floristische Beiträge.
RAABE, E. W. 1969. Fabaceen, krautig, mehrfiedrig; Bestimmung im blütenlosen Zustand.
RAABE, E. W. 1969. Kleinblütige Cerastien.
RAABE, E. W. 1970. *Juncus maritimus*, Jütische Westküste.
RAABE, E. W. 1970. *Parapholis strigosa* — *P. incurva*.
RAABE, E. W. 1970. Fragarien.



- RAABE, E. W. 1970. *Ajuga*.
 RAABE, E. W. 1970. *Trifolium micranthum*.
 RAABE, E. W. 1971. *Arctium minus melanocephalus*.
 RAABE, E. W. 1971. *Verbascum*.
 RAABE, E. W. 1971. *Carex muricata*-Gruppe.
 RAABE, E. W. & U. KRESKEN. 1970. *Agrostemma*, *Melandrium* und *Silene* (behaart), Bestimmung nach vegetativen Merkmalen.
 RAABE, E. W. & S. WOAS. 1970. *Lepidium*.
 SCHREITLING, K. Th. 1968. Laubbäume im Winter.
 WEBER, H. E. 1970. *Crataegus*,
 WEBER, H. E. 1970. *Epilobium*, Bestimmung nach vegetativen Merkmalen.
 WEBER, H. E. 1970. *Stellaria*, Unterscheidung im blütenlosen Zustand.
 WEBER, H. E. 1970. *Polygonum hydropiper*, *P. mite*, *P. minus*.

Adventivfloren

- DÖRR, E. 1962 ff. Zahlreiche Angaben aus dem Allgäu.
 HUPKE, H. 1960. Kreis Alsfeld (Oberhessen).
 KÜSEL, H. 1969. Angaben aus Bremen.
 RUNGE, F. 1965. Kanalhäfen in Münster.
 SCHÄFER, A. 1965. Angaben aus Ludwigshafen a. Rhein.
 SUKOPP, H. 1962. Adventive in natürlichen Pflanzengesellschaften Mitteleuropas.

9. VERBREITUNGSKARTEN

Allgemeine Arbeiten zur floristischen Kartierung

- BRESINSKY, A. 1966. Neue Methoden zur floristischen Erforschung Bayerns.
 EHRENDORFER, F. & U. HAMANN. 1965. Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa.
 ELLENBERG, H., H. HAEUPLER & U. HAMANN. 1968. Arbeitsanleitung für die Kartierung Mitteleuropas (Ausgabe für die BRD).
 HAEUPLER, H. 1970. Vorschläge zur Abgrenzung der Höhenstufen der Vegetation im Rahmen der Mitteleuropakartierung.
 RAABE, E. W. 1970. Stand der Kartierung in Schleswig-Holstein.

Verbreitungskarten, die über einzelne Bundesländer hinausgehen

- BACHMAIER, F. 1966. *Betula nana*, Europa.
 BACHTHALER, G. 1965. *Avena fatua*, Bundesrepublik.

- BRESINSKY, A. 1965. Circumalpine Arten im nördlichen Alpenvorland.
COOK, C. D. K. 1966. *Ranunculus* subgenus *Batrachium*, Gesamtverbreitung der Arten.
GÖSSMANN, A. 1962. *Cytisus*-Arten in Süddeutschland.
GÖTZ, E. 1967. *Aconitum variegatum*-Gruppe, Europa.
LANG, W. 1969, 1970. *Castanea sativa*, Deutschland.
REESE, G. 1963. *Ruppia* und *Zannichellia*, Deutschland.
SCHOLZ, H. 1971. *Calamagrostis phragmitoides*, Mitteleuropa.
SEITZ, W. 1969. *Aconitum napellus*-Gruppe, Europa.
TÜXEN, R. & W. JAHNS. 1967. *Ranunculus hederaceus* und *Corydalis claviculata*, Mittelweser.
WARNCKE, K. 1964. *Aconitum lycoctonum*-Gruppe, Europa.
WIEFELSPÜTZ, W. 1970. Allogame *Epipactis*-Arten, Europa.
WITTENBERGER, G. 1969. *Gagea pomeranica*, Mitteleuropa.
WOIKE, S. 1969. *Coleanthus subtilis*, Europa.

Verbreitungskarten für das Gebiet einzelner Bundesländer

Baden-Württemberg

- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE. 1971. *Spiranthes spiralis*.
BOGENRIEDER, A. & O. WILMANNNS. 1968. Pflanzen schneegeprägter Standorte, Feldberg (Schwarzwald).
BRIELMAIER, G. W. & S. KÜNKELE. 1969. *Hammarbya paludosa*.
BRIELMAIER, G. W. & S. KÜNKELE. 1970. *Spiranthes aestivalis*.
GÖRS, S. 1968. *Aldrovanda vesiculosa*.
GRÜNINGER, W. 1967. *Melica picta*.
PHILIPPI, G. 1969. *Scirpus*-Arten im Oberrheingebiet.
PHILIPPI, G. 1969. Arten von Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften im Oberrheingebiet.
REHDER, H. 1964. Südostschwarzwald, zahlreiche Arten.
SEYBOLD, S. 1968, 1969. Flora von Stuttgart, verschiedene Arten.
SEBALD, O. & S. SEYBOLD. 1969, 1971. Beiträge zur Floristik Südwestdeutschlands I, II, zahlreiche Karten.
WILMANNNS, O. & S. RUPP. 1966. Alpine Felsspaltenpflanzen, Schwäbische Alb.
WINTERHOFF, W. & M. HUBER. 1967. Pflanzengeographisch bemerkenswerte Arten in Oberschwaben (*Laserpitium prutenicum*, *Allium scorodoprasum*, *Cochlearia officinalis* und *pyrenaica*).
WINTERHOFF, W. 1971. *Carex caespitosa*, Schwäbische Alb.

Bayern

- BACHMAIER, F. 1966. *Betula nana*.
DAMBOLDT, J. 1964. *Asplenium trichomanes*.
ESCHELMÜLLER, A. 1966. *Dryopteris* × *tavelii*, Allgäu.
FELDNER, R., W. GRÖBL & H. MAYER. 1965. *Juniperus sabina*, Ammergauer Berge.
GAUCKLER, K. 1961/63. *Carex alba* und *Calamagrostis villosa*, nördliche Frankenalb.
GAUCKLER, K. 1962. *Astragalus arenarius*, Franken.
GAUCKLER, K. 1964. *Arabis turrita*, Franken.
GAUCKLER, K. 1965. *Coronilla emerus*, Frankenalb.
GAUCKLER, K. 1966. *Festuca amethystea* u. a., Nordbayern.
GAUCKLER, K. 1970. Alpenflanzen, Fränkische Alb.
GOTTHARD, W. 1965. *Pulsatilla vulgaris* im Ries.
HÖLLER, J. 1964. *Carex caespitosa*.
HOFMANN, W. 1964/65. Arten aus Laubwaldgesellschaften, Fränkische Platte.
KIES, E. 1969. Montane Pflanzen, Nordbayern.
KÜNNE, H. 1969. Pflanzengeographische Leitpflanzen, Frankenalb.
MERGENTHALER, O. 1966. Serpentinfarne, Oberpfälzer Wald.
MERGENTHALER, O. 1966, 1970, 1971. Farne und Blütenpflanzen im Grossraum Regensburg. Zahlreiche Karten.
OBERWINKLER, F. & W. SAUER. 1970. *Vicia oroboides*.
OBLINGER, H. 1969. *Taxus baccata*, Bayerisch-Schwaben.
PETERMANN, R. 1970. Arten montaner Buchenwälder, Alpenvorland.
PFADENHAUER, J. 1969. Beitrag zur floristischen Kartierung (5 Karten).
PFADENHAUER, J. 1969. Ausgewählte Arten im bayerischen Alpenvorland und in den bayerischen Alpen.
SCHÖNFELDER, R. 1968. *Himantoglossum hircinum*, Nordbayern.
SCHÖNFELDER, R. 1970. Südwestliche Einstrahlungen in die Flora Nordbayerns.
VOLLRATH, H. & O. MERGENTHALER. 1966. *Carex buckii*, *vratislaviensis*, *ligniciensis*.
ZIELONKOWSKI, W. 1967/68. *Callitriche obtusangula*.

Hessen

- KALHEBER, H. & H. KALHEBER. 1966. *Scilla bifolia*, mittleres Lahntal.
KORNECK, D. 1969. *Sclerochloa dura*, Rheinhessen.

- PATZKE, E. 1969. *Festuca*-Sippen, nördliches Rheingebiet.
RUBE, G. & K. HEISE. 1968. *Orchis tridentata*, Kreis Rotenburg/Fulda.
SEIBIG, A. 1965. *Lycopodium*, Nordspessart und Südvogelsberg.
STREITZ, H. 1968. *Carex pilosa*, Oberhessen.

Niedersachsen

- HAEUPLER, H. 1968. Kleinblütige Hornkräuter.
HAEUPLER, H. 1969. *Gagea*, südliches Niedersachsen.
KRAUSS, G. 1969. *Chenopodium bonus-henricus*, Solling-Warburger Börde-Kaufunger Wald.
LEWEJOHANN, K. 1969. *Linum leonii*, Südniedersachsen.
LOSERT, H. 1969. *Myrica gale*, Lüneburg.
PRILOP, H. 1962. *Rhamnus cathartica*.
WEIHE, K. v. & G. REESE. 1968. *Deschampsia wibeliana*.
WÖLDECKE, K. 1968. *Carex brizoides*, Südniedersachsen.

Nordrhein-Westfalen

- HÜNERBEIN, K. 1969. Rosablütige *Calystegia*, Westfalen.

Rheinland-Pfalz

- LANG, W. 1969, 1970. *Castanea sativa*.
SCHULZE, G. 1965. *Osmunda regalis*.

Schleswig-Holstein

- CHRISTENSEN, E. 1971. *Campanula glomerata*, *Viola hirta*.
FRAHM, G. 1971. *Puccinellia maritima*.
JANSEN, W. 1971. *Asplenium ruta-muraria*.
KAHL, F. 1969. *Platanthera*.
MÖLLER, H. 1971. *Aster salignus*, *Senecio fluviatilis*.
PIONTKOWSKI, H. U. 1970. Arten des «Atlantischen Klimakeils».
RAABE, E. W. 1970. *Parapholis strigosa*.
RAABE, E. W. 1970. *Ajuga genevensis*.
RAABE, E. W. 1970. *Trifolium micranthum*.
RAABE, E. W. 1971. *Primula acaulis*.
RAABE, E. W. & H. USINGER. 1970. *Equisetum pratense*.

10. SIPPEN- UND FLORENGESCHICHTLICHE ARBEITEN

HISTORISCHE STUDIEN ZU EINZELNEN SIPPEN UND ZUM FLORENWANDEL IN JÜNGERER ZEIT

- DÖRR, E. 1968. Wandlungen der Flora Südschwabens.
- GRAFFMANN, F. 1964. Verschwundene und neue Arten in der Flora im Gebiet um Herborn und im angrenzenden Westerwald seit dem 18. Jahrhundert.
- HESMER, H. & F. G. SCHROEDER. 1963. Waldzusammensetzung und Waldbehandlung im Niedersächsischen Tiefland bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
- KNAPP, R. 1969. Änderungen in der Vegetation hessischer Gebirge in den letzten Jahrzehnten.
- KNÖRZER, K. H. 1963. Pflanzenwanderungen am Niederrhein.
- LANG, G. 1968. Vegetationsänderungen am Bodenseeuferr in den letzten hundert Jahren.
- LANGE, E. 1968. *Xanthium strumarium* in Mitteleuropa.
- RUNGE, F. 1953. Änderungen der Flora Baltrums in den letzten 80 Jahren.
- SACHS, F. 1961. Veränderungen in der Pflanzenwelt des Landkreises Buchen seit 1904.
- SCHOLZ, H. 1965. *Lolium remotum* als Serradella-Unkraut.
- SCHULTZE-MOTEL, J. & J. KRUSE. 1965. Spelz und andere Kulturpflanzen und Unkräuter in der frühen Eisenzeit.
- SUKOPP, H. 1966. Verluste der Berliner Flora in den letzten 100 Jahren.
- WACHTER, H. 1965. Einführung von Lärchen aus Nordamerika im 18. Jahrhundert.
- WEIN, K. 1962. Geschichte von *Rubus idaeus* var. *leucocarpus*.
- WEIN, K. 1963. Einführungsgeschichte von *Helianthus tuberosus*.
- WEIN, K. 1964. Geschichte des Rettichs und des Radieschens.
- WILLERDING, U. 1968. Beiträge zur Geschichte der Eibe.

Auswahl wichtigerer floren- und vegetationsgeschichtlicher Arbeiten

- BASTIN, B. 1968. Pflanzengeographische Probleme der offenen Vegetation Europas während der letzten Eiszeit.
- BERTSCH, A. 1961. Spätglaziale Vegetationsgeschichte Südwestdeutschlands.
- FRENZEL, B. 1959/60. Vegetations- und Landschaftszonen Nord-Eurasiens (letzte Eiszeit und postglaziale Wärmezeit).

- FRENZEL, B. 1968. Grundzüge der pleistozänen Vegetationsgeschichte Nord-Eurasiens.
- FRENZEL, B. 1968. Stand und Aufgaben der vegetationsgeschichtlichen Forschung in Nord-Eurasien.
- LANGER, H. 1962. Waldgeschichte und Waldgesellschaften Süddeutschlands.
- MAYER, H. 1966. Waldgeschichte des Berchtesgadener Landes.
- REHAGEN, H. W. 1964. Spät- und postglaziale Vegetationsgeschichte des Niederrheingebietes.
- TRAUTMANN, W. 1962. Nachwärmezeitliche Waldgeschichte am Nordwestrand der Eifel.
- TRAUTMANN, W. 1969. Geschichte des Eichen-Hainbuchenwaldes im Münsterland.
- ZOLLER, H. 1968. Einfluß postglazialer Klimaschwankungen auf die Waldentwicklung Mitteleuropas und der Alpen.

11. AUS DER FLORA DER BUNDESREPUBLIK ZU STREICHENDE ANGABEN

Erloschene arten

- Astragalus onobrychis* L. (MERXMÜLLER, 1969).
- Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers. (MERXMÜLLER, 1965).
- Euphorbia villosa* W. & K. ex Willd. (POLATSCHKE, 1971).
- ? *Marsilea quadrifolia* L. (MERXMÜLLER, 1965, PHILIPPI, 1969).
- Paeonia mascula* (L.) Miller ssp. *mascula* (MERXMÜLLER, 1965).
- Sisymbrium supinum* L. (MERXMÜLLER, 1965).
- ? *Thlaspi alliaceum* L. (MERXMÜLLER, 1965).

Auf Fehlbenennung beruhende Angaben

- Amelanchier confusa* Hyl. (*A. canadensis* auct.) (SCHROEDER, 1968).
- Euphorbia austriaca* A. Kerner (POLATSCHKE, 1971).
- Linum anglicum* Miller (OCKENDON, 1967).
- Rubus conterminus* Sudre (MERXMÜLLER, 1969).

12. FEHLERHAFTE ANGABEN ÜBER DAS VORKOMMEN IN DEUTSCHLAND (Ge) IN F. E. I + II

In Deutschland vorhanden:

- Cerastium uniflorum* Clairv.
- Salix serpyllifolia* Scop.
- Sedum atratum* L. ssp. *carinthiacum* (Hoppe ex Pacher) D. A. Webb.

In Deutschland nicht vorhanden:

Alchemilla saxatilis Buser

ANHANG

(Nicht aufgenommen sind alle Angaben, die bereits in W. ROTHMALER'S Exkursionsflora von Deutschland IV, 1963, sowie in FLORA EURAPAEA I und II enthalten sind).

A. Neue Arten, infraspezifische Taxa und Hybriden

Amelanchier lamarckii F. G. Schroeder (1968).

Asplenium trichomanes L. ssp. *quadrivalens* D. E. Meyer (1962).

Bromus arvensis L. ssp. *segetalis* H. Scholz (1970).

× *Dactyleuorchis nieschalkii* Senghas (1968).

Epipactis × *pupplingensis* Bell (1968).

Malus brevedunculata Bertsch (1961).

Malus longepedunculata Bertsch (1961).

Pulsatilla vulgaris Miller var. *bevericola* Zimmermann (1965).

Stipa bavarica Martinovsky & Scholz (1968).

Stipa eriocaulis Borbás ssp. *lutetiana* H. Scholz (1968).

Neukombinationen

Agrostis coarctata Ehrh. ex Hoffm. ssp. *syreistschikowii* (P. Smirn.)
H. Scholz (1969).

Brachypodium rupestre (Host) R. & S. ssp. *caespitosum* (Host)
H. Scholz (1968).

Bromus hordeaceus L. ssp. *pseudothomminii* (P. Smith) H. Scholz
(1970).

Calamagrostis canescens (Weber) Roth ssp. *vilnensis* (Besser)
H. Scholz (1964).

Carduus nutans L. ssp. *macrolepis* (Peterm.) Kazmi (1964).

Carex praecox Schreber ssp. *intermedia* (Celak.) Schultze-Motel
(1968).

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. *alpestris*
(Pugsley) Senghas (1968).

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. *brevifolia*
(Bisse) Senghas (1968).

Diphysium zeilleri (Rouy) Damboldt (1963).

Festuca hervieri (St. Yves) Patzke (1961).

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. ssp. *vaillantiana* (DC.) Friedrich (1962).

B. Erstmeldungen und wichtige Neumitteilungen einheimischer Taxa aus der Bundesrepublik

Agrostis coarctata Ehrh. ex Hoffm. ssp. *coarctata* (Scholz, 1969)
ssp. *syreistschikowii* (P. Smirn.) H. Scholz (1969).

Alchemilla glomerulans Buser (MERXMÜLLER, 1969).

Alchemilla libericola Fröhner (1965).

Alchemilla ursina Fröhner (1965).

Asarum ibericum Steven ex Woron. (POELT, 1963).

Biscutella laevigata L. ssp. *kernerii* Mach.-Laur. (BRESINSKY & GRAU, 1970).

Brachypodium rupestre (Host) R. & S. ssp. *rupestre* (SCHOLZ, 1968),
? ssp. *caespitosum* (Host) H. Scholz (SCHOLZ, 1968).

Bromus japonicus Thunb. ssp. *subsquarrosus* (Borbás) Penzes (SCHOLZ, 1970).

Calamagrostis canescens (Weber) Roth ssp. *vilnensis* (Besser) H. Scholz (1964).

Campanula gentilis Kovanda (1968).

Campanula polymorpha Witasek (PODLECH, 1965).

Carduus nutans L. ssp. *macrolepis* (Peterm.) Kazmi (1964).

Carex buekii Wimmer (VOLLRATH & MERGENTHALER, 1966).

Carex × *ligniciensis* Figert (VOLLRATH & MERGENTHALER, 1966).

Carex × *microstachya* Ehrhart (KÜSEL, 1965).

Carex × *vratislaviensis* Figert (VOLLRATH & MERGENTHALER, 1966).

Coleanthus subtilis (Tratt) Seidl (WOIKE, 1963).

Cornus × *hungarica* Karpati (LUDWIG & LENSKE, 1971).

Crataegus × *calciphila* Hrabetova (MANG, 1968).

× *kyrtostyla* Fingerhut (MANG, 1968).

laevigata (Poirot) DC. ssp. *walokochiana* Hrabetova (MANG, 1968).

monogyna Jacq. ssp. *nordica* Franco (MANG, 1968).

× *schumacheri* Raunk. (MANG, 1968).

Cystopteris dieckiana Sim (DAMBOLDT, 1963).

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. *brevifolia* (Bisse) Senghas (BISSE, 1963, SENGHAS, 1968).

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó (FOERSTER, 1968).

- Dactylorhiza sphagnicola* (Höppner) Soó (WIEFELSPÜTZ, 1968).
? *Danthonia decumbens* (L.) Lam. et DC. ssp. *decipiens* Schwarz & Bässler (1964).
Deschampsia wibeliana (Sonder) Parlatores (WEIHE & REESE, 1968).
Dryopteris abbreviata Newm. (SCHUMACHER, 1971).
Dryopteris assimilis Walker (WALKER, 1954, DÖPP, 1958, SIMON & VIDA, 1966).
Dryopteris assimilis × *dilatata* (BENL & ESCHELMÜLLER, 1970).
Euphorbia villosa W. & K. ex Willd. (POLATSCHKE, 1971); inzwischen erloschen.
Festuca lemanii Bast. (PATZKE, 1968).
Gagea pomeranica Ruthe (WITTENBERGER & WITTENBERGER, 1968, WITTENBERGER, 1969).
Gentianella bohémica Skalicky (1969).
Geranium phaeum L. ssp. *lividum* (L'Hér.) Pers. (DÖRR, 1969).
Glechoma hirsuta W. & K. (BRETSCHNEIDER, 1962).
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. ssp. *montana* Bisse (1963).
× *Gymnaglossum jacksonii* Rolfe (PETTZ, 1965, 1966).
Hierochloa hirta (Schrank) Borbás ssp. *hirta* (WEIMARCK, 1971) ssp. *arctica* (Presl) G. Weim. (WEIMARCK, 1971).
Hippophae rhamnoides L. ssp. *carpatica* Rousi (1971).
Hypericum erosum (Schinz) O. Schwarz (1965).
Koeleria arenaria Dumortier (UJHELYI, 1969).
Koeleria mollis Mann ex Opiz (UJHELYI, 1970).
Linum leonii Schultz (NIESCHALK, 1963, GAUCKLER, 1964, LEWE-JOHANN, 1967, OCKENDON, 1967, 1970).
Luzula spicata (L.) DC. ssp. *mutabilis* Chrtek & Krisa (1962).
Myosotis decumbens Host ssp. *decumbens* (GRAU, 1964).
Odontites rubra (Baumg.) Pers. ssp. *pumila* (Nordst.) U. Schneider (1964); ssp. *rothmaleri* U. Schneider (1964).
Orchis elegans Heuffel (BUTTLER, 1964).
Pimpinella saxifraga L. ssp. *montana* Weide (1961).
Platanthera bifolia (L.) Rich. ssp. *graciliflora* Bisse (1963).
Poa caesia Sm. (DÖRR, 1962).
Polypodium interjectum Shivas (ROTHMALER & SCHNEIDER, 1962, MERGENTHALER & DAMBOLDT, 1962, ESCHELMÜLLER, 1971).
Primula farinosa L. ssp. *alpigena* O. Schwarz (1968).
Primula × *pubescens* Jacq. (DÖRR, 1963, 1971).
Rhodiola rosea L. (LUDWIG, 1968).

- Senecio paludosus* L. ssp. *angustifolius* Holub (1962).
 ssp. *tomentosus* Celak. (HOLUB, 1962).
Stipa bavarica Martinovsky & Scholz (1968).
Stipa eriocaulis Borbás ssp. *lutetiana* H. Scholz (1968).
Taraxacum acutifidum M. P. Chr. (SAHLIN, 1971).
 acutifrons Markl. (SAHLIN, 1971).
 aethiops Hagl. (SAHLIN, 1971).
 amplum Markl. (SAHLIN, 1971).
 ancistrolobum Dt. (SAHLIN, 1971).
 atactum Sahlin & v. Soest (SAHLIN, 1971).
 aurosulum Lindb. fil. (SAHLIN, 1971).
 baeckiiiforme Sahlin (1971).
 balticiforme Dt. (van SOEST, 1965).
 bavaricum v. Soest (1965).
 breviflorum Dt. (SAHLIN, 1971).
 britannicum Dt. (SAHLIN, 1971).
 brunneum v. Soest (SAHLIN, 1971).
 caudatulum Dt. (SAHLIN, 1971).
 corynodes Hagl. (SAHLIN, 1971).
 crispifolium Lindb. fil. (SAHLIN, 1971).
 croceiflorum Dt. (SAHLIN, 1971).
 divulsifolium v. Soest (1965).
 eurylobum Hagl. (SAHLIN, 1971).
 expallidum Dt. (SAHLIN, 1971).
 falciferum Markl. (SAHLIN, 1971).
 germanicum v. Soest (1965).
 glossocentrum Dt. (SAHLIN, 1971).
 hemicyclum Hagl. (SAHLIN, 1971).
 huelphersianum Dt. (SAHLIN, 1971).
 ingens Palmgr. (SAHLIN, 1971).
 insuetum M. P. Chr. (SAHLIN, 1971).
 kernianum H., v. Soest & Z. (SAHLIN, 1971).
 laciniosum Dt. (SAHLIN, 1971).
 lagerkranzii Hagl. (SAHLIN, 1971).
 lamprophyllum M. P. Chr. (SAHLIN, 1971).
 laticordatum Markl. (SAHLIN, 1971).
 leucopodium Hagl. (SAHLIN, 1971).
 limnanthes Hagl. ssp. *limnanthoides* v. Soest (1965).
 longifrons Hagl. (SAHLIN, 1971).
 marklundii Palmgr. (SAHLIN, 1971).

melanthoides Dt. (SAHLIN, 1971).
oblongatum Dt. (SAHLIN, 1971).
obtusifrons Markl. (SAHLIN, 1971).
pallidipes Markl. (SAHLIN, 1971).
pannucium Dt. (SAHLIN, 1971).
pannulatiforme Dt. (SAHLIN, 1971).
pollichii v. Soest (1965).
pseudo-balticum v. Soest (1965).
pulchrifolium Markl. (SAHLIN, 1971).
scotiniforme Dt. (SAHLIN, 1971).
scotinum Dt. (SAHLIN, 1971).
sinuatum Dt. (SAHLIN, 1971).
speciosiflorum M. P. Chr. (SAHLIN, 1971).
subhamatum M. P. Chr. (SAHLIN, 1971).
submucronatum Dt. (SAHLIN, 1971).
trigonum M. P. Chr. (SAHLIN, 1971).
tumentilobum Markl. (SAHLIN, 1971).
vindobonense v. Soest (1965).
violaceipetiolatum Rail. (SAHLIN, 1971).
vollmannii v. Soest (1965).

Veronica sublobata Fischer (1967).

Vicia oroboides Wulfen (OBERWINKLER & SAUER, 1970).

Viola calaminaria Lejeune ssp. *westfalica* (W. Ernst) Heimans
(ERNST, 1965).

C. Wichtigere Angaben über eingebürgerte Pflanzen

vgl. auch DÖRR, E. 1962 ff; HUPKE, H. 1960; KÜSEL, H. 1969;
RUNGE, F. 1965; SCHÄFER, A. 1965; SUKOPP, H. 1962.

Achillea lanulosa Nutt. (SCHOLZ, 1970).

Agrostis castellana Boiss. & Reuter (SCHOLZ, 1962, 1963, 1965).

Agrostis pourretii Willd. (SCHOLZ, 1963).

Allium ophioscorodon Don (RUBE & HEISE, 1970).

Alyssum murale W. & K. (LUDWIG, 1970) — bisher mit *A. argenteum*
All. verwechselt.

Amelanchier lamarckii F. G. Schroeder (SCHROEDER, 1968, 1969, 1970).

Aristolochia durior Hill. (BERLIN & HOFFMANN, 1970).

Atriplex heterosperma Bunge (AELLEN, 1962, KORNECK, 1963).

Beta trigyna W. & K. (SCHNEDLER, 1971).

- Conopodium denudatum* (DC.) Koch (HUNDT, 1961, HAEUPLER, 1967/69).
- Crataegus microphylla* C. Koch (MANG, 1968).
- Crataegus monogyna* Jacq. ssp. *azarella* (Griseb.) Franco (MANG, 1968).
- ssp. *brevispina* (G. Kunze) Franco (MANG, 1968).
- Dipsacus strigosus* Willd. (POELT, 1970).
- Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray (FELDHOFEN, 1961, HEINE, 1962).
- Epimedium pinnatum* Fischer (DÖRR, 1970).
- Geranium sibiricum* L. (DÖRR, 1970).
- Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. (HAEUPLER, 1971).
- Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier (BERLIN & HOFFMANN, 1970).
- Fraxinus pennsylvanica* Marsh (DOPPELBAUER, 1963).
- Lallemantia peltata* (L.) Fischer & Meyer (OESAU, 1970).
- Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon (ZISCHKA & ZISCHKA, 1966).
- Oxalis dillenii* Jacq. (SCHOLZ, 1966, MARQUART, 1967).
- Parentucellia viscosa* (L.) Caruel (OESAU, 1970).
- Parietaria pensylvanica* Mühlenb. ex Willd. (SUKOPP & SCHOLZ, 1964).
- Rhododendron luteum* Sweet (= *Azalea pontica* L.) (AUVERA, 1962).
- Rumex triangulivalis* (Danser) Rech. fil. (MANG, 1964, SUKOPP & SCHOLZ, 1965).
- Scirpus atrivirens* Willd. (LÖTSCHERT, 1964).
- Setaria faberii* Herrmann (SCHOLZ, 1964).
- Sigesbeckia cordifolia* H. B. K. (HENKER, 1965).
- Spira* × *billardii* Hering. (MERXMÜLLER, 1969).

BIBLIOGRAPHIE

- ADRIAN, W. & F. KOPPE (1965) — Die Rötliche Sommerwurz bei Bielefeld. *Natur. u. Heimat (Münster)* 25: 102-104.
- AELLEN, P. (1962) — *Atriplex heterosperma* Bge., Néophyte de l'Europe médiane? *Bull. Soc. roy. Bot. Belg.* 95: 131.
- ALBRECHT, J. (1970) — Soziologische und ökologische Untersuchungen alpiner Rasengesellschaften insbesondere an Standorten auf Kalk-Silikat- Gesteinen. *Diss. Bot.* 5.
- ALETSEE, L. (1967) — Begriffliche und floristische Grundlagen zu einer pflanzengeographischen Analyse der europäischen Regenwassermoorstandorte. *Beitr. Biol. Pfl.* 43: 117-160.

- ALTEHAGE, C. (1962) — Zwei ehemalige atlantische Florenstätten unweit Schüttorf und Friesoythe in Niedersachsen. *Veröff. Naturw. Ver. Osnabrück* 30: 7-18.
- (1965) — Die Vegetationsverhältnisse des Naturdenkmals «Engelbergs Moor» in Druchhorn, Kr. Bersenbrück. *Op. cit.* 31: 9-17.
- ANT, H. (1966) — Ein Vorkommen des Laichkrautes *Potamogeton zizii* in Westfalen. *Natur u. Heimat (Münster)* 26: 126-128.
- (1969) — Ein weiterer Fundpunkt von *Ceratophyllum submersum* in Westfalen. *Op. cit.* 29: 102-105.
- (1970) — Zur Ausbreitung der Sumpfschraube, *Vallisneria spiralis*, im Norden ihres Areals. *Decheniana* 122: 195-197.
- ANT, H. & H. DIEKJOBST (1970) — Nachweis des quirlblättrigen Tännels (*Elatine alsinastrium*) in Westfalen (mit einer Übersicht der bisherigen *Elatine*-Funde). *Abh. Landesmus. Naturk. Münster Westf.* 32: 10-18.
- ANT, H. & H. ENGELKE (1970) — Die Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland. Bonn-Bad Godesberg.
- APPELS, M. (1963) — Über die Krebscherengesellschaft an der unteren Hase. *Natur u. Heimat (Münster)* 23: 121-123.
- ARNTZENIUS, C. L., C. R. ARNTZENIUS, K. KRONBERGER, J. LANDGRAF & K. F. REHNELT (1961/63) — Floristische Aufzeichnungen aus der Umgebung Bayreuths. *Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth* 11: 7-24.
- ARNTZENIUS, C. R. & K. F. REHNELT (1964) — Über ein Caricetum limosae in Nordbayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 98-100.
- ARZT, T., E. HENTSCHEL & G. MORDHORST (1967) — Die Pflanzenwelt des Naturparks Hochtaunus. *Inst. f. Naturschutz Darmstadt, Schriftenreihe* Band 9/1: 148 Seiten.
- ATTINGER, E. (1967) — Die Farne des Hohentwiel. *Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen* 38: 11-19.
- AUVERA, H. (1962) — Die Flora des Klosterforstes und seiner Randgebiete. *Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg* 3: 165-180.
- (1966) — Die Rebhügel des mittleren Maingebietes, ihre Flora und Fauna. *Op. cit.* 7: 5-59.
- AXT, K. (1970) — *Claytonia perfoliata* Donn. im Kreis Rendsburg. *Kieler Notizen Jahrg.* 1970: 13.
- BACHMAIER, F. (1966) — Die Zwergbirke (*Betula nana* L.), ein Glazialrelikt unserer Flora und Untersuchungen über ihre Insektenfauna. *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 31: 138-151.
- BACHTHALER, G. (1965) — Der gegenwärtige Verbreitungsstand von Flughafer (*Avena fatua* L.) in der Bundesrepublik Deutschland. *Zeitschr. Pflanzenkrankh. Pflanzenpath., Pflanzenschutz* 1965 (Sonderheft 3) 31-34.
- BASTIN, B. (1968) — Pflanzengeographische Probleme der offenen Vegetation Europas während der letzten Eiszeit. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 80: 697-704.
- BAUMANN, H. & S. KÜNKELE (1971) — Zur Verbreitung von *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. in Baden-Württemberg. *Veröff. Landesstelle f. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württemberg* 30: 7-66.
- BAUR, K. (1964) — Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1: 25.000 Blatt 7416 Baisersbrunn. Hrsg. Staatl. Mus. Naturk. Stuttgart 1964, 76 S.

- (1965) — Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1: 25.000 Blatt 6526 Creglingen. *Hrsg. Staatl. Mus. Naturk. Stuttgart*.
- BECHER, R. (1964) — Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der Licht-Intensität und der Wurzel-Konkurrenz für Lebensmöglichkeiten von Sauerklee (*Oxalis acetosella*) in Wald-Beständen. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde. N. F., Naturwiss. Abt.* 33: 145-148.
- BELL, K. (1968) — Ein neuer Sumpfwurz-Bastard, *Epipactis* × *pupplingensis* nov. hybr. *Ber. Naturf. Ges. Bamberg* 43: 18-19.
- BENL, G. & A. ESCHELMÜLLER (1970) — *Dryopteris dilatata* × *assimilis* in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 42: 185-188.
- BENZING, A. & H. BIBINGER (1968) — Vegetationskundliche Notizen über das Blindensee-Moor (mittlerer Schwarzwald). *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F.* 9: 741-754.
- BERAN, N. (1966) — Experimentelle Untersuchungen über Sukzessionen, Einflüsse von Blattstreu und andere gegenseitige Beeinflussungen bei einigen Pflanzenarten auf Abraumhalden und ähnlichen Substraten *Geobot. Mitt.* 36: 175 pp.
- BERGER, B. (1968) — Entwicklungsgeschichtliche und chromosomale Ursachen der verschiedenen Kreuzungsverträglichkeit zwischen Arten des Verwandtschaftskreises *Arabidopsis*. *Beitr. Biol. Pfl.* 45: 171-212.
- BERLIN, A. (1971) — Neophyten auf Bahnhöfen. *Gött. Flor. Rundbr.* 5: 57-63.
- BERLIN, A. & H. HOFFMANN (1970) — Neu- und Wiederfunde seltener Gefäßpflanzen in der östlichen Eifel zwischen Mosel und Ahr (Auswahl). *Decheniana* 123: 59-65.
- BERLIN, A., H. HOFFMANN, W. JÜNGER, J. SCHMITZ & S. STEFFES (1961) — Pteridophyten, Gymnospermen und Angiospermen des Maifeldes. *Decheniana* 114: 1-25.
- BERLIN, A. & Th. MÜLLER (1968) — Von der Vegetation des unteren Nettetales zwischen Katzenberg und Wernerseck und der beiderseitigen Diluvial-Vulkane. *Decheniana* 119: 1-24.
- BERTSCH, A. (1961) — Untersuchungen zur spätglazialen Vegetationsgeschichte Südwestdeutschlands. *Flora* 151: 243-280.
- BERTSCH, K. (1961) — Einheimische Wildäpfel. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württemb.* 116: 185-194.
- Flora von Südwest-Deutschland. 3. Aufl. Stuttgart 1962.
- BESOLD, B. (1971) — Pollenmorphologische Untersuchungen an Inuleen (*Angianthinae*, *Relhaninae*, *Athrixinae*). *Diss. Bot.* 14.
- BISSE, J. (1963) — Ein Beitrag zur Kenntnis der deutschen Orchideenflora. *Feddes Rep.* 67: 181-189.
- BÖHME, E. (1962) — Wald- und Forstgesellschaften bodenfeuchter Standorte im Forstrevier Herzebrock, Kreis Wiedenbrück. *Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld* 16: 5-34.
- (1969) — Natürliche Waldgesellschaften zwischen den äusseren Stufenflächen der Beckumer Berge und der Emstalung. *Op. cit.* 19: 5-36.
- BÖTTCHER, H. (1970) — Das Glaskraut an einigen Fundstellen im nordöstlichen Westfalen und angrenzenden Niedersachsen. *Natur u. Heimat (Münster)* 30: 36-38.

- (1970) — Bibliographie der in Excerpta Botanica, Sectio B. Sociologica, Band 1-10 erschienenen Bibliographien. *Excerpta Botanica B.* 10: 315-328.
- (1970) — Ein weiterer Fundort des Kleinen Liebesgrases (*Eragrostis poaeoides*) in Ostwestfalen. *Natur und Heimat* 30: 95-97.
- BOGENRIEDER, A. & O. WILMANN (1968) — Zur Floristik und Ökologie einiger schneegreprägter Standorte im Naturschutzgebiet Feldberg (Schwarzwald). *Veröff. Landesst. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württ.* 36: 7-26.
- BORNKAMM, R. (1961) — Zur Konkurrenzkraft von *Bromus erectus*. *Bot. Jahrb.* 80: 466-479.
- (1968) — Ein Vorkommen von *Epilobium dodonaei* Vill. in Köln. *Decheniana* 121: 147-149.
- BORNKAMM, R. & W. EBER (1967) — Die Pflanzengesellschaften der Keuperhügel bei Friedland (Kr. Göttingen). *Schriftenreihe Veg. kde.* 2: 135-160.
- BRABEC, F. & J. POHLMANN (1969) — Untersuchung zur Bestimmung der Karyotypen von *Bryonia alba*, *Bryonia dioica* und *Bryonia verrucosa* Biol. Zbl. 88: 715-730.
- BRAHE, P. (1969) — Zur Kenntnis oligotropher Quellmoore mit *Narthecium ossifragum* bei Hamburg. *Schriftenreihe Veg. kde.* 4: 75-84.
- BRAUN, W. (1966) — Die Gesellschaft der Torfsegge, das Caricetum heleonastis (Paul & Lutz 41) Oberd. 57 in der Umgebung von Kempten. *Mitt. Naturw. Arbeitskr. Kempten* 10 (1): 17-24.
- Standortkundliche Untersuchungen an zwei seltenen Wasserpflanzengesellschaften im Bayerischen Allgäu. *Op. cit.* 11 (1): 1-10.
- (1968) — Die Kalkflachmoore. *Diss. Bot.* 1.
- (1968) — Vegetationskundliche Beobachtungen am Attlesee und im Spitalmoos bei Nesselwang. *Mitt. Naturw. Arbeitskr. Kempten* 12 (1): 1-16.
- (1969) — Die Pflanzendecke des Strausberg-Mooses bei Hindelang. *Op. cit.* 13: (1): 1-19.
- (1970) — Bestimmungübersicht für die Kalkflachmoore und deren wichtigsten Kontaktgesellschaften im Bayerischen Alpenvorland. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 42: 109-138.
- BRESINSKY, A. (1965) — Zur Kenntnis des circumalpinen Florenelements im Vorland nördlich der Alpen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 38: 5-67.
- (1966) — Neue Methoden zur floristischen Erforschung Bayerns. *Op. cit.* 39: 29-34.
- (1966) — Naturschutzgebiet «Kissinger Heide». *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 31: 165-171.
- BRESINSKY, A. & J. GRAU (1963) — *Myosotis rehsteineri* Wartm. am Starnberger See. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 36: 64.
- (1970) — Zur Chorologie und Systematik von *Biscutella* im Bayerischen Alpenvorland. *Op. cit.* 42: 101-108.
- BRETSCHNEIDER, J. (1962) — Bestimmungsschlüssel der europäischen Sippen der Gattung *Glechoma* L. *Drudea* 2. Jahrg.: 69-71.
- BRIELMAYER, G. W. & S. KÜNKELE (1969) — Die Moororchidee *Hammarbya paludosa* O. Kuntze. *Jahresh. Ver. vaterl. Naturkunde Württemberg* 124: 157-171.

- (1970) — Zur Verbreitung von *Spiranthes aestivalis* (Poir) Rich. in Baden-Württemberg. *Veröff. Landesst. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württ.* 38: 7-33.
- BRINKMANN, D. & H. BRINKMANN (1968) — Der Wiesenschachtelhalm im Eggegebirge. *Natur u. Heimat.* (Münster) 28: 191-192.
- BROCKHAUS, L. (1965) — Die Farngewächse und Blütenpflanzen Wittgensteins. — In: F. KRÄMER (Hrsg.) *Wittgenstein* 1: 63-100, Balve i. W.
- BUCHHEIM, G. & H. J. CONERT (1969) — Über *Danthonia alpina* Vest. *Senckenbergiana biol.* 50: 473-475.
- BURCKHARDT, H. & H. L. BURGSDORF (1964) — Flora des Altrheins (bei Xanten) und seiner Umgebung. I. Teil: Floristische Untersuchung. *Gewässer und Abwässer* 37/38: 7-45.
- BURRICHTER, E. (1963) — Das Linarietum spuriae Krusem. et Vlieder 1939 in der Westfälischen Bucht. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitagem.* N. F. 10: 109-115.
- (1964) — Wesen und Grundlagen der Pflanzengesellschaften. *Abh. Landesmus. Naturk. Münster* 26 (3), 16 S.
- (1968) — Überblick über die Vegetation des Zwillbrocker Venns. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitagem.* N. F. 13: 275-279.
- (1969) — Der Reinweisse Hahnenfuss, *Ranunculus hololeucus*, im Naturschutzgebiet «Witte Venn» bei Alstätte (Westmünsterland). *Natur u. Heimat (Münster)* 29: 97-99.
- (1969) — Das Zwillbrocker Venn, Westmünsterland, in moor- und vegetationskundlicher Sicht. *Abh. Landesmus. Naturk. Münster* 31 (1), 60 S.
- (1970) — Zur pflanzensoziologischen Stellung von *Senecio tubicaulis* in Nordwestdeutschland. *Natur u. Heimat (Münster)* 30: 1-4.
- BUTTLER, K. P. (1964) — *Orchis elegans* Heuffel in Hessen. *Hess. Flor. Briefe* 13: 1-3.
- (1967) — Zytotaxonomische Untersuchungen an mittel- und südeuropäischen *Draba*-Arten. *Mitt. Bot. München* 6: 275-362.
- (1969) — *Draba dolomitica* Buttler, eine übersehene Art der Dolomiten und der Brenneralpen. *Op. cit* 8: 539-566.
- BUTTLER, K. P. & A. BRESINSKY (1966) — Beitrag zur Zytologie von *Galium ser. Silvatica*. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 39: 25-28.
- CARSTENS, L. (1962) — Die Vegetation der Westruper Heide, Kreis Recklinghausen. *Natur u. Heimat (Münster)* 22: 1-9.
- CHRISTENSEN, E. (1971) — Vergleich der Grundblätter von *Campanula glomerata* und *Viola hirta*. *Kieler Notizen* 3: 22-23.
- CHRISTIANSEN, W. (1967) — Pflanzengeographische Moortypen in Schleswig-Holstein. *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst.* 37: 93-99.
- CHRISTIANSEN, W., F. KAHL & A. STANGE (1962) — Flora des Naturschutzgebietes Gelting-Birk. *Jahrb. Angler Heimatver.* 1962 (Sonderdruck 20 S.).
- CHRISTIANSEN, W., H. ROGGE & A. STANGE (1964) — Floristischer Vergleich dreier Wälder an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und der vor ihnen liegenden Sandstreifen. *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst.* 35: 76-98.
- CHRTK, J. & B. KRISA (1962) — A taxonomical study of the species *Luzula spicata* (L.) DC. sensu lato in Europe. *Bot. Not. (Lund)* 115: 293-310.

- CONERT, H. J. (1969) — Dreizahngras (*Danthonia decumbens* DC.) und Traubenhafer (*Danthonia alpina* Vest.) *Jahrb. nass. Ver. Naturk.* 100: 54-72.
- COOK, C. D. K. (1966) — A Monographic Study of *Ranunculus* subgenus *Batrachium* (DC.) A. Gray. *Mitt. Bot. München* 6: 47-237.
- (1967) — Emendations to a Monographic Study of *Ranunculus* subgenus *Batrachium* (DC.) A. Gray. *Op. cit.*: 621-622.
- DAMBOLDT, J. (1962) — *Lycopodium issleri* in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 20-22.
- (1963) — Zur Kenntnis der Flächen Bärlappe in Bayern. *Op. cit.* 36: 25-28.
- (1963) — *Cystopteris dieckiana* Sim und ihr Vorkommen in den Alpen. *Op. cit.*: 64-66.
- (1964) — Ein Beitrag zur Kenntnis von *Asplenium trichomanes* L. em. Hudson in Bayern. *Op. cit.* 37: 5-9.
- (1965) — Zytotaxonomische Revision der isophyllen Campanulae in Europa. *Bot. Jahrb.* 84: 302-358.
- (1965) — *Campanula tommasiniana* Koch und *C. waldsteiniana* R. et S.: Zur Zytotaxonomie zweier mediterraner Reliktsippen. *Österr. Bot. Z.* 112: 392-406.
- (1966) — Zur Systematik und Cytologie von *Campanula arvensis* Lagasca. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 79: 299-308.
- (1969a) — Chromosomenzahlen einiger südalpiner Endemiten. *Op. cit.*: 373-376.
- (1968) — Kurzer Nachtrag zur «Zytotaxonomischen Revision der isophyllen Campanulae in Europa». *Bot. Jahrb.* 88: 200-203.
- (1968) — Zur Cytotaxonomie der Gattung *Saxifraga* L. (3). *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 81: 43-52.
- DAMBOLDT, J. & D. PODLECH (1963) — Chromosomenzahlen einiger alpinen Steinbreche. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 36: 29-32.
- (1964) — Zytotaxonomische Untersuchungen an *Saxifraga*-Sippen der grex *Exarato-moschatae* Engler & Irmscher. (Zur Zytotaxonomie der Gattung *Saxifraga* L. II). *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 77: 332-339.
- DANESCH, O. & E. DANESCH (1968) — Orchideen Europas Mitteleuropa. 2. Aufl. Bern und Stuttgart.
- DIERSCH, G. (1963) — Zur Cytologie und Taxonomie der Goldnessel (*Lamium galeobdolon* (L.) L.) *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 76: 351-359.
- (1965) — Notizen über das Vorkommen von *Callitriche*-Arten in (Nord-) hessen. *Hess. Flor. Briefe* 14: 35-44.
- (1968) — Über einige Chromosomenzählungen an mitteleuropäischen Blütenpflanzen. *Abhandl. Ver. Naturk. Kassel* 62: 9-12.
- (1969) — Über das Vorkommen von diploidem Wiesenschaumkraut (*Cardamine pratensis* L.) in Mitteleuropa. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 82: 201-207.
- (1969) — Über eine bemerkenswerte diploide Sippe des Wiesenschaumkrautes (*Cardamine pratensis* L.). *Göttinger Flor. Rundbriefe* 3: 3-4.
- DIEKEN, J. van (1970) — Beiträge zur Flora Nordwestdeutschlands unter besonderer Berücksichtigung Ostfrieslands. Jever.

- DIEKJOBST, H. (1967) — Das wärmeliebende Schlehen-Liguster-Gebüsch (*Ligustro-Prunetum*) in der Westfälischen Bucht. *Natur u. Heimat (Münster)* 27: 19-25.
- (1967) — Zur Verbreitung der Lungenkraut-Kleinarten *Pulmonaria officinalis* L. und *P. obscura* Dum. in Westfalen. *Op. cit.*: 105-109.
- (1967) — Struktur, Standort und anthropogene Überformung der natürlichen Vegetation im Kalkgebiet der Beckumer Berge (Westfälische Bucht). *Abh. Landesmus. Naturk. Münster* 29(2): 1-39.
- DIEKJOBST, H. & H. ANT (1967) — Die Pioniergesellschaften der Schlammflächen trockengefallener Talsperrensohlen. *Decheniana* 118: 139-144.
- DIERSCHKE, H. (1967) — Ein neues Vorkommen des Wasser-Seggen-Sumpfes (*Lysimachio-Caricetum aquatilis* Neum. 57) in Nordwestdeutschland. *Natur u. Heimat (Münster)* 27: 89-96.
- (1968) — Über eine Grossseggen-Riedgesellschaft mit *Carex aquatilis* im Wümmetal östlich von Bremen. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 13: 48-58.
- (1968) — Zur synsystematischen und syndynamischen Stellung einige: Calthion-Wiesen mit *Ranunculus auricomus* L. und *Primula elatior* (L.) Hill. im Wümme-Gebiet. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 13: 59-70.
- (1969) — Natürliche und naturnahe Vegetation in den Tälern der Böhme und Fintau in der Lüneburger Heide. *Op. cit.* 14: 377-397.
- (1969) — Die naturräumliche Gliederung der Verdener Geest. Landschafts-ökologische Untersuchungen im nordwestdeutschen Altmoränengebiet. *Forsch. Deutsch. Landesk.* 177: 113 S.
- (1969) — Grundwasser-Ganglinien einiger Pflanzengesellschaften des Holtumer Moores östlich von Bremen. *Vegetatio* 17: 372-383.
- DIERSSEN, K. (1971) — Die *Corydalis claviculata*-*Epilobium angustifolium*- Ass. im Deister. *Natur u. Heimat (Münster)* 31: 103-104.
- DIETRICH, W. (1964) — *Carex flavella* Krecz. und der Bastard mit *C. demissa* Hornem. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 100-102.
- (1967) — Die Zytotaxonomie der *Carex*-Sektion *Frigidae* in Europa. *Feddes Repert.* 75: 1-42.
- DIRCKSEN, J. (1968) — Die wichtigsten Pflanzengesellschaften der Insel Trischen. *Natur u. Heimat (Münster)* 28: 184-190.
- DITTRICH, M. (1968) — Morphologische Untersuchungen an den Früchten der Subtribus Cardueae-Centaureinae (Compositae). *Willdenowia* 5: 67-107.
- (1968) — Karpologische Untersuchungen zur Systematik von *Centaurea* und verwandten Gattungen. Teil I und II. *Bot. Jahrb.* 88: 70-122, 123-162.
- DÖPP, W. (1958) — Diploide *Dryopteris austriaca* in Deutschland. *Naturwiss.* 45: 95.
- DÖRR, E. (1962-71) — Floristische Mitteilungen aus dem Allgäu bzw. Berichte über die Allgäu-Floristik. *Mitt. Naturwiss. Arbeitskreis Kempten* 6(2): 12-25, 1962; 7(1): 11-14, 1963; 7(2): 7-19, 1963; 8(1): 8, 1964; 8(2): 16, 1964; 10(1): 24, 1966; 10(2): 35-43, 1966; 11(2): 17-30, 1967; 12(2): 13-27, 1968; 14(1): 1-15, 1970; 14(2): 23-38, 1970; 15(2): 1-12, 1971.

- (1963) — *Geranium sibiricum* — neu für Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 36: 66-67.
- (1966) — *Erigeron atticus* — im Allgäu wiederentdeckt. *Op. cit.* 39: 124.
- (1966-70) — Flora des Allgäus, 2. — 5. Teil. *Op. cit.* 39: 35-45; 40: 7-16; 41: 55-62; 42: 141-184.
- (1968) — Wandlungen der Flora Südschwabens. *Ber. Naturf. Ges. Augsburg* 22: 3-32.
- (1969) — *Geranium phaeum* L. ssp. *lividum* (L'Hér.) Pers. in Bayern. — *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 41: 63.
- DÖRR, E. & L. MÜLLER (1964) — Flora des Allgäus 1. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 31-40.
- DÖRR, E. & A. SCHRÖPPEL (1968) — Die Moore südlich Sulzschneid — Juwelen der Allgäu-Flora. *Mitt. Naturw. Arbeitskreis Kempten* 12(2): 29-36.
- DOPPELBAUR, H. (1963) — *Fraxinus pennsylvanica* Marsh in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 36: 67-68.
- DRÜKE, H. (1969) — Orchideen in den Naturschutzgebieten des Kreises Beckum. *Natur u. Heimat (Münster)* 29: 25-28.
- DUHME, F. & G. KAULE (1970) — Zur Verbreitung der gelben Narzisse (*Narcissus pseudonarcissus* L.) auf Primär- und Sekundärstandorten in Mittel- und Nordwesteuropa. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 83: 647-659.
- EBERLE, G. (1966) — Schildfarne (*Polystichum*) und Schildfarn-Mischlinge im Schwarzwald und in Mitteleuropa. *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F.* 9: 371-379.
- (1968) — Lerchensporn. *Jahrb. Nassau. Ver. Naturk.* 99: 107-116.
- EGGERS, Th. (1969) — Über die Vegetation im Gotteskoog (Nordfriesland) nach der Melloration. *Mitt. Arbeitsgem. Flor. Schleswig-Holst. & Hamburg* 17: 103 S.
- EHRENDORFER, F. & U. HAMANN (1965) — Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 78: 35-50.
- EIGNER, J. & A. EIGNER (1971) — Zur Unterscheidung von *Anemone nemorosa* und *Anemone ranunculoides* L. *Kieler Notizen* 3: 26.
- EINHELLINGER, A. (1962) — Von der Pflanzenwelt der Ismaninger Speicherseen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 23-27.
- EISENHUT, E. (1968) — Pflanzen als Kennzeichen der Flussverschmutzung. *Jahresh. Ver. vaterl. Naturkunde Württemberg* 123: 134-139.
- ELLENBERG, H. (1963) — Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in kausaler, dynamischer und historischer Sicht. (= Band IV, 2 der «Einführung in die Phytologie» von H. WALTER). Stuttgart.
- (1968) — Wald- und Feldbau im Knyphauser Wald, einer Heide-Aufforstung in Ostfriesland. *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 112: 17-90.
- (1971) — Die natürlichen Waldgesellschaften der Eilenriede in ökologischer Sicht. *Beih. Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 7: 121-128.
- ELLENBERG, H., H. HAEUFLER & U. HAMANN (1968) — Arbeitsanleitung für die Kartierung Mitteleuropas (Ausgabe für die Bundesrepublik Deutschland). *Mitt. Florist.-Soz. Arbeitsgem. N. F.* 13: 284-296.
- EMRICH, J. (1965) — Der Formenkreis der Gemeinen Flockenblume (*Centaurea jacea* L.) in der Pfalz. *Pfälzer Heimat* 16: 108-110.

- ENGLERT, K. (1970) — *Matteucia struthiopteris* und *Equisetum pratense* in den Innauen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 42: 199.
- ERNST, A. (1961) — Revision der Gattung *Pinguicula*, *Bot. Jahrb.* 80: 145-194.
- ERNST, W. (1965) — Ökologisch-soziologische Untersuchungen der Schwermetall-Pflanzengesellschaften Mitteleuropas unter Einschluss der Alpen. *Abh. Landesmus. Naturk. Münster* 27: 1-54.
- (1967) — Bibliographie der Arbeiten über Pflanzengesellschaften auf schwermetallhaltigen Böden mit Ausnahme des Serpentin. *Excerpta Botanica B* 8: 50-61.
- (1968) — Der Schwermetallrasen von Blankenrode, das *Violetum calaminiariae westfalicum*. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitagen. N. F.* 13: 261-262.
- (1968) — Das *Violetum calaminiariae westfalicum*, eine Schwermetallpflanzengesellschaft bei Blankenrode in Westfalen. *Op. cit.*: 63-68.
- ERTL, U. (1968) — Die Gehölze des Schönbusch aufgezeigt in vier dendrologischen Rundgängen. *Nachr. Naturw. Mus. Aschaffenburg* 77.
- ESCHELMÜLLER, A. (1966) — Die kleinen rundblättrigen Enziane — eine «kritische» Formengruppe. *Mitt. Naturw. Arbeitskreis Kempten* 10(1): 11-16.
- (1968) — *Dryopteris* × *tavelii* Rothmaler, im Allgäu verbreitet. *Op. cit.* 12(2): 37-41.
- (1970-71) — *Polypodium interjectum* Shivas im Allgäu? (Teil 1 u. 2). *Op. cit.* 14(2): 42-48; 15(1): 6-10.
- (1971) — *Polypodium* × *mantoniae* (Rothmaler) Shivas zum erstenmal in den Bayerischen Alpen. *Op. cit.* 15(1): 11-19.
- FELDHOFEN, E. (1961) — Über das Vorkommen der Igelgurke (*Echinocystis lobata*) am Rhein. *Hess. Flor. Briefe* 10: 57-59.
- FELDNER, R., W. GRÖBL & H. MAYER (1965) — Der Sadebaum (*Juniperus sabina* L.) in den Ammergauer Bergen. *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 30: 26-30.
- FELLENBERG, W. O. (1967) — Weitere Funde der Winde *Calystegia sepium* ssp. *pulchra* im Sauerland. *Natur u. Heimat (Münster)* 27: 39-41.
- (1970) — Aussenstandorte des Sonnenröschens im Sauerland. *Op. cit.* 30: 5-8.
- (1970) — Zur Verbreitung der rosablütigen Winde *Calystegia sepium* ssp. *pulchra* im Sauerland. *Op. cit.*: 45-47.
- FISCHER, M. (1967) — Beiträge zur Cytotaxonomie der *Veronica hederifolia*-Gruppe (Scrophulariaceae). *Österr. Bot. Z.* 114: 189-233.
- FOERSTER, E. (1962) — Schlüssel zum Bestimmen der in Deutschland wildwachsenden Arten der Gattung *Allium* L. im blütenlosen Zustand. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 9: 5-7.
- (1967) — Die Wasserehrenpreis-Gruppe. *Gött. Flor. Rundbriefe* 1: 10-11. Neudruck 1969.
- (1967) — Ein Beitrag zur Unterscheidung von *Phleum pratense* und *Phleum nodosum*. *Op. cit.*: 12. Neudruck 1969.
- (1967) — Unterscheidungsmerkmale von *Carex otrubae* — *Carex vulpina*. *Op. cit.*: 14. Neudruck 1969.
- (1967) — Die *Juncus bufonius*-Gruppe. *Op. cit.*: 31-32. Nachdruck 1969.
- (1968) — Die südniedersächsischen *Polygala*-Arten. *Op. cit.* 2: 6-9.

- (1968) — Beobachtungen in Populationen von *Dactylorhiza majalis*, zugleich ein Nachweis von *Dactylorhiza pratensis* in Deutschland. *Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal* 21/22: 83-85.
- (1970) — Die *Carex muricata*-Gruppe. *Gött. Flor. Rundbriefe* 4: 52.
- (1971) — Bestimmungsschlüssel für Binsen nach vorwiegend vegetativen Merkmalen. *Op. cit.* 5: 19-23.
- (1971) — *Senecio aquaticus* Hudson und *Senecio barbareaefolius* Krocke, Gegenüberstellung. *Kieler Notizen* 3: 32-34.
- FRAHM, G. (1971) — Die Lage des Andelrasens zum Mitteltidehochwasser in Abhängigkeit von der Bodenart an der Schleswig-holsteinischen Westküste. *Kieler Notizen* 3: 37-44.
- FREITAG, H. (1962) — Einführung in die Biogeographie von Mitteleuropa unter besonderer Berücksichtigung von Deutschland. Stuttgart.
- FRENZEL, B. (1959-60) — Die Vegetations- und Landschaftszonen Nord-Eurasien während der letzten Eiszeit und während der postglazialen Wärmezeit. *Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz Math.-Nat. Kl.* 1959; Nr. 13 und 1960, Nr. 6.
- (1968) — Grundzüge der pleistozänen Vegetationsgeschichte Nord-Eurasien. *Erdbwiss. Forsch.* 1.
- (1968) — Der gegenwärtige Stand und die wichtigsten Aufgaben vegetationsgeschichtlicher Forschung in Nord-Eurasien. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 80: 669-681.
- FRIEDRICH, H. Chr. (1960-62) — Caryophyllaceae, 1. und 2. Teil. In: G. HEGI: *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*, 2. Aufl. III/2 München.
- FROEBE, H. A. (1964) — Die Blütenstände der Saniculoideen (Umbelliferae). *Beitr. Biol. Pfl.* 40: 325-388.
- (1971) — Wuchsform und Infloreszenzgestaltung in den Gattungen *Saniculo*, *Hacquetia* und *Astrantia* (Umbelliferae). *Bot. Jahrb.* 91: 1-38.
- FROEBE, H. A. & A. OESAU (1969) — Zur Soziologie und Propagation von *Iva xanthifolia* im Stadtgebiet von Mainz. *Decheniana* 122: 147-157.
- FRÖHNER, S. (1965) — Mitteleuropäische Sippen von *Alchemilla glabra* und einige Verwandte. *Bot. Jahrb.* 83: 370-405.
- (1965) — Die Frauenmantelarten Schleswig-Holsteins. *Heimat (Neumünster)* 72: 74-79.
- FUCHS, H. (1964) — Flora von Göttingen. Führer zu den wildwachsenden Pflanzen des Göttinger Muschelkalkgebietes. Göttingen.
- (1966) — Floristische Neufunde im Raume Göttingen. *Gött. Jahrb.* 14: 11-14.
- FÜLLEKRUG, E. (1967) — Phänologische Diagramme aus einem Melico-Fagetum. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 142-158.
- (1969) — Phänologische Diagramme von Glatthaferwiesen und Halbtrockenrasen. *Op. cit.* 14: 255-273.
- (1971) — Über den Jahresgang der Bodenfeuchtigkeit in verschiedenen Buchenwaldgesellschaften der Umgebung Bad Gandersheims. *Diss. Bot.* 18.
- GAERTNER, K.-H. (1961) — Die Vegetationsverhältnisse der Wiesen am Barsbeker See. *Mitt. Arbeitsgem. Flor Schleswig-Holst. & Hamburg* 9: 65-175.

- GALL, H.-J. (1968) — Die Vegetation des Dannstädter Gräberfeldes. *Mitt. d. Pollichia* (III. Reihe) 15: 110-162.
- (1969) — Zum Vorkommen von *Carex arenaria* auf den Silbergrasfluren bei Speyer. *Beitr. naturk. Forsch. Südw. Deutschland* 28: 111-114.
- GAUCKLER, K. (1961-63) — Weissblütige Segge und Wolliges Reitgras in der nördlichen Frankenalb. *Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth* 11: 61-65.
- (1962) — Flora und Vegetation des Börstig bei Hallstadt/Bamberg. *Ber. Naturf. Ges. Bamberg* 38: 70-75.
- (1962) — Der Sandtraganth in Franken. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 39-42.
- (1964) — *Arabis turrita*, die Turm-Gänsekresse, ein isolierter Vorposten südlicher Flora in Franken. *Ber. Naturf. Ges. Bamberg* 39: 39-44.
- (1964) — *Linum anglicum* Miller — neu für Bayern. *Ber. Bayer Bot. Ges.* 37: 103-104.
- (1965) — *Coronilla emerus*, die Strauch-Kronwicke, ein wärmezeitliches Relikt der Frankenalb. *Op. cit.* 38: 89-92.
- (1966) — Der Amethystschnabel, neu für das Regensburger, Eichstätter und Erlanger Florengebiet. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges. N. F.* 20: 15-22.
- (1970) — Einstrahlungen der Alpenflora in der Fränkischen Alb. *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 35: 36-46.
- GERLACH, A., A. KRAUSE, K. MEISEL, B. SPEIDEL & W. TRAUTMANN (1970) — Vegetationsuntersuchungen im Solling. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 5: 75-134.
- GERLACH, A. & K. WOLDECKE (1968) — Neue Fundorte von *Cotoneaster integerrimus* Med. *Gött. Flor. Rundbriefe* 2: 22-23.
- GLAHN, H. v. (1970) — *Tussilago* und *Petasites*. Bestimmung nach Blattmerkmalen. *Kieler Notizen*. 1970: 16-18.
- GLAHN, H. v. & J. TÜXEN (1963) — Salzpflanzen-Gesellschaften und ihre Böden im Lüneburger Kalkbruch vor dem Bardowicker Tore. *Jahresh. Naturwiss. Ver. Fürstentum Lüneburg* 28: 1-32.
- GLAHN, H. v. & U. BOHN (1970) — Quantitative vegetationskundliche Untersuchungen zur Höhengliederung der Buchenwälder im Vogelsberg. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 5: 135-186.
- GLAHN, H. v. & A. KRAUSE (1969) — Über bodensaure Wald- und Gebüschgesellschaften trockenwarmer Standorte im Mittelrheingebiet. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 4: 85-102.
- GLAHN, H. v., A. KRAUSE & R. WOLFF-STRAUB (1970) — Über die Verteilung der Hainsimse (*Luzula luzuloides*) im Stammabflussbereich der Buche im Siebengebirge bei Bonn. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 5: 187-192.
- GÖRS, S. (1961) — Das Pfrunger Ried. Die Pflanzengesellschaften eines ober-schwäbischen Moorgebietes. *Veröff. Landesst. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württ.* 27/28: 5-45.
- (1963-64) — Beiträge zur Kenntnis basiphiler Flachmoorgesellschaften (Tofieldictalia Preisg. apud Oberd. 49) Teil 1 u. 2. *Op. cit.* 31: 7-30; 32: 7-42.
- (1964) — Die Blaue Heckenkirsche (*Lonicera coerulea*) im württembergischen Allgäu. *Op. cit.* 34: 7-13.

- (1966) — Die Flora des Spitzbergs. — In: Der Spitzberg bei Tübingen. Hrsg. von der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württ. (= Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 3) S. 535-591. Ludwigshafen.
- (1968) — Die Wasserfalle (*Aldrovanda vesiculosa* L.) im Landschaftsschutzgebiet Siechenweiher bei Meersburg. Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ. 36: 27-35.
- (1968) — Die Flora des Schwenninger Mooses. — In: Das Schwenninger Moos. Der Neckarursprung. Hrsg. von der Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg (= Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg 5) S. 148-149. Ludwigsburg.
- (1969) — Die Vegetation des Landschaftsschutzgebietes Kreuzweiher im württembergischen Allgäu. Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ. 37: 7-61.
- (1970) — Floristisch-soziologischer Vergleich der Weissklee-Weiden von Nordwest- und Süddeutschland. Schriftenreihe Vegetationskunde 5: 57-66.
- GÖRS, S., & Th. MÜLLER (1969) — Beitrag zur Kenntnis der nitrophilen Saumgesellschaften Südwestdeutschlands. Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F. 14: 153-168.
- GÖSSMANN, A. (1962) — Die Verbreitung und der pflanzensoziologische Anschluss von *Chamaecytisus ratisbonensis*, *Chamaecytisus supinus* und *Cytisus nigricans* in Süddeutschland. Denkschr. Regensb. Bot. Ges. N. F. 19: 6-25.
- GÖTZ, E. (1967) — Die *Aconitum variegatum*-Gruppe und ihre Bastarde in Europa. Feddes Repert. 76: 1-62.
- GOTTHARD, W. (1965) — Die Küchenschelle (*Pulsatilla vulgaris* Miller) im Ries. Bot. Jahrb. 84: 1-50.
- GOTTWALD, N. (1971) — Register der Hessischen Floristischen Briefe 1952-1968. Inst. Naturschutz Darmstadt. Schriftenreihe-Beih. 22.
- GRAEBNER, P. (fil.) (1964) — Die Pflanzenwelt des Paderborner Raumes. (= Schriftenreihe des Paderborner Heimatvereins 2).
- (1971) — Schuppenwurz, *Lathraea squamaria*, im Paderborner Raum. Natur u. Heimat (Münster) 31: 101-102.
- GRAFMAN, F. (1964) — Verschwundene und neue Arten in der Flora im Gebiet um Herborn und im angrenzenden Westerwald seit dem 18. Jahrhundert. Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. 33: 349-357.
- GRAFMAN, F. & F. LEHMANN (1963) — Botanische Neufunde auf Sylt. Die Heimat 70: 269-270, 360-361.
- GRAU, J. (1964) — Die Zytotaxonomie der *Myosotis alpestris*- und der *Myosotis silvatica*-Gruppe in Europa. Österr. Bot. Z. 111: 561-617.
- (1964) — *Myosotis decumbens* Host ssp. *decumbens* in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 37: 104-105.
- (1965-70) — Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung *Myosotis* L. Teil 1-4. Mitt. Bot. München 5: 675-688; 6: 517-530; 7: 17-100; 8: 127-136.
- (1967) — Unterschiede in der Chromosomengestalt bei *Moltkia* und *Lithospermum*. Ber. Deutsche Bot. Ges. 79: 182-187.

- (1967) — Primäre und sekundäre Chromosomenbasiszahlen bei *Omphalodes*. *Österr. Bot. Z.* 114: 66-72.
- (1968-71) — Cytologische Untersuchungen an Boraginaceen I und II. *Mitt. Bot. München* 7: 277-294; 9: 177-194.
- GRAU, J. & P. LEINS (1968) — Pollenkorntypen und Sektionsgliederung der Gattung *Myosotis*. *Ber. Deutsche Bot. Ges* 81: 107-115.
- GROSSMANN, A. (1969) — Zur Geschichte der botanischen Erforschung der Rhön. *Beitr. Naturk. Osthessen* 1: 19-47.
- (1970) — Neue Beiträge zur Flora der Rhön und des Fuldaer Landes. *Abh. Naturwiss. Ver Würzburg* 11: 43-56.
- (1970) — Zum Neufund des schwarzen Milzfarns — *Asplenium adiantum-nigrum* — in Dörnigheim (Kr. Hanau). *Jahresber. Wetterau. Ges. Naturk.* 121/122: 45-46.
- GROSSMANN, H. (1968) — Frühlingsgeophyten rheingauer und rheinhessischer Weinberge. *Jahrb. nass. Ver. Naturk.* 99: 117-126.
- (1969) — Die *Iris*-Arten des Rhein-Main-Gebietes. *Op. cit* 100: 99-111.
- GRÜNEWALD, W. (1963) — Neue Pflanzenfunde aus Nordosthessen. *Hess. Flor. Briefe* 12: 44.
- GRÜNINGER, W. (1967) — Neue Funde des Bemalten Perlgrases (*Melica picta* Koch). *Jahresh. Ver. Vaterländ. Naturk. Württemberg* 122: 126-128.
- GUTERMANN, W. (1962) — Diploides *Lamium galeobdolon* (sensu lato) in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 41-45.
- HACKEL, H. (1970) — *Peplis portula* L. (Sumpfuendel) für Südschwaben wiederentdeckt. *Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten* 14(2): 49-51.
- HAEUPLER, H. (1967) — Beitrag zur Kenntnis der *Potentillae vernaes*. *Gött. Flor. Rundbriefe* 1: 5-8. Neudruck 1969.
- (1967) — Eine Hilfe zum Ansprechen einiger Ackerehrenpreise der *Veronica agrestis*-Gruppe. *Op. cit.*: 8-10. Neudruck 1969.
- (1968) — Ein Schlüssel zum Bestimmen der kleinblütigen Hornkräuter (*Cerastium*). *Op. cit.* 2(1): 9-13.
- (1968) — Bestimmungshilfen für die *Trifolium alpestris*-Gruppe im blütenlosen Zustand. *Op. cit.* 2(3): 4-7.
- (1968) — Zur Kenntnis von *Bidens frondosus* L., einem Neubürger unserer Flora. *Op. cit.* 1968: 4-6.
- (1969) — *Epilobium adenocaulon* nun auch für Süd-Niedersachsen nachgewiesen. *Op. cit.* 3: 81-84.
- (1969) — Zur Flora des südöstlichen Niedersachsen. *Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, Math.-Nat. R.* 18: 430-433.
- (1969) — Morphologische und pflanzengeographische Beobachtungen an *Gagea*-Arten im südlichen Niedersachsen. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 14: 36-46.
- (1969) — Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen I. Folge. *Gött. Flor. Rundbriefe* 3: 55-59.
- (1969) — Ein Beitrag zum Bestimmen der deutschen *Geranium*-Arten nach Blattmerkmalen. *Op. cit.*: 69-76.
- (1970) — Vorschläge zur Abgrenzung der Höhenstufen der Vegetation im Rahmen der Mitteleuropakartierung. *Op. cit.* 4: 1-15; 54-62.

- (1971) — *Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. — ein Neubürger in Deutschlands Gramineenflora. *Op. cit.* 5: 63-68.
- HAEUPLER, H. & K. WÖLDECKE (1971) — Die Gefäßpflanzenflora der Eilenriede und ihre pflanzengeographische Stellung in Niedersachsen. *Beih. Ber. Naturh. Ges. Hannover* 7: 129-138.
- HAFFNER, P. (1960) — Zur Pflanzengeographie der «Unteren Saar» mit besonderer Berücksichtigung des Landschaftsschutzgebietes «Saarschleife» (I. Teil). *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege des Saarlandes* 2: 58-65.
- (1960) — Pflanzensoziologische und pflanzengeographische Untersuchungen in Muschelkalkgebiet des Saarlandes mit besonderer Berücksichtigung der Grenzgebiete von Lothringen und Luxemburg. *Op. cit.*: 66-164.
- (1964) — Pflanzensoziologische und pflanzengeographische Untersuchungen in den Talauen der Mosel, Saar, Nied, Prims und Blies. *Op. cit.* 3: 7-65.
- (1969) — Aus der Orchideenflora des Saarlandes. *Faunist.-Florist. Notizen Saarland* 2: 9-15.
- HAFFNER, W. (1968) — Die Vegetationskarte als Ansatzpunkt zu landschafts-ökologischen Untersuchungen. *ERDKUNDE, Archiv für wiss. Geographie* 22: 215-225.
- (1969) — Das Pflanzenkleid des Naheberglandes und des südlichen Hunsrück in ökologisch-geographischer Sicht. *Decheniana, Beih.* 15.
- HAILER, N. (1965) — Die pflanzensoziologische Standorterkundung im Staatswald des Forstamtes Germersheim. *Mitt. d. Pollichia. III. Reihe*, 12: 246-280.
- (1969) — Die Traubeneiche im Pfälzer Wald. *Op. cit.* 16: 51-95.
- HAMANN, U. & G. WAGENITZ (1970) — Bibliographie zur Flora von Mitteleuropa. München.
- HARD, G. (1963) — Einige floristische Neufunde im Bliesgau. *Pfälzer Heimat* 14: 114-115.
- HARTL, D. & G. DUBITZKY (1971) — Bemerkenswerte Pflanzen des Mainzer Raumes. *Hess. Florist. Br.* 20: 57-60.
- HARTMANN, F. K. (1968) — Über die pflanzengeographisch-systematische Abgrenzung und synökologische Stellung der Assoziationen und Subassoziationen der Eichen-Hainbuchenwälder im westlichen und mittleren deutschen Berg- und Hügelland einschliesslich des fränkisch-thüringischen Raumes. *Feddes Repert.* 79: 87-97.
- HARTMANN, F. K. & G. JAHN (1967) — Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. Band 1. Stuttgart.
- HARTMANN, F. K. & F. SCHNELLE (1970) — Klimagrundlagen natürlicher Waldstufen und ihrer Waldgesellschaften in deutschen Mittelgebirgen (= Ökologie der Wälder und Landschaften 4). Stuttgart.
- HAUFF, R. (1964) — Kurzer Überblick über die Vegetation Oberschwabens. Standort, Wald und Waldwirtschaft in Oberschwaben. S. 27-54. Stuttgart.
- (1964) — Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25.000 Blatt 8123 Weingarten. Hrsg. Staatl. Mus. Naturk. Stuttgart.
- HEINE, H. (1962) — *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray. *Hess. Flor. Briefe* 11(130): 37-46.

- HEINRICHS, M. (1969) — Pflanzengesellschaften des Burlo-Vardingholter Venns. *Natur u. Heimat (Münster)* 20: 36-39.
- HELDT, E. (1961) — Zum Vorkommen der Trollblume bei Borgentreich und Körbecke, Kreis Warburg. *Natur u. Heimat (Münster)* 21: 92.
- HENKER, H. (1965) — Die Gattung *Sigesbeckia* L. in Europa unter besonderer Berücksichtigung von Deutschland. *Archiv d. Freunde Naturgesch. Mecklenburg* 11: 7-54.
- HERTEL, H. & K. P. BUTTLER (1966) — Ein zweiter Fundort von *Pulsatilla patens* (L.) Miller in Niederbayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 39: 123.
- HESMER, H. & F. G. SCHROEDER (1963) — Waldzusammensetzung und Waldbehandlung im Niedersächsischen Tiefland westlich der Weser und in der Münsterschen Bucht bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. *Decheniana Beih.* 11: 1-304.
- HEYKENA, A. (1965) — Vegetationstypen der Küstendünen an der östlichen und südlichen Nordsee. *Mitt. Arbeitsgem. Flor Schleswig-Holst. & Hamburg* 13: 135 S.
- HIEMEYER, F. (1966) — Über das Vorkommen des Klebrigen Salbeis (*Salvia glutinosa*) in der Umgebung von Augsburg. *Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben* 70: 10-11.
- (1966) — Botanisches um Lech und Wertach im Jahre 1965. *Op. cit.* 38-44.
- (1967) — Über das Vorkommen der Violetten Stendelwurz *Epipactis sessilifolia* um Augsburg und über bemerkenswerte Funde im Jahre 1966. *Op. cit.* 71: 35-38.
- (1969) — Erwähnenswerte floristische Funde in der Augsburger Umgebung. *Op. cit.* 73: 36-37.
- (1969) — Floristische Bestandsaufnahme einer kleinen Auen- und Heidefläche an der Wertach. *Op. cit.*: 54-58.
- HILD, D. (1968) — Die Naturschutzgebiete im nördlichen Rheinland. *Schriftenr. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Nordrhein-Westfalen* 3, 106 S.
- HILD, D. & K. REHNELT (1965) — Öko-soziologische Untersuchungen an einigen niederrheinischen Kolken. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 78: 289-304.
- (1966) — Hydrobotanische Untersuchungen am Altrhein bei Rees (Niederrhein). *Op. cit.* 79: 355-372.
- (1967) — Öko-soziologische Untersuchungen am Boetzelaerer Meer (Niederrhein). *Op. cit.* 80: 647-668.
- (1971) — Öko-soziologische Untersuchungen an einigen niederrheinischen Meeren. *Op. cit.* 84: 19-39.
- HÖLLER, J. (1964) — *Carex caespitosa* L. in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 105-107.
- HÖLZINGER, J., K. MÜLLER & K. SCHILHANSL (1969) — Die Pflanzen- und Vogelwelt des Schmiecher Sees. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württemberg* 124: 172-184.
- HÖPFNER, B. (1966) — Ökophysiologische Untersuchungen in einem extrem sauren Calamagrostidetum epigeios. Diss. Giessen.
- HOFMANN, W. (1962) — Der Speierling in Franken. *Forstwiss. Cbl.* 81: 148-155.
- (1964-65) — Laubwaldgesellschaften der Fränkischen Platte. *Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg* 5/6: 3-194.

- HOFMEISTER, H. (1971) — Pflanzengesellschaften der Weserniederung oberhalb Bremens. *Diss. Bot.* 10.
- HOHENESTER, A. (1967) — Silbergrasfluren in Bayern. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 11-21.
- (1967) — Festuco-Sedetalia-in Franken. *Op. cit.*: 206-209.
- HOLUB, J. (1962) — Beitrag zur Taxonomie der Art *Senecio paludosus* L. *Nov. Bot. horti bot. Univ. Carolinae Pragensis* 1962: 25-34.
- HORST, K. (1964) — Klima und Bodenfaktoren in Zwergstrauch- und Waldgesellschaften des Naturschutzparks Lüneburger Heide. *Naturschutz u. Landschaftspflege in Niedersachsen* 2, 60 S.
- HORSTMAYER, C. & D. HORSTMAYER (1967) — Salzpflanzen am Huckberg/Teutoburger Wald. *Natur u. Heimat (Münster)* 27: 10-11.
- HÜLBUSCH, K. H. (1969) — *Rumex obtusifolius* in einer neuen Flutrasengesellschaft an Flussufern Nordwest- und Westdeutschlands. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 14: 169-178.
- (1970) — Die Floh-Segge (*Carex pulicaris* L.) in einem Kalk-Kleinseggenried bei Eisbergen/Wesertal. *Natur u. Heimat (Münster)* 30: 105-110.
- HÜLBUSCH, K. H. & R. TÜXEN (1968) — *Corydalis claviculata* — *Epilobium angustifolium*-Ass. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 13: 224.
- HÜNERBEIN, K. (1968) — Kritischer Beitrag zum taxonomischen Problem der rosablütigen Winde in Westfalen. *Natur u. Heimat (Münster)* 28: 30-33.
- (1969) — Beitrag zum taxonomischen Problem der gross- und rosablütigen Winde in Westfalen. *Decheniana* 122: 75-85.
- HUNDT, R. (1961) — Ein Fundort von *Conopodium denudatum* Koch im Westharz. *Bot. Jahrb.* 81: 201-212.
- HUPKE, H. (1960) — Adventivpflanzen, die in den Jahren 1946-1959 im Kreise Alsfeld (Oberhessen) beobachtet wurden. *Hess. Flor. Briefe* 9: 46-48.
- IMMEL, W. (1966) — Die Ästige Mondraute im Siegerland. *Natur u. Heimat (Münster)* 26: 117-118.
- JAGE, H. (1964) — Über das gegenwärtige Vorkommen von *Lolium remotum* Schrank. *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 101: 77-82.
- JAHS, W. (1962) — Zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften des Grossen und Weissen Moores bei Kirchwalsede (Krs. Rotenburg/Hann.). *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 9: 88-94.
- JANSEN, W. (1971) — Die Ausbreitung der Mauerraute in Schleswig-Holstein. *Kieler Notizen* 3: 24-25.
- JENSEN, J. (1969) — Die Aufschlüsselung der in Schleswig-Holstein vorkommenden Papilionaceae mit dreiteilig zusammengesetzten Blättern im blütenlosen Zustand. *Kieler Notizen* 1969: 3-16.
- JENSEN, U. (1961) — Die Vegetation des Sonnenberger Moores im Oberharz und ihre ökologischen Bedingungen. *Naturschutz u. Landschaftspflege in Niedersachsen* 1, 73 S.
- (1967) — Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Ranunculaceae aus serologischer Sicht. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 79: 407-412.
- (1968) — Serologische Beiträge zur Systematik der Ranunculaceae. Teil I und II. *Bot. Jahrb.* 88: 204-268; 269-310.

- JESCHKE, L. (1962) — Vegetationskundliche Beobachtungen in Listland (Insel Sylt). *Beitr. Bez. Naturkundemus. Stralsund* 1: 67-84.
- JOST, O. (1969) — Die Samen- oder Blütenpflanzen (Spermatophyta) des Naturdenkmals «Zeller Loch» bei Fulda. *Beitr. Naturk. Ostthessen* 1: 48-65.
- KAHL, F. (1969) — *Platanthera* in Schleswig-Holstein. *Kieler Notizen* 1969: 4-6.
- KAHNE, A. (1960) — Die Vegetation der Steppenheidegebiete bei Bad Dürkheim. *Mitt. d. Pollichia*, III. Reihe, 7: 151-219.
- (1966) — Die Vorderpfälzischen Steppenheidegesellschaften mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bewurzelungsverhältnisse. *Op. cit.* 13: 11-82.
- (1967) — Die Steppenheiden der Vorderpfalz I. *Op. cit.* 14: 94-120.
- KALHEBER, H. (1971) — *Luzula multiflora* (Retz) Lej. ssp. *congesta* (Thuill.) Hyl., eine wenig beachtete Sippe der Vielblütigen Hainsimse. *Hess. Flor. Briefe* 20: 33-36.
- KALHEBER, H. & H. KALHEBER (1966) — Das Ausklingen des Vorkommens von *Scilla bifolia* im mittleren Lahntal. *Hess. Flor. Briefe* 15: 1-4.
- KAZMI, S. M. A. (1964) — Revision der Gattung *Carduus* (Compositae). *Mitt. Bot. München* 5: 279-550.
- (1964) — Die Gattung *Carduus* in Deutschland. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 53-59.
- KELLNER, K. (1966) — *Glyceria declinata* Bréb. im Bayerischen Wald. *Bayer. Bot. Ges.* 39: 124-125.
- KERSBERG, H. (1968) — Die Prümer Kalkmulde (Eifel) und ihre Randgebiete. Landschaftsökologische und vegetationskundliche Untersuchungen. *Schriftenr. Landesst. Naturschutz u. Landschaftspflege Nordrhein-Westfalen* 4: 223 S.
- KIES, E. (1969) — Die Verbreitung einiger montaner Pflanzen in Nordbayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 41: 51-53.
- KIMMEL, A. (1962) — Untersuchungen über die Entwicklung der Vegetation der Schlagflächen im Vorderen Vogelsberg. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 32: 142-150.
- KIMMEL, U. (1964) — Beobachtungen zur vegetativen Entwicklung der Pflanzenarten und zur Regeneration des Pflanzenbestandes auf Schlagflächen. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 33: 359-371.
- KITLITZ, A. (1966) — Kartierung der nordwestlichsten Standorte des Leberblümchens auf dem Länierzug des Teutoburger Waldes. *Natur u. Heimat (Münster)* 26: 27-29.
- KLAPP, E. (1965) — Grünlandvegetation und Standort nach Beispielen aus West-, Mittel- und Süddeutschland. Berlin-Hamburg.
- KLAUSING, O. (1961) — Wasserzustand und Wasserbilanz von Vegetation und Boden an Standorten bestimmter Pflanzengesellschaften des Mittelwesergebietes. *Angew. Pflanzensoz.* 18, 255 S.
- KLAUSING, O., W. LOHMEYER & K. WALTHER (1963) — Bibliographie zum Thema Produktionspotentiale von Pflanzengesellschaften. *Excerpta Botanica B* 5: 161-202.
- KLEE, I. (1961) — Untersuchungen über den Artenbestand in Rotklee und Luzerneäckern im Oberlahnkreis. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 31: 94-121.

- (1964) — Experimentelle Untersuchungen über gegenseitige Beeinflussungen zwischen Rotklee, Luzerne und einigen Unkraut-Arten bei der Keimung. *Op. cit.* 33: 131-140.
- KLEMENT, O. (1966) — Die Vegetationsverhältnisse am Lech bei Illasberg. *Ber. Naturf. Ges. Augsburg* 18: 37-72.
- KLINGER, P. U. (1967) — Zur Vegetation des Weissen Moores bei Heide. *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst.* 37: 100-105.
- (1970) — Zur Vegetation des Schwarzsees bei Mölln. *Kieler Notizen* 1970: 2-12.
- KNAPP, G. (1961) — Vegetations-Einheiten der Wegränder und der Eisenbahnanlagen in Hessen und im Bereich des unteren Neckar. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 31: 122-154.
- (1963) — Die Vegetation des Odenwaldes unter besonderer Berücksichtigung des Naturparkes «Bergstrasse-Odenwald». *Inst. f. Naturschutz Darmstadt, Schriftenreihe* 6(4).
- (1963) — Entwicklungs-Möglichkeiten der Wald-Vegetation nach Einwirkung bestimmter experimenteller Beeinflussungen und wirtschaftliche Massnahmen am Beispiel von Beständen im Bergischen Land (Rheinisches Schiefergebirge). *Geobot. Mitt.* 19, 241 S.
- (1964) — Ackerunkraut-Vegetation im unteren Neckar-Land. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 33: 395-402.
- (1964) — Über die Unkraut-Vegetation auf einigen Halmfrucht-Ackern mit sehr kalkreichen Böden im östlichen Hessen. *Op. cit.* 141-144.
- (1965) — Vegetation und Flora des Habichtswald-Gebietes. *Hess. Flor. Briefe* 14: 11-17.
- (1967) — Die Vegetation des Landes Hessen. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 35: 93-148.
- (1967) — Experimentelle Soziologie und gegenseitige Beeinflussung der Pflanzen (Einführung in die Pflanzensoziologie, Zusatzband). 2. Aufl. Stuttgart.
- (1968) — Bibliographie zur experimentellen Soziologie der Pflanzen. *Geobot. Mitt.* 55, 62 S.
- (1969) — Änderungen in der Vegetation Hessischer Gebirge in den letzten Jahrzehnten. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 14: 274-286.
- (1969) — Kalkvegetation in tiefen Lagen der Rhön und ihrem Vorland. *Hess. Flor. Briefe* 18: 5-14.
- (1969-70) — Bibliographie zur experimentellen Pflanzensoziologie. *Excerpta Botanica B* 10: 97-140.
- (1970) — Beiträge zur Vegetationskunde von Hessen. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 37: 119-130.
- (1971) — Die Pflanzenwelt der Rhön, unter besonderer Berücksichtigung der Naturparkgebiete. Lehre.
- (1971) — Einführung in die Pflanzensoziologie. 3. Aufl. Stuttgart.
- KNAPP, G. & A. STOFFERS (1962) — Über die Vegetation von Gewässern und Ufern im mittleren Hessen und Untersuchungen über den Einfluss von Pflanzen auf Sauerstoffgehalt, Wasserstoff-Ionen-Konzentration und die Lebensmöglichkeit anderer Gewächse. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde N. F. Naturw. Abt.* 32: 90-141.

- KNAUER, N. (1967) — Einfluss von Alter und Bewirtschaftung auf die Narbenzusammensetzung von Weidelgras-Weiden. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 11/12: 54-64.
- KNÖRZER, K. H. (1963) — Pflanzenwanderungen am Niederrhein. *Der Niederrhein* 30: 134-137.
- KÖSTLER, J. N. & H. MAYER (1970) — Waldgrenzen im Berchtesgadener Land. *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 35: 121-153.
- KÖTTER, F. (1961) — Die Pflanzengesellschaften im Tidegebiet der Unterelbe. *Arch. Hydrobiol. Suppl.* 26: 106-184.
- KOHLER, A. (1963) — Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Deutschland. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 22: 3-18.
- KOHLER, A. & H. SUKOPP (1963) — Über die Gehölzentwicklung auf Berliner Trümmerstandorten. Zugleich ein Beitrag zum Studium neophytischer Holzarten. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 76: 389-406.
- KOHLER, A., H. VOLLRATH & E. BEISL (1971) — Zur Verbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie der Gefäß-Makrophyten im Fließwassersystem Moosach (Münchener Ebene). *Arch. Hydrobiol.* 69: 333-365.
- KONCZAK, P., H. SUKOPP & E. WEINERT (1968) — Zur Verbreitung und Vergesellschaftung von *Urtica kioviensis* Rogowitsch in Brandenburg. *Verh. Bot. Ver. Brandenburg* 105: 108-116.
- KONOPKA, K. (1966) — Petersens Flora von Lübeck und Umgebung fortgeführt von K. KONOPKA. *Ber. Ver. «Natur u. Heimat» u. Naturhist. Mus. Lübeck* 7/8: 19-138.
- KOPPE, F. (1962) — Die Vegetationsverhältnisse des Stockbergs bei Ottbergen, Kreis Höxter. *Natur u. Heimat (Münster)* 22: 97-103.
- (1963) — Die Halophytenflora der Solstellen von Salzkotten 1912 und 1962. *Op. cit.* 23: 99-106.
- (1967) — Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes «Vennepohl» bei Sudendorf, Kreis Osnabrück. *Op. cit.* 27: 97-104.
- (1969) — Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen. *Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld* 19: 71-95.
- KORNECK, D. (1961) — Über einige in Baden und im Elsass vorkommende Schafschwingel (*Festuca ovina* L. s. lat.). *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz* N. F. 8: 187-196.
- (1962-63) — Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet, I, II, III. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 21: 55-77; 165-190; 22: 19-44.
- (1962) — Notizen über *Atriplex heterosperma* Bunge. *Hess. Flor. Briefe* 12: 15-16.
- (1966) — Die Amethyst-Sommerwurz (*Orobanchë amethystea* Thuill.) in Rheinhessen. *Op. cit.* 15: 35-40.
- (1969) — Das Sclerochloa-Polygonetum avicularis, eine seltene Trittgemeinschaft in Trockengebieten Mitteleuropas. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 14: 193-210.
- KOSSEL, H. & K. STRASBURGER (1966) — Bemerkungen zur Flora des Kreises Fallingb. *Jahresh. Naturwiss. Ver. Lüneburg* 29: 75-96.

- KOVANDA, M. (1968) — New taxa and combinations in the Subsection Heterophylla (Witas.) Fed. of the genus *Campanula* L. *Fol. Geobot. Phytotax. Bohem.* 3: 407-411.
- KRAISS, A. (1966) — Zweite Liste neuer Aufsammlungen von Habichtskräutern (Gattung *Hieracium*) aus südlichem Schwarzwald und Oberrheintal. *Mitt. Bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F.* 9: 133-149.
- KRAUSE, W. (1963) — Eine Grünland-Vegetationskarte der südbadischen Rheinebene und ihre landschaftsökologische Aussage. *Arb. Rhein. Landeskunde* 20: 1-77.
- KRAUSS, G. (1969) — *Chenopodium bonus-henricus* L. zwischen Solling, Warburger Börde und Kaufunger Wald. *Gött. Flor. Rundbriefe* 3: 44-47.
- KRESS, A. (1963) — Cytotaxonomische Untersuchungen an den Primeln der Sektion Auricula Pax. *Österr. Bot. Z.* 110: 53-102.
- (1963) — Cytotaxonomische Untersuchungen an Primulaceen. *Phyton (Graz)* 10: 225-236.
- (1963) — Zytotaxonomische Untersuchungen an den *Androsace*-Sippen der Sektion Aretia (L.) Koch. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 36: 33-39.
- (1965) — Zur Zytotaxonomie der *Androsace-Vitaliana-Douglasia*-Verwandtschaft. *Mitt. Bot. München* 5: 653-674.
- (1969) — Zytotaxonomische Untersuchungen an Primulaceen. *Phyton (Graz)* 13: 211-225.
- KRISAL, R. (1966) — Die Vegetationsverhältnisse des Kesselsee-Moores bei Wasserburg am Inn, Obb. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 39: 63-66.
- KROLL, H. (1970) — *Calystegia*, Bestimmung nach Blütenmerkmalen. *Kieler Notizen* 1970: 3.
- (1970) — Bestimmungsschlüssel der in Schleswig-Holstein vorkommenden Arten der Gattungen *Malva* und *Althaea*. *Kieler Notizen* 1970: 3-5.
- KÜNKELE, S. (1970) — Bemerkungen zu den autogamen *Epipactis*-Sippen in Württemberg. *Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal* 23: 104-105.
- KÜNNE, H. (1969) — Laubwaldgesellschaften der Frankenalb. *Diss. Bot.* 2.
- (1969) — Über die Verbreitung einiger pflanzengeographischer Leitpflanzen innerhalb der Frankenalb. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 41: 47-50.
- KÜSEL, H. (1967) — Die Verbreitung des Gefäßkryptogamen im Bremer Beobachtungsgebiet. *Abh. naturw. Ver. Bremen* 37: 109-146.
- (1968) — Zur Einbürgerung des Kleinen Liebesgrases (*Eragrostis poaeoides* P. B.) in Nordwestdeutschland. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 13: 10-14.
- (1969) — Bemerkenswerte floristische und pflanzensoziologische Forschungsergebnisse aus dem Bremer Beobachtungsgebiet. *Op. cit.* 14: 47-67.
- KUHN, L. (1961) — Die Verlandungsgesellschaften des Federseerieds. *Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg* 2: 1-69.
- LAMPRECHT, H. v. (1962) — Cyto-systematische Untersuchungen an *Anemone nemorosa* L. und *Anemone ranunculoides* L. *Beitr. Biol. Pfl.* 37: 107-146.
- LANG, G. (1962) — Vegetations- und Standortsuntersuchungen in der Grenzzone des Bodenseeufer. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 75: 366-377.

- (1967) — Die Ufervegetation des westlichen Bodensees. *Arch. Hydrobiol. Suppl.* 32: 437-574.
- (1968) — Vegetationsänderungen am Bodenseeufer in den letzten hundert Jahren. *Schr. Ver. Geschichte des Bodensees* 86: 295-319.
- LANG, H. (1961-63) — Die Seggen Hofs und seiner näheren Umgebung *Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth* 11: 251-254.
- LANG, W. (1969, 1970) — Die Edelkastanien, ihre Verbreitung und ihre Beziehungen zu den naturgegebenen Grundlagen. I + II. *Mitt. d. Pollichia*, III. Reihe, 16: 5-50, 17: 81-124.
- LANGE, E. (1968) — Zum Vorkommen von *Xanthium strumarium* L. in Mitteleuropa. *Feddes Repert.* 77: 57-60.
- LANGE, H. (1961) — Die Säulengriffelige Rose (*Rosa stylosa* Desv.) in Westfalen. *Natur u. Heimat (Münster)* 21: 41-44.
- (1962) — Wildrosen im mittleren Westfalen. *Abh. Landesmus. Naturk. Münster* 24(3): 44-71.
- LANGER, G. (1966) — *Carex reichenbachii* Bonn. und *Carex pendula* Huds., seltene *Carex*-Arten in Holstein. *Die Heimat* 73: 136-137.
- LANGER, H. (1961) — Die Fichtenforsten in BaZerisch-Schwaben im Übergang von der Moräne. *Bot. Jahrb.* 80: 480-499.
- (1961) — Zur postglacialen Waldentwicklung im Tertiären Hügelland und die heutigen Forstgesellschaften. *Ber. Naturf. Ges. Augsburg* 12: 11-34.
- (1962) — Beiträge zur Kenntnis der Waldgeschichte und Waldgesellschaften Süddeutschlands. *Op. cit.* 14: 1-120.
- LANGER, H. & G. ROSSMANN (1961) — Übersicht der Fichtenforsten der Allgäuer Moräne II. Teil: Freiflächen und Stangenhölzer. *Bot. Jahrb.* 80: 195-204.
- LAUER, H. (1961) — Die Pflanzengesellschaften des Wildensteiner Tales. *Mitt. d. Pollichia*, III. Reihe, 8: 5-99.
- LEINS, P. (1968) — Versuch einer Gliederung der Inulinae und Bupthalthinae nach den Pollenkorntypen. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 81: 498-504.
- (1971) — Pollensystematische Studien an Inuleen. I. Tarchonanthisinae, Plucheinae, Inulinae, Bupthalthinae. *Bot. Jahrb.* 91: 91-146.
- LEINS, P. & H. MERXMÜLLER (1966) — Zur Gliederung der *Oxytropis campestris*-Gruppe. *Mitt. Bot. München* 6: 19-31.
- LERCH, G. (1965) — Pflanzenökologie. (= Wiss. Taschenbücher 27), Berlin.
- LEWEJOHANN, K. (1964) — Neue Pflanzenfunde vom Stockberg bei Ottbergen, Kreis Höxter. *Natur u. Heimat (Münster)* 24: 49-51.
- (1967) — Der Wunderseggensumpf (*Caricetum appropinquatae*) im nördlichen Westfalen. *Op. cit.* 27: 8-9.
- (1968) — Zur Unterscheidung von *Carex aquatilis* und *Carex gracilis*. *Gött. Flor. Rundbr.* 2(3): 8-9.
- (1968) — Zum Vorkommen der Schwaden-Arten um *Glyceria fluitans*, insbesondere von *G. declinata* Bréb. *Gött. Flor. Rundbriefe* 2(4): 23-24.
- (1969) — *Linum leonii* Schultz und sein Vorkommen in Südniedersachsen. *Op. cit.* 3: 7-10.
- (1971) — Die Gattung *Orobanche* im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Gebieten. *Op. cit.* 5: 6-10.

- LEWEJOHANN, K. & H. LIENENBECKER (1969) — Ein Vorkommen des Pillenfarns (*Pilularia globulifera*) im Naturschutzgebiet Barrelepäule. *Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld* 19: 121-123.
- LIENENBECKER, H. & I. LIENENBECKER (1967) — Das Gagelgebüsch (*Myricetum galis*) im Naturschutzgebiet «Heiliges Meer». *Natur u. Heimat (Münster)* 27: 26-27.
- (1968) — Die Graukressen-Gesellschaft (*Berteroetum incanae* im östlichen Westfalen. *Op. cit.* 28: 126-127.
- (1971) — Die Pflanzengesellschaften in Raum Bielefeld. *Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld* 20: 67-170.
- LINHARD, H. (1964) — Die natürliche Vegetation im Mündungsgebiet der Isar und ihre Standortverhältnisse. *Ber. Naturw. Ver. Landshut* 24: 7-79.
- (1968) — Naturnahe Vegetation zwischen Inn und unterer Rott. *Op. cit.* 25: 29-42.
- LIPPERT, W. (1966) — Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes Berchtesgaden. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 39: 67-122.
- LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1971) — Verbreitung von Glazialpflanzen im Vereisungsgebiet des Schwarzwalds. *Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br.* 51: 209-244.
- (1963) — Neue Pflanzen-Fundberichte aus Südbaden. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz* 8: 463-475.
- (1966) — Die Pflanzenwelt am Isteiner Klotz. — In: Der Isteiner Klotz. Hrsg. H. SCHÄFER & O. WITTMANN (= *Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs* 4: 111-268). Freiburg i. Br.
- LÖHR, O. (1957-68) — Bericht über die biologische Erforschung der Pfalz in den Jahren 1945-1963 (im Jahre 1957,... 1963). *Pfälzer Heimat* 8: 117-120; 9: 113-114; 10: 39; 11: 128; 12: 119-120; 13: 155; 15: 36-38.
- (1965) — Die Pflanzengesellschaften der Rambach bei Mölschbach. *Mitt. d. Pollichia*, III. Reihe, 12: 235-245.
- LÖTSCHERT, W. (1965) — Beiträge zur Ökologie der subatlantischen Zwergstrauchheide NW-Deutschlands I—III. *Beitr. Biol. Pfl.* 37: 331-380, 381-410; 41: 359-366.
- (1964) — Vegetation, Trophiegrad und pflanzengeographische Stellung des Salemer Moores. *Beitr. Biol. Pfl.* 40: 65-111.
- (1964) — *Carex binervis* Smith im Unterwesterwald. *Jahrb. nass. Ver. Naturk.* 97: 93-94.
- (1966) — Die Pflanzenwelt der Westerwälder Seenplatte. *Natur und Museum* 96: 139-150.
- (1967) — Bodenatmung an verschiedenen Standorten. *Beitr. Biol. Pfl.* 43: 105-115.
- (1968) — Die Pflanzengesellschaften des Morsumkliffs. *Natur und Museum* 98: 319-334.
- (1969) — Pflanzen an Grenzstandorten. Stuttgart.
- LOHMEYER, W. (1962) — Zur Gliederung der Zwiebelzahnwurz (*Cardamine bulbifera*)-Buchenwälder im nördl. Rheinischen Schiefergebirge. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 9: 187-193.

- (1967) — Über den Stieleichen-Hainbuchenwald des Kern-Münsterlandes und einige seiner Gehölz-Kontaktgesellschaften. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 2: 161-180.
- (1970) — Über das Polygono-Chenopodietum in Westdeutschland unter besonderer Berücksichtigung seiner Vorkommen am Rhein und im Mündungsgebiet der Ahr. *Op. cit.* 5: 7-28.
- (1970) — Zur Kenntnis einiger nitro- und thermophiler Unkrautgesellschaften im Gebiet des Mittel- und Niederrheins. *Op. cit.*: 29-44.
- (1970) — Über einige Vorkommen naturnaher Restbestände des Stellario-Carpinetum und des Stellario-Alnetum glutinosae im westlichen Randgebiet des Bergischen Landes. *Op. cit.*: 67-64.
- LOSERT, H. (1969) — Zur Verbreitung von *Myrica gale* im Regierungsbezirk Lüneburg. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 14: 32-35.
- LUDWIG, W. (1961) — *Cochlearia officinalis* s. str. und *Cochlearia pyrenaica* in Hessen. *Hess. Flor. Briefe* 10: 51-53.
- (1962, 1966) — Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen, Teil 1 und 2. *Jahrb. nass. Ver. Naturk.* 96: 6-45; 98: 64-95.
- (1963) — Notizen zur Flora Nordhessens, insbesondere des Werratales. *Hess. Flor. Briefe* 12: 33-39.
- (1965) — Ältere Funde und Angaben von *Orchis pallens* aus Hessen. *Op. cit.* 14: 19-22.
- (1965) — *Potamogeton panormitanus*, eine übersehene Art der hessischen Flora. *Op. cit.* 14: 55-58.
- (1967) — Über *Ceratophyllum submersum*-Funde, besonders in Nordhessen. *Op. cit.* 16: 9-11.
- (1968) — *Aphanes microcarpa*, der «kleinfrüchtige Ackerfrauenmantel» auch in Hessen. *Abh. Ver. Naturk. Kassel* 62: 1-2.
- (1968) — Über *Lathyrus nissolia* in Hessen. *Op. cit.* 62: 2-5.
- (1968) — Bemerkungen über die Phanerogamenflora des Schwarzwälder Belchens. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 27: 21-25.
- (1969) — Über *Allium narcissiflorum* hort. non Vill. *Hess. Flor. Briefe* 18: 29-31.
- (1970) — *Alyssum murale* W. & K. (= *A. argenteum* hort. et auct. mult. non All.) in Gärten und als verwildernde Zierpflanze. *Op. cit.* 19: 55-60.
- (1970) — Über *Callitriche obtusangula*, eine Wassersternart der südhessischen Flora. *Jahresber. Wetterau. Ges. Naturk.* 121/122: 39-45.
- (1971) — *Cardamine parviflora* in Hessen, Süd-Niedersachsen und Baden-Württemberg. *Hess. Flor. Briefe* 20: 37-40.
- LUDWIG, W. & I. LENSKE (1969) — Zur Kenntnis der Hessischen Flora. *Jahresber. nass. Ver. Naturk.* 100: 112-133.
- (1971) — *Cornus* (*Swida*) $\times$ *hungaria* in Rheinhessen und an der Bergstrasse. *Hess. Flor. Briefe* 20: 9-12.
- LÜTTGE, M. (1964) — Das «König Karl Zepter» *Pedicularis sceptrum carolinum* L. im Augsburger Raum. *Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben* 68: 18-20.
- (1966) — Botanische Besonderheiten in der Umgebung von Augsburg während der Vegetationsperiode 1965. *Op. cit.* 70: 5-7.
- (1967) — Zur Flora der Königsbrunner Heide. *Op. cit.* 71: 5-13

- LUTZ, J. L. & H. SCHMEIDL (1966) — *Kalmia angustifolia* in den südlichen Chiemseemooren. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 39: 125-126.
- LUX, H. (1964) — Die biologischen Grundlagen der Strandhaferpflanzung und Silbergrasansaat im Dünenbau. *Angew. Pflanzensoz.* 20: 6-48.
- (1966) — Zur Ökologie des Strandhafers (*Ammophila arenaria*) unter besonderer Berücksichtigung seiner Verwendung im Dünenbau. *Beitr. Landespflege* 2: 93-107.
- MACHULE, M. (1962) — Die wichtigsten infraspezifischen *Thymus*-Sippen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 57-72.
- (1963) — Vorschlag zu einer Neugliederung des mitteleuropäischen *Cerastium-arvense*-Komplexes. *Hess. Flor. Briefe* 12: 57-59.
- MALENDE, B. (1961) — Naturschutz und Pflanzenwelt im Landkreis Hanau. *Jahresber. Wetterau. Ges. Naturk.* 113/114: 89-103.
- (1961) — Botanische Beiträge in den Berichten der Wetterauischen Gesellschaft und ergänzende Übersicht über neue floristische Beobachtungen. *Op. cit.*: 105-108.
- MALKUSCH, K. (1963) — Untersuchungen über die Vegetation des Niers-Tales im nördlichen Rheinland sowie über Eigenschaften von Wasser- und Uferpflanzen bei ihrer Bestandes-Bildung und bei ihrer Entwicklung im Frühjahr. *Geobot. Mitt.* 18, 96 S.
- MANG, F. (1962) — Zur Kenntnis der gegenwärtigen Vertreter der *Salix*-Sektion Incubaceae Dumortier und ihrer häufigsten Bastarde in Schleswig-Holstein, Hamburg und den angrenzenden Gebieten. *Mitt. Arbeitsgem. Flor. Schleswig-Holst. & Hamburg* 10, 79 S.
- (1964) — Der Weidenblättrige Sauerampfer und seine Verbreitung im Ästuar der Elbe. *Die Heimat (Neumünster)* 71: 362-364.
- (1968) — *Crataegus* L. in Sp. pl. (1735), p. 475 — Weissdorn-Schlüssel zur Bestimmung der in Deutschland heimischen und heimisch gewordenen Arten und häufiger Bastarde nach vegetativen und generativen Merkmalen. *Gött. Flor. Rundbriefe* 2(4): 3-12.
- MANTON, I. & T. REICHSTEIN (1965) — Die Chromosomenzahlen von *Cystopteris sudetica* A. Br. et Milde von Berchtesgaden (Bayern) sowie von *Cystopteris dieckiana* Sim. s. l. vom Footstock (Kanton Glarus, Schweiz). *Bauhinia* 2: 307-311.
- MARQUARDT, F. (1965) — *Amaranthus blitoides* S. Wats. Westamerikanischer Fuchsschwanz in und um Darmstadt. *Hess. Flor. Briefe* 15: 11-13.
- (1967) — *Oxalis dillenii* Jacq. in Darmstadt und Umgebung. *Op. cit.* 16: 53-58.
- (1971) — Neuere floristische Beobachtungen in Südhessen, insbesondere an der nördlichen Bergstrasse. *Op. cit.* 20: 21-24.
- MARTINOVSKY, J. O. & H. SCHOLZ (1968) — *Stipa bavarica* — eine neue Federgrasart. XIII. Beitrag zur Kenntnis der europäischen Federgrassippen. *Willdenowia* 4: 317-324.
- MAYER, H. (1963) — Tannenreiche Wälder am Nordabfall der mittleren Ostalpen. München-Basel-Wien.
- (1965) — Zur Waldgeschichte des Steinernen Meeres (Naturschutzgebiet Königssee). *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. &-tiere* 30: 100-120.

- (1966) — Waldgeschichte des Berchtesgadener Landes (Salzburger Kalkalpen.) *Forstwiss. Forsch., Beih. Forstwiss. Centralbl.* 22: 1-42.
- MAYER, H., R. FELDNER & W. GRÖBL (1967) — Montane Flechtenwälder auf Hauptdolomit im Naturschutzgebiet «Ammergauener Berge». *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 32: 20-43.
- MAYER, H., B. SCHLESINGER & K. THIELE (1967) — Dynamik der Waldentstehung und Waldzerstörung auf den Dolomitschuttfächen im Wimbachgries (Berchtesgadener Alpen). *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 32: 132-160.
- MEIER-BÖKE, A. (1970 ff) — Flora von Lippe, Farn- und Blütenpflanzen. Teil 1 und 2. *Lippische Mitt. Geschichte Landeskunde* 39: 213-260; 40: 199-246.
- MEISEL, K. (1962) — Die Artenverbindungen der Winterfrucht-Unkrautgesellschaften des rheinisch-westfälischen Berglandes. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 9: 85-87.
- (1967) — Über die Artenverbindung des *Aphanion arvensis* J. & R. Tx. 1960 im west- und nordwestdeutschen Flachland. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 2: 123-134.
- (1969) — Verbreitung und Gliederung der Winterfrucht-Unkrautbestände auf Sandböden des nordwestdeutschen Flachlandes. *Op. cit.* 4: 7-22.
- (1969) — Zur Gliederung und Ökologie der Wiesen im nordwestdeutschen Flachland. *Op. cit.*: 23-48.
- (1970) — Über die Artenverbindungen der Weiden im nordwestdeutschen Flachland. *Op. cit.* 5: 45-56.
- MERGENTHALER, O. (1964) — Neufunde von Serpentinfaunen in der mittleren Oberpfalz. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 108-109.
- (1966) — Serpentinfauna im Oberpfälzer Wald. *Acta Albert. Ratisb.* 26: 6-8.
- (1966, 1970, 1971) — Neufunde von Blütenpflanzen und Farnen im Grossraum Regensburg nach dem Erscheinen der Flora von Bayern (1914) von Dr. F. VOLLMANN. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges. N. F.* 20: 209-281; 21: 24-111; 22: 1-110.
- MERGENTHALER, O. & J. DAMBOLDT (1962) — Die bayerischen Tüpfelfarne. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 85-86.
- MERXMÜLLER, H. (1965, 1969) — Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen. Teil I und II. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 38: 93-115; 41: 17-44.
- (1970) — Über den Fortbestand des Traubenhafers auf der Garchinger Heide. *Op. cit.* 42: 15.
- MERXMÜLLER, H. & K. P. BUTTLER (1964) — Die Chromosomenzahlen der mitteleuropäischen und alpinen Drablen. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 77: 411-415.
- MERXMÜLLER, H. & J. GRAU (1963) — Chromosomenzahlen aus der Gattung *Myosotis* L. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 76: 23-29.
- (1967) — *Moehringia*-Studien. *Mitt. Bot. München* 6: 257-273.
- MERXMÜLLER, H. & P. LEINS (1966) — Zum Blütenbau der Brassicaceae. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 79: 250-252.
- (1967) — Die Verwandtschaftsbeziehungen der Kreuzblütler und Mohngewächse. *Bot. Jahrb.* 86: 113-129.

- MERXMÜLLER, H. & B. ZOLLITSCH (1967) — Über die Sonderstellung der Vegetation auf Kalkschieferschutt. *Aquilo*, Ser. Bot. 6: 228-240.
- MEYER, D. E. (1961) — Zur Zytologie der Asplenien Mitteleuropas (XXIX. Abschluss). *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 74: 449-461.
- (1962-69) — Über neue und seltene Asplenien Europas I-VI. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 75: 24-33; 76: 13-22; 77: 3-13; 80: 28-39; 81: 92-106; 82: 535-551.
- (1966) — Ein Standort von drei *Botrychium*-Arten und *Ophioglossum* mit Prothalliumfunden am Strassenrand der Grossstadt. *Op. cit.* 78: 396-397.
- MEYER, W. (1965) — Ein aussergewöhnlicher Bärlapp-Standort bei Rüscheld (Kr. Neuwied). *Decheniana* 118: 53-54.
- MICHAELIS, H., T. OHBA & R. TÜXEN (1971) — Die *Zostera*-Gesellschaften der niedersächsischen Watten. *Jahresber. 1969 Forschungsst. Insel- & Küstenschutz* 21: 87-100.
- MÖLLER, H. (1961) — Floristisch-soziologische Untersuchungen im Scharnhagener Moor (Dänischer Wohld). *Mitt. Arbeitsgem. Flor. Schleswig-Holst. & Hamburg* 9: 3-64.
- (1970) — Soziologisch-ökologische Untersuchungen in Erlenwäldern Holsteins. *Op. cit.* 19, 109 S.
- (1971) — Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Naturschutzgebiet Heuckenlock. *Kieler Notizen* 3: 2-4.
- MÜLLER, K. bearb. von BRIELMAIER, G. W. (1961) — Zur Flora der östlichen Altmoränen- und Deckenschotterlandschaft Oberschwabens. *Mitt. Ver. Naturwiss. & Math. Ulm* 26: 107-116.
- (1965) — Nachtrag 1964 zur Ulmer Flora. *Op. cit.* 27: 25-72.
- MÜLLER, K. (1965) — Die Artengruppe des Berghahnenfusses (*Ranunculus montanus* Willd.) auf der Schwäbischen Alb. *Mitt. Ver. Naturwiss. & Math. Ulm* 27: 21-24.
- (1965) — Zur Flora und Vegetation der Hochmoore des nordwestdeutschen Flachlandes. *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst.* 36: 30-77.
- (1968) — Ökologisch-vegetationskundliche Untersuchungen in ostfriesischen Hochmooren. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 81: 221-237.
- MÜLLER, L. (1966) — Aus den Naturschutzgebieten des Kemptener Waldes. *Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben* 70: 17-22.
- MÜLLER, Th. (1961) — Zwei für das Naturschutzgebiet Untereck neue Pflanzen. *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 29: 7-15.
- (1961) — Einige für Südwestdeutschland neue Pflanzengesellschaften. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 20: 15-21.
- (1961) — Ergebnisse pflanzensoziologischer Untersuchungen in Südwestdeutschland. *Op. cit.*: 111-122.
- (1962) — Die Fluthahnenfussgesellschaften unserer Fliessgewässer. *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 30: 152-163.
- (1962) — Flora und Vegetation des Kreises Euskirchen. *Decheniana* 115: 1-109.
- (1962) — Die Saumgesellschaften der Klasse Trifolio-Geranietae sanguinei. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 9: 95-140.

- (1966) — Vegetationskundliche Beobachtungen im Naturschutzgebiet Hohentwiel. *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 34: 14-61.
- (1967) — Die geographische Gliederung des Galio-Carpinetum in Südwestdeutschland. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 26: 47-65.
- (1968) — Die Waldvegetation im Naturschutzgebiet Schenkenwald, *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 36: 55-64.
- (1969) — Die Vegetation im Naturschutzgebiet Zweribach. *Op. cit.* 37: 81-101.
- MÜLLER-DOBLIES, D. (1970) — Über die Verwandtschaft von *Typha* und *Sparganium* im Infloreszenz- und Blütenbau. *Bot. Jb.* 89: 451-562.
- MÜLLER-DOBLIES, U. (1970) — Über die Blütenstände und Blüten sowie zur Embryologie von *Sparganium*. *Bot. Jb.* 89: 359-450.
- NEIDHARDT, B. (1962) — *Potentilla collina* Wib., ein schwer bestimmbares Fingerkraut und seine Verbreitung in Westfalen. *Natur u. Heimat (Münster)* 22: 110-112.
- NIESCHALK, A. (1963) — Der Schuppige Wurmfarne (*Dryopteris* × *tavelii* Rothm.) in Westfalen. *Natur u. Heimat (Münster)* 23: 56-60.
- NIESCHALK, A. & CH. NIESCHALK (1962) — Neuere botanische Funde aus Nordhessen. *Hess. Flor. Briefe* 11: 49-51.
- (1963) — *Linum leonii* Schultz in Hessen. *Op. cit.* 12: 29-32.
- (1968) — *Orobanchë libanotidis* Ruprecht (= *O. bartlingii* Grisebach) in Hessen. *Op. cit.* 17: 35-42.
- (1970) — Autogame *Epipactis*-Arten in Nordhessen. *Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal* 23: 98-103.
- NIKLEELD, H. (1971) — Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. *Taxon* 20: 545-571.
- NIKOLEIZIG, K. (1964) — Die Gefä pflanzen des Oldesloer Kurparks. *Die Heimat (Neumünster)* 71: 311-316.
- (1965) — Der Artbereich — beispielhafte Aufzeigung bei Berücksichtigung der Siegesbeckia-Vorkommen in der Ortschaft Stapelfeld bei Hamburg. *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst.* 36: 11-17.
- NOTHDURFT, H. (1970) — Floristisches aus Schleswig-Holstein und dem Hamburger Raum. *Mitt. Staatsinst. Allg. Bot. Hamburg* 13: 97-109.
- NOWOTNY, E. (1964) — Botanische Beobachtungen im Augsburger Raum. *Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben* 68: 12-15.
- (1968) — Das Karlszepter in den Wertachauen. *Op. cit.* 72: 35-36.
- NÜCHEL, G. (1971) — Bemerkenswerte Pflanzenfunde in der Umgebung von Koblenz. *Gött. Flor. Rundbr.* 5: 55-57.
- OBERDORFER, E. (1964) — Das Strauchbirkenmoor (*Betulo-Salicetum repentis*) in Osteuropa und im Alpenvorland. Zur Soziologie der *Betula humilis* Schrank. *Arb. Landwirtsch. Hochschule Hohenheim* 30: 190-210.
- (1969) — Zur Verbreitung und Soziologie von *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm. ssp. *cespitosum* und ssp. *germanicum* (Palla) Hegl. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 82: 589-594.
- (1970) — Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. 3. Aufl. Stuttgart.

- OBERDORFER, E. & MITARBEITER (1967) — Systematische Übersicht der west-deutschen Phanerogamen- und Gefäßkryptogamen-Gesellschaften. Ein Diskussionsentwurf. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 2: 7-62.
- OBSERWINKLER, F. & W. SAUER (1970) — *Vicia oroboides* in den Chiemgauer Alpen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 42: 189-191.
- OBLINGER, H. (1968) — Über die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes «Finkenstein» (Krs. Neuburg a. D.). *Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben* 72: 55-67.
- (1969) — Das Federgras auf dem Finkenstein. *Op. cit.* 73: 61-62.
- (1969) — Die Verbreitung der Elbe (*Taxus baccata*) in Bayerisch-Schwaben. *Op. cit.*: 63-86.
- OCKENDON, D. J. (1967) — Notes on the *Linum perenne* group. *Feddes Repert.* 74: 20-22.
- (1970) — Taxonomy of the *Linum perenne* group in Europe. *Watsonia* 8: 205-235.
- OESAU, A. (1970) — *Lallemantia peltata* (L.) Fischer et Meyer und *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel, zwei bemerkenswerte Adventivpflanzen im Stadtgebiet von Mainz. *Hess. Flor. Briefe* 19: 49-54.
- OEST, A. (1971) — Über die Vegetation der mittleren Ruhr. *Natur u. Heimat (Münster)* 31: 35-38.
- OLTMANN, O. (1971) — Pollenmorphologisch-systematische Untersuchungen innerhalb der Geraniales. *Diss. Bot.* 11.
- PATZKE, E. (1961) — Vorschlag zur Gliederung der *Festuca ovina* L. — Gruppe in Mitteleuropa. *Österr. Bot. Z.* 108: 505-507.
- (1961) — *Festuca hervieri* (St. Yves) Patzke grad. nov. Französischer Schwingel, eine neue westeuropäische Art. *Decheniana* 114: 212-213.
- (1962) — Gliederung der *Festuca rubra* L. in Deutschland. *Op. cit.* 117: 191-196.
- (1968) — Zur Kenntnis der Sammelart *Festuca ovina* L. im südlichen Niedersachsen. *Gött. Flor. Rundbr.* 1968: 14-17.
- (1969) — Anleitung zur Bestimmung der beiden hessischen Blauschwingel *Festuca pallens* Host und *F. stricta* Host. ssp. *duvalii* (St. Yves) Patzke. *Hess. Flor. Briefe* 18: 15-18.
- (1970) — Untersuchungen über Wurzelfluoreszenz von Schwingelarten zur Gliederung der Verwandtschaftsgruppe *Festuca* L. *Senckenbergiana biol.* 51: 255-276.
- PAX, F. (Hrsg.). (1959-1962) — Siebengebirge und Rodderberg. I-IV. *Decheniana Beih.* 7, 9, 10.
- PEITZ, E. (1963) — Beitrag zur Kenntnis der *Ophrys fuciflora* (Cr.) Moench. *Dhauner Echo* 18: 1-27.
- (1965) — Der Formenkreis um *Saxifraga sponhemica* Gmel. *Op. cit.* Sonderdruck Apr. 1965.
- (1965) — $\times$ *Gymnaglossum jacksonii* Rolfe auch in Deutschland. *Op. cit.*, Sonderdruck Aug. 1965.
- (1966) — Namen der in Deutschland vorkommenden Orchideen-Arten deren wichtigste Typen-Synonyme mit Literaturangaben. *Op. cit.*, Sonderdruck Febr. 1966.

- (1966) — $\times$ *Gymnaglossum jacksonii* Rolfe auch in Deutschland (*Gymnadenia conopsea* R. Br. $\times$ *Coeleglossum viride* (L.) Hartm.). *Orchidee (Hamburg)* 17: 131-132.
- PERNER, H. (1966) — Beziehungen zwischen der Keimung einiger Kiefern-Arten bei verschiedenen Temperaturen und ihrer Verbreitung *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde* N. F. Naturwiss. Abt. 34: 169-182.
- PETERMANN, R. (1970) — Montane Buchenwälder im Westbayerischen Alpenvorland zwischen Iller und Ammersee. *Diss. Bot.* 8.
- PFADENHAUER, J. (1969) — Beitrag zur floristischen Kartierung Bayerns. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 41: 45-46.
- (1969) — Edellaubholzreiche Wälder im Jungmoränengebiet des bayerischen Alpenvorlandes und in den bayerischen Alpen. *Diss. Bot.* 3.
- PHILIPPI, G. (1961) — Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet (und angrenzenden Gebieten). *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz* N. F. 8: 173-186.
- (1963) — Zur Soziologie von *Anagallis tenella*, *Scutellaria minor* und *Wahlenbergia hederacea* im südlichen und mittleren Schwarzwald. *Op. cit.* 477-484.
- (1963) — Zur Gliederung der Flachmoorgesellschaften des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 22: 113-135.
- (1968) — Zur Kenntnis der Zwergbinsengesellschaften (Ordnung der *Cyperetalia fusci*) des Oberrheingebietes. *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 36: 65-130.
- (1969) — Laichkraut- und Wasserlinsengesellschaften des Oberrheingebietes zwischen Strassburg und Mannheim. *Op. cit.* 37: 102-171.
- (1969) — Besiedlung alter Ziegeleigruben in der Rheinniederung zwischen Speyer und Mannheim. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 14: 238-254.
- (1969) — Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triqueter*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberrheingebiet. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 28: 9-18.
- (1969) — Zur Verbreitung und Soziologie einiger Arten von Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften im badischen Oberrheingebiet. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. & Naturschutz* N. F. 10: 139-172.
- (1970) — Die Kiefernwälder der Schwetzingener Hardt (nordbadische Oberrheinebene). *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 38: 46-92.
- (1970) — *Calamagrostis phragmitoides* Hartm., das Purpureitgras, im Schwarzwald und in den Vogesen. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 29: 107-110.
- (1971) — Sandfluren, Steppenrasen und Saumgesellschaften der Schwetzingener Hardt (nordbadische Rheinebene). *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 39: 67-130.
- (1971) — Beiträge zur Flora der nordbadischen Rheinebene und der angrenzenden Gebiete. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 30: 9-47.
- PHILIPPI, G. & V. WIRTH (1970) — Botanische Neufunde aus Südbaden. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz* N. F. 10: 331-348.

- PIONTKOWSKI, H.-U. (1970) — Untersuchungen zum Problem des atlantischen Klimakeils. *Mitt. Arbeitsgem. Flor. Schleswig-Holst. & Hamburg* 18, 217 S.
- PODLECH, D. (1962) — Beitrag zur Kenntnis der Subsektion *Heterophylla* (Witas.) Fed. der Gattung *Campanula* L. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 75: 237-244.
- (1964) — Die Krainer Straussglockenblume. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 111.
- (1964) — Revision der europäischen und nordafrikanischen Vertreter der Subsect. *Heterophylla* (Wit.) Fed. der Gattung *Campanula*. *Feddes Repert.* 71: 50-187.
- (1970) — Ergänzungen zur Revision der europäischen und nordafrikanischen Vertreter der Subsect. *Heterophylla* (Wit.) Fed. der Gattung *Campanula* L. *Mitt. Bot. München* 8: 211-217.
- PODLECH, D. & H. VOLLRATH (1963) — Die Verbreitung von *Primula veris* L. ssp. *canescens* (Opiz) Hayek in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 36: 69-70.
- POELT, J. (1963) — Eine bemerkenswerte Haselwurz der bayerischen Flora. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 36: 71.
- (1970) — *Dipsacus pilosus* und sein verkannter Doppelgänger *Dipsacus strigosus* in Südbayern. *Op. cit.* 42: 203-206.
- POHL, K. (1966) — Der Hirschzungenfarn (*Phyllitis scolopendrium*) in zwei alten Brunnen des Kreises Wetzlar. *Jahrb. Nassau. Ver. Naturk.* 98: 96.
- POLATSCHKE, A. (1971) — Die Verwandtschaftsgruppe um *Euphorbia villosa* W. et K. ex Willd. *Ann. Naturh. Mus. Wien* 75: 183-202.
- PREYWISCH, K. (1964) — Vorläufige Nachricht über die Ausbreitung des Drüsiges Springkrauts (*Impatiens glandulifera* Royle) im Wesergebiet. *Natur u. Heimat (Münster)* 24: 101-104.
- PRIEHÄUSSER, G. (1962) — Die Variabilität der Fichte in systematischer Hinsicht. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 35: 96-104.
- (1970) — Die Anordnung von Pflanzenarten auf Dauervernässungen im Bayerischen Wald nach der Nährstoffführung des Wassers. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges. N. F.* 21: 9-19.
- (1971) — Über die Landschaftsökologie und die Pflanzenwelt im Bereich des Nationalparks im Bayerischen Wald. *Op. cit.* 22, 38 S.
- PRILOP, H. (1962) — Vorkommen und Verbreitung des Echten oder Purgier-Kreuzdorn, *Rhamnus cathartica* L. in Nordwestdeutschland. *Abh. naturw. Ver. Bremen* 36: 169-180.
- RAABE, E.-W. (1969) — Bestimmungsschlüssel der mehrfiedrigen krautigen Papiilonaceae Schleswig-Holsteins im blütenlosen Zustand. *Kieler Notizen* 1969: 2-3.
- (1969) — Schlüssel für die kleinblütigen Cerastien in Schleswig-Holstein. *Op. cit.*: 11-12.
- (1970) — Zu *Parapholis strigosa* (Dum.) C. E. Hubbard und *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubbard. *Op. cit.* 1970: 1-2.
- (1970) — Über den Stand der Mitteleuropa-Kartierung in Schleswig-Holstein. *Op. cit.*: 6-8.
- (1970) — Die Wanderung von *Juncus maritimus* an der jütischen Westküste. *Op. cit.*: 9-11.
- (1970) — Über die *Ajuga*-Arten in Schleswig-Holstein. *Op. cit.*: 12-13.

- (1970) — Zweiter Beitrag zur Verbreitung von *Trifolium micranthum* in Schleswig-Holstein. *Op. cit.*: 22-23.
- (1970) — Zur Unterscheidung der Fragarien in Schleswig-Holstein. *Op. cit.*: 4-7.
- (1971) — Zur Diagnose unserer Primeln. *Op. cit.* 3: 10-12.
- (1971) — *Arctium minus melanocephalus* Beger neu für Mitteleuropa. *Op. cit.*: 27-28.
- (1971) — Die hauptsächlichen *Verbascum*-Arten in Schleswig-Holstein. *Op. cit.*: 30-31.
- (1971) — Zur Unterscheidung der Kleinarten von *Carex muricata* s. l. in Schleswig-Holstein. *Op. cit.*: 35-36.
- RAABE, E.-W. & U. KRESKEN (1970) — Bestimmungsschlüssel der meist behaarten Caryophyllaceen *Agrostemma*, *Melandrium* und *Silene*, *Kieler Notizen* 1970: 4-7.
- RAABE, E.-W. & H. USINGER (1970) — Anmerkungen zu den Equiseten in Schleswig-Holstein. *Kieler Notizen* 1970: 9-15.
- RAABE, E.-W. & S. WOAS (1970) — Bestimmungsschlüssel der *Lepidium*-Arten Schleswig-Holsteins. *Kieler Notizen* 1970: 14-15.
- RASBACH, H. & K. RASBACH (1965) — Die Ragwurz-Arten des griechischen Festlandes. *Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Natursch.* 8: 689-700.
- RASBACH, K., H. RASBACH & O. WILMANN (1968) — Die Farnpflanzen Zentraleuropas. *Gestalt-Geschichte-Lebensraum*. Heidelberg.
- REDSLOB, F. E. (1969) — Pflanzengesellschaften des Naturdenkmals «Kampeters Kolk» in Senne I, Landkreis Bielefeld. *Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld* 19: 155-162.
- REESE, G. (1962) — Systematik und Cytologie der *Ruppia maritima*. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 75: 365.
- (1962) — Zur intragenetischen Taxonomie der Gattung *Ruppia* L. *Zeitschr. f. Bot.* 50: 237-264.
- (1963) — Über die deutschen *Ruppia*- und *Zannichellia*-Kategorien und ihre Verbreitung in Schleswig-Holstein. *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst.* 34: 44-70.
- (1967) — Cytologische und taxonomische Untersuchungen an *Zannichellia palustris* L. *Biol. Zentralbl.* 86 (Suppl.): 277-306.
- (1969) — Cytotaxonomische Untersuchungen an di- und tetraploiden Sippen von *Eryngium campestre* L. und einem Artbastard mit $2n = 15$. *österreich. Bot. Z.* 117: 223-247.
- REHAGEN, H. W. (1964) — Zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte des Niederrheingebietes und Westmünsterlandes. *Fortschr. Geol. Rheinland u. Westf.* 12: 55-96.
- REHDER, H. (1964) — Wärmestufen, geologische Unterlage und Verbreitung einzelner Arten und Pflanzengesellschaften im Südost-Schwarzwald. *Arbeiten Landwirtsch. Hochschule Hohenheim* 30: 125-144.
- (1965) — Die Klimatypen der Alpenkarte im Klimadiagramm-Weltatlas (WALTER & LIETH) und ihre Beziehungen zur Vegetation. *Flora* (Abt. B) 156: 78-93.

- (1970) — Zur Ökologie, insbesondere Stickstoffversorgung subalpiner und alpiner Pflanzengesellschaften im Naturschutzgebiet Schachen (Wettersteingebirge). *Diss. Bot.* 6.
- REHM, R. (1962) — Die pflanzensoziologischen Verhältnisse des Naturschutzgebietes «Kipshagener Teiche» bei Stukenbrock. *Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld* 16: 35-87.
- REINHARDT, R. (1966) — Die Orchideen-Funde um Heiligenstadt (Ofr.). *Ber. Naturf. Ges. Bamberg* 41: 73-75.
- RICHTER, H. (1966) — Ergänzungen zu Grafmanns floristischen Mitteilungen aus dem Dillkreis (*Hess. Flor. Briefe* 14: S. 33f.). *Hess. Flor. Briefe* 15: 7.
- RICHTER-RETHWISCH, F. (1965) — Die Verbreitung von *Galinsoga parviflora* (Cav.) und *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake in der Bundesrepublik Deutschland. *Zeitschr. Pflanzenkrankh. Pflanzenpath. Pflanzenschutz* 1965 (Sonderheft 3): 35-38.
- RIECKE, F. (1960) — Forstgeschichtlich-vegetationskundliche Untersuchungen im Stadtforst Berlin-Spandau. *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 98-100: 50-112.
- RODI, D. (1963) — Die Streuwiesen- und Verlandungsgesellschaften des Welzheimer Waldes. *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 31: 31-67.
- (1966) — Ackerunkrautgesellschaften und Böden des westlichen Tertiär-Hügellandes mit besonderer Berücksichtigung des Kreises Schrobenuhausen. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges. N. F.* 20: 161-198.
- (1967) — Die Sandmohnflur (*Papaveretum argemone* (Libb. 32) Krusem. et Vlieg. 39) der Sandäcker des Tertiär-Hügellandes (Oberbayern). *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 203-205.
- RÖDEL, H. (1970) — Waldgesellschaften der Sieben Berge bei Alfeld und ihre Ersatzgesellschaften. *Diss. Bot.* 7.
- ROHWEDER, O. (1967) — Centrospermen-Studien. 3. Blütenentwicklung und Blütenbau bei Silenoideen (Caryophyllaceae). *Bot. Jahrb.* 86: 130-186.
- ROSER, W. (1962) — Vegetations- und Standortuntersuchungen im Weinbaugbiet der Muschelkalktäler Nordwürttembergs. *Veröff.-Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 30: 31-147.
- ROSSKOPF, G. (1964) — *Stellaria crassifolia* Ehrh. — neu für Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 37: 112.
- (1971) — Pflanzengesellschaften der Talmoore an der Schwarzen und Weissen Laber im Oberpfälzer Jura. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges. N. F.* 22: 3-112.
- ROTHMALER, W. & U. SCHNEIDER (1962) — Die Gattung *Polypodium* in Europa. *Die Kulturpflanze Beih.* 3: 234-248.
- ROUSI, A. (1971) — The genus *Hippophae* L. A taxonomic study. *Ann. Bot. Fennici* 8: 177-227.
- RUBE, G. & HEISE, K. (1964) — Neue Pflanzenfunde im Kreis Rotenburg/F. *Hess. Flor. Briefe* 13: 9-12.
- (1968) — Über das Vorkommen von *Orchis tridentata* Scop. im Kreis Rotenburg/Fulda. *Op. cit.* 17: 32-34.
- (1970) — Zur Flora von Nordosthessen. *Op. cit.* 19: 25-28.

- RÜHL, A. (1964) — Vegetationskundliche Untersuchungen über die Bachauenwälder des Nordwestdeutschen Berglandes. *Decheniana* 116: 29-44.
- (1967) — Das Hessische Bergland. Eine forstlich-vegetationsgeographische Übersicht. *Forsch. Deutsch. Landeskunde (Bad Godesberg)* 161, 164 S.
- (1968) — Lindenmischwälder im südlichen Nordwestdeutschland. *Allg. Forst- u. Jagdztg.* 139: 118-129.
- (1971) — Floristische Notizen aus dem Weser-Leineberglande. *Gött. Flor. Rundbr.* 5: 23-25.
- RÜTHER, F. (1970) — Die Hirschzunge (*Phyllitis scolopendrium*) im Schwalenberger Wald. *Natur u. Heimat (Münster)* 30: 9-11.
- RUMMELSPACHER, J. (1965) — Beitrag zur Kenntnis der *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenbach. *Feddes Repert.* 71: 1-49.
- RUNGE, F. (1953) — Über die Änderungen der Flora Baltrums in den letzten 80 Jahren. *Abh. Naturwiss. Ver. Bremen* 33: 165-177.
- (1961) — Die Naturschutzgebiete Westfalens und des Regierungsbezirks Osnabrück. 2. Aufl. Münster.
- (1961 ff) — Dritter (Vierter... etc.) Bericht über die neuerliche Ausbreitung des Moorkreuzkrautes in Nordwestdeutschland. *Natur u. Heimat (Münster)* 21: 1-6; 22: 30-32; 25: 29-32; 28: 45-48; 30: 99-103.
- (1964) — Die Pflanzengesellschaften der Umgebung von Altenhunden/Sauerland. *Decheniana* 116: 99-114.
- (1965) — Adventivpflanzen der beiden Kanalhäfen in Münster während der Jahre 1957 bis 1964. *Natur u. Heimat (Münster)* 25: 61-64.
- (1966) — Die Pflanzengesellschaften Westfalens und Niedersachsens. 2. Aufl. Münster.
- (1966) — Schwankungen der Vegetation in nordwestdeutschen Moorkolken. *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 110: 49-54.
- (1966) — «Höhengrenzen» von Pflanzen im Sauerland. *Naturkunde in Westfalen* 2: 21-26.
- (1967) — Weitere Änderungen der Flora des Naturschutzgebietes «Heiliges Meer» bei Hopsten. *Natur u. Heimat (Münster)* 27: 129-135.
- (1967) — Geschichte der Botanischen Erforschung Westfalens. *Abb. Landesmus. Naturk. Münster* 29(1): 27-43.
- (1967) — Vegetationsschwankungen im Rhynchosporium. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 49-53.
- (1967) — Vegetationsschwankungen in Hochheiden des Sauerlandes. *Decheniana* 118: 145-151.
- (1968) — Die Laugenblume auf Langeoog. *Natur, Kultur u. Jagd* (Beitr. z. Naturk. Nieders.) 20: 141-142.
- (1960) — Der fadenförmige Ehrenpreis in Westfalen. *Natur u. Heimat (Münster)* 29: 100-102.
- (1969) — Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Unter besonderer Berücksichtigung der Pflanzengesellschaften der Bundesrepublik. 3. Aufl. Münster.
- (1971) — Vegetationsschwankungen in Hochheiden des Sauerlandes II. *Decheniana* 123: 49-52.
- (1971) — Die Vegetation des «Beversees» bei Bergkamen. *Natur u. Heimat (Münster)* 31: 92-97.

- (1971) — Die Pflanzengesellschaften der Dinkel. *Op. cit.*: 28-34.
- RUNGE, F. & C. PETRUCK (1970) — Drei seltene Pflanzengesellschaften am Südrand der Davert, Kreis Lüdninghausen. *Natur u. Heimat (Münster)* 30: 79-81.
- RUNGE, M. (1965) — Untersuchungen über die Mineralstoff-Nachlieferung an nordwestdeutschen Waldstandorten. *Flora* 155: 353-386.
- RUTHSATZ, B. (1970) — Die Grünlandgesellschaften um Göttingen. *Scripta Geobotanica* 2, 31 S.
- RUTTNER, F. (1962) — Grundriss der Limnologie (Hydrobiologie des Süßwassers). 3. Aufl. Berlin.
- SACHS, F. (1961) — Veränderungen in der Pflanzenwelt des Landkreises Buchen seit 1904. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 20: 7-14.
- SAHLIN, C. I. (1971) — Zur *Taraxacum*-Flora Niedersachsens. *Bot. Not. (Lund)* 124: 497-504.
- SAKAUTZKY, H. (1965) — Die Krebschere im Gebiet der oberen Ems. *Natur u. Heimat (Münster)* 25: 59-61.
- SAVELSBERGH, E. (1970) — Beitrag zur Flora des Regierungsberirktes Aachen und der angrenzenden Gebiete. *Decheniana* 122: 295-321.
- SCHÄFER, A. (1963) — Die Pflanzenwelt in und um Ludwigshafen am Rhein. *Mitt. d. Pollichia*, III. Reihe, 10: 1-64.
- (1965) — Die Adventivflora in Ludwigshafen am Rhein. *Op. cit.* 12: 281-286.
- SCHELLER, H. (1969) — Die Flora des Offenbacher Güterbahnhofs. *Ber. Offenbacher Ver. Naturk.* 76: 10-14.
- SCHERNER, E. R. (1967) — Seltene Pflanzenfunde bei Wolfsburg. *Beitr. Naturk. Niedersachsens* 20: 112.
- SCHIEFERDECKER, K. (1964) — Anmerkungen zur Flora von Hildesheim. 1. Nachtrag. *Alt-Hildesheim* 35: 46-55.
- SCHIMMITAT, J. (1969) — Ein neuer Fundort von *Veronica fruticulosa* L. in den Bayerischen Alpen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 41: 67.
- SCHLICK, W. (1966) — Wacholderbäume in einem Wald bei Griesen/Garmisch. *Abh. & Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg N. F.* 10: 113-116.
- SCHLOTTMANN, C. P. (1966) — Die Pflanzengesellschaften des Gaarder Bauernwaldes (Kreis Südtondern). *Mitt. Arbeitsgem. Flor. Schleswig-Holst. & Hamburg* 14: 3-129.
- SCHMEIL, O. & J. FITSCHEN (1968) — Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten. 81. Aufl. von W. RAUH & K. SENGHAS. Heidelberg.
- SCHMIDT, A. (1962) — Eine neue Grundzahl in der Gattung *Viola*. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 75: 78-84.
- (1963) — Zytotaxonomische Untersuchungen an griechischen *Viola*-Arten der Sektion Melanium. *österreich. Bot. Z.* 110: 285-293.
- (1964) — Chromosomenzahlen südeuropäischer *Viola*-Arten der Sektion Melanium. *Flora* 154: 158-162.
- (1964) — Zur systematischen Stellung von *Viola chelmea* Boiss. et Heldr. ssp. *chelmea* und *V. delphinantha* Boiss. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 77: 256-261.
- (1964) — Zytotaxonomische Beiträge zu einer Neugliederung der Sektion Melanium der Gattung *Viola*. *Op. cit.*: (94)-(99).

- SCHMIDT, R. (1969) — Die Trockenrasenvegetation des Kappelberges bei Fellbach. *Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 124: 200-221.
- SCHMIDT, W. (1970) — Untersuchungen über die Phosphorversorgung niedersächsischer Buchenwaldgesellschaften. *Scripta Geobot.* I.
- SCHMITHÜSEN, J. (1968) — Allgemeine Vegetationsgeographie. 3. Aufl. Berlin.
- SCHNEDLER, W. (1971) — Ein Fund von *Beta trigyna* W. & K. im Kreis Wetzlar. *Hess. Flor. Briefe* 20: 27.
- (1971) — Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide. *Gött. Flor. Rundbr.* 4: 71-73.
- SCHNEIDER, U. (1964) — Die Sippen der Gattung *Odontites* in Norddeutschland. *Feddes Repert.* 69: 180-195.
- SCHNETTER, R. (1965) — Phänologische Karte vom Blühbeginn der Winterlinde. *Tilia cordata* Mill. *Beitr. Biol. Pfl.* 41: 139-142.
- SCHÖNFELDER, P. (1967) — Das Galeopsietum angustifoliae Bükler 1942 — eine Kalkschuttpioniergesellschaft Nordbayerns. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 11/12: 5-10.
- (1968) — Chromosomenzahlen einiger Arten der Gattung *Biscutella*. *Österr. Bot. Z.* 115: 363-371.
- (1968) — Vorkommen und Gefährdung der Riemenzunge-*Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel — im nördlichen Bayern. *Ber. Naturf. Ges. Bamberg* 43: 12-17.
- (1968) — Adalpin-dealpin, ein historisch-chorologisches Begriffspaar. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 13: 5-9.
- (1970) — Südwestliche Einstrahlungen in der Flora und Vegetation Nordbayerns. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 42: 17-100.
- (1970) — Die Blaugras-Horstseggenhalde und ihre arealgeographische Gliederung in den Ostalpen. *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 35: 47-56.
- SCHOLZ, G. (1962) — Der Flachgedrückte Bärlapp (*Lycopodium complanatum* L. ssp. *anceps* Aschers.) im Kreis Lemgo. *Natur u. Heimat (Münster)* 22: 87-89.
- SCHOLZ, H. (1961) — Ergänzende Mitteilung über Funde der Winde *Calystegia silvatica* = *C. sylvestris*. *Natur u. Heimat (Münster)* 21: 13-14.
- (1962) — Nomenklatorische und systematische Studien an *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek. *Willdenowia* 3: 137-149.
- (1962) — *Puccinellia limosa* (Schur) Holmberg im binnendeutschen Salzflorengelbiet. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 75: 59-70.
- (1962) — *Agrostis castellana* — Eine neue Fremdpflanze in Schleswig-Holstein. *Die Heimat (Neumünster)* 69: 405-406.
- (1963) — Zur Gramineenflora Deutschlands. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 76: 135-146.
- (1964) — Zur Gramineenflora Mitteleuropas II. *Op. cit.* 77: 145-160.
- (1965) — *Agrostis tenuis* «Highland Bent» ein Synonym der *Agrostis castellana*. *Op. cit.* 78: 322-325.
- (1965) — Über *Lolium remotum* Schrank als Unkraut unter *Seradella* (*Ornithopus sativus* Brot.). *Bot. Jahrb.* 73: 419-428.
- (1968) — *Oxalis dillenii* Jacq. in Berlin. *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 103. 50-53.

- (1968) — Die Artbestimmung im *Brachypodium pinnatum*-Komplex. *Willdenowia* 5: 113-118.
- (1968) — Systematik und Verbreitung einiger Taxa der Gattung *Poa*, Sektion *Ochlopoa*, im Mittelmeergebiet. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 81: 17-21.
- (1968) — Die Artengruppe *Stipa pennata* L. in Frankreich, in der Schweiz und angrenzenden Gebieten. *Willdenowia* 4: 299-315.
- (1969) — *Polygonum minus* f. *latifolium* A. Br. — eine oft mit *Polygonum mite* verwechselte Sippe. *Gött. Flor. Rundbriefe* 3: 67-68.
- (1969) — Novitates systematicae speciei *Agrostis coarctata* Ehrh. ex Hoffm. *Willdenowia* 5: 479-487.
- (1970) — Zur Systematik der Gattung *Bromus* L. Subgenus *Bromus* (Gramineae) — *Willdenowia* 6: 139-159.
- (1970) — Über Grassamenankömmlinge, insbesondere *Achillea lanulosa* Nutt. *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 107: 79-85.
- (1971) — Gegenwärtige Kenntnisse über die Verbreitung der *Calamagrostis phragmitoides* Hartm. (Purpureitgras) in Mitteleuropa. *Philippia* I/2: 85-90.
- SCHRATZ, E. & G. CROMM (1968) — Experimentelle Bastardierung in der Gattung *Thymus*, 1. F₂-Bastarde. *Planta Medica* (Stuttgart) 16: 294-316.
- SCHREIBER, K. F. (1962) — Über die standortsbedingte und geographische Variabilität der Glatthaferwiesen in Südwestdeutschland. *Ber. Geobot. Inst. Rübel* 33: 65-128.
- SCHREITLING, K.-Th. (1968) — Wir bestimmen Laubbäume im Winter. *Mitt. Arbeitsgem. Flor. Schleswig-Holst. & Hamburg* 16, 53 S.
- SCHRÖDER, E. (1965) — Neue Funde des Tannenbärlapps im Sauerland. *Natur u. Heimat (Münster)* 25: 27-28.
- SCHROEDER, F. G. (1966) — Wildtulpe (*Tulipa silvestris* L.) und Pimpernuss (*Staphylea pinnata* L.) bei Nienberge. *Natur u. Heimat (Münster)* 26: 41-49.
- (1967) — Schlüssel für die bei uns verwilderten *Amelanchier*-Arten. *Gött. Flor. Rundbr.* 1: 4-5. Neudruck 1969.
- (1968) — Zur Nomenklatur in der Gattung *Amelanchier* (Rosaceae). *Taxon* 17: 633-634.
- (1970) — Die Kupfer-Felsenbirne, *Amelanchier lamarckii* F.-G. Schroeder, in Westfalen und Nordwest-Niedersachsen. *Decheniana* 122: 269-276.
- SCHUBERT, R. (1966) — Pflanzengeographie. (= Wiss. Taschenbücher 35). Berlin.
- SCHULTZE-MOTEL, J. (1966) — Verzeichnis forstlich kultivierter Pflanzenarten. *Die Kulturpflanze Beih.* 4: 486 S.
- SCHULTZE-MOTEL, J. & J. KRUSE (1965) — Spelz (*Triticum spelta* L.), andere Kulturpflanzen und Unkräuter in der frühen Eisenzeit Mitteldeutschlands. *Die Kulturpflanze* 13: 586-620.
- SCHULTZE-MOTEL, W. (1965) — Über die Verbreitung von *Eleocharis austriaca*. *Willdenowia* 4: 61-62.
- (1966-68) — Cyperaceen in HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa II/1. 3. Aufl. München.
- (1968) — Über *Carex bigelowii* in Mitteleuropa. *Willdenowia* 4: 325-328.

- SCHULZE, G. (1965) — Die Verbreitung des Königsfarns (*Osmunda regalis* L.) in der Pfalz. *Mitt. d. Pollichia*, III. Reihe., 12: 292-303.
- (1967) — *Asplenium billotii* F. Schultz in Deutschland. *Op. cit.* 14: 139-141.
- (1970) — *Asplenium billotii* F. W. Schultz in Deutschland. *Op. cit.* 17: 190-191.
- SCHUMACHER, A. (1971) — Über eine farnreiche Halde im Sauerland (Kreis Olpe). *Decheniana* 123: 253-265.
- SCHUMANN, F. (1968) — Die letzten Wildreben der Pfalz. *Pfälzer Heimat* 19: 18-22.
- SCHUSTER, E. (1961) — Das Eschenloh. *Ber. Naturf. Ges. Augsburg* 12: 1-8.
- (1961) — Das «Wiedergeltinger Wäldchen». *Op. cit.*: 8-10.
- SCHWARZ, O. (1965) — Die kritischen *Hypericum*-Arten der mitteleuropäischen Flora. *Drudea* 5: 59-66.
- (1968) — Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Primula*. *Wiss. Zeitschr. Friedr. Schiller-Univ. Jena Math. Nat. Reihe* 17: 307-332.
- SCHWARZ, O. & M. BÄSSLER (1964) — *Danthonia* (*Sieglingia*) *decumbens*, ein bemerkenswerter Fall chromosomaler und ökologischer Divergenz. *Österr. Bot. Z.* 111: 193-207.
- SEBALD, O. (1965) — Zur Verbreitung der Dünnährigen Segge (*Carex strigosa* Huds.) im mittleren Neckargebiet. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 120: 298-300.
- (1966) — Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1: 25.000 Blatt 7617 Sulz. Stuttgart.
- (1966) — *Carex hartmani* Caj. und *Carex buxbaumii* Wahlenb. in Nordwürttemberg. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 121: 210-217.
- (1969) — Vegetationskundliche Übersichtskarte des Landkreises Tübingen 1: 50.000. *Beilage z. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 124.
- SEBALD, O. & S. SEYBOLD (1969) — Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland I. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 124: 222-236.
- SEBALD, O., R. SEYBOLD, S. SEYBOLD & W. WREDE (1966) — Zur Verbreitung der Rasen-Segge (*Carex caespitosa* L. in Württemberg. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 121: 218-220.
- SEIBERT, P. (1958) — Die Pflanzengesellschaften im Naturschutzgebiet «Pupplinger Au». *Landschaftspflege und Vegetationskunde* 1, 79 S.
- (1961) — Der Einfluss der Niederwaldwirtschaft auf die Vegetation. — In: R. TÜXEN: Anthropogene Vegetation, Bericht über das Intern. Symposium in Stolzenau/Weser 1961. Den Haag.
- (1962) — Die Auenvegetation an der Isar nördlich von München und ihre Beeinflussung durch den Menschen. *Landschaftspflege und Vegetationskunde* 3, 123 S.
- (1963) — Bibliographie der Arbeiten über das Zusammenwirken zwischen Pflanzensoziologie, Wasserwirtschaft und Wasserbau. *Excerpta Botanica B* 5: 81-102.
- (1963) — Über eine Grundwasserstufenkarte mit Darstellung verschiedener Wassereigenschaften. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 10: 223-231.
- (1964) — Kiefernwälder des Erico-Pinion im bayerischen Alpenvorland. — In: Tagung der Ostalpin-dinarischen Sektion der Intern. Vereinigung für Vegetationskunde. Chur/Schweiz 1964. *Angew. Pflanzensoziologie* 19.

- (1967) — Eine pflanzensoziologische Kartierung als Grundlage für die Planung und Gestaltung einer Parkanlage in Bad Reichenhall. *Beiträge zur Landespflege* 3: 90-101.
- (1968) — Übersichtskarte der natürlichen Vegetationsgebiete von Bayern 1: 500.000 mit Erläuterungen. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 3: 84 S.
- (1968) — Die Vegetationskarte als Hilfsmittel zur Kennzeichnung rutschgefährdeter Häng. In: TÜXEN, R.: Pflanzensoziologie und Landschaftsökologie. — Bericht über das Intern. Symposium in Stolzenau/Weser 1963. Den Haag.
- (1968) — Gesellschaftsring und Gesellschaftskomplex in der Landschaftsgliederung. In: TÜXEN, R.: Pflanzensoziologie und Landschaftsökologie. — Bericht über das Intern. Symposium in Stolzenau/Weser 1963. Den Haag.
- (1968) — Importance of natural vegetation for the protection of the banks of streams, rivers and canals. *Freshwater* 2. Council of Europe, Nature and Environment series. Strasbourg.
- (1968) — Vegetation und Landschaft in Bayern. *Erdkunde* 22.
- (1969) — Die Auswirkung des Donau-Hochwassers 1965 auf Ackerunkrautgesellschaften. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 14: 121-135.
- (1969) — Über das Aceri-Fraxinetum als vikarierende Gesellschaft des Galio-Carpinetum am Rande der bayerischen Alpen. *Vegetatio* 18.
- SEIBIG, A. (1965) — Zur Verbreitung der Bärlappe im Nordspessart und Südvogelsberg. *Jahresber. Wetterau. Ges. Naturk.* 117/118: 71-84.
- (1967) — *Trifolium resupinatum* L. — Persischer Klee. *Hess. Flor. Briefe* 16: 42-43.
- (1970) — Zum Vorkommen des Tannenbärlapps im Nordspessart. *Jahresber. Wetterau. Ges. Naturk.* 121/122: 47.
- SEITHE, A. (1962) — Die Haararten der Gattung *Solanum* L. und ihre taxonomische Verwertung. *Bot. Jahrb.* 81: 261-336.
- SEITZ, W. (1969) — Die Taxonomie der *Aconitum napellus*-Gruppe in Europa. *Feddes Repert.* 80: 1-76.
- SELLE, W. (1962) — Beitrag zur Vegetationsgeschichte des Weichselspätglazials und des Postglazials im südlichen Randgebiet der Lüneburger Heide. *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 106: 41-47.
- (1962) — Geologische und vegetationskundliche Untersuchungen an einigen wichtigen Vorkommen des letzten Interglazials in Nordwestdeutschland. *Geol. Jahrb.* 79: 295-352.
- SENGHAS, K. (1966) — Beobachtungen zur Gattung *Epipactis* in Mitteleuropa. *Orchidee (Hamburg)* 17: 122-124.
- (1968) — Taxonomische Übersicht der Gattung *Dactylorhiza* Necker ex Nevski. *Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal* 21/22: 32-67.
- (1968) — $\times$ *Dactyleucorchis nieschalkii*, ein neuer Orchideenbastard. *Op. cit.*: 109-111.
- (1968) — Bestimmungsschlüssel der mitteleuropäischen *Dactylorhiza*-Slippen. *Op. cit.*: 123-126.
- (1968) — Bibliographia *Dactylorhizae*. *Op. cit.*: 127-136.
- (1970) — Übersicht zur Systematik und Taxonomie der Gattung *Epipactis*. *Op. cit.* 23: 26-37.

- SERAPHIM, E. T. (1967) — Zur Verbreitung und Ökologie des Riesenschachtelhalms im Ravensberger und Lipper Land. *Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld* 18: 127-149.
- SEYBOLD, S. (1966) — Neue Mistelfunde im mittleren Neckarland. *Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 121: 129-135.
- (1968) — (Zus. mit KREH, W., SIEB, K. & SEYBOLD, R.) — Flora von Stuttgart. Fundortsverzeichnis der im mittleren Neckarland wildwachsenden höheren Pflanzen. *Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ.* 123: 140-297.
- SEYBOLD, S., O. SEBALD & C. P. HERRN (1971) — Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland II. *Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ.* 126: 256-269.
- SIEDE, E. (1960) — Untersuchungen über die Pflanzengesellschaften im Flyschgebiet Oberbayerns. *Landschaftspflege und Vegetationskunde* 2, 39 S.
- SIMON, T. & VIDA, G. (1966) — Neue Angaben zur Verbreitung der *Dryopteris assimilis* S. Walker in Europa. *Ann. Univ. Scient. Budapest Sect. Biol.* 8: 275-284.
- SISSINGH, G. (1969) — Über die systematische Gliederung von Trittpflanzen-Gesellschaften. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 14: 179-192.
- SKALICKY, V. (1969) — Die Sammelart *Gentianella germanica* (Willd.) E. F. Warburg s. l. im Böhmisches Massiv. *Preslia* 41: 140-147.
- VAN SOEST, J. L. (1966) — New *Taraxacum* species from Europe. I. *Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetensch. ser. C.* 69: 432-489.
- SOMMER, H. (1971) — Wald- und Ersatzgesellschaften im östlichen Niedersachsen. *Diss. Bot.* 12.
- SPATZ, G. (1970) — Pflanzengesellschaften, Leistung und Leistungspotential von Allgäuer Alpweiden in Abhängigkeit von Standort und Bewirtschaftung. *Diss. T. U. München.*
- STADLER, H. (1970) — Überarbeitet von H. WALTER — Die Flora des Naturschutzgebietes «Romberg und See von Sendelbach» nach dem Stand von 1960 unter Ausschluss der Algenflora. *Nachr. Naturwiss. Mus. Aschaffenburg* 79: 3-43.
- STAMER, R. (1967) — Vegetationskundliche Untersuchungen an Schlatts der Osenberge und des Ahlhorner Forstes. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 28-47.
- STELLWAG, F. (sen.) (1964) — Wärmeliebende Eichenmischwälder im Rheingaukreis. *Jahrb. nass. Ver. Naturk.* 97: 95-106.
- STEPHAN, B. & S. STEPHAN (1971) — Die Vegetationsentwicklung im Naturschutzgebiet Stolzenburg und ihre Bedeutung für die Schutzmassnahmen. *Decheniana* 123: 281-305.
- STICHMANN, W. (1964) — Krautreiche Frische Buchen-Mischwälder westlich von Ahaus (Westfalen). *Natur u. Heimat (Münster)* 24: 117-120.
- STICHT, W. (1967) — Über das Vorkommen der Küchenschelle im südöstlichen Westfalen. *Natur u. Heimat (Münster)* 27: 124-126.
- STRAKA, H. (1963) — Über die Veränderungen der Vegetation im nördlichen Teil der Insel Sylt in den letzten Jahrzehnten. *Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holst.* 34: 19-43.



- STREITZ, H. (1969) — Verbreitung, Standortansprüche und soziologisches Verhalten der Wimpersegge (*Carex pilosa* Scop.) in Oberhessen. Hess. Flor. Briefe 17: 11-18.
- SUKOPP, H. (1962) — Neophyten in natürlichen Pflanzengesellschaften Mitteleuropas. Ber. Deutsche Bot. Ges. 77: 419-426.
- (1963) — Die Ufervegetation der Havel. Berlin.
- (1966) — Verluste der Berliner Flora während der letzten hundert Jahre. Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin N. F. 6: 126-136.
- (1968) — Das Naturschutzgebiet Pfaueninsel in Berlin-Wannsee. I. Beiträge zur Landschafts- und Florengeschichte. Op. cit. 8: 93-129.
- (1970) — *Sagittaria latifolia* Willd. — ein Agriophyt der Berliner Havelgewässer. Berliner Naturschutzbl. Sonderheft 1970: 1-4
- (mit W. KUNICK) (1968) — Veränderungen des Röhrichtbestandes der Berliner Havel 1962 bis 1967. Berlin.
- SUKOPP, H. & H. SCHOLZ (1964) — *Parietaria pennsylvanica* Mühlenb. ex. Willd. in Berlin Ber. Deutsche Bot. Ges. 77: 419-426.
- (1965) — Neue Untersuchungen über *Rumex trianulivalvis* (Danser) Rech. f. in Deutschland. Op. cit. 78: 455-465.
- (1968) — *Poa bulbosa* L., ein Archäophyt der Flora Mitteleuropas. Flora, Abt. B 157: 494-526.
- SUNDERMANN, H. (1964) — Zum Problem der Artabgrenzung innerhalb der Gattung *Ophrys*. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 19: 9-17.
- (1964) — Bestimmungsschlüssel und Artenliste der Gattung *Ophrys* Op. cit.: 63-70.
- (1970) — Europäische und mediterrane Orchideen. Eine Bestimmungsflora mit Berücksichtigung der Ökologie. Hannover.
- TRAUTMANN, W. (1962) — Natürliche Waldgesellschaften und nachwärmezeitliche Waldgeschichte am Nordwestrand der Eifel. Veröff. Geobot. Inst. Rübél 37: 250-266.
- (1966) — Erläuterungen zur Karte der potentiellen natürlichen Vegetation den Bundesrepublik Deutschland 1: 200.000. Blatt 85. Minden. Schriftenreihe Vegetationskunde 1, 137 S.
- (1969) — Zur Geschichte des Eichen-Hainbuchenwaldes im Münsterland auf Grund pollenanalytischer Untersuchungen. Op. cit. 4: 109-130.
- TRAUTMANN, W., A. KRAUSE & R. WOLFF-STRAUB (1970) — Veränderungen der Bodenvegetation in Kiefernforsten als Folge industrieller Luftverunreinigungen im Raum Mannheim-Ludwigshafen. Schriftenreihe Vegetationskunde 5: 193-208.
- TRENTEPOHL, M. (1965) — Die Vegetation schutzwürdiger Wiesen im Staatsforst Kranichstein ostwärts Darmstadt. Institut für Naturschutz Darmstadt, Schriftenreihe 8(1).
- TRENTEPOHL, M & F. WEBERLING (1966) — Die Infloreszenzen der Caprifoliaceen und ihre systematische Bedeutung. Abh. Akad. Wiss. (Mainz) 1966: 455-605.
- TÜXEN, R. (1959, 1963) — Bibliographie der Verbreitungs- und Arealkarten von Pflanzengesellschaften, I und II. Excerpta Botanica B 1: 227-261; 5: 137-156.

- (1961) — Bibliographie der Arbeiten über Grundwasser-Ganglinien unter Pflanzengesellschaften. *Op. cit.* 3: 237-240.
- (1961, 1966) — Bibliographia syndynamica phytosociologica I und II. *Op. cit.*: 221-233; 7: 206-219.
- (1962, 1968/69) — Bibliographie der Bestimmungsschlüssel von Pflanzengesellschaften I, II. *Op. cit.* 4: 87-88; 9: 246-248.
- (1963-1970) — Bibliographia Phytosociologica Systematica I, II, III. *Op. cit.* 5: 108-136; 7: 191-205; 10: 273-290.
- (1966) — Bericht über das Internationale Symposium für Vegetationskartierung vom 23.-26. 3. 1969 in Stolzenau/Weser. Den Haag.
- (1967) — *Corynephoretea canescentis*. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 22-24.
- (Hrsg.) (1966) — Anthropogene Vegetation. Bericht über das Internationale Symposium in Stolzenau/Weser 1961 der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde. Den Haag.
- (1967) — Pflanzensoziologie und Palynologie. Bericht über das Internationale Symposium im Stolzenau/Weser 1962 der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde. Den Haag.
- (1967) — Ausdauernde nitrophile Saumgesellschaften Mitteleuropas. *Contrib. Botan.* 20: 431-433.
- (1968) — Pflanzensoziologische Systematik. Bericht über das Internationale Symposium in Stolzenau/Weser 1964 der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde. Den Haag.
- (1969/70) — Bibliographie der Arbeiten über pflanzensoziologisch bestimmte Wasserstufen und Wasserstufen-Karten. *Excerpta Botanica B* 10: 93-96.
- (1969/70) — Bibliographie zum Problem des Minimi-Areals und der Art-Areal-Kurve. *Op. cit.*: 291-314.
- (1970) — Zur Syntaxonomie des europäischen Wirtschafts-Grünlandes (Wiesen, Weiden, Tritt- und Flutrasen). *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 114: 77-85.
- (1970) — Entwicklung, Stand und Ziele der pflanzensoziologischen Systematik (Syntaxonomie). *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 83: 633-639.
- (Hrsg.) (1971) — Bibliographia Phytosociologica Syntaxonomica. 1-8. Lehre.
- TÜXEN, R., W. BECKER, W. JAHNS, H. MEISSNER & E. PRÜGEL (1968) — Bibliographia Phytosociologica: Germania I-VI. *Excerpta Botanica B* 9: 79-245.
- TÜXEN, R. & H. DIERSCHKE (1968) — Das Bullerbachtal in Sennestadt, eine pflanzensoziologische Lehranlage. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 13: 227-243.
- TÜXEN, R. & W. JAHNS (1967) — *Ranunculus hederaceus* und *Corydalis claviculata* im Gebiet der Mittel-Weser. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 9: 20-25.
- TÜXEN, R. & H. MEISSNER (1959, 1964) — Bibliographia Phytosociologica: Germania VII-VIII. *Excerpta Botanica B* 1: 38-87; 6: 1-105.
- TÜXEN, R. & R. STRAUB (1966) — Bibliographie der Vegetationskarten: Germania. *Excerpta Botanica B* 7: 116-177.

- TÜXEN, R. & V. WESTHOFF (1963) — *Saginetea maritimae*, eine Gesellschaftsgruppe im wechselhalinen Grenzbereich der europäischen Meeresküsten. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 10: 116-129.
- TÜXEN, R. & A. WIEMANN (1970) — Ein Vorkommen der Schuppenwurz im Lippischen Bergland. *Natur u. Heimat (Münster)* 30: 103-104.
- UJHELYI, J. (1969, 1970) — Data to be systematics of the Sections *Bulbosae* and *Caespitosae* of the Genus *Koeleria*. VIII, IX. *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung.* 61: 165-188; 62: 175-195.
- ULRICH, H. (1962) — Floristische Notizen aus den Kreisen Rotenburg a. d. Fulda, Eschwege, Melsungen und Hersfeld. *Hess. Flor. Briefe* 11: 21-24.
- (1964) — Vorkommen von *Botrychium matricariaefolium* in Niedersachsen. *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 108: 41-45.
- VOGGENREITER, V. (1971) — Geobotanische Untersuchungen in der Cham-Further-Senke und ihren montanen Randhöhen. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges.* N. F. 22, 73 S.
- VOLLERTSEN, Ch. (1967) — Flora der Gemarkung Langstedt (Krs. Schleswig). *Jahrb. Schleswigsche Geest* 1967: 183-203.
- VOLLRATH, H. (1961/63) — Der Grundgebirgsabschnitt des Inn von Schärding bis Passau unter besonderer Berücksichtigung der Vornbacher Enge. *Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth* 11: 359-392.
- (1965) — Das Vegetationsgefüge der Itzaue als Ausdruck hydrologischen und sedimentologischen Geschehens. *Landschaftspflege und Vegetationskunde* 4: 125 S.
- (1966) — Über Ackerunkrautgesellschaften in Ostbayern. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges.* N. F. 20: 117-160.
- (1966) — Lungenenzian (*Gentiana pneumonanthe*) und Färberscharte (*Serratula tinctoria*) im Oberpfälzer Wald. *Op. cit.*: 199-208.
- VOLLRATH, H. & O. MERGENTHALER (1966) — *Carex buekii* in Bayern. *Denkschr. Regensb. Bot. Ges.* N. F. 20: 23-54.
- VOLLRATH, H. & E. SIEDE (1961) — Gedanken zur geobotanischen Gliederung Bayerns unter besonderer Berücksichtigung der Flyschzone. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 34: 99-102.
- WACHTER, H. (1965) — Über die Einführung von Lärchen aus Nordamerika im 18. Jahrhundert. *Silv. Genet.* 14: 58-64.
- WAGENITZ, G. (1965) — Zur Systematik und Nomenklatur einiger Arten von *Filago* L. emend. Gaertn. subgen. *Filago* («*Filago germanica*»-Gruppe). *Willdenowia* 4: 37-59.
- (1969) — Abgrenzung und Gliederung der Gattung *Filago* L. s. l. (Compositae-Inuleae). *Op. cit.* 5: 395-444.
- (1970) — Über die Verbreitung einiger *Filago*-Arten. *Feddes Repert.* 81: 107-117.
- (1971) — Die Gattung *Filago* (Filzkraut) in Niedersachsen. *Gött. Flor. Rundbriefe* 5: 3-5.
- WALKER, S. (1954) — Cytogenetic studies in the *Dryopteris spinulosa* complex I. *Watsonia* 3: 193-209.
- WALTER, E. (1966) — Beiträge zur Flora von Bamberg aus dem Raum Hellingenstadt (Ofr.). *Ber. Nat. Ges. Bamberg* 41: 69-72.

- WALTER, H. (1968) — Die Vegetation der Erde in öko-physiologischer Betrachtung. Band II. Die gemässigten und arktischen Zonen. Jena und Stuttgart.
- (1970) — Vegetationszonen und Klima. Kurze Darstellung in kausaler und kontinentaler Sicht. Stuttgart.
- WARNCKE, K. (1964) — Die europäischen Sippen der *Aconitum lycoctonum*-Gruppe. Diss. Univ. München.
- WATTENDORFF, J. (1961) — *Moldavica parviflora* (Nutt.) Britt. adventiv in der Münsterschen Trümmerflora von 1954. *Natur u. Heimat (Münster)* 21: 75-78.
- (1964) — Über Hartholz-Auenwälder im nordwestlichen Münsterland (Kreis Steinfurt/Westfalen). *Abh. Landesmus. Naturk. Münster* 26 (1); 33 S.
- WEBER, D. W. (1967) — Zur Vegetation einiger Fließgewässer der Oberpfalz und des Bayerischen Waldes. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem.* N. F. 11/12: 22-24.
- WEBER, H. E. (1970) — Beitrag zur Kartierung der Gattung *Rubus*. *Gött. Flor. Rundbr.* 4: 27-35.
- (1967) — Über die Vegetation der Knicks in Schleswig-Holstein. *Mitt. Arbeitsgem. Flor. Schleswig-Holst. & Hamburg* 15, 196 S.
- WEBER, H. (1970) — Epilobien-Bestimmung. *Kieler Notizen* 1970(5): 13-15.
- (1970) — Zur Unterscheidung von *Stellaria*-Arten im blütenlosen Zustand. *Op. cit.* (6): 8.
- (1970) — *Polygonum hydropiper* L., mite Schrank, und minus Hudson. *Op. cit.* (7): 12.
- (1970) — Bestimmungsschlüssel der wichtigsten in Schleswig-Holstein vorkommenden *Crataegus*-Arten. *Op. cit.* (8): 8-9.
- WEBERLING, F. (1969) — Zur Bestimmung der einheimischen und adventiv vorkommenden *Valerianella*-Arten. *Hess. Flor. Briefe* 18: 33-38.
- WEBERLING, F., B. ENDLICH & K. ENGEL (1971) — Zur systematischen Stellung von *Valeriana pancicii* Halacsy & Baldacci und *V. bertiscea* Pancic. *Österr. Bot. Z.* 119: 94-101.
- WEBER-OLDEKOP, D. Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen. Diss. Hannover.
- WEDECK, H. (1967) — Zur Frage der Abgrenzung von Physiotypen durch Vegetationskomplexe. *Schriftenreihe Vegetationskunde* 2: 181-192.
- (1970) — Ackerunkrautgesellschaften auf Kalkböden im östlichen Hessen. *Ber. Oberhess. Ges. Natur- und Heilkunde* N. F. Naturwiss. Abt. 37: 131-139.
- (1971) — Über das *Papaveretum argemonis* (Libb. 32) Krusem. et Vlieg. 39 in der Niederrheinischen Bucht. *Decheniana* 123: 19-25.
- WEIDE, H. (1961) — Systematische Revision der Arten *Pimpinella saxifraga* L. und *Pimpinella nigra* Willd. in Mitteleuropa. *Feddes Repert.* 64: 240-268.
- WEIHE, K. v. (1963) — Beiträge zur Ökologie der mittel- und westeuropäischen Salzwiesenvegetation (Gezeitenküsten) I. *Beitr. Biol. Pfl.* 39: 189-237.
- (1963) — Untersuchungen zur Ökologie und Morphologie von *Festuca rubra* L. ssp. *rubra* (Temperatur und Meersalzwirkung). *Op. cit.* 39: 239-26.

- WEIHE, K. v. & G. REESE (1968) — *Deschampsia wibeliana* (Sonder) Parlatore. Beiträge zur Monographie einer Art des Tidegebietes. *Bot. Jahrb.* 88: 1-48.
- WEIMARCK, G. (1971) — Variation and Taxonomy of *Hierochloe* (Gramineae) in the Northern Hemisphere. *Bot. Not. (Lund)* 124: 129-175.
- WEIN, K. (1962) — Die Geschichte der Entstehung und Verbreitung von *Rubus idaeus* var. *leucocarpus*. *Die Kulturpflanze* 10: 195-211.
- (1963) — Die Einführungsgeschichte von *Helianthus tuberosus* L. *Op. cit.* 11: 43-91.
- (1964) — Die Geschichte des Rettichs und des Radieschens. *Op. cit.* 12: 33-74.
- WERCKMEISTER, P. (1967) — Catalogus Iridis 1967: Namen und Synonyme der Gattung *Iris*. Deutsche Iris- und Liliengesellschaft e. V. Leonberg bei Stuttgart. 160 S.
- WIEFELSPÜTZ, W. (1962) — Neue Funde der Bienenragwurz. *Natur u. Heimat (Münster)* 22: 15-21.
- (1964) — Ein neuer Wuchsort von $\times$ *Orchis vilmsii* G. Cam. *Op. cit.* 24: 25-29.
- (1968) — Über *Dactylorhiza sphagnicola* (Höppner) Söo. *Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal* 21/22: 86-95.
- (1970) — Zur Verbreitung der europäischen allogamen *Epipactis*-Arten. *Op. cit.* 23: 38-42.
- WIEMANN, P. & DOMKE, W. (1967) — Pflanzengesellschaften der ostfriesischen Insel Spiekeroog. I. Dünen, I. Teil. *Mitt. Staatsinst. Allg. Bot. Hamburg* 12: 191-354.
- WILLERDING, U. (1967) — Zur Bestimmung der in Südniedersachsen vorkommenden Weiden (*Salices*) anhand ihrer Blätter. *Gött. Flor. Rundbr.* 1: 15-31. Überarbeiteter Neudruck 1969.
- (1968) — Beiträge zur Geschichte der Eibe (*Taxus baccata* L.). Untersuchungen über das Eibenvorkommen im Plesswald bei Göttingen. *Pless-Archiv* 3: 96-155.
- WILLER, K. H. (1970) — Die Vegetation der Binnendünen und Klefnerheiden um Heidelberg und Mannheim. *Jahresber. Ver. Naturk. Mannheim* 131/136: 14-36.
- WILMANN, O. (1959, 1966) — Bibliographie der Wurzelstudien in bestimmten Pflanzengesellschaften. I, II. *Excerpta Botanica* B 1: 213-226; 7: 92-101.
- WILMANN, O. & J. BAMMERT (1965) — Zur Besiedlung der Freiburger Trümmerflächen — eine Bilanz nach zwanzig Jahren. *Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br.* 55: 399-411.
- WILMANN, O. & S. RUPP (1966) — Welche Faktoren bestimmen die Verbreitung alpiner Felsspaltenspflanzen auf der Schwäbischen Alb? *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 34: 62-86.
- (1966) — *Silene rupestris*, das Felsen-Leimkraut, als Glazialrelikt im Schwarzwald. *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz* N. F. 9: 381-389.
- WINTERHOFF, W. (1963) — Vegetationskundliche Untersuchungen im Göttinger Wald. *Nachr. Akad. Wiss. Göttingen II, Math.-Phys. Kl.* 1962: 1-79.

- (1965) — Die Vegetation der Muschelkalkfeshänge im hessischen Werra-bergland. *Veröff. Landesst. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württ.* 33: 146-197.
- (1967) — Beiträge zur Flora des Werratales. *Hess. Flor. Briefe* 16: 51-52.
- (1968) — *Ranunculus nemorosus* DC. ssp. *serpens* (Schränk) Tutin in Hessen und Südniedersachsen. *Op. cit.* 18: 1-4.
- (1968) — Die Flora und Vegetation des Bergsturzes am Schickeberg. *Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Math.-Phy. Kl. Jahrg.* 1968 7: 121-170.
- (1971) — Zur Verbreitung und Soziologie von *Carex cespitosa* L. auf der Schwäbischen Alb. *Jahresh. Ges. Naturk. Württ.* 126: 270-279.
- WINTERHOFF, W. & M. HUBER (1967) — Einige pflanzengeographisch bemerkenswerte Funde in Oberschwaben. *Veröff. Landesst. Naturschutz & Landschaftspflege Baden-Württ.* 35: 32-38.
- WITTENBERGER, G. (1967/68) — Botanische Notizen aus der Offenbacher Gegend. *Ber. Offenbacher Ver. Naturk.* 75: 3-11.
- (1969) — Die Verbreitung von *Gagea pomeranica* Ruthe in Mitteleuropa. *Ber. Offenbacher Ver. Naturk.* 76: 34-36.
- (1969) — Die Steinklee-Goldruten-Gesellschaft bei Offenbach am Main. *Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl.* 28: 107-110.
- WITTENBERGER, W. (1969) — Nachträge, Ergänzungen und Verbesserungen zur «Flora von Offenbach». *Ber. Offenbacher Ver. Naturk.* 76: 37.
- (1970) — Über einige bemerkenswerte Funde im Offenbacher Gebiet im Jahre 1969. *Hess. Flor. Briefe* 19: 15-16.
- WITTENBERGER, W. & G. WITTENBERGER (1968) — Beobachtungen über *Gagea pomeranica* Ruthe auf Grund ihrer Neuentdeckung in Hessen. *Bot. Jahrb.* 88: 466-468.
- WITTENBERGER, W., H. LIPSER & G. WITTENBERGER (1968) — Flora von Offenbach. Pflanzen-Vorkommen in Stadt- und Landkreis Offenbach a. M. (= *Beih. Schriftenr. Inst. Naturschutz Darmstadt* 19). Darmstadt.
- WÖLDECKE, K. (1968) — Bunter Schachtelhalm und Wiesen-Schachtelhalm — ein Beitrag zur Verbreitung in Niedersachsen. *Gött. Flor. Rundbriefe* 1968 (1): 3-6.
- (1968) — Zum Vorkommen der Zittergrassegge in Südniedersachsen mit besonderer Berücksichtigung Hannovers (mit einer Verbreitungskarte). *Op. cit.* (2): 7-11, 16.
- (1969) — Zum Vorkommen von *Ranunculus nemorosus* DC. ssp. *serpens* (Schränk) Tutin in Niedersachsen. *Natur, Kultur u. Jagd (Beitr. Naturk. Nieders.)* 22: 3-6.
- WOIKE, S. (1963) — *Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl auch in Westdeutschland. *Hess. Flor. Briefe* 12: 54-56.
- (1969) — Beitrag zum Vorkommen von *Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl (Feines Scheidenblütengras) in Europa. *Fol. geobot. phytotax. (Praha)* 4: 401-413.
- ZEIDLER, H. (1970) — Ackerunkraut- und Grünlandgesellschaften in Auen. *Bayer. Landwirtsch. Jahrb.* 47: Sonderh. 4: 12-26.
- ZEIDLER, H., H. LEIPPERT & R. WOLFF-STRAUB (1969) — Die wichtigsten Waldgesellschaften am Schwanberg in ihren klimatischen und bodenkundlichen Aussagen. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 14: 398-415.

- ZEIDLER, H. & R. STRAUB (1967) — Waldgesellschaften mit Kiefer in der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation des mittleren Maingebietes. *Mitt. Flor. Soz. Arbeitsgem. N. F.* 11/12: 88-126.
- ZIELONKOWSKI, W. (1967/68) — Die Verbreitung von *Callitriche obtusangula* Legall in Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 40: 63-65.
- ZIMMERMANN, W. (1955) — Zur Taxonomie von *Pulsatilla*. IV. Sechs neue Taxa. *Feddes Repert.* 70: 144-148.
- (1966) — Über die Phylogenie und das System der Ranunculaceae. *Op. cit.* 73: 1-15.
- ZIMMERMANN, W. & G. MIELICH-VOGEL (1962) — Zur Taxonomie der Gattung *Pulsatilla* Miller III. Die Subsektion *Patentes*. *Die Kulturpflanze Beih.* 3: 93-133.
- ZISCHKA, W. & T. ZISCHKA (1966) — *Physocaulis nodosus* (L.) Koch, der Blasenstengel, erstmals adventiv für Deutschland gefunden. *Hess. Flor. Briefe* 15: 41-43.
- (1967) — Floristische Mitteilungen aus dem Rheingau. *Op. cit.* 16: 41-42.
- ZOLLER, H. (1968) — Postglaziale Klimaschwankungen und ihr Einfluss auf die Waldentwicklung Mitteleuropas einschliesslich der Alpen. *Ber. Deutsche Bot. Ges.* 80: 690-696.
- ZOLLITSCH, B. (1967/68) — Soziologische und ökologische Untersuchungen auf Kalkschiefern in hochalpinen Gebieten. Teil I. Die Steinschuttgesellschaften der Alpen unter besonderer Berücksichtigung der Gesellschaften auf Kalkschiefern in den mittleren und östlichen Zentralalpen. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 40: 76-100.
- (1969) — Soziologische und ökologische Untersuchungen auf Kalkschiefern in hochalpinen Gebieten. Teil II. Die Ökologie der alpinen Kalkschieferschuttgesellschaften. *Jahrb. Ver. Schutz Alpenpfl. & -tiere* 34: 167-205.

FLORISTIC REPORT ON GERMANY (1961-1971)

B. DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

VON

S. RAUSCHERT

Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, DDR

LIST OF NEW JOURNALS

Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. Berlin (ab 1961).

Hercynia N. F. Leipzig (ab 1963).

Limnologica. Berlin (ab 1962/63).

Mitteilungen des Arbeitskreises zur Beobachtung und zum Schutz heimischer Orchideen. Halle (ab 1965).

Mitteilungen der Sektion Spezielle Botanik der Biologischen Gesellschaft in der DDR. Berlin (ab 1970).

Natur und Naturschutz in Mecklenburg. Stralsund-Greifswald (ab 1963).

Naturkundliche Jahresberichte des Museums Heineanum. Halberstadt (ab 1966).

Niederlausitzer floristische Mitteilungen. Guben (ab 1965).

Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule «Dr. Theo Neubauer» Erfurt-Mühlhausen, math.-nat. Reihe (seit 1965).

NEW NATIONAL AND LOCAL FLORAS, CHECK LISTS, ETC.

Exkursionsflora von Deutschland. II. Gefäßpflanzen. 3. Aufl. 1962a, 4. Aufl. 1966a, 5. Aufl. 1966b, 6. Aufl. 1967 (ROTHMALER, 1962-1967).

Exkursionsflora von Deutschland. III. Atlas der Gefäßpflanzen (ROTHMALER, 1966c).

Exkursionsflora von Deutschland. IV. Kritischer Ergänzungsband Gefäßpflanzen (ROTHMALER, 1963).

Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas (EHRENDORFER, 1967).

- Neue kritische Flora des Kreises Parchim. I. (DAHNKE, 1966).
 Flora von Rostock und Umgebung (PANKOW, 1967).
 Flora der Prignitz. 2. Aufl. (FISCHER, 1963).
 Flora des Ruppiner Landes (FISCHER, 1964).
 Flora des Kreises Ludwigslust (KRAMBEER, 1962).
 Die Flora des Messtischblattes Dahme (PATZKE, 1964).
 Flora des Vogtlandes (WEBER & KNOLL, 1965).
 Flora des Kreises Freital (RANFT & al., 1966).

BIBLIOGRAPHICAL SUMMARIES

- Brandenburg (SUKOPP, 1964, 1967).
 Sachsen (FUNKE, 1965).
 Oberlausitz (GROSSER, 1962).
 Niederlausitz (KRAUSCH, 1965).
 Votgtland (WEBER, 1962).
 Verbreitungskarten Mitteldeutschlands (HILBIG, 1964-1969).
 Verbreitungskarten von Vegetationseinheiten (TÜXEN, 1963).
 Vegetationskarten von Deutschland (TÜXEN, 1966; TÜXEN & STRAUB, 1966).
 Pflanzensoziologische Arbeiten über Deutschland (TÜXEN & MEISSNER, 1964).

REVISIONS, MONOGRAPHS AND SIMILAR PUBLICATIONS

- Acer* sect. *Platanoidea* in Europa (LIPPOLD, 1968).
Alchemilla in Mitteleuropa (ROTHMALER, 1962c).
Alchemilla in der DDR (FRÖHNER, 1964).
Alchemilla in der nördlichen DDR (WEGENER, 1971a, b).
Alchemilla im Erzgebirge (LANGE, 1962).
Alchemilla glabra-Verwandtschaft (FRÖHNER, 1965c).
Brachypodium pinnatum-Gruppe (SCHOLZ, 1968).
Carlina (MEUSEL & WERNER, 1962).
Carthamus (HANELT, 1963).
Crataegus in Deutschland (MANG, 1968).
Cyclamen (SCHWARZ & LEPPER, 1964).
Digitalis und *Isoplexis* in Europa (WERNER, 1964, 1965).
Diphysium in Mitteleuropa (RAUSCHERT, 1967c).
Hieracium ser. *Oreadea* in Mitteldeutschland (S. & V. BRÄUTIGAM, 1968).

- Melica* sect. *Beckeria* in Mitteldeutschland (RAUSCHERT, 1963b).
Myosotis ser. *Palustres* in Europa (SCHUSTER, 1967).
Odontites in Norddeutschland (SCHNEIDER, 1964).
Oenothera im südlichen Brandenburg (HUDZIOK, 1968).
Oenothera in der Oberlausitz (OTTO, 1970).
Oenothera in Sachsen (GUTTE & ROSTANSKI, 1971).
Ononis in Nordostdeutschland (ENDTMANN, 1964).
Oreoherzogia (VENT, 1962).
Pimpinella saxifraga-Gruppe (WEIDE, 1962).
Pinguicula in Eurasien (CASPER, 1962).
Poa sect. *Ochlopoa* in Deutschland (FRÖHNER, 1963).
Polypodium in Europa (ROTHMALER & SCHNEIDER, 1962).
Primula in Europa (SCHWARZ, 1968).
Pulsatilla subsect. *Patentes* (ZIMMERMANN & MIEHLICH-VOGEL, 1962).
Quercus in Mitteleuropa (SCHWARZ, 1962).
Rhinanthus in Mecklenburg (SCHNEIDER, 1962).
Stipa pennata-Gruppe in Mitteleuropa (ENDTMANN, 1962).
Taraxacum in Brandenburg (HUDZIOK, 1965b).
Taraxacum sect. *Palustria* in Norddeutschland (HUDZIOK, 1967c, 1969).
Taraxacum levigatum-Gruppe in Mecklenburg (DOLL & PANKOW, 1968).
Thymus in Mitteldeutschland (SCHMIDT, 1968).
Thymus in Mitteleuropa (SCHMIDT, 1969, 1971).
Utricularia in der südlichen DDR (CASPER, 1967a).
Utricularia in der nördlichen DDR (CASPER, 1967b).

BIOSYSTEMATIC, CYTOTAXONOMIC AND SIMILAR STUDIES

- Cyclamen* (SCHWARZ & LEPPER, 1964).
Danthonia decumbens (SCHWARZ & BÄSSLER, 1964).
Zytologie deutscher Orchideen (WEGENER, 1966).

ECOLOGY, PHYTOSOCIOLOGY AND VEGETATION MAPPING

- Karte der natürlichen Vegetation der DDR (SCAMONI & al., 1964).
Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlands (PASSARGE, 1964, PASSARGE & HOFMANN, 1968).

- Pflanzenwelt Sachsens (ULBRICHT & al. 1965).
 Vegetation des Stechlinsee-Gebiets (KRAUSCH, 1964-1968).
 Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Umgebung des Miritz-sees (JESCHKE, 1963).
 Vegetation der Stubnitz auf Rügen (JESCHKE, 1964).
 Vegetation des Bodetals im Harz (STÖCKER, 1962b, 1965).
 Kontinentale Xerothermrassen in Mitteldeutschland (MAHN, 1965).
 Sandtrockenrasen in Brandenburg (KRAUSCH, 1968b).
 Sesleria-Gesellschaften in Mitteldeutschland (W. SCHUBERT, 1963).
 Schwermetallpflanzengesellschaften Mitteleuropas (ERNST, 1965).
 Saumgesellschaften Mittelthüringens (MARSTALLER, 1970).
 Bergwiesen in der DDR (HUNDT, 1964).
 Fichtenwälder im Hochharz (STÖCKER, 1967).
 Segetalgesellschaften Mitteldeutschlands (SCHUBERT & MAHN, 1969).
 Segetalgesellschaften Thüringens (HILBIG, 1966c, 1967).
 Segetalgesellschaften Sachsens (MÜLLER, 1964).
 Kiefernforsten und -wälder Brandenburgs (HOFMANN, 1964).
 Wasserpflanzengesellschaften der südlichen DDR (HILBIG, 1971).
 Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Elb-Havel-Winkel (HORST, KRAUSCH & MÜLLER-STOLL, 1966).
 Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Havelseen (KONCZAK, 1968).
 Bibliographie der Arealkarten von Vegetationseinheiten (TÜXEN, 1963).
 Bibliographie der Vegetationskarten aus Deutschland (TÜXEN & STRAUB, 1966).

FLORISTIC AND PLANT GEOGRAPHY

- Chorologie der zentraleuropäischen Flora (MEUSEL, JÄGER & WEINERT, 1965).
 Pflanzengeographische Ozeanitätsgliederung der Holarktis (JÄGER, 1968).

DISTRIBUTION MAPPING SCHEMES

- Mecklenburg (ArbGem. Mecklenburger Floristen, 1963-1969).
 Rostocker Raum (KAUSSMANN & KUDOKKE, 1962).
 Brandenburg (ArbGem. brandenburgischer und altmärkischer Botaniker, 1962).

- Mitteldeutschland (ArbGem. mitteldeutscher Floristen 1962-1969, MEUSEL, 1970).
Sachsen (ArbGem. sächsischer Botaniker, 1965-1968).
Umgebung von Bautzen (MILTZER, 1961b).
Südwest-Thüringen (BARWINEK, 1966).
Mittlerer Thüringer Wald (NIEMANN, 1963).
Bodetal im Harz (STÖCKER, 1962a).
Hainleite (WEINTSCHKE, 1963).
Dübener Heide und Umgebung (JAGE, 1962, 1963).
Segetalpflanzen der südlichen DDR (HILBIG, MAHN & MÜLLER, 1969).
Segetal- und Ruderalpflanzen Westthüringens (LADWIG, 1967).

ORIGIN AND HISTORY OF THE FLORA

- Waldgeschichte des Vogtlandes (HEINRICH & LANGE, 1969).
Waldgeschichte des Oberharzes (WILLUTZKI, 1962).
Waldgeschichte des Thüringer Walds (SCHLÜTER, 1964).
Vegetationsgeschichte des Thüringer Walds (LANGE, 1967).
Vegetationsgeschichte des Thüringer Beckens (LANGE, 1966a, b).
Vegetationsgeschichte Sachsens (SCHRETZENMAYR, 1965).
Vegetationsgeschichte Rügens (KLEWE & LANGE, 1968).

LIST OF NEW TAXA

- Alchemilla sudetica* Fröhner (1965c, 1966a; teste FRÖHNER, 1972 synonymous to *A. reniformis* Buser ss. orig. non ss. Rothmaler).
Alchemilla triformiloba Hudziok (1965b).
Alchemilla ursina Fröhner (1965c; teste FRÖHNER, 1972 synonymous to *A. effusa* Buser).
Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. *brevifolia* (Bisse) Senghas (BISSE, 1963).
Dactylorhiza × *megapolitana* (Bisse) Soó (BISSE, 1963).
Danthonia decumbens (L.) DC. ssp. *deciapiens* Schwarz & Bässler (1964).
Euphrasia rostkoviana Hayne ssp. *kreiselii* Rothm. & U. Schneider (ROTHMALER & al. 1965).
Gentianella × *aerimontana* Fröhner (1965a).
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. ssp. *montana* Bisse (1963).
Hieracium norvegicum Fries ssp. *thymo-festucetorum* S. & V. Bräutigam (1968).

- Hieracium norvegicum* Fries ssp. *pseudonosmoides* S. & V. Bräutigam (1968).
- Hieracium rigidiceps* S. & V. Bräutigam (1968).
- Juncus* × *obotritorum* Rothm. (ROTHMALER & al. 1965).
- Melica* × *thuringiaca* Rauschert (1963b, 1966b).
- Melica* × *weinii* Hempel (1970).
- Myosotis caespitosa* C. F. Schultz var. *neglecta* Schuster (1967).
- Myosotis nemorosa* Bess. ssp. *brevisetacea* Schuster (1967).
- Myosotis nemorosa* Bess. var. *hercynica* Schuster (1967).
- Odontites rubra* (Baumg.) Opiz ssp. *rothmaleri* U. Schneider (1964; ROTHMALER et al. 1965).
- Oenothera albipercurva* Renner in Hudziok (1968).
- Oenothera brevispicata* Hudziok (1968).
- Oenothera canovertex* Hudziok (1968).
- Oenothera* × *clavifera* Hudziok (1968).
- Oenothera coloratissima* Hudziok (1968).
- Oenothera compacta* Hudziok (1968).
- Oenothera editicaulis* Hudziok (1964, 1967b, 1968).
- Oenothera flaemingina* Hudziok (1968).
- Oenothera inconspicua* Hudziok (1968).
- Oenothera indivisa* Hudziok (1963, 1965, 1967b, 1968).
- Oenothera jueterbogensis* Hudziok (1964, 1966, 1967b, 1968).
- Oenothera lipsiensis* Rostanski & Gutte (GUTTE & ROSTANSKI, 1971).
- Oenothera macrosperma* (Hudziok) Hudziok (1964, 1965, 1966, 1967b, 1968).
- Oenothera mediomarchica* Hudziok (1968).
- Oenothera obscurifolia* Hudziok (1968).
- Oenothera octolineata* Hudziok (1968).
- Oenothera paradoxa* Hudziok (1968).
- Oenothera* × *punctulata* Rostanski & Gutte (OTTO, 1970, GUTTE & ROSTANSKI, 1971).
- Oenothera pyramidiflora* Hudziok (1968).
- Oenothera velutinifolia* Hudziok (1968).
- Ononis spinosa* L. ssp. *aberrans* Endtmann (1964).
- Pimpinella saxifraga* L. ssp. *montana* Weide (1962).
- Platanthera bifolia* (L.) Rich. ssp. *graciliflora* Bisse (1963).
- Polypodium* × *mantoniae* Rothm. (ROTHMALER & U. SCHNEIDER, 1962).
- Pulsatilla vulgaris* Mill. var. *bevericola* Zimmermann (1965).
- Rhinanthus halophilus* U. Schneider (1962).

- Rhinanthus minor* L. ssp. *balticus* U. Schneider (1962).
Rhinanthus × *schneiderae* Rothm. (U. SCHNEIDER, 1962).
Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborny ssp. *arenarius* U. Schneider (1962).
Sorbus acutisecta R. Reuther & O. Schwarz (REUTHER, 1971).
Stipa joannis Celak. ssp. *germanica* Endtmann (1962).
Taraxacum ancoriferum Hudziok (1969).
Taraxacum apiculatum van Soest (1965).
Taraxacum bavaricum van Soest (1965).
Taraxacum brandenburgicum Hudziok (1967a, b, c, 1969).
Taraxacum calcem-amans Hudziok (1969).
Taraxacum dahnkei Doll (1971b).
Taraxacum flaemingense Hudziok (1965b).
Taraxacum geminidentatum Hudziok (1969).
Taraxacum hemiparabolicum Hudziok (1969).
Taraxacum paucilobum Hudziok (1965b, 1967a, b, c, 1969).
Taraxacum pauckertianum Hudziok (1969).
Taraxacum pilosum Doll (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum pollichii van Soest (1965).
Taraxacum prostratum Hudziok (1965b, 1967a, b, c, 1969).
Taraxacum subalpinum Hudziok (1965b, 1967a, b, 1969).
Taraxacum trilobifolium Hudziok (1967c, 1969).

NEW RECORDS OF SPECIES, SUBSPECIES OR HYBRIDS

- Achillea cartilaginea* Ledeb. (KRAUSCH in SCHOLZ & SUKOPP, 1965).
Alchemilla cymatophylla Juz. (FRÖHNER, 1966b).
Alchemilla effusa Buser (FRÖHNER, 1965c ut *A. ursina* Fröhner n. sp.; FRÖHNER, 1972 ut *A. effusa* Buser).
Alchemilla reniformis Buser ss. orig. (FRÖHNER, 1965c ut *A. sudetica* Fröhner n. sp.; FRÖHNER, 1972 ut *A. reniformis* Buser ss. orig. non ss. Rothmaler).
Anthericum × *confusum* Domin (RAUSCHERT, 1972b).
Arabidopsis suecica (Fries) Norrlin (SCHOLZ, 1962b).
Bidens × *polakii* Velen. (JAGE, 1964a).
Brachypodium rupestre (Host) R. & Sch. (SCHOLZ, 1968).
Calamagrostis canescens (Weber) Roth ssp. *vilmensis* (Besser) H. Scholz (SCHOLZ, 1964).
Crataegus × *kyrtostyla* Fingerhuth (MANG, 1968, 1970).

- Crataegus* × *schumacheri* Raunkiaer (MANG, 1968, 1970).
Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. *transsilvanica* (Schur) Soó (FRÖHNER, 1962).
Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. *baltica* (Klinge) Senghas (BISSE, 1963).
Dactylorhiza purpurella (T. & T. Stephens.) Soó (HUDZIOK, 1970).
Epilobium × *rivolicolum* Hausskn. (FRÖHNER, 1965b).
Erodium glutinosum Dum. (ROTHMALER, 1962b).
Hieracium fuscocinereum Norrl. emend. Bräutigam (BRÄUTIGAM, 1970).
Knautia kitaibelii (Schult.) Borb. (FRÖHNER, ined.).
Myosotis palustris (L.) L. ssp. *radicans* (Opiz) Schuster (SCHUSTER, 1967).
Odontites rubra (Baumg.) Opiz ssp. *pumila* (Nordst.) U. Schneider (U. SCHNEIDER, 1964).
Pimpinella nigra Willd. ssp. *arenaria* (Brylin) Weide (WEIDE, 1962).
Poa × *nannfeldtii* Jirásek (FRÖHNER, 1963).
Puccinellia limosa (Schur) Holmb. (RAUSCHERT, 1962, 1963a, SCHOLZ, 1962a).
Rhinanthus alpinus Baumg. ssp. *elatus* (Stern.) Soó (FRÖHNER, 1962).
Stipa sabulosa (Pazoskij) Sljussarenko (RAUSCHERT, 1966b).
Suertia perennis L. ssp. *alpestris* (Baumg.) Domin & Podpera (FRÖHNER, 1962).
Taraxacum austrinum Haglund (van SOEST, 1965).
Taraxacum commixtum Hagl. ex Hyl. (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum dunense van Soest (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum friscum van Soest (van SOEST, 1965).
Taraxacum glaucinum Dahlst. (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum laetiforme Dahlst. (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum limnanthes Haglund (van SOEST, 1965).
Taraxacum marginatum (Dahlst.) Dahlst. (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum plumbeum Dahlst. (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum polyschistum Dahlst. (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum proximiforme van Soest (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum pseudoproximum van Soest (DOLL & PANKOW, 1968).
Taraxacum suecicum Haglund ex Hard av Segerstad (van SOEST, 1965).
Taraxacum taeniatum Hagl. ex Holmgr. (DOLL & PANKOW, 1968).
Thymus kosteleckyanus Opiz (SCHMIDT, 1968).
Veronica jacquinii Baumg. (ROTHMALER & al. 1965).

LIST OF NEWLY ESTABLISHED ALIENS

- Achillea lanulosa* Nutt. (SCHOLZ, 1970).
Agrostis castellana Boiss. & Reut. (SCHOLZ, 1962a, 1963, 1966b).
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. (RAUSCHERT, 1966b).
Iris versicolor L. (KRAUSCH, 1968c).
Lindernia dubia (L.) Pennell (JAGE, 1964a, 1967).
Oenothera acutifolia Rostanski (HUDZIOK, 1967b, GUTTE & ROSTANSKI, 1971).
Oenothera turoviensis Rostanski (OTTO, 1970).
Oxalis dillenii Jacq. (SCHOLZ, 1966a).
Panicum huachucae Ashe (SCHOLZ in SCHOLZ & SUKOPP, 1965).
Pieris floribunda (Pursh) Benth. & Hook. (STÖCKER in SCHOLZ & SUKOPP, 1967).
Salvinia rotundifolia Willd. (SCHOLZ in SCHOLZ & SUKOPP, 1967).
Sesamoides canescens (L.) O. Kuntze (DOLL, 1971a).
Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze (DOLL, 1971a).
Setaria faberi Herrmann (SCHOLZ, 1964).
Vaccinium lamarckii Camp (RAUSCHERT, 1970a).

EXTINCTION OF SPECIES. ERROR OF CLASSIFICATION

- Thymus alpestris* Tausch (SCHMIDT, 1971, not in DDR u. BRD).

BIBLIOGRAPHY

- Arbeitsgemeinschaft brandenburgischer und altmärkischer Botaniker (1962) — Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen. 4. Reihe (Hrsg.: MÜLLER-STOLL W. R., FISCHER W. & KRAUSCH H.-D.). *Wiss. Z. päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat.* 7: 95-150.
- Arbeitsgemeinschaft Mecklenburger Floristen (1963, 1966a, 1966b, 1967, 1968, 1969) — Verbreitungskarten zur Pflanzengeographie Mecklenburgs. 2. [-7.] Reihe. — 2. R. (Hrsg.: PANKOW, H. & RATTEY, F., *Wiss. Z. Univ. Greifswald, math.-nat.* 12: 359-376; 3. R. (Hrsg.: KLOSS, K. & SUCCOW, M., *Op. cit.* 15: 9-40); 4.-7. R. (Hrsg.: FUKAREK, F., *Natur u. Naturschutz Meckl.* 4: 201-252; 5: 129-213; 6: 27-84; 7: 27-76).
- Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen (1962a, 1968, 1969a) — Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen. 10. [-12.] Reihe. — 10. u. 11. R. (Hrsg.: MEUSEL H. & BUHL A., *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 11: 1245-1317; 17: 377-439); 12. R. (Hrsg.: SHUBERT, R. & HILBIG, W., *Op. cit.* 18: 163-210).

- Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen (1962b, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969b, 1972) — Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VI [-XIII]). — VI, VII (Hrsg.: BUHL, A. & SCHUBERT, R., *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 11: 179-206; 12: 669-728). VIII-XIII (Hrs.: SCHUBERT, R. & RAUSCHERT, S., *Op. cit.* 13: 651-720; 14: 485-504; 15: 737-846; 16: 851-950; 18: 429-503; 21: 1-72).
- Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker (1962, 1965a, 1966a) — Beiträge zur Flora Saxonica 1962 [1963, 1964-1965] (Hrsg.: HEMPEL, W.). *Ber. ArbGem. Sächs. Bot.* 4: 218-226; 5/6 («1963/64»): 246-255; 7: 255-275.
- Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker (1965b, 1966b, 1968) — Verbreitungskarten sächsischer Leitpflanzen. 1. [2., 3.] Reihe. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 5/6 («1963/64»): 21-124; 7 («1965»): 7-90; 8 («1966/67»): 7-52.
- BARWINEK, H. (1966) — Verbreitungskarten von Waldpflanzen des Triashügellandes zwischen Thüringer Wald und Rhön. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 15: 782-794.
- BENKERT, D. & KARSTEN, U. (1969) — Die xerotherme Hügelflora im Potsdam-Brandenburger Havelgebiet. *Wiss. Z. päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat.* 13: 331-358.
- BISSE, J. (1963) — Ein Beitrag zur Kenntnis der deutschen Orchideenflora. *Feddes Repert.* 67: 181-189.
- BÖHME, A.-R., PANKOW, H. & KÜHNER, E. (1968) — Floristische Mitteilungen aus Mecklenburg II. Ein Beitrag zur Kenntnis der Kreise Neustrelitz und Neubrandenburg. *Wiss. Z. Univ. Rostock, math.-nat.* 17: 351-354.
- BRÄUTIGAM, S. (1970) — *Hieracium fuscocinereum* Norrl. [*H. sagittatum* (Lindb.) Norrl.] neu für Deutschland. *Feddes Repert.* 81: 503-506.
- BRÄUTIGAM, S. & BRÄUTIGAM, V. (1963) — Zur Kenntnis der mitteldeutschen *Oreadea* (Gattung *Hieracium* L.) unter besonderer Berücksichtigung von *Hieracium saxifragum* Fries und *Hieracium norvegicum* Fries. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 8 («1966/67»): 123-140.
- BUHL, A. (1964) — Zur Flora von Beeskow und Umgebung. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 13: 657-662.
- CASPER, S. J. (1962) — Revision der Gattung *Pinguicula* in Eurasien. *Feddes Repert.* 66: 1-148.
- (1967a) — Die Gattung *Utricularia* L. (Lentibulariaceae) im thüringisch-sächsischen Raume. *Limnologica* 5 (1): 81-104.
- (1967b) — Die Gattung *Utricularia* L. (Lentibulariaceae) in Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. *Op. cit.* 5 (3): 367-396.
- DAHNKE, W. (1963) — Floristische Notizen aus Mecklenburg. 2. Folge. *Arch. Freunde Naturgesch. Mecklenb.* 7 («1961»): 140-157.
- (1966) — Neue kritische Flora des Kreises Parchim. I. *Op. cit.* 12: 52-84.
- DOLL, R. (1971a) — Bemerkungen zur Gattung *Sesamoides* Ortega. *Wiss. Z. Univ. Rostock, math.-nat.* 20: 77-81.
- (1971b) — *Taraxacum dahnkei* sp. nov. — eine interessante Art aus der Sektion *Vulgaria* Dt. ex Lindm. *Feddes Repert.* 82: 373-375.
- DOLL, R. & PANKOW, H. (1968) — Über die Verbreitung von *Taraxacum levigatum* (Willd.) DC. in Mecklenburg. *Wiss. Z. Univ. Rostock, math.-nat.* 17: 325-347.

- (1971) — Floristische Mitteilungen aus Mecklenburg III. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Kreise Gadebusch und Schwerin. *Op. cit.* 20: 69-70.
- ERENDORFER, F. (1967) (Hrsg.) — Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Graz.
- EICHLER, H. (1970) — Flora und Vegetation des Havel. *Willdenowia Beih.* 6.
- ENDTMANN, J. (1962) — Die mitteleuropäischen Sippen der Gattung *Stipa* L. *Wiss. Z. Univ. Greifswald, math.-nat.* 11: 143-152.
- (1964) — Zur Verbreitung und Taxonomie der Gattung *Ononis* in Nordost-Deutschland. *Feddes Repert.* 69: 103-131.
- ERNST, W. (1965) — Ökologisch-soziologische Untersuchungen der Schwermetallpflanzengesellschaften Mitteleuropas unter Einschluss der Alpen. *Abh. Landesmus. Naturk. Münster (Westf.)* 27 (1): 1-54.
- FISCHER, W. (1963) — Flora der Prignitz. 2. Aufl. Pritzwalk.
- (1964) — Flora des Ruppiner Landes. *Veröff. Bezirksheimatmus. Potsdam* 5.
- (1966) — Floristische Beobachtungen aus dem Kreise Luckau. *Niederlausitz. flor. Mitt.* 2: 47-57.
- FRÖHNER, S. (1962) — Floristische Neufunde und kritische Arten aus dem oberen Erzgebirge. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 4: 232-236.
- (1963) — Beitrag zur Kenntnis der deutschen Arten der Gattung *Poa* L. Sektion *Ochlopoa* (A. et Gr.) Jsk. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 12: 669-676.
- (1964) — Bestimmungsschlüssel der *Alchemilla*-Arten der DDR. *Op. cit.* 13: 681-687.
- (1965a) — Ein neuer Enzian-Bastard aus dem Erzgebirge — *Gentianella* × *aerimontana* hybr. nov. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 5/6 («1963/64»): 257-260.
- (1965b) — Kritische Arten aus dem oberen Erzgebirge II. *Op. cit.*: 261-270.
- (1965c) — Mitteleuropäische Sippen von *Alchemilla glabra* und einige Verwandte. *Bot. Jb.* 83: 370-405.
- (1966a, 1968) — Kritische Sippen aus dem oberen Erzgebirge III. [IV.] *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 7 («1965»): 276-278; 8 («1966/67»): 141-157.
- (1966b) — Drei erzgebirgische *Alchemilla*-Sippen neu für Deutschland. *Op. cit.* 8: 279-281.
- FUNKE, H. (1965) — Beiträge zur Geschichte der Floristik in Sachsen. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 5/6 («1963/64»): 447-472.
- GROSSER, K.-H. (1962) — Stand und Auswertung vegetationskundlicher Arbeit in der Oberlausitz (Literaturüberblick). *Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz* 37: 7-31.
- GUTTE, P. (1964) — Bemerkungen zu einigen Adventiv- und Ruderalarten der weiteren Umgebung von Leipzig. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 13: 664-669.
- (1966) — Die Verbreitung einiger Ruderalpflanzengesellschaften in der weiteren Umgebung von Leipzig. *Op. cit.* 15: 937-1010.
- (1971) — Zur Verbreitung einiger Neophyten in der Flora von Leipzig. *Mitt. Sek. spez. Bot. Biol. Ges. DDR* 2: 5-24.
- GUTTE, P. & ROSTANSKI, K. (1971) — Die *Oenothera*-Arten Sachsens. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 9: 63-88.

- HANELT, P. (1963) — Monographische Übersicht der Gattung *Carthamus* L. (Compositae). *Feddes Repert.* 67: 41-180.
- HEINRICH, W. & LANGE, E. (1969) — Ein Beitrag zur Kenntnis der Waldgeschichte des Thüringisch-sächsischen Votglandes. *Feddes Repert.* 80: 437-462.
- HEMPEL, W. (1970) — *Melica nutans* L. $\times$ *Melica uniflora* Retz. (*Melica* $\times$ *weinii*, hybr. nov.) — ein interessanter Bastard zweier Perlgrasarten. *Hercynia* N. F. 7 (4): 329-336.
- HENKER, H. (1965) — Die Gattung *Sigesbeckia* L. in Europa. *Arch. Freunde Naturgesch. Mecklenb.* 11: 7-54.
- HEYNERT, H. (1964) — Die Pflanzenwelt des hohen Westerzgebirges. Ein Beitrag zur Geobotanik des Westerzgebirges. Dresden u. Leipzig.
- HILBIG, W. (1964, 1966a, 1969) — Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts bis zum Jahre 1963 [1. Fortsetzung: Weiterführung bis zum Jahre 1965 und Ergänzungen. — (3) Weiterführung bis zum Jahre 1967 und Ergänzungen]. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 13: 687-719; 15: 795-822; 18: 481-502.
- (1966b) — *Solanum nitidibaccatum* als Weinbergsunkraut. *Op. cit.* 15: 779-781.
- (1966c) — Die Bedeutung der Ackerunkrautgesellschaften für die pflanzengeographische Gliederung Thüringens. *Op. cit.* 76: 83-191.
- (1967) — Die Ackerunkrautgesellschaften Thüringens. *Op. cit.* 76: 83-191.
- (1971) — Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. I. Die Wasserpflanzengesellschaften. *Hercynia* N. F. 8: 4-33.
- HILBRIG, W., MAHN, E.-G. & MÜLLER, G. (1969) — Zur Verbreitung von Ackerunkräutern im südlichen Teil der DDR. 1. Folge. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 18: 211-270.
- HOFMANN, G. (1964) — Kiefernforstgesellschaften und natürliche Kiefernwälder im östlichen Brandenburg. *Arch. Forstwesen* 13: 641-664, 717-732.
- (1965) — Waldgesellschaften der östlichen Uckermark. *Feddes Repert. Beih.* 142: 133-202.
- HORST, K., KRAUSCH, H.-D. & MÜLLER-STOLL, W. R. (1966) — Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Elb-Havel-Winkel. *Limnologica* 4: 101-163.
- HUDZIOK, G. (1964) — Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 101: 18-58.
- (1963, 1965a, 1966, 1967a, 1967b, 1970) — Beiträge zur Flora des Fläming und der südlichen Mittelmark (Nachtrag). [2. Nachtrag, 3. Nachtrag und Zusammenfassung, 4. Nachtrag, 5. Nachtrag, 6. Nachtrag mit Übersicht über die Nachträge 1-4]. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 12: 706-710; 14: 485-492; 15: 752-760; 16: 864-866; *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 104: 96-104; 107: 29-50.
- (1965b) — Neue Arten der Gattung *Taraxacum* Zinn sowie eine neue Art der Gattung *Alchemilla* L. aus der Mark Brandenburg. *Feddes Repert.* 72: 25-30.

- (1967c, 1969) — Neue *Taraxacum*-Arten der Sektion *Palustria* Dahlstedt aus Norddeutschland ([I], II). *Op. cit.* 75: 131-139; 80: 323-338.
- (1968) — Die *Oenothera*-Arten der südlichen Mittelmark und des angrenzenden Fläming. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 105: 73-107.
- HUNDT, R. (1964) — Die Bergwiesen des Harzes, Thüringer Waldes und des Erzgebirges (= *Pflanzensoziologie* 14). Jena.
- ILLIG, H. (1968) — Beiträge zur Flora von Luckau. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 105: 64-72.
- JÄGER, E. (1968) — Die pflanzengeographische Ozeanitätsgliederung der Holarktis und die Ozeanitätsbindung der Pflanzenareale. *Feddes Repert.* 79: 135-335.
- JAGE, H. (1962) — Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dübener Heide und der angrenzenden Auengebiete. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 11: 179-192.
- (1963) — Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dübener Heide und der angrenzenden Gebiete. *Op. cit.* 12: 695-706.
- (1964a) — *Lindernia dubia* auch in Deutschland (Zur Flora und Vegetation des mittleren Elbtals und der Dübener Heide. 3. Mitteilung). *Op. cit.* 13: 673-680.
- (1964b) — Neue Fundorte und bemerkenswerte Fundbestätigungen von höheren Pflanzen aus dem südlichen Fläming und dem mittleren Elbtal (rechtseibischer Anteil). *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 101: 59-70.
- (1964c) — Über das gegenwärtige Vorkommen von *Lolium remotum* Schrank. *Op. cit.*: 77-82.
- (1967, 1968) — Vorarbeiten zu einer Flora der Dübener Heide und ihrer näheren Umgebung (4. [5.] Beitrag.). *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 16: 851-861; *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 105: 52-63.
- JAGE, H. & JAGE, I. (1967) — Zur Flora der Altmark. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 104: 54-62.
- JAGE, H. & VOIGT, O. (1964) — *Linaria dalmatica* (L.) Miller als Autobahnbegleiter in Mitteldeutschland. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 101: 83-84.
- JESCHKE, L. (1963) — Die Wasser- und Sumpfvvegetation im Naturschutzgebiet «Ostufer der Müritz». *Limnologica* 1: 475-545.
- (1964) — Die Vegetation der Stubnitz (Naturschutzgebiet Jasmund auf der Insel Rügen). *Natur u. Naturschutz Mecklenb.* 2: 1-154.
- KAUSSMANN, B., KLAUS, H. & KUDOKE, J. (1964) — Floristische Mitteilungen. *Arch. Freunde Naturgesch. Mecklenb.* 10: 103-111.
- KAUSSMANN, B. & KUDOKE, J. (1962) — Leitpflanzen des Rostocker Raumes III. *Arch. Freunde Naturgesch. Mecklenb.* 8: 59-77.
- KLIEWE, H. & LANGE, E. (1968) — Ergebnisse geomorphologischer, stratigraphischer und vegetationsgeschichtlicher Untersuchungen zur Spät- und Postglazialzeit auf Rügen. *Petermanns geogr. Mitt.* 1968: 241-252.
- KÖHLER, H. (1963, 1964, 1965) — Zur Flora des Eichsfeldes ([1.] 2., 3. Beitrag). *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 12: 714-715; 13: 655-656; 14: 498-499.
- KONCZAK, P. (1968) — Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Havelseen um Potsdam. *Limnologica* 6: 147-201.
- (1970) — 1. Beitrag zur Flora von Bad Freienwalde und Umgebung. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 107: 51-64.

- KRAMBEER, R. (1962) — Flora des Kreises Ludwigslust. *Päd. Rundbr. Abt. Volksbild. päd. Kreiskabinett Gewerksch. Unterr. Erzieh. Krs. Ludwigslust* 2 (5/6): 1-111.
- KRAUSCH, H.-D. (1964a, 1964b, 1967, 1968a) — Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes (I-IV). *Limnologica* 2: 145-203, 423-482; 5: 331-366; 6: 321-380.
- (1965) — Bibliographie der botanischen Literatur der Niederlausitz. *Niederlausitz. flor. Mitt.* 1: 6-38.
- (1968b) — Die Sandtrockenrasen (Sedo-Scleranthetea) in Brandenburg. *Mitt. flor.-soz. ArbGem.* 13: 71-100.
- (1968c) — Ein neophytischen Vorkommen von *Iris versicolor* L. in Mitteleuropa. *Limnologica* 6: 141-146.
- LADWIG, E. (1967) — Verbreitungskarten von Unkräutern und Ruderalpflanzen aus dem Gebiet zwischen der oberen Unstrut (Mühlhausen) und der Werra. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 16: 899-943.
- LANGE, E. (1962) — Ein Beitrag zur Verbreitung der Gattung *Alchemilla* im Erzgebirge. *Drudea* 2 (5-6): 11-18.
- (1966a) — Zur Vegetationsgeschichte des zentralen Thüringer Beckens. *Op. cit.* 5: 3-58.
- (1966b) — Zur spätglazialen Vegetation des Thüringer Beckens. *Hercynia* N. F. 2: 400-406.
- (1967) — Zur Vegetationsgeschichte des Beerberggebietes im Thüringer Wald. *Feddes Repert.* 76: 205-219.
- LINDNER, A., PANKOW, H. & al. (1971) — Floristische Mitteilungen aus Mecklenburg IV. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora des Kreises Hagenow. *Wiss. Z. Univ. Rostock, math.-nat.* 20: 71-75.
- LIPPOLD, H. (1968) — Die europäischen Arten der Gattung *Acer* aus der Sektion *Platanoidea* Pax emend. Momotani. *Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat.* 17: 34-347.
- MAHN, E.-G. (1965) — Vegetationsaufbau und Standortverhältnisse der kontinental beeinflussten Xerothermrasengesellschaften Mitteldeutschlands. *Abh. sächs. Akad. Wiss. Leipzig, math.-nat. Kl.*, 49 (1).
- MANG, F. (1968) — *Crataegus* L. in Sp. pl. (1753), p. 475 — Weissdorn. Schlüssel zur Bestimmung der in Deutschland heimischen und heimisch gewordenen Arten und häufiger Bastarde nach vegetativen und generativen Merkmalen. *Göttinger florist. Rundbr.* 1968 (4): 3-13.
- (1970) — Seltene Weissdorne in Mecklenburg (Kurzbericht). *Naturschutzarb. Mecklenb.* 13: 21-25.
- MARSTALLER, R. (1966, 1967, 1969a, 1972a, 1972b) — Zur Flora von Ostthüringen ([1.] 2., [3.] 4., 5. Beitrag). *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 15: 765-768; 16: 874-877; 18: 441-444; 21: 8-18, 19-21.
- (1969b) — Die xerothermen Pflanzengesellschaften waldfreier Sonderstandorte im Buntsandsteingebiet des mittleren Saale-tals (Thüringen). *Hercynia* N. F. 6: 225-257.
- (1970) — Die natürlichen Saumgesellschaften des Verbandes *Geranion sanguinei* Th. Müller 61 der Muschelkalkgebiete Mittelthüringens. *Feddes Repert.* 81: 437-455.

- MEINUNGER, L. (1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1972) — Zur Flora von Südthüringen ([1.]-6. Beitrag). *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 13: 656-657; 14: 500-502; 15: 772; 16: 877-879; 18: 449-453; 21: 32-36.
- MERTENS, F. (1966) — Nachtrag zur «Flora von Halberstadt». *Naturkd. JBer. Mus. Heineanum* 1: 7-20.
- MEUSEL, H. (1970) — Verbreitungskarten südlicher Florenelemente in Mitteldeutschland. *Feddes Repert.* 81: 289-309.
- MEUSEL, H., JÄGER, E. & WEINERT, E. (1965) — Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. [1. Band] (in 2 Teilbänden: Text und Karten). Jena.
- MEUSEL, H. & WERNER, K. (1962) — Über die Gliederung von *Carlina acaulis* L. und *Carlina vulgaris* L. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 11: 279-292.
- MILITZER, M. (1961a) — Veränderungen in der Flora der Oberlausitz und der nördlichen CSR, 2. Fortsetzung. *Abh. Ber. NaturkMus. Görlitz* 37 (1): 43-56.
- (1961b) — Verbreitungskarten zur Flora von Bautzen. *Natura Lusatica* 5: 39-60.
- (1962) — Veränderungen in der Flora von Hoyerswerda. *Märkische Heimat* 6: 317-327.
- (1963) — Zur Flora des Stolpener Landes. *Abh. Ber. NaturkMus. Görlitz* 38: 1-56.
- (1964) — *Solanum nitidibaccatum* Bitter, der Argentinische Nachtschatten-Irrgast und Neubürger. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 13: 663-664.
- (1965, 1966a, 1967, 1968, 1969, 1970a) — Floristische Beobachtungen 1964 [1964/65, 1966/67, 1967, 1968, 1969]. *Abh. Ber. NaturkMus. Görlitz* 40 (11): 19-20; 41 (15): 9-14; 42 (9): 3-8; 43 (6): 3-8; 44 (13): 3-8; 45 (13): 3-10.
- (1966b, 1970b) — Die Ackerunkräuter in der Oberlausitz. *Op. cit.* 41 (14): 1-125; 45 (9): 1-43.
- MÜLLER, G. (1964) — Die Bedeutung der Ackerunkrautgesellschaften für die pflanzengeographische Gliederung West- und Mittelsachsens. *Hercynia* N. F. 1: 82-166, 213-313.
- MÜLLER-STOLL, W. R. & GÖTZ, H. G. (1962) — Die märkischen Salzstellen und ihre Salzflora in Vergangenheit und Gegenwart. *Wiss. Z. päd. Hochsch. Potsdam* 7: 243-296.
- NIEMANN, E. (1963) — Lokalverbreitungskarten charakteristischer Pflanzenarten im Querschnitt durch den mittleren Thüringer Wald. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 12: 678-695.
- OTTO, H.-W. (1970) — Die Nachtkerzen (*Oenothera*) der Oberlausitz. *Abh. Ber. NaturkMus. Görlitz* 45 (8): 1-18.
- PANKOW, H. (1965) — Floristische Mitteilungen aus Mecklenburg I. *Wiss. Z. Univ. Rostock, math.-nat.* 14: 541-543.
- (1967) (Hrsg.) — Flora von Rostock und Umgebung (Bearb.: DUTY, J. & PANKOW, H.). Rostock.
- PASSARGE, H. (1964) — Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. (= *Pflanzensoziologie* 13). Jena.
- PASSARGE, H. & HOFMANN, G. (1968) — Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes II (= *Pflanzensoziologie* 16). Jena.

- PATZKE, E. (1964) — Die Flora des Messtischblattes Dahme. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg*. 101: 121-178.
- RANFT, M. & al. (1966) — Flora des Kreises Freital. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 7 («1965»): 115-196.
- RAUSCHERT, S. (1962, 1963a, 1964, 1965, 1966a, 1967a, 1970a, 1972a) — Zur Flora von Thüringen (1.-8. Beitrag). *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 11: 200-205; 12: 710-713; 13: 651-653; 14: 494-498; 15: 762-765; 16: 869-871; *Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat.* 19: 413-418; *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 21: 59-60.
- (1966b, 1967b, 1970b, 1972b) — Zur Flora des Bezirks Halle (1.-4. Beitrag). *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 15: 737-750; 16: 867-868; *Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat.* 19: 413-418; *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 21: 63-65.
- (1963b) — Die Arten von *Melica* sect. *Beckeria* (Bernh.) Asch. in Mitteleuropa. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 76: 235-243.
- (1963c, 1966c) — Aufruf zur Neubestätigung verschollener und zweifelhafter Pflanzenfundorte in Thüringen [... im Bezirk Halle]. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 12: 716-718; 15: 774-778.
- (1967c) — Taxonomie und Chorologie der *Diphasium*-Arten Deutschlands (Lycopodiaceae). *Hercynia* N. F. 4: 439-487.
- (1967d) — *Linum leonii* F. W. Schultz in Thüringen und im nördlichen Harzvorland. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 16: 944-948.
- (1968) — Der Sandschwingel, *Festuca psammophila* (Hack.) Fritsch, in der Niederlausitz. *Niederlausitz. flor. Mitt.* 4: 5-8.
- (1972c) — Zur Flora des Bezirks Magdeburg. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 21: 55-56.
- REUTHER, R. (1971) — *Sorbus acutisecta* R. Reuther et O. Schwarz — eine neue Art der Gattung *Sorbus* in Nordwestthüringen. *Wiss. Z. päd. Hochsch. Erfurt-Mühlhausen, math.-nat.* 7: 53-60.
- ROTHMALER, W. (1962a, 1966a, 1966b, 1967) — Exkursionsflora von Deutschland. II. Gefäßpflanzen. 3. [4., 5., 6.] Aufl. Berlin.
- (1962b) — *Erodium glutinosum* Dum., neu für Deutschland. *Mitt. flor.-soz. ArbGem.* 9: 10-17.
- (1962c) — Systematische Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Alchemilla*. X. Die mitteleuropäischen Arten. *Feddes Repert.* 66: 194-234.
- (1963) — Exkursionsflora von Deutschland. IV. Kritischer Ergänzungsband Gefäßpflanzen. Berlin (Unveränderte Nachdrucke: 1966, 1970).
- (1966c) — Exkursionsflora von Deutschland. III. Atlas der Gefäßpflanzen. 3. Aufl. Berlin.
- ROTHMALER, W. & SCHNEIDER, U. (1962) — Die Gattung *Polypodium* in Europa. *Die Kulturpflanze Beih.* 3: 234-248.
- ROTHMALER, W. & al. (1965) — Beiträge zur Kenntnis der Flora von Mecklenburg. II. *Wiss. Z. Univ. Greifswald, math.-nat.* 14: 77-92.
- SCAMONTI, A. & al. (1964) — Karte der natürlichen Vegetation der Deutschen Demokratischen Republik (1:500.000) mit Erläuterungen. *Feddes Repert. Beih.* 141: 5-106.

- SCHLÜTER, H. (1964) — Zur Waldgeschichte im Thüringer Gebirge, hergeleitet aus Pollendiagrammen, Archivquellen und Vegetationsuntersuchungen. *Arch. Forstwesen* 13: 283-305.
- SCHMIDT, P. (1968) — Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Thymus* L. in Mitteleuropa. *Hercynia* N. F. 5: 385-419.
- (1969) — Zur taxonomischen Abgrenzung und Verbreitung von *Thymus serpyllum* L. emend. Miller. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 18: 810-818.
- (1971) — Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Thymus* L. unter besonderer Berücksichtigung von Wuchsform, Verbreitung und soziologischem Verhalten. Diss. Halle, Mskr.
- SCHNEIDER, U. (1962) — Taxonomische und chorologische Untersuchungen der Gattung *Rhinanthus* L. in Mecklenburg. *Wiss. Z. Univ. Greifswald, math.-nat.* 11: 153-162.
- (1964) — Die Sippen der Gattung *Odontites* in Norddeutschland. *Feddes Repert.* 69: 180-195.
- SCHOLZ, H. (1962a) — *Puccinellia limosa* (Schur) Holmberg im binnenländischen Salzflorengelände. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 75: 59-70.
- (1962b) — *Hylandra suecica* (*Cardaminopsis suecica*) im Herbar Roman Schulz. *Willdenowia* 3: 325-328.
- (1962c) — *Agrostis castellana*. Eine neue Fremdpflanze in Schleswig-Holstein. *Die Heimat (Neumünster)* 69: 405-406.
- (1963) — Zur Gramineenflora Deutschlands. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 76: 135-146.
- (1964) — Zur Gramineenflora Mitteleuropas II. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 77: 145-160.
- (1966a) — *Oxalis dillenii* Jacq. in Berlin. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 103: 50-53.
- (1966b) — *Agrostis tenuis* 'Highland Bent' ein Synonym der *Agrostis castellana*. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 78: 322-325.
- (1968) — Die Artbestimmung im *Brachypodium pinnatum*-Komplex. *Willdenowia* 5: 113-118.
- (1970) — Über Grassamenankömmlinge, insbesondere *Achillea lanulosa* Nutt. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 107: 79-85.
- SCHOLZ, H. & SUKOPP, H. (1965, 1967) — Drittes [Viertes] Verzeichnis von Neufunden höherer Pflanzen aus der Mark Brandenburg und angrenzenden Gebieten. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg.* 102: 3-40; 104: 27-47.
- SCHRETZENMAYR, M. (1965) — Nachschießzeitliche Vegetationsentwicklung im sächsischen Raum. *Ber. ArbGem. Sächs. Bot.* 5/6 («1963/64»): 431-446.
- SCHUBERT, R. & MAHN, E.-G. (1969) — Übersicht über die Ackerunkrautgesellschaften Mitteldeutschlands. *Feddes Repert.* 80: 133-304.
- SCHUBERT, W. (1963) — Die *Sesleria varia* reichen Pflanzengesellschaften in Mitteleuropa. *Feddes Repert. Beih.* 140: 71-199.
- SCHUSTER, R. (1967) — Taxonomische Untersuchungen über die Serie *Palustres* M. Pop. der Gattung *Myosotis* L. *Feddes Repert.* 74: 39-98.
- SCHWARZ, O. (1962) — Die Populationen mediterraner Eichen in Mitteleuropa nördlich der Alpen-Karpaten-Schranke. Teil I. *Drudea* 2 (1-4): 11-36.
- (1968) — Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Primula*. *Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat.* 17: 307-332.

- SCHWARZ, O. & BÄSSLER, M. (1964) — *Danthonia (Sieglingia) decumbens*, ein bemerkenswerter Fall chromosomaler und ökologischer Divergenz. *Österr. bot. Z.* 111: 193-207.
- SCHWARZ, O. & LEPPER, L. (1964) — Systematische Monographie der Gattung *Cyclamen* L. II. Teil. *Feddes Repert.* 69: 73-103.
- SOEST, J. L. VAN (1965) — *Taraxacum* sect. *Palustria* Dahlstedt. *Acta bot. neerl.* 14: 1-53.
- STAPPERFENNE, H.-J. (1967) — Beiträge zur Verbreitung der Orchideen im Bezirk Halle. *Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg* 4: 28-42.
- STÖCKER, G. (1962a) — Verbreitung einiger Leitpflanzen im Gebiet der Bode zwischen Thale und Altenbrak (Unterharz). *Arch. Naturschutz Landsch.-Forsch.* 2: 156-179.
- (1962b, 1965) — Vorarbeit zu einer Vegetationsmonographie des Naturschutzgebietes Bodetal. I. [II.]. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 11: 897-936; 14: 505-561.
- (1967) — Der Karpatenbirken-Fichtenwald des Hochharzes. (Eine vegetationskundlich-ökologische Studie). (= *Pflanzensoziologie* 15). Jena.
- SUKOPP, H. (1962) — Neophyten in natürlichen Pflanzengesellschaften Mitteleuropas. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 75: 193-205.
- (1964, 1967) — Bibliographie der botanischen Literatur über Brandenburg 1959-1963 [1964-1966]. *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.* 101: 99-120; 104: 6-24.
- (1966) — Verluste der Berliner Flora während der letzten hundert Jahre. *SitzBer. Ges. naturforsch. Freunde Berlin N. F.* 6: 126-136.
- SUKOPP, H. & SCHOLZ, H. (1965) — *Parietaria pensylvanica* Mühlenb. ex Willd. in Berlin. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 77: 419-426.
- (1962) — Neue Untersuchungen über *Rumex triangulivalvis* (Danser) Rech. f. in Deutschland. *Ber. deutsch. bot. Ges.* 78: 455-465.
- TÜXEN, R. (1963) — Bibliographie der Verbreitungs- und Arealkarten von Pflanzengesellschaften (II). *Excerpta bot.* B 5: 137-156.
- (1966) — Germany. In KÜCHLER, A. W. (Edit.): *International Bibliography of Vegetation maps* 2: 260-368. Lawrence, Kansas.
- TÜXEN, R. & MEISSNER, H. (1964) — Bibliographia Phytosociologica: Germania VIII (1959-1963). *Excerpta bot.* B 6: 1-105.
- TÜXEN, R. & STRAUB, R. (1966) — Bibliographie der Vegetationskarten: Germania. *Excerpta bot.* B 7: 116-177.
- ULBRICHT, H. & al. (1965) — Die Pflanzenwelt Sachsens. *Ber. ArbGem. sächs. Bot.* 5/6 («1963/64»): 289-472.
- VENT, W. (1962) — Monographie der Gattung *Oreoherzogia* W. Vent gen. nov. *Feddes Repert.* 65: 3-132.
- VOIGT, O. (1965, 1966, 1967, 1972) — Zur Flora der Umgebung von Dessau (1.-4. Beitrag). *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 14: 492-494; 15: 750-751; 16: 862-864; 21: 66-71.
- WAGENITZ, G. (1965) — Zur Systematik und Nomenklatur einiger Arten von *Filago* L. emend. Gaertn. subgen. *Filago* («*Filago-germanica*» Gruppe) *Willdenowia* 4: 37-59.

- WEBER, R. (1962) — Geschichte der floristischen Erforschung des nördlichen und nordwestlichen Vogtlands. *Jahrb. Mus. Hohenleuben-Reichenfels* 11: 64-85.
- WEBER, R. & KNOLL, S. (1965) — Flora des Vogtlandes (= *Museumsreihe* Heft 29). Plauen.
- WEGENER, K.-A. (1966) — Ein Beitrag zur Zytologie von Orchideen aus dem Gebiet der DDR. *Wiss. Z. Univ. Greifswald, math.-nat.* 15: 1-7.
- (1971a) — Zur Verbreitung der Gattung *Alchemilla* L. in Mecklenburg. *Feddes Repert.* 82: 287-312.
- (1971b) — Die Gattung *Alchemilla* L. im Norden der DDR. *Mitt. Sekt. spez. Bot. Biol. Ges. DDR* 2: 45-64.
- WEIDE, H. (1962) — Systematische Revision der Arten *Pimpinella saxifraga* L. und *Pimpinella nigra* Willd. in Mitteleuropa. *Feddes Repert.* 64: 240-268.
- WEINERT, E. & BREITKOFF, H. (1967) — *Acroptilon repens* (L.) DC., ein Neophyt in Mitteldeutschland. *Hercynia* N. F. 4: 146-151.
- WEINITSCHKE, H. (1963) — Pflanzenverbreitung in Abhängigkeit von klimatischen und geomorphologischen Gegebenheiten, dargestellt am Beispiel der Hainleite (nördliches Thüringen). *Arch. Naturschutz LandschForsch.* 3: 95-116.
- WERNER, K. (1964) — Die Verbreitung der *Digitalis*-Arten. *Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.* 13: 453-486.
- (1965) — Taxonomie und Phylogenie der Gattungen *Isoplexis* (Lindl.) Benth. und *Digitalis* L. *Feddes Repert.* 70: 109-135.
- WILLUTZKI, H. (1962) — Zur Waldgeschichte und Vermoorung sowie über Rekurrenzflächen im Oberharz. *Nova Acta Leopold.* N. F. 25 (160): 1-52.
- ZIMMERMANN, W. (1965) — Zur Taxonomie von *Pulsatilla*. IV. Sechs neue Taxa. *Feddes Repert.* 70: 144-148.
- ZIMMERMANN, W. & MIEHLICH-VOGEL (1962) — Zur Taxonomie der Gattung *Pulsatilla* Miller. III. Die Subsektion *Patentes*. *Die Kulturpflanze Beih.* 3: 93-133.

Werner, A. (1905) - Die Relativität der Bewegung und die Gleichzeitigkeit der Ereignisse. *Annalen der Physik*, 322, 203-25.

Werner, A. (1907) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 324, 371-404.

Werner, A. (1909) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 326, 1-10.

Werner, A. (1911) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 328, 1-10.

Werner, A. (1913) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 330, 1-10.

Werner, A. (1915) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 332, 1-10.

Werner, A. (1917) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 334, 1-10.

Werner, A. (1919) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 336, 1-10.

Werner, A. (1921) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 338, 1-10.

Werner, A. (1923) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 340, 1-10.

Werner, A. (1925) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 342, 1-10.

Werner, A. (1927) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 344, 1-10.

Werner, A. (1929) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 346, 1-10.

Werner, A. (1931) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 348, 1-10.

Werner, A. (1933) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 350, 1-10.

Werner, A. (1935) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 352, 1-10.

Werner, A. (1937) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 354, 1-10.

Werner, A. (1939) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 356, 1-10.

Werner, A. (1941) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 358, 1-10.

Werner, A. (1943) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 360, 1-10.

Werner, A. (1945) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 362, 1-10.

Werner, A. (1947) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 364, 1-10.

Werner, A. (1949) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 366, 1-10.

Werner, A. (1951) - Über die Relativität der Bewegung. *Annalen der Physik*, 368, 1-10.

TAXONOMIC AND FLORISTIC RESEARCH IN GREECE DURING THE LAST DECADE 1961-1971

D. PHITOS

Institute of Botany, University of Patras, Greece

INTRODUCTION

IN the Proceedings of the Second Symposium of Flora Europaea (Geneva 1961) RECHINGER presented a detailed report on botanical investigations in Greece, particularly those between the years 1945-1961. He gave a list of the new records as well as of the new species described from Greece during that interval. He also referred to the basic works on the Greek flora and to botanical bibliography between 1936 and 1961. From the above presentation, the very important contribution of RECHINGER to the knowledge of the Greek flora during that period was obvious.

The period after 1961 can be considered as the beginning of a new era for the botany of Greece. New scientists are taking part with enthusiasm in the study of the Greek flora. Thus, one group under RUNEMARK (Lund) began an intense cytotaxonomical investigation of the flora on the Cyclades islands in 1957 and have begun publishing the first significant findings of their work since 1961. Their publications, through the last decade, are characterized by detailed and thorough study, and their contribution to the knowledge of the Aegean flora is extremely significant.

Another group (SNOGERUP et al.) from the University of Lund has undertaken, in collaboration with the University of Patras, Greece, the study of the flora of the Northern Sporades. This work was begun over a year ago.

Two other botanists, DAMBOLDT (Berlin) and GREUTER (Geneva), are intensively studying the Greek flora. Mention should also be made of the contributions by QUEZEL and CONTANDRIOPOULOS (Marseille) to the cytotaxonomy and phytosociology of the flora.

Finally, we would like to mention that in the last decade more and more Greek botanists have been taking part in the study of the Greek flora. It is true that many of them are new, just receiving their training in this field, but we are very hopeful that before too long they will be able to make serious contributions. Specifically, in the Botanical Institutes of the Universities in Athens, Thessaloniki and Patras, there are at present 14 assistants working on the phytogeography and systematics of the Spermatophytes. Also, the herbaria in all three Universities are now well organized and they can be used by anyone interested. In the herbarium of the Botanical Institute of the University of Patras, organized five years ago, there are about 30,000 specimens mostly of the Greek flora and this material is available to all scientists to borrow or for exchange.

In this report we do not refer to the Flora of Kriti because it is a separate phytogeographical area for *Flora Europaea*.

1. A NEW «FLORA HELLENICA»

As is well known, HAYEK's classical work, «*Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae*» (1924-1933), is the latest critical flora, which includes the largest part of Greece in its present geographical boundaries, the entire territory which is designated as Greece (Gr) by *Flora Europaea*.

The publication of «*Flora Aegaea*» by RECHINGER in 1943, and the subsequent publications since 1946 of several contributions towards the knowledge of the flora of continental Greece and of the Greek islands, showed how inadequate was our knowledge of the flora of Greece. Even the extensive collecting by the amateur K. GOULIMIS (†1963), who found several hundreds of new records and numerous new species, confirmed the above statement.

On the other hand, the emerging problems of nomenclature confuse our knowledge as to the actual numbers of taxa in the various groups and their correct naming. For all these reasons, and also due to the fact that in the work of HAYEK some parts of Greece such as the Eastern islands (Mitilini, Samos, etc.) and the whole group of the Dodecanese islands are not included, it became evident, even before the last decade, that there was a need for a new «Flora hellenica». That is to say, a work which would include the whole area designated politically as Greece, and

which would include all the scientific information available for the area, based on the new taxonomic methods and the new rules of nomenclature.

It should be stressed that the writing of a new Flora, which is not a new idea, as we explained above, could not be handled by one or two people. This should be a collective project in which Greek as well as foreign scientists working on the flora of Greece should take part and contribute their valuable knowledge and experience in writing a truly modern Flora. In fact, the excellent organization of the *Flora Europaea* provides a good example.

2. LOCAL FLORAS

As far as continental Greece is concerned, with a few exceptions such as the peninsula of Kassandra (LAVRENTIADIS, 1961) and the peninsula of Athos (GANIATSAS, 1963), there are no local Floras of large areas (Attiki, Peloponnisos etc.), which can be defined as such geographically or politically.

On the contrary, the islands of Greece are more suitable for local Floras if each island, however small, could be considered as representing a «local flora». Following is a list of the islands whose flora has been described during the last decade in separate papers:

Kythira: GEUTER, W. & RECHINGER, K. H. (1967).

Kythira: YANNITSAROS, A. (1969).

Levkas: HOFMANN, U. (1968).

Santorini: HANSEN, A. (1971).

Skiathos: ECONOMIDOU, E. (1969).

Sporades: PHITOS, D. (1967).

We would also like to mention that we are working in collaboration with Prof. DAMBOLDT (Berlin) on the flora of Kephallinia, and that this work is nearing completion.

On the other hand, we are hoping that Prof. RUNEMARK's group (Lund), which has been thoroughly investigating the Cyclades, will eventually publish the Flora of this large group of islands.

3. CYTOTAXONOMIC STUDIES

The past decade has been most intense and productive of cytotaxonomic research on the Spermatophytes of Greece. There are numerous papers with material concerning the cytotaxonomy of several groups of species of the Greek flora. Thus we can assert that certain genera are well known from the cytological aspect.

All the chromosome numbers found up to 1969 have been included in FEDOROV's «Chromosome Numbers of Flowering Plants». Chromosome numbers are also presented in the publications of IAPT. Nevertheless, we cite here some of the cytotaxonomic revisions or papers dealing exclusively with cytology, in which information on chromosomes of various genera has been presented in detail:

Alyssum: CONTANDRIOPOULOS, 1969; PERSSON, 1971.

Campanula: CONTANDRIOPOULOS, 1964, 1966; DAMBOLDT, 1965; PHITOS, 1964d, 1965.

Erysimum: SNOGERUP, 1967a, 1967b.

Nigella: STRID, 1965, 1968, 1970.

This cytotaxonomic research is continuing at present at an intensive pace, and in some centres of botanical research abroad (e. g. Lund, Berlin) and in Greece (Patras) there are projects which involve cytological work on the Greek flora. For example, a project was started a year ago at the Institute of Botany of the University of Patras, which concerns cytological studies of the endemic flora of Kriti; the first results are to be published in the near future.

4. GREEK JOURNALS IN WHICH TAXONOMIC AND FLORISTIC PAPERS ARE PUBLISHED

Biologia Gallo-Hellenica.

Epetiris Dasologikis Scholis Panepistimiou Thessalonikis.

Epistimoniki Epetiris Physikomathimatikis Scholis Panepistimiou Thessalonikis.

Praktika Akadimias Athinon.

5. LIST OF NEW SPECIFIC AND SUBSPECIFIC TAXA

- Alyssum densistellatum* T. R. Dudley (1962).
A. gionae Quezel et Contandr. (1967).
A. vourinonense Dudley et Rechinger fil. (1966).
Anchusa rechingeri H. Riedl (1963b).
Anthemis rigida Boiss. subsp. *ammanthiformis* (Greuter et Rech. fil.) Greuter (1968b).
Anthyllis vulneraria L. subsp. *pindicola* Cullen (1968).
Aquilegia amaliae Heldr. subsp. *meridionalis* Quezel et Contandr. (1967).
Aremonia agrimonoides (L.) DC. subsp. *pouzavii* Skalicky (1968).
Arenaria filicaulis Fenzl. subsp. *euboica* McNeill (1963).
A. litoralis Phitos (1967).
A. peloponnesiaca Rech. fil. (1965b).
Asperula gionae Quezel et Contandr. (1967).
Astragalus lusitanicus Lam. subsp. *orientalis* Chater et Meikle (1968).
A. tymphaeus Quezel et Contandr. (1967).
Aubrieta deltoidea (L.) DC. var. *sporadum* (Phitos) Phitos (1970b).
Bupleurum aira Snog. (1962).
Campanula andrewsii DC. subsp. *hirsutula* Phitos (1965).
C. carpatha Hal. var. *oreophila* Phitos (1965).
C. celsii DC. subsp. *carystea* Phitos (1965).
C. celsii DC. subsp. *parnesia* Phitos (1965).
C. cymaea Phitos (1964c).
C. euboica Phitos (1965).
C. garganica Ten. subsp. *acarnanica* (Damboldt) Damboldt (1968c).
C. merxmulleri Phitos (1963b).
C. patenticalyx Bocquet (1968).
C. rechingeri Phitos (1965).
C. reiseri Hal. var. *pelagia* Phitos (1965).
C. saxatilis L. subsp. *cytherea* Rech. fil. et Phitos, in Phitos (1965).
C. sciathia Phitos (1964c).
C. scopelia Phitos (1964c).
C. topaliana Beaur. subsp. *cordifolia* Phitos (1965).
C. topaliana subsp. *delphica* Phitos (1965).
Carduus pycnocephalus L. var. *pubescens* Lavrent. (1961).
Carum macedonicum Quezel et Contandr. (1968).
Centaurea cytherea Rech. fil. in Greuter W. et Rechinger K. H. (1967).
Centaurea pseudocadmea Wagenitz (1971).

- C. rechingeri* Phitos (1964b).
Centaureum limoniiforme Greuter, in Greuter W. et Rechinger K. H. (1967).
Ceterach officinarum Lam. et DC. subsp. *bivalens* D. E. Meyer (1964).
Delphinium hellenicum Pawl. (1963).
Dianthus stamatiadae Rech. fil. (1971a).
D. taygeteus Quezel et Contandr. (1967).
Erysimum naxense Snog. (1967b).
E. senoneri (Heldr. et Sart.) Wettst. subsp. *amorginum* Snog. (1967b).
Filago aegaea Wagenitz subsp. *aegaea* (1970).
F. aegaea subsp. *aristata* Wagenitz (1970).
F. cretensis Gandoger subsp. *cycladum* Wagenitz (1970a).
Freyera macrocarpa Boiss. et Sprun. subsp. *sporadum* Phitos (1967).
Fumaria officinalis L. var. *cassandrina* Lavrent. (1961).
Heliotropium halacsyi H. Riedl (1966).
Herniaria nigrimontium Hermann var. *puernardaghii* Chaudhri (1968).
Hesperis rechingeri Dvorák (1966).
Hypericum taygeteum Quezel et Contandr. (1967).
Inula sophiae Beauv. var. *sporadum* Phitos (1967).
Leontodon hellenicus Phitos (1965a).
Limosella tenella Quezel et Contandr. (1967).
Lithospermum arvense L. var. *ochroleuca* Ganiatsas (1963).
L. goulandrionum Rech. fil. (1971b).
Minuartia setacea (Thuill.) Hayek var. *thracica* McNeill (1963).
Muscari cycladicum Davis et Stuart (1967).
Myosotis refracta Boiss. ssp. *pauciflora* Grau (1968).
Nigella degenii Vierh. subsp. *barbro* Strid (1970).
N. degenii subsp. *jenny* Strid (1970).
N. degenii subsp. *minor* Strid (1970).
N. stricta Strid (1970).
Onosma psammophilum Rech. fil. (1971a).
Ophrys cretica (Vierh.) Nelson subsp. *naxia* Nelson (1962).
Orobanche rechingeri Gilli (1966).
Parapholis marginata Run. (1962).
Paronychia albanica Chaudhri subsp. *graeca* Chaudhri (1968).
P. bornmülleri Chaudhri (1968).
P. capitata (L.) Lam. var. *scabrida* Chaudhri (1968).
P. cephalotes (M. Bieb.) Besser subsp. *thracica* Chaudhri (1968).
P. macedonica Chaudhri subsp. *macedonica* (1968).
Paronychia rechingeri Chaudhri (1968).

- Petrorhagia suffruticosa* Rech. fil. et Phitos in Phitos (1966a).
Pisum graecum Quezel et Contandr. (1967).
Polygala helenae Greuter in Greuter W. et Rech. fil. (1967).
Potentilla goulandrii Rech. fil. (1971a).
P. parnassica Quezel et Contandr. (1967).
Rhinanthus intermedius Quezel et Contandr. (1967).
Scaligeria moreana Engst. (1970).
Scirpus graecus Quezel et Contandr. (1967).
Scutellaria naxensis Bothm. (1969).
S. rubicunda Hornem. subsp. *cytherea* Rech. fil. in Greuter W. et
Rechinger K. H. (1967).
Sedum tymphaeum Quezel et Contandr. (1967).
Serapias neglecta De Not. subsp. *ionica* Nelson (1968).
S. orientalis Nelson subsp. *orientalis* (1968).
Seseli farinosum Quezel et Contandr. (1967).
Stachys pangaea Phitos (1965a).
Symphytum davisii Wickens (1969).
Taraxacum apiculatifforme van Soest (1966).
T. cylleneum Fürnkr. (1969).
Tordylium aegaeum Run. (1968).
Trifolium cryptoscias Gris. var. *leucopurpureum* Ganiatsas (1963).
Trisetum rechingeri Chrtek (1967).
Valeriana epirotica Phitos (1964a).
V. phitosiana Quezel et Contandr. (1967).
Veronica contandriopouli Quezel (1967).
V. serpyllifolia L. subsp. *graeca* Quezel et Contandr. (1967).
× *Alkanna intercedens* Rech. fil. (1965c).
× *Centaurea kapsaliensis* Rech. fil. in Greuter W. et Rechinger K. H.
(1967).
× *Ophrys epidavrenis* Eberle (1966).
× *Ophrys raslachii* Eberle (1966).
× *Phlomis cytherea* Rech. fil. in Greuter, W. et Rechinger, K. H.
(1967).

6. LIST OF NEW RECORDS OF NATIVE TAXA IN GREECE

- Adoxa moschatellina* L.
Alectorolophus ovifugus (Chab.) Sternek
Alkanna scardica Griseb.

- Antennaria dioica* (L.) Gärtn. var. *australis* Gris.
Arenaria pirinica Stoj.
A. serpentini A. K. Jakson
Asplenium adulterinum Midle.
A. lepidum Presl.
Aurinia petraea (Ard.) Schur.
Barbarea balkana Panc.
Carex nitida Host.
Cerastium uniflorum Clairv.
Chondrilla urumoffii Degen.
Dianthus pelviformis Heuff.
Draba lasiocarpa Rochel
Equisetum hyemale L.
Festuca panciciana (Hack.) Richter
F. paniculata (L.) Schinz et Thell.
Genista rhodopea Vel.
Hippuris vulgaris L.
Jasione montana L.
Lilium carniolicum Benth. subsp. *jankae* (Kern.) Asch. et Graebner
Lotus suaveolens Pers.
Luzula sudetica (Willd.) DC.
Micromeria bulgarica (Vel.) Hayek
Minuartia verna (L.) Hiern. subsp. *collina* (Neilr.) Halliday
Oxytropis purpurea (Bald.) Mark.
Peucedanum longifolium Waldst. et Kit.
Potentilla ternata C. Koch
P. tommasiniana F. Schultz.
Ranunculus stevenii Andrz.
Sedum alpestre Vill.
Senecio nemorensis L.
Seseli annuum L.
S. rhodopeum Vel.
Silene retzdorffiana (K. Maly) Walters.
Vaccinium uliginosum L.
Verbascum nobile Vel.
Viola dukadjinika Beck.
V. rupestris Schm.

BIBLIOGRAPHY

- BALL, P. W. (1963) — A review of *Malcolmia maritima* and allied species. *Feddes Repert.* 68, 3: 179-186.
- (1968) — A revision of the genus *Huetia* Boiss. (*Freyera* Reichenb.). *Feddes Repert.* 79, 1-2: 1-68.
- (1971) — The genus *Melittis* in Europe. *Bot. Jour. Linn. Soc.* 64, 1: 69-71.
- BALL, P. W. & HEYWOOD, V. H. (1964) — A revision of the genus *Petrorhagia*. *Bull. Brit. Mus. (Bot.)*, 3, 4: 121-172.
- BENTZER, B. (1969) — Chromosome Morphology in Aegean populations of *Leopoldia* Parl. (*Liliaceae*). *Bot. Notiser* 122: 457-480.
- BENTZER, B. et al. (1971) — Some sources of error in the determination of Arm Ratios of Chromosomes. *Bot. Notiser* 124: 65-74.
- BOTHMER, R. von (1967) — Intraspecific Variation in *Clinopodium vulgare* L. (*Labiatae*). *Bot. Notiser* 120: 202-208.
- (1969) — Studies in the Aegean Flora XIV. Studies in *Scutellaria* section *vulgares* subsection *peregrinae* from Greece and adjacent Turkey. *Bot. Notiser* 122: 38-56.
- (1970a) — Studies in the Aegean Flora XV. Chromosome numbers in *Labiatae*. *Bot. Notiser* 123: 52-60.
- (1970b) — Cytological Studies in *Allium* I. Chromosomes numbers and Morphology in sect. *Allium* from Greece. *Bot. Notiser* 123: 519-551.
- BOCQUET, G. (1968) — Collationes ad floram orientalem, I: *Campanulae* novae tres. *Compt. Rend. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève* 3, 2: 90.
- BROWICZ, K. (1963) — The genus *Colutea* L. A monograph. *Polsk. Towarz. Bot. (Monogr. Bot.)* 14: 1-135.
- (1966) — The genus *Periploca* L. A monograph. *Arboretum Kornickie* 11: 5-104.
- (1967) — Genus *Cionura* Grisebach. Distribution, history and application. *Arboretum Kornickie* 12: 5-32.
- (1969) — Distribution of woody *Rosaceae* in W. Asia III. *Arboretum Kornickie* 14: 5-24.
- (1970) — «*Malus florentina*». Its history, systematic position and geographical distribution. *Fragm. Fl. Geobot.* 16, 1: 61-83.
- (1971) — Distribution of woody *Rosaceae* in W. Asia VII. *Arboretum Kornickie* 16: 5-26.
- BRUMMITT, R. K. (1971) — The diagnostic characters of the European *Heliotropium* species. *Bot. Jour. Linn. Soc.* 64, 1: 60-67.
- CAUWET, A. (1967) — Contribution à l'étude caryosystematique du genre *Bupleurum* L. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 114: 371-386.
- CESCA, G. (1969) — Recherche citotassonomiche nelle *Euphorbiaceae*: *Euphorbia spinosa* L., *E. bivenae* Steud., *E. melitensis* Parl., *E. acanthothamnus* Heldr. et Sart. *Giorn. Bot. Ital.* 103, 3: 205-263.
- CHATER, A. O & MEIKLE, R. D. (1968) — In HEYWOOD, W. H. (ed), *Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes*. *Feddes Repert.* 79: 48.
- CHAUDHRI, M. N. (1968) — A Revision of the *Paronychiinae*. 1-440. Tilburg.
- CHRTK, J. (1967) — *Trisetum rechingeri*, eine neue Art der Flora Griechenlands. *Acta Univ. Carol. Biol. (Praha)* 1966, 2: 91-94.

- CONTANDRIOPOULOS, J. (1964) — Contribution à l'étude caryologique des *Campanulacées* de Grèce. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 111: 222-235.
- (1966a) — Contribution à l'étude caryologique des *Gesnériacées* d'Europe et de leur germination. *Compt. Rend. 91^e Congr. Nat. Soc. Savantes.* 3: 271-280.
- (1966b) — Contribution à l'étude cytotoxinomique des *Campanulacées* de Grèce. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 113: 453-474.
- (1969) — Contribution à l'étude cytotoxinomique des *Alysseae* Adams de Grèce. *Bull. Soc. Bot. Suisse.* 79: 313-334.
- (1970) — Contribution à l'étude cytotoxinomique des *Campanulacées* du Proche Orient. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 117: 55-70.
- CONTANDRIOPOULOS, J. & LANZALAVI, M. (1968) — Contribution à l'étude cytotoxinomique des *Hypericum* de Grèce. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 115: 5-13.
- CONTANDRIOPOULOS, J. & MARTIN, D. (1967) — Contribution à l'étude cytotoxinomique des *Achillea* de Grèce. Irrégularités de la méiose. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 114: 257-275.
- CONTANDRIOPOULOS, J. & QUÉZEL, P. (1964) — A propos de *Veronica contandriopouli* Quézel, espèce nouvelle endémique du mont Kyllini (Grèce méridionale). *C. R. Acad. Sc. Paris* 259: 425-427.
- (1965) — A propos de deux véroniques critiques des montagnes grecques: *Veronica erinoides* Boiss. & Spruner et *V. thessalica* Benth. *Candollea* 20: 43-48.
- CONTANDRIOPOULOS, J., QUÉZEL, P. & ZAFFRAN, J. (1965) — A propos de deux *Sedum* de la flore Grecque. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 112: 462-466.
- CONTANDRIOPOULOS, J. & ZAFFRAN, J. (1969) — A propos de quelques espèces remarquables de la flore Grecque. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 116: 103-110.
- CONTANDRIOPOULOS, J., PAMUKÇUOĞLU, A. & QUÉZEL, P. (1972) — A propos des *Cicer* vivaces du pourtour Méditerranéen oriental. *Biologia Gallo-Hellenica* 4, 1: 1-18.
- CULLEN, J. (1968) — Nomenclatural notes on the genus *Anthyllis*. *Watsonia* 6, 6: 389.
- CULLEN, J. & HEYWOOD, V. H. (1964) — Notes on the European species of *Paeonia*. *Feddes Repert.* 69: 32-35.
- DAFIS, S. (1966) — Standorts- und Ertrags-Kundliche Untersuchungen in Eichen- und Kastanienniederwälder der N. O. Chalkidiki. 1-120. Thessaloniki. In Greek. German summary.
- DAMBOLDT, J. (1965) — Zytotaxonomische Revision der isophyllen *Campanulae* in Europa. *Bot. Jahrb.* 84, 3: 302-358.
- (1968a) — Vorarbeiten zu einer Revision der Gattung *Asyneuma* (*Campanulaceae*). I. *Willdenowia* 5, 1: 35-54.
- (1968b) — Kritische Bemerkungen zu *Trachelium taygetum* und *Diosphaera hysteraantha* (*Campanulaceae*). *Österr. Bot. Zeitschr.* 115: 144-151.
- (1968c) — Kurzer Nachtrag zur «Zytotaxonomischen revision der isophyllen *Campanulae* in Europa». *Bot. Jahrb.* 88, 2: 200-203.
- (1968d) — In IOPB Chromosome number reports XV. *Taxon* 17: 91-104.
- (1970) — Revision der Gattung *Asyneuma*. *Boissiera* 17: 1-128.
- DAMBOLDT, J. & PHITOS, D. (1966) — Ein Beitrag zur Zytotaxonomie der Gattung *Silene* in Griechenland. *Österr. Bot. Zeitschr.* 113: 169-175.

- (1968) — Zur Cytotaxonomie einiger Arten der Gattung *Silene* L. (*Caryophyllaceae*). *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg* 105: 44-51.
- (1970a) — In IOPB Chromosome number reports XXVI. *Taxon* 19: 265.
- (1970b) — Beiträge zur Flora Ionica. II. Bemerkungen zu einigen *Silene*-Arten aus Griechenland. *Österr. Bot. Zeitschr.* 118: 341-352.
- (1971) — In IOPB Chromosome number reports XXXIV. *Taxon* 20: 787.
- DANESCH, O. & DANESCH, E. (1969) — *Orchideen Europas, Südeuropa*. 1-255. Stuttgart.
- DAVIS, P. H. & STUART, D. C. (1967) — Three new species of *Muscari*. The Lily Year Book, 123-125.
- DAVIS, P. H. & HEDGE, I. C. (1971) — Floristic links between N. W. Africa and S. W. Asia. *Ann. Naturh. Mus. (Wien)* 75: 43-57.
- DIAPOLIS, CH. (1967) — Phytogeographiki exaploxis idia en Helladi tis *Quercus trojana*. *Biol. Gallo-hellenica*. 1: 27-31. In Greek. English summary.
- DIETRICH, W. (1967) — Die Zytotaxonomie der *Carex*-Sektion *Frigidae* in Europa. *Feddes Repert.* 75, 1 + 2: 1-42.
- DITTRICH, M. (1971) — *Lamyropsis* (Charadze) Dittrich — Zur Frucht- und Blütenmorphologie einer kritischen Gruppe aus der *Ptilostemon*-Verwandtschaft. *Candollea* 26, 1: 97-102.
- DONADILLE, P. (1964) — A propos du *Vincetoxicum nivale* Boiss. et Heldr. de Grèce. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 111, 7-8: 351-356.
- DUDLEY, T. R. (1964a) — Synopsis of the genus *Alyssum*. *Journ. Arn. Arb.* 45: 358-373.
- (1964b) — Synopsis of the genus *Aurinia* in Turkey. *Journ. Arn. Arb.* 45, 3: 390-400.
- (1966) — A new Greek endemic: *Alyssum vourinonense* and a note regarding *Bornmuellera*. *Österr. Bot. Zeitschr.* 113, 2: 265-270.
- DVORÁK, F. (1966) — Ad *Hesperidis* L. generis species in Haemo crescentes adnotationes aliquae. (Několik poznamek K druhům rodu *Hesperis* L. rosoucím na Balkanském poloostrově). *Preslia* 38, 1: 57-64.
- DVORÁK, F. & KONÁŘIKOVÁ, V. (1970) — Study of the characters of the genus *Malcolmia* R. Br. *Feddes Repert.* 81, 6-7: 387-416.
- EBERLE, G. (1966) — Zwei neue *Ophrys*-Bastarde aus Griecheland. *Senck. Biol.* 47, 4: 283-289.
- (1967) — Zwei neue griechische Rangwurz-(*Ophrys*)-Mischlinge. *Mitt. Bad. Landesver. Natursch.* 9, 3: 511-512.
- ECONOMIDOU, E. (1969) — Geobotaniki erevna tis nisou Skiathou. In Greek; Athen, 1-152, French summary.
- (1971) — *Verbascum Aphantulium* Heldr. (*V. pelium* Hal.). Notes sur sa répartition, son Écologie et sa Nomenclature. *Biologia Gallo-Hellenica* 111, 2: 133-147.
- ENGSTRAND, L. (1970a) — Studies in the Aegean Flora XVIII. Notes and Chromosome numbers in Aegean Umbelliferae. *Bot. Notiser* 123: 384-393.
- (1970b) — The European species of *Scaligeria* (Umbelliferae). *Bot. Notiser* 123: 505-511.
- FAURE, J. & PIETRERA, D. (1969) — Contribution à l'étude cytotoxinomique des *Rubiacees* de Grèce. *Ann. Fac. Sc. Marseille* 42: 271-283.

- FAVARGER, C. (1967a) — Nombres chromosomiques de quelques taxa principalement balkaniques du genre *Minuartia* (L.) Hiern. *Bot. Jahrb.* 86: 280-292.
- (1967b) — Cytologie et distribution des plantes. *Biol. Rev.* 42: 163-206.
- (1969) — De caryologia *Cerastiorum* specierum aliquot imprimis in peninsula balcanica crescentium. *Acta Bot. Croat.* 28: 63-74.
- (1971) — Relations entre la flora méditerranéenne et celle des enclaves à végétation subméditerranéenne d'Europe centrale. *Boissiera* 19: 149-168.
- FEINBRUN, N. (1970) — A taxonomic review of European *Cuscutae*. *Israel Jour. Bot.* 19: 16-29.
- FISCHER, M. (1967) — Beiträge zur Cytotaxonomie der *Veronica hederifolia*-Gruppe (*Scrophulariaceae*). *Österr. Bot. Zeitschr.* 114, 2: 189-233.
- (1969) — *Veronica caespitosa* Boiss., *V. bombycina* Boiss. & Kotschy und *V. thessalica* Benth. gehören nicht in die Sektion *Veronicastrum* Benth. *Österr. Bot. Zeitschr.* 117: 54-63.
- FUKAREK, P. (1968a) — A short description of some trees and shrubs of the Balkan peninsula. *Intern. Dendr. Soc. Year Book.*
- (1968b) — Geobotanische Grundlagen für höhere systematische Einheiten der Waldgesellschaften. *Pflanzensoz. Systematik.* Den Haag.
- (1969) — Ueber einige Illyrisch-Äpenninische Baum- und Straucharten. *Mitt. ostalp.-din. pflanzensoz. Arbeitsgen.* 9: 79-90.
- (1970) — Bemerkungen zu einigen balkanischen und balkano-karpatischen Baum- und Straucharten. *Feddes Repert.* 81, 1-5: 163-170.
- FÜRNKRANZ, D. (1968) — Beiträge zur Systematik und Karyologie der Gattung *Cicer*. I. Die europäischen Arten. *Österr. Bot. Zeitschr.* 115: 400-410.
- (1969a) — Eine neue mediterrane Reliktart der Gattung *Taraxacum*. *Österr. Bot. Zeitschr.* 117: 149-156.
- (1969b) — Beiträge zur Verbreitungsgeschichte der Gattung *Taraxacum* im zentral- und nordostmediterranen Raum. *Österr. Bot. Zeitschr.* 117: 157-162.
- GADELLA, T. W. J. (1964) — Cytotaxonomic studies in the genus *Campanula*. *Wentia* 11: 1-104.
- GANIATSAS, C. (1963) — I vlastisis ke i chloris tis chersonisou tou Hagiou Orous. *Athoniki Politia* 1-170. In Greek.
- (1970) — I chloris ke i vlastisis tis limnis ton Ioanninon. *Ipirotiki Estia* 1-20. In Greek.
- (1971) — Votanikai erevnai epi tis charadras tou Vikou. *Ipirotiki Estia* 1-28. In Greek.
- GIBBS, P. E. (1968) — Taxonomy and distribution of the genus *Calicotome*. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 28: 275-286.
- GILLI, A. (1966) — Neue Fundorte von *Orobanchaceen* aus dem Mediterrangebiet. *Österr. Bot. Zeitschr.* 113, 2: 211-216.
- GOULIMIS, C. (1968) — Wild flowers of Greece. 1-194. Athens.
- GRAU, J. (1964) — Die Zytotaxonomie der *Myosotis-alpestris* und der *Myosotis-silvatica*-Gruppe in Europa. *Österr. Bot. Zeitschr.* 111, 5: 562-617.
- (1967) — Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung *Myosotis* L. II. *Myosotis sicala* s. l. *Mitt. Bot. München* 6: 517-530.
- (1968a) — Cytologische Untersuchungen an *Boraginaceen* I. *Mitt. Bot. München* 7: 277-294.

- (1968b) — Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung *Myosotis* L. III. Die Annuellen Sippen. *Mitt. Bot. München* 7: 17-100.
- (1971) — Cytologische Untersuchungen an *Boraginaceae* II. *Mitt. Bot. München* 4: 177-194.
- GREUTER, W. (1967) — Contributiones floristicae austro-aegeae 10-12. *Candollea* 22, 2: 233-253.
- (1968a) — Contributio floristica austro-aegea 13. *Candollea* 23, I: 143-150.
- (1968b) — Notulae nomenclaturales et bibliographicae 5-6. *Candollea* 23, 2: 257-265.
- (1969) — Contributio floristica austro-aegea 14. *Candollea* 24, 1: 45-50.
- (1970a) — The taxonomic position of *Lloydia graeca* (*Liliaceae*) and related species. *Israel Jour. Bot.* 19: 155-160.
- (1970b) — Zur Paläogeographie und Florengeschichte der südlichen Ägäis. *Feddes Repert.* 81, 1-5: 233-242.
- (1971) — Betrachtungen zur Pflanzengeographie der Südägäis. *Opera Bot.* No. 30: 49-62.
- GREUTER, W. & RECHINGER, H. (1967) — Flora der Insel Kythera. *Boissiera* 13: 1-206.
- GREY-WILSON, C. (1969) — The heights of Olympus. *Quart. Bull. Alp. Gard. Soc.* 37, 3: 255-273.
- GUSTAFSSON, M. (1970) — Studies in the Aegean Flora XVII. Variation and distribution of *Atriplex recurva* D'Urv. (*Chenopodiaceae*). *Bot. Notiser* 123: 371-383.
- HANSEN, A. (1971) — Flora der Inselgruppe Santorin. *Candollea* 26, 1: 109-163.
- HENEEN, W. K. & RUNEMARK, H. (1962) — Chromosomal polymorphism and morphological diversity in *Elymus Rechingeri*. *Hereditas* 48: 545-564.
- HERMJAKOB, G. (1969a) — Braune Ragwurz (*Ophrys fusca* ssp. *fusca*) blüht zur Weihnachtszeit in Attika. *Orchidee* (Hamburg) 20, 2: 83-84.
- (1969b) — Kleinblütiges Knabenkraut (*Neotinea intacta*) und Kretische Ragwurz (*Ophrys cretica* ssp. *cretica*) auf Ägina. *Orchidee* (Hamburg) 20, 2: 84-85.
- HERRNSTADT, I. & HEYN, C. C. (1971) — Studies in *Heptaptera* (*Umbelliferae*) II: Taxonomic revision. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 31, 1: 91-107.
- HEYN, C. C. (1970) — Studies in *Lotus* III. The *L. Angustissimus* Group. *Israel Jour. Bot.* 19: 271-292.
- HEYN, C. C. & DAFNI, A. (1971) — Studies in the genus *Gagea* (*Liliaceae*) I. The Platyspermous species in Israel and neighbouring areas. *Israel Jour. Bot.* 20: 214-233.
- HEYWOOD, V. H. (ed.) (1967) — Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes. No. 6. *Feddes Repert.* 74, 1-2: 22-37.
- (1968) — Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes. No. 7. *Feddes Repert.* 79, 1-2: 1-68.
- HOFMANN, U. (1968) — Untersuchungen an Flora und Vegetation der Ionischen Insel Levkas. *Mitt. Bot. Mus. Zürich* 113, 239: 209-256.
- JALAS, J. (1971a) — Notes on *Thymus* L. (*Labiatae*) in Europe. I. Supraspecific classification and nomenclature. *Bot. Jour. Linn. Soc.* 64, 2: 199-215.
- (1971b) — Notes on *Thymus* L. (*Labiatae*) in Europe. II. Comments on species and subspecies. *Bot. Jour. Linn. Soc.* 64, 3: 247-271.

- KAZMI, S. M. A. (1964) — Revision der Gattung *Carduus* (Compositae). Teil II. *Mitt. Bot. Staatssam. München* 5: 279-550.
- KNAPP, R. (1964) — Vegetations-Untersuchungen in mittleren Griechenland und über Probleme der Entstehung anthropogener Pflanzengesellschaften. *Ber. Oberhes. Ges. Natur-Heilk. Giessen* 33, 4: 373-393.
- (1965) — Die Vegetation von Kephallinia, Griechenland. 1-206. Koenigstein.
- KOLLMANN, F. (1971) — *Allium «descendens»* in the Mediterranean. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 31, 1: 119-124.
- KOLLMANN, F. & FEINBRUN, N. (1968) — A Cyto-Taxonomic study in Palestinian *Anagallis arvensis* L. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 28, 2: 173-186.
- KRAUSE, W., LUDWIG, W. & SEIDEL, F. (1963) — Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans. 6. Vegetationsstudien in der Umgebung von Mantoudi (Euböa). *Bot. Jahrb.* 82, 4: 337-403.
- LAVRENTIADES, G. J. (1961) — Chloristiki, Phytogeographiki ke Phytokinoniologi ki erevna tis chersonisou tis Kassandras. 8on Parartima Epist. Ep. Panep. Thessalonikis 1-155. In Greek. English summary.
- (1963) — On the vegetation of the Keramoti coasts. *Boll. Instit. Bot. Univer. Catania Serie 3*, 4: 81-103.
- LEUTE, G. H. (1970) — Untersuchungen über den Verwandtschaftskreis der Gattung *Ligusticum* L. (Umbelliferae). *Ann. Naturh. Mus. Wien.* 74: 457-519.
- (1971) — Die Arten der Gattung *Conium* L. (Umbelliferae). *Ann. Naturh. Mus. Wien* 75: 91-98.
- MEIKLE, R. D. (1970) — The nomenclature and taxonomy of *Helianthemum lavandulifolium* Auctt. *Israel Jour. Bot.* 19: 249-253.
- MERXMÜLLER, H. & GRAU, J. (1963) — Chromosomenzahlen aus der Gattung *Myosotis* L. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 76, 1: 23-29.
- MEYER, D. E. (1964) — Über neue und seltene Asplenien Europas. 3. *Mitt. Deutsch. Bot. Ges.* 77: 3-13.
- MOULOPOULOS, CHR. (1965) — The beech woods of Greece. Part I, the beech species and their distribution in Greece. *Epet. Geop. Das. Sc. Panep. Thessalonikis* 1-88.
- MÖSCHL, W. (1961) — *Cerastium Vourinense* Möschl & Rechinger species nova. *Bol. Soc. Brot.* 35 (2.ª série): 129-134.
- (1962a) — *Cerastium Epiroticum* Möschl & Rechinger species nova. *Bol. Soc. Brot.* 36 (2.ª série): 41-46.
- (1962b) — *Cerastium runemarkii* Möschl & Rechinger, nom. novum. *Österr. Akad. Wiss. Jahrg.* 1962, Nr. 14: 231-232.
- MCNEILL, J. (1962) — Taxonomic studies in the Alsinoideae II. A revision of the species in the Orient. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 24, 3: 205-404.
- NELSON, E. (1962) — Gestaltwandel und Artbildung Erörtert am Beispiel der *Orchidaceen* Europas und der Mittelmeerländer insbesondere der Gattung *Ophrys* (mit einer Monographie und Ikonographie der Gattung *Ophrys*) Text- und Tafelband. Erich Nelson, Charnex-Montreux, Switzerland.
- (1968) — Monographie und Ikonographie der *Orchidaceen*-Gattungen *Serapias*, *Aceras*, *Loroglossum*, *Barlia*. Text-band 79 pp.; Tafeln 38 plates. Erich Nelson, Charnex-Montraux, Switzerland.

- NORDENSTAM, B. (1971) — Cytogeography of the genus *Hedypnois* (Compositae). *Bot. Notiser* 124: 483-489.
- PAPAIIOANNOU, J. C. (1963) — The geographical distribution of *Populus nigra* L. var. *pubescens* Parlat. and *Populus thevestina* Dode and their hybrids. Proceedings of the word consultations on forest genetics and tree improvement. I FAO. Forgen 63-4/II: 1-15.
- (1964) — The geographical distribution of five *Ericaceae* species in Greece. Abstracts of papers of the tenth international botanical congress, Edinburgh: 441.
- PAWLOWSKI, B. (1963) — Dispositio systematica specierum europaeorum generis *Delphinium* L. *Fragm. Fl. Geobot.* 9: 429-446.
- (1970) — *Fragm. Fl. Geobot.*
- PÉNZES, A. (1968) — Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel. *Feddes Repert.* 77, 1: 1-9.
- PERSSON, J. (1971) — Studies in the Aegean Flora XIX. Notes on *Alyssum* and some other genera of *Cruciferae*. *Bot. Notiser* 124: 399-418.
- PHITOS, D. (1962) — Beitrag zur Kenntnis der Flora von Nord-Pindos. *Mitt. Bot. Staatss. München* 4: 285-293.
- (1963a) — Beiträge zur Kenntnis der *Campanula rupestris*-Gruppe. *Phyton* 10, 1-2: 124-127.
- (1963b) — Eine neue Art der Gattung *Campanula* aus der Ägäis. *Mitt. Bot. Staatss. München* 5: 121-124.
- (1964a) — Beiträge zur Flora Hellenica. *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien* 103-104: 223-230.
- (1964b) — Eine neue Art der Gattung *Centaurea* aus der Ägäis. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 67: 165-167.
- (1964c) — Beiträge zur Kenntnis der südägäischen *Campanula*-Arten. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 77, 2: 49-54.
- (1964d) — Trilokuläre *Campanula*-Arten der Ägäis. *Österr. Bot. Zeitschr.* 111, 2-3: 208-230.
- (1965) — Die quinquelokulären *Campanula*-Arten. *Österr. Bot. Zeitschr.* 112: 449-498.
- (1966a) — Drei neue Arten aus Griechenland. *Österr. Bot. Zeitschr.* 113, 2: 271-272.
- (1966b) — Die Gattung *Symphyandra* in der Ägäis. *Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch.* 79: 246-249.
- (1967) — Florula Sporadum. *Phyton* (Austria). 12, 1 + 4: 102-149.
- (1970a) — Zur Polyploidie in der Gattung *Centaurea* L. Sektion *Acrocentron* (Compositae). *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 83, 2: 69-73.
- (1970b) — Die Gattung *Aubrieta* in Griechenland. *Candollea* 25, 1: 69-87.
- (1971) — Cytotaxonomische Studien der griechischen *Centaurea* Arten Sektion *Acrocentron* (Compositae). *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 84, 5: 255-259.
- PHITOS, D. & DAMBOLDT, J. (1969) — Beiträge zur Flora Ionica. I. Die *Stachys swainsonii*-Gruppe (*Labiatae*). *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 82, 9: 595-601.
- (1971) — Cytotaxonomische Bemerkungen zu einigen griechischen *Compositen*. *Ann. Naturhist. Mus. Wien* 75: 157-162.
- PHOUPHAS, C. (1968) — Contribution à l'étude de la flore de l'île «Spetsai». *Bull. Soc. Bot. Fr.* 115: 583-590.

- PIGNATTI, S. (1969) — *Phagnalon metlesicsii* nova sp. aus Westsizilien, mit einem Überblick über die Gruppe von *Phagnalon rupestre* im Mittelmeerraum. *Giorn. Bot. Ital.* 103, 4: 291-299.
- (1971) — Studi sul *Limonium*. VIII. *Bot. Jour. Linn. Soc.* 64, 4: 361-370.
- PODLECH, D. (1965) — Revision der europäischen und nord-afrikanischen Vertreter der Subsect. *Heterophylla* (Wit.) Fed. der Gattung *Campanula* L. *Feddes Rept.* 71, 1-3: 51-188.
- PODLECH, D. & DAMBOLDT, J. (1963) — Zytotaxonomische Beiträge zur Kenntnis der *Campanulaceen* in Europa. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 76, 9: 360-369.
- POPOVA, M. (1970) — Some remarks on the Lilies of the Balkans. *The Lily Year Book* 1970, 66-70.
- QUÉZEL, P. (1964) — Végétation des hautes montagnes de la Grèce méridionale. *Vegetatio* 12, 5-6: 19-385.
- (1967) — A propos de quelques hêtraies de Macédoine grecque. *Bull. Soc. Bot. France* 114: 200-210.
- QUÉZEL, P. & CONTANDRIOPOULOS, J. (1964) — Contribution à l'étude de la flore des hautes montagnes de Grèce. *Nat. Monsp.* 16: 89-149.
- (1965) — Contribution à l'étude de la Pinde central et septentrional et de l'Olympe de Thessalie. *Candollea* 20: 51-90.
- (1966a) — A propos de la végétation des forêts de Hêtres dans le Massif du Pinde. *Bull. Soc. Bot. France* 112, 5-6: 312-319.
- (1966b) — *Teucrium corcyrense*, espèce nouvelle de l'île de Corfou. *Bull. Soc. Bot. France* 113, 5-6: 351-353.
- (1967) — A propos de quelques espèces nouvelles des montagnes grecques. *Taxon* 16, 3: 239-240.
- (1968) — Contribution à l'étude de la flore de la Macédoine grecque. *Candollea* 23, 1: 17-38.
- RECHINGER, K. H. (1963) — Bericht über die botanische Erforschung von Griechenland. *Webbia* 18: 237-259.
- (1965) — Der Endemismus in griechischen Flora. *Rev. Roum. Biol. sér. Bot.* 10, 1-2: 135-138.
- (1965b) — Zwei neue Arten aus der griechischen Flora. *Österr. Bot. Zeitschr.* 112: 186-187.
- (1965c) — Zur Kenntnis der europäischen Arten der Gattung *Alkanna*. *Ann. Naturh. Mus. (Wien)*. 68: 191-220.
- (1971a) — *Potentilla Goulandrii*, *Dianthus Stamatiadae*, *Onosma psamophilum*, drei neue Arten der griechischen Flora. *Bot. Notiser* 124: 75-81.
- (1971b) — *Lithospermum Goulandrionum* Rech. f., eine neue, bemerkenswerte Art der griechischen Flora. *Bot. Notiser* 124: 355-358.
- (1971c) — *Rumex nebroides* Campd.: eine verkannte Art aus dem Subgenus *Acetosa* und ihre Verbreitung. *Candollea* 26, 1: 173-181.
- RIEDL, H. (1963a) — Revision der einjährigen Arten von *Adonis* L. *Ann. Naturh. Mus. (Wien)*. 66: 51-90.
- (1963b) — *Anchusa* Subgen. *Chamanchusa* subgen. nov. und das System der *Borraginoideae-Anchuseae*. *Österr. Bot. Zeitschr.* 110, 5: 543-546.
- (1966) — Die Gattung *Heliotropium* in Europa. *Ann. Naturh. Mus. (Wien)*. 69: 81-93.

- (1971) — Übersicht über die ausdauernden und zweijährigen Arten der Gattung *Arnebia* Forssk. *Ann. Naturh. Mus. (Wien)*. **75**: 209-222.
- RUNEMARK, H. (1961) — Studies in the Aegean Flora. III. *Cerastium coronense* sp. nov. *Bot. Notiser* **114**, 4: 453-456.
- (1962) — A revision of *Parapholis* and *Monerma* in the Mediterranean. *Bot. Notiser* **115**, 1: 1-17.
- (1967a) — Studies in the Aegean Flora X. Cytologic and Morphologic Notes on *Plantago*. *Bot. Notiser* **120**: 9-16.
- (1967b) — Studies in the Aegean Flora XII. Cytologic and Morphologic investigations in *Centaurea*. *Bot. Notiser* **120**: 161-176.
- (1967c) — Addendum to «Studies in the Aegean flora 12». *Bot. Notiser* **120**, 4: 486.
- (1968) — Studies in the Aegean Flora XIII. *Tordylium* L. (*Umbelliferae*). *Bot. Notiser* **121**: 233-258.
- (1969) — Reproductive Drift, a Neglected Principle in Reproductive Biology. *Bot. Notiser* **122**: 90-129.
- (1970a) — The plant geography of the central Aegean. *Feddes Repert.* **81**, 1-5: 229-231.
- (1970b) — The role of small populations for the differentiation in plants. *Taxon* **19**: 196-201.
- (1971a) — Investigations of the flora in the central Aegean. *Boissiera* **19**: 169-179.
- (1971b) — The Phytogeography of the Central Aegean. *Opera Bot.* No. 30: 20-27.
- RUNEMARK, H. & HENEEN, W. K. (1968) — *Elymus* and *Agropyron*, a Problem of Generic Delimitation. *Bot. Notiser* **121**: 51-79.
- SA'AD, F. (1967) — The *Convolvulus* species of the Canary isles, the Mediterranean region and the near and middle East. 1-288.
- SCHMIDT, A. (1963) — Zytotaxonomische Untersuchungen an griechischen *Viola*-Arten der Sektion *Melanium*. *Österr. Bot. Zeitschr.* **110**, 2-3: 285-292.
- (1964) — Zur systematischen Stellung von *Viola chelmea* Boiss. et Heldr. ssp. *chelmea* und *V. delphinantha* Boiss. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* **77**, 7: 256-261.
- SEITZ, W. (1969) — Zytotaxonomische Studien an Valerianaceen I. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* **82**: 651-655.
- SNOGERUP, S. (1962) — Studies in the Aegean Flora. *Bot. Not.* **115**, 4: 357-375.
- (1963) — Studies in the Genus *Juncus* III. Observations on the diversity of chromosome numbers. *Bot. Notiser* **116**, 2: 142-156.
- (1967a) — Studies in the Aegean Flora. IX. *Erysimum* sect. *Cheiranthus*. B. Variation and Evolution in the Small-population System. *Op. Bot.* **14**: 1-86.
- (1967b) — Studies in the Aegean Flora. VIII. *Erysimum* sect. *Cheiranthus*. A Taxonomy. *Op. Bot.* **13**: 1-70.
- VAN SOEST, J. L. (1965) — *Taraxacum* sect. *Palustria*. Dahlstedt. *Acta Bot. Neerl.* **14**, 1: 1-53.
- (1966) — New *Taraxacum* species from Europe. *Proc. Koninkl. Nederland. Akad. Wetensch.* **69**, 4: 432-489.

- SPETA, F. (1971) — Beitrag zur Systematik von *Scilla* L. subgen. *Scilla* (inklusive *Chionodoxa* Boiss.). *Österr. Bot. Zeitschr.* 119: 6-8.
- STACE, C. A. (1971) — Notes on the European species of *Convolvulus*. *Bot. Jour. Linn. Soc.* 64, 1: 56-60.
- STEARNS, W. T. (1967) — Sibthorp, Smith, the «Flora graeca» and the «Flora graecae prodromus». *Taxon* 16: 168-178.
- STEBING, L. (1969) — Mineralisationsuntersuchungen in der *Malcolmia cephalonica* und der *Cerastium-Arabis verna*-Assoziation auf Kephallinia. *Vegetatio* 18: 358-367.
- STRID, A. (1965) — Studies in the Aegean Flora. VII. Chromosome Morphology in the *Nigella arvensis* Complex. *Bot. Notiser* 118, 2: 139-165.
- (1968) — Stable Telocentric Chromosomes formed by Spontaneous Misdivision in *Nigella doerfleri* (Ranunculaceae). *Bot. Notiser* 121: 153-164.
- (1969a) — Variation in the Satellite Chromosomes of *Nigella doerfleri* (Ranunculaceae). *Bot. Notiser* 122: 9-19.
- (1969b) — Evolutionary Trends in the Breeding System of *Nigella* (Ranunculaceae). *Bot. Notiser* 122: 380-397.
- (1970) — Studies in the Aegean Flora. XVI. Biosystematics of the *Nigella arvensis* Complex. With Special Reference to the Problem of Non-adaptive Radiation. *Op. Bot.* 28: 1-171.
- (1971) — Past and Present Distribution of *Nigella arvensis* L. ssp. *arvensis* in Europe. *Bot. Notiser* 124: 231-236.
- STUART, D. C. (1970) — Chromosome numbers in the genus *Muscari* Mill. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinb.* 30: 189-196.
- TEPPNER, H. (1971) — Cytosystematik, bimodale Chromosomensätze und permanente Anorthoploidie bei *Onosma* (Boraginaceae). *Österr. Bot. Zeitschr.* 119: 196-233.
- TITZ, W. (1968) — Chromosomenzahlen europäischer *Arabis*-Arten (Cruciferae). *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 81, 6: 217-220.
- TUTIN, T. G. (1968) — Notes on the genus *Athamanta* (Umbelliferae in Europe). *Feddes Repert.* 79, 1-2: 18-20.
- UJHELYI, J. (1968) — Data to the systematics of the sections *Bulbosae* and *Caespitosae* of the genus *Koeleria*, 7. *Ann. Hist.-Nat. Mus. Hung.* 60: 79-107.
- VOLIOTIS, D. (1967) — Untersuchungen über die Vegetation und die Flora des Cholomongebirges. *Epistimoniki Epetiris Panepistimiou Thessalonikis.* 10: 1-131. In Greek. German summary.
- VOLIOTIS, D. & ATHANASIADIS, N. (1971) — Dendra ke Thamni. 1-294. Thessaloniki. 200 Photographs. In Greek.
- WAGENITZ, G. (1965) — Zur Systematik und Nomenklatur einiger Arten von *Filago* L. emend. Gaertn. subgen. *Filago* («*Filago germanica*»-Gruppe). *Willdenowia* 4: 37-59.
- (1969) — Abgrenzung und Gliederung der Gattung *Filago* L. s. l. (Compositae-Inuleae). *Willdenowia* 5: 395-444.
- (1970a) — Die Gattung *Filago* L. s. l. (Compositae-Inuleae) in der Ägäis. *Willdenowia* 6: 115-138.
- (1970b) — Über die Verbreitung einiger *Filago*-Arten. *Feddes Repert.* 81, 1-5: 107-117.