



Prague, 17 Mars 1886

Monsieur,

En vous remerciant cordialement de l'envoi des bruyères  
3 et 4 du Balatón et de votre lettre du 6 Mars j'accepte  
avec beaucoup de plaisir votre offre de vouloir m'envoyer  
un échantillon et un dessin en couleurs de votre Drac Batisseii,  
afin que je place le publier dans mes Illustrations. Je ne  
doute pas que cette espèce rare ne vienne aussi dans les montagnes  
des provinces limitrophes de l'Espagne et c'est la raison, par  
laquelle je désire le publier dans l'ouvrage cité, de même comme le  
Viola Henriquezii. Mais quant à cette dernière plante je ne  
possède plus des échantillons dans mon herbarium et je ne me rappelle  
pas si dans l'herbarium, qui est à l'automne, j'ai joint à l'étiquette  
du V. Henriquezii quelque note en distinguant. Par conséquent je  
ne pense pas vous donner la description de cette plante, mais  
je dirai vous direz que vous la trouverez vous-même ou qu'ez la

bon à le m'envoyer dans une lettre des échantillons floristiques  
et botaniques de cette petite plante, afin que je puisse en faire  
une description exacte.

Agéez, Monsieur et Mme Cologne, l'assurance de ma  
très considération et amitié.

Votre très dévoué

M. Willkomm



Viola Fleuryi Wx.

Annu, nana, gracillima, caule filiforme erecto, simplici & parum ramoso,  
foliis rotundatis grossè crenatis, basi sepe subreniformibus, in fine tragi.  
caeruleis breviter petiolatis, stipulis parvis, folio multo brevioribus, basi leviter  
lobo terminali oblongo-lanceo, laceribus rugosis, indecussatis; foliis longissime pec-  
tinate, pedunculo recto filiformi, sub apice curvato erecto, lacinia longissima  
genitrix; florae parvulae coeruleo-erubentes, petalis rotundatis, impressi submarginis, calice  
scutato obtuso subintus intime corollas appendiculatis calycinis ducto longiori. —  
Caulis 1-10 cm longi, basi sepe armato-adocente, pedunculi 3-4,5 cm. longi,  
foliorum limbis 3-8 mm latae, florae 7 mm longi. Tota planta teste viridis,  
parvo pubente.

Specie ex sectione Mnemion, vnde affit V. Demetriae Prot., qua tamen  
ab ea differt statura magis et robustior, stipularum lobo terminali oblongo recto  
lanceo-petiolato, floribus duplo majoribus latier, calice appendiculis calycinis vix  
longiori.

Willdenow.