

Grenouillet-
te
Bassinet

Vires in
genere

Lepra
Alopecia

Struma
Favula

Temper.

quenter inveniuntur. Eadem de causa Grenouillet-
lette à Gallis nominatur: Bassinet verò à floribus,
quod vasis æneis constrinatur, in quibus bar-
bas emolliunt, similes videantur colore ac figu-
ra. Vulgus Herbariorum Apium rufus vocat, ab
effectione quam inducit.

Vim habent Ranunculi folia & caules teneti
impositi exulcerandi, & crustam cum dolore in-
ducendi. Vnde & scabros vngues & Scabiem
remouent, & stigmata & puncta delent, fornica-
rias item ac peniles verrucas & alopecias ad
breue tempus imposita tollant. Foliorum verò
decocto tepido perniones perfunduntur. At
radix arida trita naribus admota, sternutamenta
mouet: & adalligata dentium dolores leuat:
frangit tamen ipsos auctore Dioscoride. Ra-
nunculis omnibus [ita Plinius vertit] vis caustica,
si cruda folia imponuntur, pustulasque, vt ig-
nis, faciunt. Ideò ad lepras his vtuntur, & ad
tollenda stigmata, causticisque omnibus mis-
cent. Alopecias imponunt, celeriter remouentes.
Radix in dolore manducata diutius, tumpit den-
tes. Eadem sicca concisa, sternutamentum facit.
Nostri Herbarii Strumea vocant: quoniam me-
detur strumis & panis, parte in fumo suspensa,
creduntque eam rursus lata, rebellare quæ curauit
vitia. Quatuor habet speciatim Ranuncu-
lus differentias, inquit Galenus. Sed omnes ve-
hementer acrem facultatem possident, adeò vt
cum dolore exulcerent &c. Omnium tum radi-
cem, tum vniuersam plantam vehementer cali-
dam & siccam esse testatur quoque Fuchsius. Pri-
mi tamen generis siluestris lutei [Ranunculi ro-
tundifolii] non perinde ac reliquorum acris ad-
modum esse facultatis.

RANUNCULVS RECTVS, NON REPENS
flore simplici luteo.

Descript.



AD duos
interdum vi-
deas recto la-
ui caule hunc
assurgere ex
radice fibrosa
albaque: folia
ex longis pe-
diculis reptan-
tantis Ranun-
culi foliis simi-
lia accedunt
interdum ad
Aconitum lu-
teum, vt me
pene fefelle-
rint, interdum
purpureas ha-
bent maculas,
parum hirsuta
sunt, acris: flos

luteus, eumque subsequens echinatum seminum
capitulum.

Synon.

Lobel. in Aduers. pratenfis Ranunculi varie-
tas: in Obs. p. 379. figuram ex Dodonæo habet,
surrectis cauliculis pratenfis Ranunculi titulo.

Ranunc. 12
Tabern.
da Ran.
filu. 2.

Tabern. in Hist. vocat Ranunculum i. gemei-
nen Ranensfuß: Item, Ranunc. 2. siluestris: in
Icon. Ranunc. siluestris. Vna figura, duæ des-
criptiones.

Gerardus pro Ranunculo surrectis cauliculis
ponit iconem, quod non placet, à Tabern. pro
Ranunculo dulci exhibitam: Pro Ranunculo
verò batrachoide, Ranunculum siluestris Ta-
bern. montani. Schvvenckf. est Ranunculus
vulgaris pratenfis causticus: 2. Matthioli: 1. Ta-
bern. Ranunc. siluestris pratenfis surrectis cau-
liculis.

Gerard.
notatur.

Ran. Gulg.
pratenfis
causticus
Schvvenckf.

C. Bauh. phyt. Ranunc. 6. siue pratenfis ere-
ctus lauis: Item, Ranunc. 7. siue pratenfis ere-
ctus maculato folio, Calthæ alterum genus Tra-
gi, Chrysanthemum Fuchsii.

C. B. not.

An Anguillæ Ranunculus Sardonius?

Genevæ spontè provenit & Montbelgardi in
pratis: Basileæ in sylvis: In valle Griesbachiana
copiosè provenit foliis nigris maculis notatis:
In Kirchen Ducatus Vvrt. foliis magnis ad A-
conitum accedentibus. In Silesiæ pratis plùs quàm
notissimus, vt cuius flores sæpe integra prata
operiunt.

Locus

Hoc Ranunculo se aliquoties vsum pro vesti-
catorio asserebat D. Rentzius Med. Fontis ad-
mirabilis.

Vfus

RANUNCULVS RECTVS NON RE-
pens pleno flore.

Descri-
ptio

Ranunculo recto præcedenti cætera similis,
attorubente rigido caule ramoso præditus:
folia iam dicto proxima, maiora, crebrius incisa,
acutiora: flos parvus auricomus, non, vt illius,
simplex, sed quod fortassis culturæ mangonio
debetur, denso foliorum stipatu multiplex.

Dodon. gall. vocat Polyanthemum multiplex,
Bassinet double, simplici planè simile. Brunfels.
tom. 1. Rhaph. 23. Cruris galli speciem domesti-
cam & hortulanam foliatis & repletis floribus:
Camer. hort. Ranunc. tertium flore pleno ere-
ctum, Bauarorum Klein Bueß hertz, Misenstü
gelb rausensschön. C. Bauh. phyt. Ranunc. 8. siue
hortensis erectus multiplex, Pes corui flore ple-
no Brunfels. tom. 1. rhaph. 23. Coronopus eidem
in 4. p. 132.

Polyanth.
multiplex
Dod.
Crus galli
species
domestica

An est Trago Ranunc. 2. multiplex, gesülter
Ranensfuß. An Geln. Ran. lardous flore mul-
tiplici: An Cordo quod figuram attinet, quæ ea-
dem cum nostra, Ranunc. multiplex: An Lo-
bel. in Aduers. Polyanthemus multiflorus siue
holeraceus?

C. Bauh. in Pinace, Ranunc. luteus vel 3. flore
multiplici Tragi, Ranunc. multiplex Fuchs. ter-
tius Turn. quartus Lonic. Ranunculi 7. species
coronaria Cordi Hist. Ranunc. filu. 2. Dod. Lugd.
Ran. polyanthemus Lob. polyanth. 3. erectus
Camer. at 2. epit. Ran. erectus hortensis flore
pleno luteo Eyf. Maior & minor habetur: & ille
dicitur Ran. multi florus Tabern. Ran. max. mul-
tiplex Gerardo. Flores Bellidum plenarum orbi-
culos imitantur, sæpius geminatim combinan-
tur, ac quandoque sobolem aliam ex se mittunt.

Syn. C. B.

RANUNCULVS TENVIFOLIVS MON-
tanus luteus.

CAP. XXVI.

Peculiaris hæc Ranunculi species est. Radix
ex capitulo denso tenuium fibrarum longa-
rum

Descri-



rum nigricantium agmine constat. Ex qua ima statim folia singularia longis pediculis oriuntur, Geranii gruinialis, siue quarti Fuchsi, tripartita, sed minutius dissecta parte singula in minores diuisuras. Cauliculi plures, sesquipalmes, graciles quibus adherent folia sine pediculis, sed in angustiores

quàm priora multò partes diuisa & verè digitata. In quorù summo flores singulares, lutei, splendentes, quinquefolii: Quorù media numerosi apices concolores, sed obsoletiores occupant: inter quæ crassus quidam globulus futurorum seminum, vt in reliquis Ranunculis, rudimentum.

An aliquis eius meminerit, nondum mihi constat. Obseruatus Geneuë in montis Iuræ præalta parte Thuiri.

RANUNCULVS MAGNVS VALDE HIR-
sutus, flore luteo.



EX radice oblonga ex qua veluti capillamenta sursum feruntur ad modum Dauci alterius Fuchsi, caules prodeunt cubitales, striati, caui, hirsutie asperi, & ex ruffo flauescetes, qui in ramos brachiantur: foliis quinque palmatis & sesquipalmatis pediculis [caulis formâ & colore] radice pro-

deuntibus, quæ densa sunt, lata, in ternas profundas lacinias diuisa, quæ denuò incisa sunt, per ambitum serrata, colore ex viridi nigricante, vel potius rufescente, quæ propter lanuginem & hirsutiem splendent: in caule folia parua & quidem breuioribus pediculis habentur: in summis caulis flores parui, aliorum Ranunculorum more quinque foliis donati, pallidè lutei: semen in capitula congestum succedit.

C. Bauh. phyt. vocat Ranunculum 15. siue montanum latifolium hirsutum alterum. An Thalictrum Ranunculus Cordi sextus, seu Fammula.

Tom. III

Prouenit in monte Basileensi Apollineo, Muretto dicto, locis vmbrosis, vbi vt plurimum reperitur Iunio florens: eundem etiam in Kossberg monte prope Tubingam collegit descriptionis author C. Bauhinus.

RANUNCULVS RECTVS FOLIIS PAL-
lidioribus hirsutis.

Radicibus figitur multis, fibrosis, albis, nequam reptantibus: vnde caules pullulant, complures pedales vel cubitales, caui, molles hirsuti, in varios ramulos diuisi, quorum extrema flores sustinent paruos, luteos, quinque foliis, raro pluribus constantes, apicibus medium occupantibus, crebris luteis: quibus succedunt capitula aspera, vt in plerisque Ranunc. folia multò minora quàm in Reptante, vel Recto, hirsuta, longis nixa pediculis quoque, in tria primaria segmenta diuisa, quorum vnumquodque deinceps in profundas lacinias subsecatur, quorum

color subpallidus minutusque virens quàm in reliquis Ranunculi speciebus: At verò, priora nec profundè, nec in tot lacinias diuisa sunt, vt supremi, figurâ etiam sunt rotundiora. In gustu nullam percepimus acrimoniâ manifestam.

An Ranunculus 19. Casp. Bauh.

Circa Môtbelgardum & Beffordiam, lo-

cis potissimum humidioribus & lutosis abundat: floretque Maio, Iunio & Iulio.

RANUNCULVS TUBEROSVS MAIOR
CAP. XXVII.



QVemadmodum inter vulgares Ranunc. hunc quoque est reperire, ita quoque folia iis habet similia, similiterque subsecta, pilosa, maculis albescens notata: flore aureo, cauleque hirsuto, vulgari Ranunculo respondet: radix subest alba, bulbosa, Fabæ vulgaris mediocris magnitudine, quæ

Y 73

Locus & tempus

Deser.

Locus & Tempus.

Deser.

Locus

Deser.

Synon.

facile separari potest, multis fibris circumdata. Et talem reperi in Italia: Geneuz obseruau in Ranunculo simili hirsuto bulbū dependentem, vt Matthiolus pingit.

Minoris

Iam descripto accedit Ranunculus paruus, si non idem, à me sepius obseruatus, verticillato tubere non admodum altè acto donatus [qui non facile separatur à caule & foliorum pediculis] fibras satis crassas demittente ex inferiore bulbi parte, quique caulem erigit subhirsutum, floribus vulgaris Ranunculi recti simplicibus, quos excipit similiter capitulum, Fragis, vel Pentaphyllo simile: cui succedunt semina parua compressa, duplici pelliculā vnaquæque inuoluta: folia non admodum magna, in tria segmenta potissimum dissecta, hirsuta, Hic Ranunculus interdum valdè paruus cum caule singulari, vix dodrantali, interdum maiore, ramolo.

Icon.

Crus galli.
Coronopus
filus.

Figura ex Fuchianis apposita non in omnibus satisfaci. Brunfelsii figura, Tom. r. haph. 23. Crus galli, des Kleinen hansenfuß / & Coronopi siluestris titulo donata, respondet Ranunculo tuberoso minori hic descripto.

Ran. minor
Ranunculi
9 spes
Ran. 1 exi-
guus idem
que sceler-
atus.

Fuch. in Hist. (vbi describere neglexit) & Icon. dicitur Ranunculus minor. Cordo Hist. Ranunculi 9. species, cognomento rotunda, germ. Drüßwürtz. Cum Batrachio picto à Matthiolo, & à nobis priore loco descripto conuenit descriptio Tragi Ranunculi primi exigui eiusdemque sceleratissimi folio nigricante, leuiterque hirsuto, parte sui auersa ranam viridè referente.

Batrachi
Apuleii
Ran. tub-
erosus

Dod. gall. vocat *Batrachion* Apuleii, Belgarum Sint *Aurhuenis* ræp. In Hist. purg. & lat. in fol. inscribit Ranunculum tuberosum: ait autem Diolcoridem huius non meminisse: Apuleium verò ab aliis separasse, seorsumque de isto egisse & peculiariter Batrachion appellasse: & hinc Apuleii Batrachion dici, vulgoque Rapum D. Antonii nominari. Figura Dod. gallici erat eadem quæ Fuchii: Latini alia est, qualis apud Lobelium.

Rapum D.
Antonii.

Bulbosum Ranunculum Lobelii in Icon. Plant. p. 667. fuisse malè in Aduers. ab hirsuto muricato semine denominatum, monet in Obf. p. 380.

Ranunc. bulbosus, siue quintus Matth. in Diosc. & Hist. germ. respondet Ranunculo priori descripto.

H. Lugd. duas habet figuras: Ranunculum 5. Matthioli. p. 1029. Ranunc. tuberosum p. 1034.

Lonic. dicitur Ranunc. 5. Officinarum Pes columbinus, *Taubensfüß* / quod nomen non placet. Camer. hort. Ranunc. radice bulbosā vel tuberosā potius, flore simplici. Thal. Ranunc. bulbosus Apuleii à Dod. ascriptus. Cæsalp. Ranunc. aliud genus, tum foliis tum caulibus lanuginosum, radicem ferens Verticilli modo rotundam, priuatim Pes coruinus vocatum. Tabern. in Ic. Ran. minor: in Hist. Ran. 4. minor, Ran. rotundus, Ranunculus Vulcani, & D. Antonii, Flammula minor, rotunda Vulcani, Brenfraut, *Rusdenhansenfüß*. Gerard. Ran. bulbosus, *Roondrooted*. Cronq. foote.

Ran. bulb.
radice Cr.

Varietas

C. Bauh. phyt. Ranunc. 12: siue bulbosus radice verticilli modo rotundā. In siluestribus flore est simplici, in hortos translatus non modò flores multiplicat, sed ex vno & alterum promittit. Reperitur etiam locis arenosis & laxosis ita paruus, vt vix tritum vnciarum sit. Item, Ranunc. 13. siue minimus saxatilis hirsutus, cauliculo triū vnciarum, hirsuto.

In montibus Bononiensibus obseruau flores re Aprili, nec non inter Veronam & Castelfranc: Geneuz cum tubere ex tenui folio pendente virentem mensis Februarii principio. Minor Ranunculus, cui fibræ à tubere dependent abundat Montbelgardi loco valdè sicco ad Meridiem sito in Vitiū monte, talis etiam in monte arcis Belfordianæ.

Tempus

Scribit Tragus Batrachium exiguum adurere & exulcerare efficacissimè, non secus atque ea, quæ corrosiua vocant, nec nisi externis corporis partibus adhiberi debere, pustulas excitare, quare erodendis & exulcerandis duris tumoribus mirificè conducere, verrucas formicantes & penfiles, & id genus vitia, citra incisionem, seu adustionem, succum illitu tollere. Radix, vt ait Matthiolus, tuberosa pendens nucis Juglandis magnitudine, acris & exulcerans, per Hiemem, arecentibus iam foliis, à quibusdam, vbi exulcerare partem aliquam volunt, vsurpatur. Herbam Batrachion tusā cū sua radice mixto aceto impones, auctore Apuleio, his qui habent cicatrices nigras: exedit enim eas & similem corpori reliquo reddit colorem. Camerarius de Ranunculi bulbosi flore pleno & simplici facultatibus hæc subdit: Radix bulbi instar rotunda, si recens sit caustica est, ac admodum vrit: exiccata verò post vnum mensem dulcis efficitur: vtinam hac radice tusā, & emplastri modo imposita tempore pestis ad rumpendos abscessus. Nebulones mendici quidam, quòd facilius nobis imponant, eā sanguine Draconis macerata suras aut femora illinunt.

Vires & vltus.

Radix re-
cent
caustica
sicca dulcis

RANUNCVLVS MAXIMO TUBERE, flore magno pleno.



Iucundi spectaculi oblectamento, omnium Ranuncolorum primas, amæno florum incremento: qui colore aureo non tantum denso foliorum stipatu luxuriant, sed & è medio flore alius assurgit minor, hirsutis suis foliis quinque non minus quam inferior obulatus, numerosaque folio-

Delicti

rum congestione multiplex, pediculo inferiorem transadigente: folia rugosiora quam pratensis, siue surrecti, siue repentis, maiora, rotundiora, inque minus acutos angulos diuisa: radix subest tuberosa verticillata, Cyclaminī magnitudine.

Et hic vocatur à Lob. in Adu. Ranunculus polyanthemos Anglorum: in Ic. Pl. p. 666. Ran. magnus Anglicus polyanthos. A Dod. de purg. Ran. tuberosus flores multiplicans: in fol. lat. Ran. tub. flore

flore multiplici. A Camer. hort. Ran. radice bulbosa, vel tuberosa potius flore pleno. A C. Bauh. phyt. Ran. 11. siue radice tuberosa pleno fl. habetur & simplici: in Pin. Ran. hort. flore pleno quintus, siue Ran. rad. tuberosa fl. pleno & prolifero, Ran. 3. Camerarii in Epitome. Solum florem appictum habet. A Tabern. in Hist. Ran. 24. omnino similis quarto minori tuberoso, radice & foliis, nisi quod maior est, & flores pleni: Ran. tuberosus aut bulbosus multiflorus, Germ. *gesüß würtz* / & *gesüßter fleiner hancsfüß*: Item, Ranunc. 25. praedicto similis: sed flos duplex, aut triplex.

Montbelgardi colui Ranunculum amplissimo flore pleno, radice valde tuberosa, plurimum se multiplicantem. In Belgii hortis reperitur, eo primum ex Anglia delatus, & tandem in Germaniam.

RANUNCULVS FLORE GLOBOSO, quibusdam Trollius flos.

CAP. XXVIII.



Ranunc. fl. globo-
to dictus, radice
nigram,
fibrosamque
Helleb. emu-
lam habet, folia
ferè Aconiti,
in quinque; leg-
menta diui-
sa, idque ad ip-
sum usque pe-
diculum do-
drante longi-
orem, nisi
quod folia in
caule, nullo
pediculo cauli
adnascuntur, cõ-
similiter tamẽ
diuisa: caulis
sesquicubitalis

læuis, inanis, ramulos, flores sustinet vulgari Ranuncolorum sorte maiores, iis tamen concoloribus, sed minus micantibus, denis, aut videntis foliis constantibus, intrò modicè reflexis, ut sessilem globum imitentur: [qui minus bene nostrã figurã exprimitur] fibræ luteæ, medium occupant.

Ranunculi huius Clusius duo in Austriacarum Stiariacarumque Alpium pratis obseruabat genera: Maius vnum, ampliore flore, & quasi aureo: Alterum, humilius, flore paulò minore, & colore, ut plurimum, ex viridi pallescente: aliàs, foliorum formã, capitulis, semine nigro, & radice inter se conueniebant hi duo Ranunculi glomerato flore, ut in post. Hist. author vocat, vel ut in Pannon. p. 372. Trollius flos.

Matthiolus Aconitis adnumerat hunc Ranunculum, licet ad Aconiti genera non pertineat. Lacuna in Diosc. Aconiti tertii inscriptione solam iconem ponit, nam in annot. ubi Aconiti tertii meminit, hoc non intelligit. Thallio dicitur Aconitum 3. Matth. flore Ranunculi luteo magno.

Tabern. in Icon. Ran. alp. luteus: in Hist. Ran. n. montanus luteus. Item, in Ic. & Hist. [ubi ei quintum] Aconitum Matthioli tertium. Hæ duæ

figuræ non sunt diuersarum duarum plantarum sed vnius, quod Compil. nõ animaduertit.

Petius apud H. Lugd. triplex imago ponitur. H. Lugd. p. 1029. Ranunculus 6. Matthioli: p. 1033. Ranunc. flore globoso: p. 1739. Aconitum lycoctonum 3. Matthioli. Priori & posteriori loco non describitur.

Gesn. hort. Trollius flos, Anemone montana Synon. luteo & in globum collecto flore, & Ran. montanus. Dodon. Ran. externus quintus Ran. fl. globoso, & sicetia Eyf. Lob. in Obs. p. 385. Ic. pl. p. 675. Ran. mont. Alp. glomeratus. Gerardo Ran. globosus. Schvv. Ran. Alp. luteus globosus. C. Bauh. phyt. Ran. 44. siue montanus globoso flore luteo, & [secundum Tabern. qui Ranunculum 12. Alp. album nominat] lbo: Eidein in Pin. Ran. mont. 9. siue Aconiti folio, fl. globoso, Ranunc. mont. alter folio altiore quasi Napelli, Castalpi ni.

Proferunt hunc alti montes Harcinia, & Helictiorum Alpes: itemque Silesia vallis Gigantum ad Oupz cataractam, florentem Iulio: Geneuenles, ut mons Thuri, copiosum etiam Iunio: Non diu durat in hortis, nisi loco ymbroso & frigidiusculo plantetur.

Notandum Matthiolum tribuere suo Aconito flore Ranunculi, vsus & vires lycoctoni quas nostro inesse Ranunculo globoso flore vix credimus. Potest tamen in animalibus fieri periculum. Schvv. quidem ceteris Ranunculis hunc minus acrem ait, ac propterea minus calefacere & siccare.

ACONITVM 5. MATTHIOLI EFFIGIE alicuius Ranunculi vel Anemones.

CAP. XXIX.

Cuius plantæ icon à Matthiolo in Epit. anni 1571. pro Aconito quinto floribus purpureis sit proposita, hætenus præsentire non licuit, quia nullam addidit descriptionem: folia quidem referunt Ranunculi genus aliquod, sed caules ita picti, ut singulares & non ramosi videantur, flores autem quinquefolii. An potius ad Anemonem aliquam sit referendum, fatemur nos ignorare. Camer. in Epit. sic describit: Aconito quinto flores insunt crocei, folia vitigineis aut ficulneis accedunt magnitudine ac figurã seu diuisione, maculis verò albis & huiusmodi venis deformantur, radix nigra. Eius autem inuenitur copia in monte Baldo.

RANUNCULVS REPENS, FLORE LUTEO simplici.

CAP. XXX.

Fibrosã radice reptante, quæ non bene exprimitur figurã apposita ex Fuchsiã, albida, quæ nititur, ex qua caules oriuntur al quot fistulosi, purpureo & viridi, instar Serpentaria, versicolores, nonnihil hirsuti, brachiati, supini, humi sparsi, quam attingentes fibris productis denud radices agunt: folia atrouirentia, subinde maculis nonnullis albis notata, hirsuta, Apii diuisurã quodammodò sapore herbaceo: flores aurei, quinque foliolis splendens compositi: fibræ & apices crocei, capitulum echinatum.

A Trago pro Ranunculo pratensi primo, siue

Locus & tempus.

Matth. h. purpureis

Acon. 5. fl. purpureis Matth. quid

Descriptio

Ran. dulcis seu pratensis Trago

Defen

Ranunculus globo-
flore duarum generum Clusio

Synon.

Tabern. duarum florum



dulci reat de-
scribitur, sed
malè pro Ran.
siluestri pingi-
tur, transpoli-
tis figuris.
huius enim
imago poste-
riori loco p.
98. pro silu.
Ranunculo
posita, debe-
bat priori p.
97. poti pro
Ranunculo
dulci seu pra-
tensi: & econ-
trà qua p. 97.
pro dulci ex-
extat, ponen-
da erat p. 98.
pro siluestri.

An Fuchsio Chrysanthemum, germ. Wassert-
hanensfuß:

Polyanthe-
mum
simpl. Dod.
gall.

Dodon. gall. vocat Polyanthemum simplex
à Plinio lib. 27. cap. 12. descriptum, minus calidum
& sicum Ranunculo, ut quod, teste Trago, ci-
bis admisceatur. Breuiter & ambigue describit,
nec figuram in omnibus respondentem, Fuchsii
scilicet, assumpsit. Ea autem, quam in purg.
nist. & lat. in fol. Ranunculi hortensis primi ti-
tulo exhibuit, nobis satisfacit. Ranunculi por-
rò speciem esse, non modò florum, verum & ip-
sà totius herbae facie, & facultate ostendi posse
credidit.

Synon.
nonnulla

Lobel. in Adu. vocat Ranunculi differentiam
& varietatem vulgatissimam vbiq; pratens-
sem à Brabantis titè Doterblom (quasi Florem
butyri) vocatam, ut quā tenerā floribusque o-
nustā multum pasta vacca, quum ad mulctum
veniant, vberius lac dant. In Obs. p. 379. Ic. Pl. p.
664. Ran. pratens. euanque hortens. in reptan-
te cauliculo. Gesn. hort. Ranunculi genus per
terram magis repens, & acrimoniā carens, Co-
ronopodem quorundam, & Ranunculi spe-
ciem similem luteam flore simplici: Idem de
coll. stirp. Ranunculum plumbum habentem, &
interea serpentem, floribus maioribus, iuxta se-
mitas. Celsus. Ranunculi genus humi serpens
non mordens. Turn. Ran. tertium, vulgari simi-
lem per omnia, sed dulcem, Monguntinensibus
Schmalzwort Süss hanensfuß nuncupatum.
Hort. Lus. Ran. vinealem repentem weingar-
ten hanensfuß: Item, Ran. dulcem pratensem,
Süssen wissen hanensfuß. Tabern. in Icon. Ra-
nunc. dulcem, Batrachium saluterum: Item,
Ran. holeraceum maiorem, grossen süßen ha-
nensfuß/Bütterblüm: Et, Ran. vinealem, Batra-
chium vineale, wingart hanensfuß: In Hist. de
his ait: Ranunculum dulcem quidam docti im-
prudenter miscent cum Coronopo. Dioscoridis:
dicitur græce Βατραχίου γλυννερν, Batrachii dulce,
aut saluterum, Ran. dulcis pratensis, vulgò her-
baris holeraceus, quibusdam saluterus, Süss
hanensfuß: dimittit cauliculos repentes, Fragariæ
modo Ran. dulcis 3. siue holeraceus maior, aut
pratensis maior, germ. groß Schmalzblum/
groß Butterblum: folia habet priori dulci simi-
lia, maiora, minus laciniata, caulem maiorem, ac
etiam flores maiores. Ran. dulcis 6. doctis
in Leonardi. & Istinopodium, Lat. dictus Pes milui-

nus, Batrachium vineale, Ran. repens dulcis &
vinealis priori (dulci) foliis similis foret, nisi cras-
siora & obscurius viridia essent, caules item cras-
siusculi & fasci: repit & se renouat. Descriptio
Ranunc. i. dulcis Tabern. conuenit cum nostro
Ranunculo, non item icon, quæ non respondet
descriptioni, ut in qua nulli caules repētes. An 3.
dulcis sit repens non indicat Tabern. nec icone
demonstrat. Ranunculi 6. icon facta videtur
ad iconem Lobelii.

Icones
Tabern.
qua?

Gerardus pro Ranunculo pratensi etiamque
hortensi, Lommon Gromfoote proponit iconem
Ran. repentis dulcis texti Tabern. Item, pro
Ran. auricomus, golde harze Gromfoote eiusdem
Ran. dulcem tertium.

Ranunculum dulcem Schvvenckf. Taberno-
montanum secutus, triplicem constituit: Ran.
dulcem pratensem, oleraceum: Ranunc. dul. prat-
maiolem: & Ran. dul. prat. maculosū, serpentē.

An Ranunculus secundus Matthioli?

Historia certè Lugd. præter Ranunculum se-
cundum Matthioli, quem p. 1028. exhibet, pro
repente alium Ranunculum, sc. hortensem prio-
rem Dodonæi p. 1031. demonstrat. Et hunc no-
strum pulchrè exprimere dicimus, quamvis alte-
rius sit opinionis Dalechamp. qui eum ad quar-
tum Matthioli accedere suspicatur.

Ran. hort.
prior Dod.
H. Lugd.

An Brunfels. Coronopus & Crus galli filius?

An est Anguill. epist. ii. Ranun. tertia species?

Thabo est Ranunc. polyanthemus 1. Dodo-
næi, Ranunc. pratens. 1. Anglorum, Ranunculi 8.
species Cordi: Item, Ran. auricomus, seu 3. Ran.
species Dod. gallici, Ran. dulcis siue pratensis
Tragi. Ego Ran. octauum Cordi huc non refero,
sed ad Ran. surrectum acem, licet Thabio assen-
tiatur C. Bauh. in phyt. vbi ei est Ranunc. 9. siue
pratensis repens hirsutus simplici flore.

Locus &
Tempus

Basileæ in pratis florentem adhuc Octobri ob-
seruari, & Genevæ Nouembri & Martii princi-
pio, April. Monspelii, ac passim Montbelgardi.
Locis umbrosis, & nonnihil humentibus, non
prorsus aridis, secus vias & in locis hortorum in-
cultis spontè exit: in pratis quoque, & non raro
iuxta agrorum margines occurrit. Nec enim
quod in hortis tantummodò gignatur, Dodo-
næo hortensis dicitur, sed quia ferè præ cæteris
hortis sit familiarior, atque in his creberrimè
gramini permixtus reperitur. Maio ac deinde
serius multò vigent flores.

Ranunculum maiorem siue pratensem dul-
cem minimè acem perhibet Tragus, ac propte-
rea citra periculum & noxam vrinque corpori
adhiberi posse ait: folia quidem quacunque in
corporis parte ortos tumores imposita discute-
re ac resoluerè. Refert Lobelius, herbam tene-
ram, floribusque onustam, nec non semen, mi-
nus vrente gustu, nec insuauis odore lactis copia
imperire credi: pasci enim hanc præ cæteris ar-
mèta, seu gratiore, & pratis pinguioribus vsq; cū-
ctis copiosissimam. Tabern. scribit Ranunculum 1.
dulcem April. & Maio collectum in pulvis o-
leraceis esse valdè gratum, sicuti & dulcem ter-
tium Maio collectum, ac eum insuper cum sexto
bobus & vaccis gratum & salubre pabulum præ-
bere, iisque lac augere.

Vires &
vltus.

RANUNCVLVS REPENS FLORE pleno.

ET huic quoque fistulosi caules, maculosi, sub-
hirsuti, humi fusi, qui vbi terram attigerunt
demissis fibris eam denud subeunt: folia Repen-

Descri

SCROPHULARIA VULGARIS
& major.

CAP. XXXI.

Descriptio.



Foetidi odoris tota est. Radix oblique agitur, alba, crassiuscula, & tuberculis inaequalibus strumosa: caulis firmus, rectus, quadratus, canis, purpureus, ad binos cubitos excrecit, in alas diuisus: folia Galeopsis, maiora, acuta, serrata, ex caulibus geniculis aduersa, atrovirentia: flores

ex hirsutis pediculis, caulicibus quinque-foliis insident, Antirrhini minimi, hiantis oris instar habentes, suprema lacinia intus atro-purpurea, extra nonnihil virescente, lateralibus duabus cum infima extrorsum reflexa magis ex viridi pallefcentibus, prominulo è recto stilo virente, altè reconditis tortuosis staminibus cum apicibus ochreis.

Nomina
linguarum

Passim Scrophulariam vocant, cognomento maiorem, ad differentiam minoris, quæ Fabarola & Chelidonium minus quoque nuncupatur. Appellant verò & Millemorbiæ, Ficariæ, Ferrariæ & Castrangulæ: Germani Braunwurtz / Saumwurtz / Seumwurtz / Feigwurtzenfraut / Feigwurtzenfraut / & groß feigwurtzenfraut: Belgæ groot specuifruyte steenfruyt & helmcruyt: Galli Scapulaire: Ital. Scrofolaria: Angli water betonye / broune murt: Hung. Scrofulariam appellant Corofgiif siu: Fekese, bozza, h. e. nigrum Ebulum.

Radix in empta sculpta figura minus placet: tubera enim inaequalia strumosa non satis exprimit.

Fuchf. Cordus, Dod. gal. & Gesn. ap. p. 10. de Scrophularia repubata.

Fuchf. Cordus, & Dod. gall. itémque Gesn. in cat. pl. Scrophulariam hic à nobis traditam pro Galeopside demonstrant, & describunt. Quorum sententiam reprobant Matth. & Dod. lat. in fol. In Scrophularia vulgari grauem odorem, quo Galeopsis præditam esse volunt, frustra desiderantes: Vnde odoratus sensum eos [præsertim verò Matthiolum] perdidisse facile quis crediderit.

Galeopsis esse non posse dicimus, inquit Marantha, quodd præter alia, tota planta foetidi & grauis sit odoris, licet omnino nullam contritionis violentiam sit perpessa: Galeopsos autem folia non nisi trita odorem grauem reddant.

Cæcutiunt & illi, qui cum Trago Ocymastrum faciunt. Nec minus aberrant qui cum Rob. Constant. Clymenum Plinij esse contendunt. Quidam herbam Chrysippeam Plinij esse putant, quæ cum Ficis strumis medetur. Sed in tanta verborum Plinij breuitate, quod concludam

Tom. IIL.

non, occurrit. Tigureses vocant Schwärze Nachtschat, i. e. Solanum nigrum, improprie tamen: nec desunt qui wurmfrant / hoc est, Vermium herbam, aut Vermicularæ vocitent, sed quam ob causam, nondum patet. Gesn. in cat. pl. cur Agripalmam cognominari, haud video. Geneuæ vocant L'herbe du siege, à parte cui remedio est. Summo enim emolumento radice vtuntur, in hæmorrhoidibus abigendis.

Cæterum, Matth. passim in comm. suis, Hist. Synon! germ. & Epit. etiam cum add. Camerarij, Lac. & Dod. lat. in fol. vocant Scrophulariam: Brunfels. Cast. Dur. Gesn. quadr. Lon. Turn. Lobelin Ad. Obs. p. 289. Icon. Plant. p. 533. Thal. Camer. & Tabern. Scrophulariam maiorem: H. Lugd. pag. Scroph. maiorem Matthioli: C. Bauh. phyt. Scrophulariam i. [2. apud Matth.] sine nodosam foetidam. Gesn. hort. Scrophulariam maiorem: Item, Clymenum nodosæ seu scrophulas in radice habens, & Clymenum marem: Cæsalp. Scrophulariam maiorem recentiorum Medicorum. Galeopsis Fuchf. Cord. & Dodon. gall. itémque Gesner. in cat. pl. Galeopsis minorem Fuchf. in Icon.

Scrophulariam vulgarem maiorem obseruauimus Basileæ Octobri ad fluuium Bile extra & intra urbem: item florentem extra portam Basileæ minoris Rietterthor, mense Iunio: Geneuæ passim: Lugduni quoque, & in Italia inter Veronam & Castelfranc. Secus agrorum margines, in scrobibus siccis non raro prouenit, ac in syluis. Iulio ac Augusto cum flore viget; semen inde maturefcit.

Cæterum, quamuis satis sit, Scrophulariam non esse Galeopsis: ea tamen viribus pollet non contemnendis, namque eius radix strumas, & hæmorrhoidas sanat. In quem usum radix effoditur autumnali tempore, & repurgata tunditur cum recenti butiro, operculatque fictili in vliginoso loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim dies. Deinde lento igne butyrum illud liquefit, & percolatum asservatur, quo prædicti morbi itémque scabies, vtilissimè illinuntur, referente Matthiolo, Solenandro consmed. 20. section. 4. & Dodonzo. Scrophularia radicem habet tuberosam (inquit Porta phyt. lib. 5. cap. 23. vbi figura) vlcibus strumosis cauernosis, carcinomati, aut depascentibus sideratis, satis opportunam: tuberculis itém ab humore frigido glaciatis emolliendo opitulantem. Facultate autem calida & sicca est, & propterea desiccatur, extenuatur, discutit, abstergit: est enim gustu amara & subtilium partium. Et hinc ad duos glandularum tumores quos Græci γαστρίδες, Latini strumas, & vulgò Scrophulas appellant, & hæmorrhoidum cum dolore tumores prodesse fertur. Nonnulli vel collò appensam, vel aliàs gestatam ad sanitatem conferre temerè prædicant. Sicca radicis puluis impositus hæmorrhoidas siccat: Idem drachmæ pondere potus, lumbricos ventris pellit. Aqua è radicibus distillata, faciei ruborem illita tollit.

Locus
tempus,Vires
usus.

Superficia,

SCROPHULARIA MAXIMA
radice fibrosa.

CAP. XXXII.

Quadratis caulibus ad cubitos aliquot altis excrecit: per quod folia Scrophulariæ

Zz



vulgaris, vel
Betonica, ferra-
ta, nigricantia,
fœtida: flores
& vascula ad
maioris vulga-
tæ Scrophulariæ
accedunt: ve-
rum radix non,
vt illi, strumosa,
sed ex innume-
ris fibris con-
texta.

Hoc est Oci-
mastrum illud
maius Tragi,
quod Ocima-
stro minore
[Scrophularia
vulgari] caule
& foliis viridio-
ribus esse per-
hibet, & ad pro-

ceritatem sæpè viri assurgere.

Eandem plantam cum Trago fortè intelligit
Cornarius per Ocimum in aquosis nascens,
quod Herbarios pro Erino Dioscoridis, & Erineo
herba Plinii agnoscere ait, & Germanos pro
wasser Basiliens. Hoc non describit, & fortè no-
men germanicum fingit.

An Ocimum aquatile Gesnero?

Lobel. in Obs. Scrophulariam maximam sub
sequentibus nominibus pingit pag. 288. Betonica
aquatica Septentrionalium an Clymenum Dio-
scoridis? Galeopsis siue Scrophularia altera Do-
donæi vernacula editionis [gallicæ, intelligo.]
Clymenon Turneri [eius verba præc. cap. ad-
scripsi:] Solanoides minus fortè Solimanò. Ter-
pentaria D. I. Dilfil à Terebinthina dote simili.
Ocimastrum alterum Tragi. Belg. Beecf Scüym
& cruyt / S. Antuenis cruyt. In Icon. Plant.
pag. 533. intulauit Betonicam aquaticam Sep-
tentrionalium: Dodonæus Lat. Betonicam a-
quaticam. Camer. apud Matth. vocat Scrophu-
liam fœminam, & vulgo germ. *weissen Vlasch-*
schatten/ hoc est, Solanum album.

C. Bauh. phyt. Scrophulariam 2. siue palustrem
non fœtidam. Item. Scrophulariam 3. siue aqua-
ticam folio Betonicæ: Ocymastrum maius Tra-
go: Beton. aquat. Septentrionalium Lobelio. A-
pud Matth. Scrophulariam palustrem radicibus
fibrosis, caule & foliis prorsus viridibus, in palu-
stribus Basileensibus minimè fœtulentem. Se-
cundam & tertiam Fratris Scrophulariam non-
dum separauerim.

C.B. not.

Locus &
Tempus

Varis in locis prouenit Montbelgardii. Mont-
pelii floret mense Maio & Iunio ad fossas aqua-
rum. Iuxta aquas profluentes emicat, inquit
Dod. ac secus scrobium ripas: in aridis vix repe-
ritur. Iulio ac Augusto cum flore viget, semen in-
de maturefcit.

Vires &
Vlus,

Facultate calida & sicca est: folia absterforia
vi prædita, ad praua, & fœtida vlcera pluri-
mum prodesse feruntur: & cum melle suc-
cus horum decoctus. Curant autem
vlcera & contusa, si manè & serò
continuis diebus in foco cale-
facta & contrita folia impo-
nantur.

* *

SCROPHVLARIA FLORE RVBRO Camerarii.

CAP. XXXII.



Scrophula- *Scroph sine*
Sria altera *tuberculis*
siue scrophu-
lis siue tuber-
culis, cuius
flosculos &
folia Scrophu-
larie vulgaris
maioris ele-
gantiora esse
ait author Ca-
merarius, in
cæteris fermè
conuenire,
nescit an ab
aliis descrip-
ta, nisi sit Ga-
leopsis An-
guillare. Se-
mine quotan-
nis sua sponte
propagatur.

Huius ico- *Icon. Scroph. p. 1*
nem quadagesimo tertio loco, Scrophularia
peregrina titulo pictam dedit. In hac autem
imagine flosculi è suo conceptaculo euulsi, par-
te anteriore & posteriore, & vntus eidem adhuc
inhærens, denique semen cum suo vasculo di-
stinctè notari possunt. Sculptor noster malè ca-
pitulorum apices ademit, & ea nimis rotunda re-
presentauit.

C. Bauhinus, cui à Doldio ex horto Camerarij
transmissa, vocauit in phyt. Scrophulariam
quartam, siue flore rubro. An est Clusio Scro-
phularia Cretica 2. cuius delineationem infra ea-
dem inscriptione dabimus?

SCROPHVLARIA LVTEA MAGNA amplis foliis.

CAP. XXXIII.



Caules *Descriptio*
Cprofert
plures bicu-
bitales circi-
ter, quadra-
tos, nonnihil
pilosos: folia
superiora a-
cuminata, ner-
tiosa, profun-
dè per ambi-
tum serrata,
infima qui-
dem quatuor
vncias longa,
totidem lata,
pediculo qua-
ternis vncis
longiore:
que his su-
periora sunt,
per caulem veluti ad genicula opposito situ
nascuntur

nascuntur, alia trium, alia duarum vnciarum & semuncialibus tandem pediculis hærent, decrefcente pariter foliorum magnitudine: ex vniuscuiusque ferè folij sinu pediculus emergit palmaris circiter, cuius circa fastigium foliola bina exigua conspiciuntur, supra quæ extremo pediculi cacumine flores hærent complures, lutei, Pisi minimi magnitudine, concaui, hiantes, apicibus itidem intus luteis, quos extrinsecus amplectuntur foliola quædam lutea: subsequuntur *seminum* conceptacula turbinata, capitulis hyperici similia. Nullum mihi manifestum odorem halat planta. Sapor autem tam florum, quam foliorum nonnihil dulcis mihi videtur.

Lamium Pannonicum 2. siue exoticum Clusio.

Locus & tempus

Montbelgardi in horto Ill. E. C. pluribus annis durat se quotannis semine renouans, Aprili & Maio florens. Clusius florentem obseruauit primum Viennæ Austriæ in hortulo suo ad parietem natam, nescit quo semine. Eam subsequens Hiems auferbat quidem, sed deciduo semine prognata sunt insequente anno aliquot plântæ, quæ demum altero Vere flores protulere. Floret Maio, semen Iunio maturum est: deinde tota planta radicitus perit: nonnunquam tamen ex radice etiam repullulat.

SCROPHULARIA INDICA CAPITVLIS maximis, & de Creticis Syluij Scrophularijs.

CAP. XXXIV.

semen. Indica. Calycis



Scrophulariæ Indicæ nomine accepi *semen* quoddam, cuius calyces sunt ex breuibus inæqualis longitudinis pediculis quinque simul iunctis, formæ ferè & magnitudinis Ciceris arietini rotundi, qui bipartiti in acumē desinunt, quos folia ambiunt breuia: semē in capitulis, siue calycib., minutum, nigrum. Hanc Caspar. Bauh. in

phyt. vocat Scrophulariam 6. siue Indicam capitulis aliquot iunctis, sed quadruplò quàm in alijs maioribus.

Scrophulariæ autem Creticæ genera duo tradit & describit Clusius: 1. quidem quod Francofurti natum ex semine Cretæ accepto, Ruta siluestris appellatione: ac 2. quod folio vrticæ esse dicit; ac de quo meritò quæritur & dubitari possit, utrū sit Scrophularia peregrina Camerarij necne.

SCROPHULARIA TERTIA DODONÆO tenuifolia, Ruta canina quibusdam vocata.

CAP. XXXV.

Descriptio Scrophulariæ tertiæ nomine exhibita à Dodonæo planta, radicem habet longam, simplicem,

mediocriter crassam: caules cubitales striatos, teretes, ferè nigricantes; medullâ fungosâ plenos, ramosos, per quos folia oblonga, angusta, profundè laciniata, grauitè odorata: flores eo ordine dispositi quo in Scrophularia maiore vulgari, copiosiores, parui, nigri, quos vascula excipiunt Scrophulariæ minora, acuminata, in duas catinas dehiscencia.




Scrophulariæ suæ tertiæ speciem Dod. gall. pro Galeopseos specie sumi posse admittit. Lobel. in Aduers. huius mentionē facit nomine Rutæ caninæ [sic] in Obseru. pag. 588. & Ic. Plat. Tom. 2. pag. 55. quoque inscribitur.] & suspicatur Hypocoum esse. Clus. in Histot. post. vocat Scrophulariam, siue Rutam caninam primam.

Ad Sideritidem reducitur à Casalpino & Camerario. Gesnerus tradit in pede montis circa Glaronam locis saxosis nasci, Monspelijs Rutam caninam vocatam:

An Cordo Herba folijs Pyrethri? An Herba Mora Italorum H. Lugdunens.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. per multos annos floruit adhuc Octobri, radice perenni. Eam autem primum obseruavi Ellingæ in horto cultiss. Ioan. Volmarij, qui Sesamoides nominabat; dein Monspelijs & Lugduni, itémque Brisaci ad Rhenum.

Locus & tempus.



CHAMÆROPS.

CAP. XXXVI.



Chamærops Plinij hæc videtur esse Historiæ Lugdunensi pagina 1339. quæ in siluosis gignitur, radice crassâ & multiplici, caulibus multis & cubitalibus, folijs Myrti circa caulem geminis: flore copioso; è foliorum sinibus nascente, semine in oblongis vasculis.

Eodem verò effectus Z z x

Chamærops Plinij Descriptio

H. Lugd.
not.

lateris doloribus habet Chamærops, inquit lib. 26. cap. 7. Plinius, myrtes circa caulem geminis foliis, capitulis Græcæ rosæ ex vino pota. Quisquis ille fuerit apud H. Lugdunensem, qui Chamæropem Plinii ita seivnè delinearit, nec natalè adscripserit, authoritati suæ non consuluit. Merito cum Casp. Bauhino, quænam hæc sit, aliquis perierit.

DE SIDERITIDE IN GENERE, ET particulatim de Heraclea.

CAP. XXXVII.

Sideritidis
Erymon.

Sideritidis Gr. Latinis quoque Sideritis dicitur ἀσδαίδης, à ferro, quasi Ferruminatrix, quod vulneribus ferro factis perutilis sit, vel quoniam glutinandis vulneribus apta, præcipuè in bello habeat usum, quod sæpè ab eo metallo in græcis scriptoribus indicatur. Sed eum permultæ sint plantæ, diversi etiam generis, eæque inuicem, quæ ferro sauciatis partibus, vel vulneribus quouis modo acceptis, opem polliceantur, ac ob id Sideritides nuncupentur, haud immeritò hæc eæ commemorandæ veniunt. Sed enim studiosis bene consultum fore speramus, si eæ, quæ à veteribus, & maximè à Dioscoride, descriptæ sunt, illis primò innotescant.

Sideritidis
tria genera
Diosc. lectio
illustratur.

Dioscorides itaque tria facit Sideritidis genera, quorum primum est Sideritis, quam aliqui Heracleam vocant [hanc solum describit Byzant. cod. Sarrac.] herba folia habens parua multa & tenuia, similia Marrubio [ῥοια πρασίω. Vet. ἐλεισφάκω πρὸς τὰ τὸ δρυὸς.] sed oblongiora [ἐπιμηκετέρα.] ad Saluæ [ἐλεισφάκω] aut Quercus [δρυὸς] folia accedentia, minora quidem & aspera. Caules verò edit quadratos, pedales [dodrantes, Sarrac. σπθαμαίους græc. cod. πηχύους vet.] & maiores, non iniucundi gustus [ἐκ ἀνδρείς. ἀειδαίς Dal. ἡδαίς vet.] & quodammodò leuiter subastringentis, in quibus ex intervallo verticilli spectantur rotundi, ut in Marrubio, & in iis semen nigrum. In locis sub quibus petra latent, nascitur. Folia imposita vim habent glutinandi vulnera, & ab inflammatione vindicandi. Sideritis altera ramos habet binum cubitorum, exiles: folia longis herentia pediculis, ceu Filicis, in extrema sui parte incisuris diuisa, utrinque numerosa: è superioribus autem alarum cauis nouos erumpentes furculos longos, tenues, capitulis in cacumine globosis & asperis, in quibus semen continetur, ceu Betæ, verum aliquantò rotundius atque durius. Huius etiam foliorum vis vulneribus utilis est. Traditur & tertia Sideritis, quam etiam Crateuas Heracleam vocat. In maceris vinetisque nascitur, foliis ab vna radice multis, Coriandro similibus, circa cauliculos dodrantes, leues, teneros, cum rubore candicantes: floribus puniceis, paruis, gustu amaris & lentis. Huius etiam impositæ ea vis est, ut cruenta recentiaque vulnera glutinet.

Panax He-
raclæa.
Millefoliū.

Panaxem Heracleam, alii Sideritim, & apud nos Millefolium vocant, cubitali scapo ramosam, minutionibus quàm Fœniculi foliis vestitam ab imò. Alii fatentur quidem illam vulneribus utilem, sed veram Achilleam esse scapo caruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Alii quadrato caule, capitibus Marrubii, folio Quercus. Hanc etiam præcitos neruos glutinare ferunt. Alii Sideritim

in maceris nascentem, cum teritur, fœdè odorist. Etiam num aliam similem huic, sed candidioribus foliis & pinguioribus, tenerioribus cauliculis, in vineis nascentem. Alam verò binum cubitorum, rathulis exilibus, triangulis, folio Filicis, pediculo longo, Betæ semine, omnes vulneribus præcipuas. Nostri eam quæ est latissimo folio, Scopas regias vocant. Medetur anginis suum.

Achilleas seu Sideritides sex statuit & describit Plinius, ac satis quidem indistinctè, ita tamen ut agnosci & intelligi possit [inquit Dalech.] primam Achilleon eius, Dioscoridis Achilleam esse: secundam, Achilleon veram, scapo caruleo, &c. esse Myriophyllum Dioscoridis. Tertiam quadrato caule, &c. esse Sideritin Heracleam Dioscoridis primam. Quartam in maceris nascentem, &c. esse Heracleam Crateuæ, apud Dioscoridem. Quintam superiori similem, sed foliis candidioribus, &c. esse tertiam Sideritin Dioscoridis. Sextam, Dioscoridis Sideritin secundam.

Galenus vniuersè duntaxat Sideritidis meminit. Sideritis [inquit 8. simpl.] habet quidem etiam abstergendi facultatem quandam, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: pauca verò inest adstrictio, quare phlegmonem sedat & glutinat.

Clauius vno eodemque capite veterum codicum lectione & fide per Marcellum moniti, tres ab aliis seorsum tractatas Sideritides, nec satis certà à veteribus etiam historiâ descriptas. Quominus miretur aliquis nostra ætate incertas earum notas: & inter similes herbas & eiusdem potestatis vagos Medicorum vsus, miscentibus earum genera Herbariis, & inuicem commutantibus. Factum hoc iam pridem est, quodque Plinii ætate incertum erat, ignorari sæculo nostro nullus mirabitur. Nos quidem ingenuè fatemur in tanta veterum & iuniorum diuersitate nihil habere, quod pro comperto tradere valeamus.

Sideritis nomine sequentes insigniuntur plantæ. Sideritis hirsuta vulgaris. Sider. Clus. capitato flore. Sider. Monspeul. Sider. hisp. hirsuta Clusio. Sideritis flosculis vix ex vasculis prominentibus fascis. Sideritis quarta Clusii ramulis procumbentibus. Sideritis folio rotundiore. Sideritis glabra aruensis. Sideritis Valerandi Dourez breui spica. Sideritis lignosa. Sideritis glabra angustifolia speciosis verticillis. Sideritis cruciata. Sideritidis genus spinosis verticillis. Sideritis spinosa. Sider. foliolis Oleæ. Ladanum segetum flore albo. Ladanum segetum flore rubro. Cannabis siluestris quorundam. Cardiaca. Marrubium Tragi palustre. Marrubium Pannonicum. Marrub. album angustum. Herba venti. Melisophyllum Fuchsi. Galeopsis angustifolia fœtida. Galeopsis, latifolia fœtida. Gallitrichum siluestre. Gallitrichum latium. Gallitricho affine Maru. Galeopsis lutea. Ternionaria. Coris lutea Monspeulana. Euphrasia 2. Dod. purpurea. Botrys altera. Chamæpitys. Senetio hirsutus fœtidus. Parietaria. Millefolium stratiotes. Achillea. Fumaria minor. Geranium sanguineum. Geranium Robertianum. Scrophularia tertia Dodonæi. Sanicula vulgaris. Sanguisorba minor. Barbarea. Filix floribus insignis. Tanacetum album. Verbenaca supina. Pulmonaria gallica. Virga aurea. Erice. Eruum.

SIDERITIS

SIDERITIS VVLGARIS HIRSVTA.

CAP. XXXVIII.

Descrip.



EX lignosa radice caules emittit pedales & bipedales, quadratos, hirsutos, ex albedo virore flavescentes: ad quorum genicula folia ex eunt aduersa, rugosa hirsuta, vnciali, aut sextantali longitudine, semuncia circiter lata, in ambitu crenata, sapore exsiccante & adstringente cum calore aliquo: flores

verticillati genicula amplectuntur, galericulati, ex albedo lutei, labro sanguineis punctis guttato, ex calyculis hirsutis, in quinque mucronata segmenta abeuntibus: relinquunt post se singuli flores quaternaria semina.

Ex Clusio. Clusius de sua dicit, folia grauitur odorata, gustus amaricantis & acrisculi: flores galeatos aliquantulum, candidos, odoratos, hiatum, siue ritum sanguineis notis conspersum habentes: semen in pentagonis vasculis inaequale, nigrum.

Lob. descr. Lob. sic describit. Virgultis pedibus, iam surrectis iam depressis, quadratis, duriusculis, ternis, aut quaternis, verticillis crebribus donatis, pungentibus, floribus albicantibus ex diluta purpura. Iuxta quos & subter, folia sunt longiora, angustiora, incana, & vt totus caulis, scabra, & crispata, ambitu laciniato, vt Chamædrys, aliquando laciniosa diuisura obscurius apparet in quibusdam foliis, quæ caula fuit, vt Dioscorides iam quæræ frondi, iam Saluæ & Marrubio contulerit. Radix lignosa Marrubij, minutis fibrosa.

Synon. linguarum. Sideritim appellat Ruellius: Sider. Heracleam Euch. Roessl. & Lobelius: Sider. heracleam Dioscor. Tabern. Sideritidem primam Fuchsi. Sideritim i. Dioscoridis Turn. Sideritim Fuchsi Cord. in Hist. & Camer. Hort. Sideritim i. Dodonæi [gall.] & Fuchsi Hort. Lusit. & Thalius. Sideritim i. Fuchsi Gesn. hort. Siderit m. i. Marrubij folio in cat. pl. Sider. i. florib. albis de coll. stirp. Sideritim vulgarem Camer. in Hist. germ. & Epit. Matthioli. Sideritidem quartam Lonic. Sideritim Pannonicam spicato flore Clusi. in Pannon. Hist. Sid. i. vulgarem in Hist. post. Sid. i. siue vulgarem hirsutam C. Bauh. phyt. Aliqui veram Achilleam cognominant. Sed & Alysson Galeni vocat Presburger. Recentiores Herbarij & officina nonnullæ Iudaicam herbam, & Tetrabit aut Tetrabit barbaro nomine inscribunt: Germani wundfraut, i. e. herbam vulnerariam, & gliedfraut, h. e. Artuum, & Zeißfraut. Galli espece de Tetrabit, Fuchsi. & Lob. Hung. Tiztos siu, h. e. Nobilem herbam. Magna officinarum pars, ac nonnulli recentiorum pro Chamapity veterum ostendunt, eaque non sine errore, vt bene docet Tom. III.

Fuchsius Sideritidem i. inscribens, pro Chamapity vtuntur. Fuchsius in eo aduersatur Matthioli, à cuius è contrâ stat partib. in adu. Lob. Vocabulo, inquit, quod ferro sauciat partib. opem promitteret, nobilitantur primi mortales complures plantas, Sideritidesq; vocarunt, potius virium confimiles effectiones sequuti, quàm vultuum affinitates, genericæve differentias. Quare Sideritidem hanc Heracleam, siue Ferruminatricem Herculeam, docti Barbari illam multo experimento competam & vocatam Tetrabit, siue Iudaicam esse sanxerunt: non modò propter vires efficacissimas, & planè Herculeas, sed etiam quia quàm proximè delineationem Dioscoridis, si quæ alia, repræsentat. Quo magis dolet peritis & candidis plantarum arbitris, Commentatorem Senensem eò securitatis ignauæ progressum, vt cum quænam esset, vel Italicis Iudæis Iudaica herba, se nescire quereretur, quam scitè, vt sèper omnia Ruellius, & ex eo Fuchsius expressisset, tamen in vtrumque inscitæ calumniam impegit, & sensu studio planè deprauato plausum è triuio captarit. Huicque herbæ de sua classe pulsa, sibi missas, vt semper iactat, nec tamen nisi mutile descriptas, aliàs suffecerit, sc. Marrubium aquaticum vulgi. Hæc Lobel. in Aduers. vbi plantam minus felici picturâ expressit. Eandem imaginem in Ic. Plant. p. 523. pro Sideritide siue Ferruminatrice, & Sideritide Herculea Diosc. Cordo, Clusio & Herbarijs dedit: Itémque ibidem aliam pro Tetrabit Herbariorum pinxit. Is autem in Obs. p. 282. pro Tetrabit Aduersariorum, siue Heraclea Sideritide Dioscoridis Cordi & Clusij, aut pro Sideritidis vulgaris figura, ponit iconem Clusij Sideritidis Hispanicæ, quasi putarit eandem cum vulgari Fuchsi. Libro etiam Iconum, plantæ, quam exhibuerat pro vulgari hac Sideritide, titulum iam scriptum adaptauit, ibidemque iconem Clusij à vulgari non separauit. Et hæc occasio vt Lobelij descriptionem nostræ subiecerimus: Clusij autem Sideritis Hispanicæ capite proprio.

Sed & H. Lugd. primam Dioscoridis Sideritim Tetrabit esse pronunciat. Ait autem inter cætera. Matthioli Ruellium & Fuchsi erroris insinuat, quod primam Sideritidem dixerint herbam esse, quæ hodie nostris herbarijs & officinis barbaro nomine Tetrabit, aliis herba Iudaica nominatur. At periti & exercitati Herbarij, tum Ruellio, Fuchsi & ætate superiores, tum inferiores multis rationibus inducti Tetrabit siue Iudaicam herbam, primam, siue Heracleam Sideritidem esse censuerunt: &c. Eadem verò historia huius plantæ duas proponit figuras p. 119. Vnam quidem habet hoc titulo: Tetrabit, Herba Iudaica, Sideritis prima Fuchsi: alteri titulum fecit, Tetrabit, Sideritis Heraclea Dioscoridis. Et hanc Clusius & Lobelius quoque pictam dederunt, quæ meo iudicio eiusdem plantæ cum Sideritide prima Fuchsi: nec meminit Historia duarum discrepantium Herbariorum Dioscoridis Tetrabit.

Camerarius in Epit. & Hist. germ. Matth. ait se apposuisse Sideritidem vulgarem, propter vires celebrem, tamen glabram & ferratis folijs pinxit, quæ non respondere videtur vulgari, sed potius nostræ Sideritidi cruciatæ, de qua paulò post.

Monspelij florentem obseruauimus mense Iunio, Locus & ac etiam Genevæ & Basileæ quæ itur Moutets, & Tempus, inter portam cineream & lapideam, circa castel-

lum Hermes : Item extra portam Riemerthor. Iunio & Octobri. Montbelgardi copiosè prouenit. Clusius passim in Gallia, Germania, Pannonia, & Austria siccoribus agrorum & siluarum cæduarum marginibus obuam perhibet. Collib. apricis & meridiano Soli obiectis, in promontoriis præcipuè circa Ilfeldam, Vvernigerodam: versus Northulam obseruauit Thalius. Lobelius in maritimis, & montosis Italia, Insuæ, & ad Apenninos montes, Venetiis ad Lio, inque Galliis Narbonensi & Lugdunensi reptantem, strigosamque vel sabulosa arida perpetuò amantem, inque Autumnum perdurantem: Iulio & Iunio florentem.

Vires &
Vius

Iam diu valdè magno emolumento cognita practiciis quibusdam Iudæis & Maranis cursoribus, qui hæc enterocelas & alba menstrua curant. Vehementer exsiccat, nonnihil odora adstrictione insigni, nec ingrato sapore, ad vulnera nata & prorsum tanto Herois nomine digna. Hanc in usum desiccata adseruant thizotomæ mulierculæ: Nam præterquam quod aduersus capitis dolorem, quem Sini fies peer appellant [vnde herba nomen, inquit Clus.] ipsum decocto illius lauari vtile censent, ab aliquo indocto empirico edocta: earundem etiam decocto pedes & alios artus defatigatos, aut alioqui rigentes, vtiliter foueri prædicant. Quidam ad crurum Erysipelata [Belgæ de roose/Germ. die Rôre appellant] curanda, recens collecta & adhuc viuentis decocto, non sine felici successu vsi sunt, crura fouendo, aut decocti fumo leniendo.

SIDERITIS SECUNDA CLVSIO, capitato flore.

Descriptio

Hvmilior priore, neque pedalem excedit altitudinem, in raros diuisa ramulos, foliis priori similibus, mollioribus tamen: flores ampliores albi, pallescente labro, & paucis rubris punctis asperso, verticillatim in vtriculis caulem supremosque ramulos ambientes, breuiorem quàm in iam dicta, & quasi mutilatam spicam efficiunt, vt in Prunella vulgò dicta, auctore Clusio qui Sideritim secundam Pannonicam capitato flore in Hist. Pann. vocat, & Sideritim 2. in post.

Locus.

Nusquam non occurrit in agris, & inter segetes in multis Pannoniæ & Austriæ locis: circa tribuswinkel autem frequentissima. Floret Iulio.

SIDERITIS MONSPESSVLANA.

C A P. XXXIX.

Descriptio.

Sideritidi Monspeffulanæ radix subest crassiuscula lignosa, raris fibris donata: caules à radice mox plures, subinde ramosi, dodrantes, valdè hirsuti, albicantes: folia breuiora, rotundiora, magisque hirsuta, quàm Sideritidis vulgaris, serrata, amara: flores verticillati, forma quidem & magnitudine similes, sed coloris ex luteo albescens, odore est graui. Amaricantem exsiccatemque gustu præditi sunt flosculi, inquit Lobelius, ac nonnihil aromatici suauisque halant, quod Chamædryn aut Betonicam referat.

Synonyma

Lobel. dicitur in Adv. Sideritis Monspelica Scordioides, siue Scordii folio. In Obs. pag. 283.



uit Monspelienfium Schola.

SIDERITIS CLVSIO HISPANICA hirsuta.

C A P. XL.

Longiore est folio quàm Marrubium, satis ad Saluæ folium accedente, minore tamen, querni ferè folii diuisurâ, scabro, villis quibusdam prædito, nec iniucundi gustus, nec odoris: caules fundit quadrangulos, palmum vt plurimum excedentes, interdum procumbentes, duros, hirtos, candicantes, quorum summitates per interualla verticillati orbes coronant, vt in vulgari Sideritide, orbes vasculis constant, in quibus flos prior par, ex candido nonnunquam purpurascens, quo evanescente, semen in vasculis nigricans reperitur: radix dura, lignosa, viuax, auctore descriptore Clusio.

Lobelius in Obs. & in Icon. pl. assumpta Icone Sideritis Hispanicæ Clusii, eandem fecit cum vulgari, vt iam antè annotauimus. Dodonæus etiam proponit iconem Sideritidis Hispanicæ Clusii, quam à vulgari non distinguit. An verò Sideritis vulgaris sit, de qua scribit, iudicent lectores.

C. Bauh. phyt. ait Sideritim suam 3. siue hirsutam alteram esse Sideritim ieracleam Clusii hisp. & Tetrahit herbariorum Lobelii, differreque à vulgari, quòd illa altior: hæc caules habeat procumbentes, magisque hirsutæ candicet. Ego autem ferè dicerem Sideritim hispanicam Clusii eandem esse cum Monspelienfi, nisi Lobelius & Casp. Bauh. eam ab illa separarent. Posteriores hanc rem diligentius perquirent.

An Sideritis 1. Schvvenckfeld?

Nusquam ferè non occurrit hæc arida & petroso solo per Hispaniam, Galliam, Germaniam, floretque Æstate, & quibusdam etiam locis in Autumnum vsque florens spectatur, vt refert Clus. in hisp. Idem in hist. post. ait frequentem occurrere aridis & petrosis Castellæ veteris locis, Æstate florentem, quibusdam etiam locis in Autumnum vsque floribus onustam conspici.

SIDERITIS

& Icon. Plant. pag. 525. Sideritis Monspelica Scordioides floribus luteis, Tragoriganum Prasfoides Francis Pennini. H. Lugd. pag. 1122. Sideritis Monspelienfis Penn. C. Bauh. phyt. Sideritis 5. siue hirsuta Monspelica.

Florentem mense Aprili & Maio vidi prope patibulum Monspelici vbi abundare annota-

Locus & Tempus.

SIDERITIS FLOSCVLIS VIX EX VAS.
culis prominentibus fuscis.

CAP. XLII.

Descriptio



Cubitalis est
plūs minūs
planta, caule
quadrato, hirsu-
to, foliis dona-
to ad articulos
vt in Sideritide
vulgari, aduersis
nequaquam per
marginem. fer-
ratis (in planta
quā habemus)
vncialibus & cle-
cuncialibus hir-
sutis: rami in
quos diuiditur
oppositum ha-
bent situm: per
quos longā se-
rie flores verti-
cillati, pusilli, in-
tra ipsos calyces

propemodum occultati, fusco colore in aeneni, in
sicca, calycibus admodum hirsutis, in quinque a-
cutas in spinulam desinentes sectiones diuisis:
porro vnicuique verticillo bina subiunguntur ad-
uersa folia, multo inferioribus minora, magis to-
mentosa, neruis secundum longitudinem dona-
ta, æquabili marginum circumscriptione ad Ser-
pulum accedentia.

Iconem nostram ex sicca pictor minūs scilicet
ter delineauit.

Clus. in Pannon. p. 600. dicitur Sider. Pann. 3.
In Hist. post. Siderit. 6. Pannon. C. Bauh. phyt.
Sid. 4. siue hirsuta Pannon. Rhizotomis Viennē lib.
mulierculis siue pect. fraud.

Ex plantis Agerij habui Sideritidē Pannonicā
hanc antē nō visam. Frequentissima autem est in
Pannoniæ Austriæque inferioris arctis & inter se-
getes, macro & sterili solo. Floret Iunio & Iulio,
semen subinde maturum etiam Iulio.

Huius vires adscriptæ sunt ex Clusio capite de
Sideritide vulgari.

SIDERITIS QVARTA CLVSII,
ramulis procumbentibus.

CAP. XLIII.

Descriptio

Aliquot habet ramos procumbentes, qua-
drangulos, tenues, villis quibusdā obsitos,
quos per interualla contrario semper situ bina
cingūt folia, vulgari, ferē similia, paulō tamen mi-
nora, a medio ad extremū serrata, nonnihil etiam
villosa: summos ramos verticillatim ambiunt
vascula in quibus flores, prioribus formā similes,
quātum ex delineatione colligere potuit author
Clus. propterea nihil de colore pronunciat, ne-
que de semine, quod superiorum semini par esse
verisimile est: radix non videtur viuax, sed eo
anno, quo planta flores protulit, perire.

SIDERITIS FOLIO ROTVNDIORE.

CAP. XLIV.

Descriptio

Medium caulem habet surrectum, quadran-
gulum: deinde, statim à radice, multos in
latera spargit ramos, humi fufos, quadrangulares,
quibusdā villis pubescentes, geniculatos; quos

bina semper inter se opposita, ad singulos nodos,
amplectuntur folia, præcedentis folii penē simi-
lia, minūs tamen serrata, inter quæ, ab imo ad sū-
mum vique, verticillorum ritu nascuntur in
vasculis flores, superioribus etiam forma similes,
(quorum color, ni fallitur author Clusius, nam in
aruis Belgicæ illam olim obseruasse putat) albus:
nec huius radix viuax esse videtur: Iconē ad Clus.
mittebat Iac. Plateau, eleganter expressam.

An Thalia Sideritis Cordi?

SIDERITIS GLABRA ARVENSIS.

CAP. XLV.



Sideritim vul-
garem refert,
tum caule qua-
drato, tū foliorū
cōsimili positu,
serratis, verū
tum ille, tū hæc
glabra sunt & a-
tro virore splen-
dentia, folia etiā
latiora: florum
verticilli spicam
effigiantes patu-
lo rictu, subiecta
habent singuli
bina: flores ipsi
maiores videntur,
candoris ni-
uei, subinde pi-
lofi, veluti & ca-
lyx: radix sim-
plex, gracilis.

Descriptio

Hæc est illa stirps, quam Tabern. in Hist. Aly-
sum maius: C. Bauh. phyt. Sider. 6. siue aruensem
glabram, flore pallido. Non est autem Sideritis
altera Matth. vt alicui facile co-cesserit C. Bauh.

Montbelgardi obseruavi in aruis inter Ar-
bouans pagum & Audincourt, & eundo ad vi-
tes, florentem Iunio & Iulio ac Augusto: Basilea
etiam frequentem.

Locus & Tempus

SIDERITIS VALERANDI DOVREZ
breui spicā.

CAP. XLVI.



Minimum
digitum
crassitudine
fermē æquat
radix, lignosa,
non sine adna-
tis fibris, Lo-
belio flexuosa,
pulla, amarica-
te gustu, præ-
ficca, nec in-
grata: quæ ex se
innumeras
promit virgas
lignescētes,
dodrantes,
oppositis ra-
mis paulō su-
pra radicē bra-
chiatas, hirsu-
tas, per quas
folia ad jun-
cturas

Descriptio

auras bina oblonga, angusta, per extremum nonnihil ferrata, minora quàm Sideritidis-Fuchsiæ: desinunt autem singuli ramuli in spicas Betonicæ, vel Phalaridis spicarum æmulas, vnciam aut fescunciam ferè longas, pulchris calycibus in quinos aculeos desinentibus, maioribus quàm vel Fuchsiæ, vel Monspeßulanæ Sideritidis, minusque hirsutis dense stipatas, adjacentibus foliis barbatis at ferè spinosis: florum color quis fuerit, non dixerim certò, præsertim cum iam olim à Valerando Dourez reposita planta quam habeo, propemodum exoleuerit.

Sideritis montana Lobel.

Sideritim montanæ (ita namque vocat Lobel. in Aduers. itemque Icon. Plant. pag. 525. persimam exhibens effigiem:) satis bellè quadrare arbitraretur Heracleæ Sideritidi, ni folia angustiora multò essent, vique efficacior carerent. H. Lugd. pag. 1122. inscribit Sideritim montanæ Penæ: Calp. Bauh. phyt. Sideritim 9. siue montanæ.

SIDERITIS GENVS SPINOSIS verticillis.

CAP. XXVI.

Descriptio



Sideridi affinem plantam vocamus, cui caulis est quadratus, hirsutus, & ad singulos nodos verticillatim circumnascuntur flores, Sideritidis vulgaris floribus similes, candidi, hiantes, non ita exerti, calycibus laxis, duris, in quinque lacinias rigidas spinosas, supremam omnium longè maximam, diuisis: unicuique au-

tem verticillo, ab imo ramo ad summum usque fastigium, duo sunt subiecta ex aduerso orta folia, modicà hirsutie obfusa, serrata vt Teucrii, sed nonnihil oblongiora, angustiora. Hanc Cherlerus collegit prope Romam.

SIDERITIS SPINOSA.

CAP. XXVII.

Descriptio

Montbelgardi in horto Ill. E.C. nobis prouenit ex semine, si bene recorder, Cretico, planta, cui nomen dedimus Sideritidis spinosæ, propter quandam cum vulgari Sideritide similitudinem. Est autem hæc vulgaris foliis vnciam longioribus, in acumen desinentibus, hirsutis, candicantibus, sibi que oppositis: caulibus aliquot dodrantalibus, ramis itidem contrario naturæ vinculo ornatis, in spinas desinentibus non

admodum rigidas, etiam hirsutis: plantæ notellæ radix pedalis, simplex, exiguis fibris conspicua.

An Gaidarothymo Belli in epistola ad Clusium? An Clus. Stachys spinosa?

PRVNELLA FLORE MINORE, vulgaris.

CAP. XXVIII.



EX repetitâ Descriptione censuèst & hæc, quæ subinde à caulium angulorum, subhirsutorum, purpurascens, geniculis, demissis fibris radicatur: folia ferè bina, ad articulos opposita, nonnihil rubentia, hirsuta, Origani vulgaris, sapore nonnihil viscido, subdulci, subamaro: flores verticillati, duobus semper hirsutis

rubentibus subiectis foliis, spicam deformant; quorum singuli colore ex caruleo purpurascens, Lamii floribus non ab similes, ex calyce hirsuto purpurascens prodeunt cucullati.

Ex Solidaginum genere Brunellam esse autem Solidag. etor est Brunfelsius, vnam ex primis herbis verno tempore germinantium, foliis Ozimo similibus, coloris herbacei, cum quodam acumine: flore quadantenus Stæchadis Arabicæ, coloris violacei. Hæc ille qui suâ figurâ non laudabili & descriptione denotat Prunellam, de qua hîc agimus, verum dum vernam facit plantam, cum ea confundere videtur Consolidam mediam.

Hallucinantur Matthioli iudicio, qui Symphytum petraum putant hanc esse plantam, quam is cum officinis Consolidam & Solidaginem minorem vocat, & Prunellam, germanico nomine (vt ait in Hist. germ.) ex latîno deriuat, vel à morbo linguæ, dicto Breûne, aut à florum colore Braune. Camer. apud Matthiolum refert herbam hanc describi in lib. de Dynamidiis, falsò Galenò adscripto: Quin & Herb. ant. Io. Cubæ de Prunella citat Hippocratem & Dioscoridem, neuter tamen indicat quomodo nominarint.

C. Bauh. phyt. vocat Brunellam i. siue maiorem folio non dissecto, flore communiter purpureo, vel caruleo punicante: aliquando ex diluto albo: caule glabro aliis, aliis ac rectis hirsuto: foliis etiam aliquando integris, aliquando leuiter crenatis. Clusius Prunellam vulgarem foliis subrotundis. Trag. Prunellam 6. flore minore, Prunellam vulgarem. Lobel. in Adv. Prunellam & Consolidam minorem: In Obs. p. 251. Brunellam, Symphytum petraum: In Icon. Plant. p. 474. Symphytum petraum & Consolidam minorem Matth. Cast. Durant. Consolidam minimam. Quidâ Polynemon Dioscoridis: Valer. Dourez Peristertio Præpositi: Guiland. Britannicam.

Cæterum

Nomina
leguar.

Ceterum vulgus Medicorum & Herbariorum; Prunellam aut Brunellam: Germ. Braunellin/ & Gottsheil ab efficacia insigni: nobilis enim est vulneraria: Belg. Bruynelle: Galli, Herbe au Charpentier: Itali Consolida minore, Morellam, & Herbam Moram: Boh. Czernohlavet: Hung. Teuz siu.

Vires

Prunellam flore minore purpureo Argentinae & Basilea, quâ itur Moutets, florentem observari Octobri; ad fluvium Birsâ intra urbem, & circa montem propè Krentzach, & in monte Leurach, itémque Montbelgardi passim in pratis Iunio, Iulio & Augusto; Lugd. & Monspelij Maio: Genevâ sparsim virentem Februarij principio.

Locus &
Tempus.

Brunellam more reliquarum Solidaginum, omnibus ferè cognitam aut Brunellâque ob eximiam eius virtutem: esse in cõmodis faucium & linguar atque gutturis accommodatissimam, ardorem eorum extinguendo, quem Germani die Breune vocant, si ex illius decocto, aut aqua distillata colluantur & gargazentur: Aquam [succum aliq], jeni acetæ & oleo rosato mixtam, vehementes capitis dolores sedare, si ex ea tempora inungantur: Huic mixturæ autem posse & aquam rosatam addi. Aphthas & oris ulcera sanare, fauciumque vitia succum eiusdem, addit Fuchsius, qui herbam calidam & siccam esse, ex gustu concludit: Laudatur Prunella ad vulnera sclopetorum in potione & lotionel succus cum vino sumptus ad morsus venenatorum. Sal eius ut fiat, docet Quercin pharm. rest.

Prunella flore magno, folio non laciniato.

Descriptio



Habet caulem quadrangulū molliter hirsutum, geniculatum: folia in singulis geniculis bina, ex aduerso sita, nonnihil villosa, vulgaris Prunellæ foliis ferè respondentia, gustu amaricante: capitula in summis caulibus crassiora, quâ in vulgari: flores illius floribus forma

quidem similes, sed longè maiores, nec ingrati odoris, ventre laxiore, galeaque saturatiùs plerumque purpurascens, tametsi inveniuntur aliquando dilutiores, & quasi exalbidi, interdum etiam subcinerei coloris: semina in singulis vasculis, ut plurimum quaterna: radicem nigram: multis crassiusculis & candicantibus fibris præditam, nonisq; propaginibus sese, annis singulis, argentem.

Locus

Quamvis Fuchsiana nostra figura videatur differre à Clusij Prunella, siue non vulgari, eiusdem tamen plantæ existimamus, ac propterea eius descriptioni hîc adiunximus. Nec etiam à Clusiana icone separamus Prunellam tertiam Tabernamontani, quamvis eius compilator suo more nihil distinctè scribat.

Locus

Eadem quoque est Prunella 6. Tragi, siue v. Tom. III.

ra, pulcherrimo, magno & purpureo flore, foliis Menthastrum imitantibus.

Tempus.

Eam primùm in Vngaria & Austria, deinde etiam multis aliis Europæ prouinciis nascentem inueniebat Clusius, editioribus & gramineis locis, minùs tamen vberem & luxuriantem, quàm quæ in Austria crescit. Floret Iunio, Iulio & Augusto, & subinde semen profert. Circa Montbelgardum copiosè luxuriat.

Prunella flore magno albo, folio laciniato.

Tota planta vix quatuor digitos excedit, foliis superioribus admodum dissectis, hirsutis, flore magno albo, alioquin vulgari similis.

Descriptio

C. Bauh. phyt. Prunella 5. siue minima alba, An Prunella 7. siue candida altera Tragi: Montbelgardi prope Arbouans & in planitie provenit quâ itur Adincourt, in agris ad Dubim: Genevâ circa Rhodanum versus la Bastie.

Locus

Prunella laciniata, flore magno purpureo.

Descriptio



Caule est palmari, hirsuto, cuius singulas iuncturas ornant bina ex aduerso posita folia, inferiora quidè vnciali pediculo nixa, superiora proportionem minori, tandem etiâ nullo, vnciam & fescuciâ ferè longas, subhirsuta, in aduersas lacinias dissecta: flores inter spicæ vncialis squamata folia

subrubentia, emicant magni, tres vnciæ quadrantes æquantes, hiatus patulo stamina emittentes, purpurascens.

Observata Prunella hæc, folio etiam non laciniato, flore maiori purpureo, Montbelgardi iuxta hortum Ill. E. C. florens Iulio & Augusto: item à la Chau vbi Vites, & inter pontem Vauiaucourt à Dampierre.

Varietas
Locus &
tempus.

Prunella flore albo paruo, folio laciniato.



Offeret nobis à D. Thoma Platero, Medico insigni, elegantiq; Ei folia erant multa à radice fibrosa, ex longis pediculis, quædâ palmaria, oblonga, vnciâ digiti angustiora, pilosa, ultra medium caulis pedalis duo, magnis laciniis dissecta, cornu ceruinum repræsentantia, iteq;

Descriptio

Aaa

alia duo iuxta florum caput vnciam & semis longum, latum vnam, paucioribus laciniiis prædita: flores inter squamas conspiciuntur hiantes, albi, & nonnunquam rubelli, mediocriter eminentes.

Synon.

Lobel. in Obs. p. 251. in Ic. Plant. p. 475. effigiem nostrā pinxit pro Symphyto petræo: Dod. lat. in fol. pro Brunellæ altera iconē. Quamuis autem nostra descriptio non in omnibus conueniat cum figura hac nostra ex Lobelio desumpta, eandem tamen plantam putamus, quam cum pingendam curauimus, non erat nobis ad manum Plateriana.

Compiler Tabern. Prunellæ suæ albæ secundæ ineptam descriptionem subnectit in Historia. Casp. Bauh. phyt. dicitur Prunella 3. siue minor folio laciniato, aliquando non solum superiori, sed & inferiori. Clusio dicitur Prunella 2. non vulgaris.

Gaudere autem herbosis & gramineis locis, itemque aliis, quæ à fluminibus nonnunquam mundantur, saxosis, testis est idem Clusius. Floret maturius Prunellâ flore magno, nempe Maio, tamen etiam Ianio. Obseruauimus autem Montpelii & Geneuæ.

PRVNELLA ANGVSTIFOLIA.

CAP. L.

Descriptio



Nostræ vulgaris notitia Prunellæ similis caulis, drontalis, angulosus, nonnihil rubescit, pilis hirsutus, sicuti & folia ex geniculis aduerso situ nata, sextantalia aut etiam quadrantalia, culmo latiora, ex quorum alis alia suboriuntur vt longitudine, ita & latitudine multum illis cedentia: flores in spicam digesti rubescunt,

forma & magnitudine Prunellæ vulgaris. Talis est quæ à Genere nostro Cherlero nobis delata ex Gallia Narbonensi: quæ verò à D. Thoma Platero communicata, angustifolia etiam, minor fuit, quatuor & quinque vnciarum, satis aspera & rigida, sapore nullo insigni: radice fibrosâ, crassiuscula, nonnihil amarescens: floribus maiusculis.

C. Bauh. in phyt. vocat Brunellam 2. siue minorem folio rigido integro: floribus obscurè purpurascens. Huic figuram Prunellæ albæ 2. apud Tabern. satis conuenire diceret, si folia essent media parte angustiora, & etiam longiora.

PRVNELLA ITALICA.

CAP. LI.

Descriptio

Plantula hæc palmaris, caule rotundo, striato, leuiter hirsuto, foliis paucis profunde in

aliquot lacinias diuisis cincto, quorum inferiora minora, & in ternas lacinias diuisa sunt, flores habet in summo, tanquam ex spica [quam foliola etiam laciniata cingunt] prodeuntes galericulatos, ex purpura nigricantes, rarius enim infra spicam flores profert: radix exilis, nigricans.

Casp. Bauh. descriptionis author vocat in phyt. Brunellam 6. siue Italicam, testaturque Vlysses Adroandum Bononiensem Botanicum Euphrasie speciem facere.

Romæ in monte Testaceo & etiam in via Romana reperiri scribit author.

Locus

CONSOLIDA MEDIA, QVIBVSDAM Bugula.

CAP. LII.



Quadrato, Cinani, hirsuto, & aliquantulum cyaneo assurgit caule: foliis Anagallidis aquaticæ maioris, nonnihil serratis, binis oppositis, per intervalla nascentibus, colore vel violaceo, vel purpurascēte, vel virente, sapore primo occursu subdulci, mox amarescente & adstringente, inferioribus ex satis longis pediculis, ad Bellidem accedentibus: clematibus longè se spargentibus: flores ex foliorum alis calyci insident sessili, breui, hirsuto, cyaneo, quinquepartito, carulei variati, labello Orchidis alicuius similes, in quatuor segmenta, duolateralia productiora, inferiora totidem, minus alta, sed

magis lata, abeuntes, nullâ galeâ, alisue vt Orchides & Lamia: apicibus & stylo cyaneis: sapore melleo, si caudicellam, qua calyci hæret, suxeris: radix tenuis, fibrosa, maiore adstrictione, quam folia, gustum mouet.

Duas has Fuchianas icones exhibemus non quod eiusdem planta esse ignoremus, sed quod huius herbæ frequentem demonstrant varietatem

tem & naturæ lusum.

Consolida media C. Bauh. Prunellam vocat Tragus, eîusque, aliquot recenset & describit species. C. Bauh. phyt. vocat consolidam mediam 1. 5. & apud Matth. siue cæruleam pratensem, Consol. mediam Brunfels. fol. p. 95. Tom. 1. Rhaps. 14. & in 4. p. 153. cæruleam vel priorem Tragi sine iconē, Chamæcisson spicatam Plinij, eîusdemque Anonymon aliorum: flore communiter cæruleo, aliquando albo, cinereo: foliis vel solum leuiter incis, vel sinuatis, lationibus, angustioribus: Item Consolidam mediam tertiam siue purpuream pratensem; Brunellam purpuream vel 4. Tragi, Consol. med. purp. Fuchsi. Consolida mediam i. e. Symphytum, inquit, in Ad. Lobel. Chirurghi vocarunt, seu Solidaginem & Bugulam. Is verò in Obs. & Ic. Plant. Prunellam & Herbam sacram Cordi vocat.

Bugula Dod. Dod. gall. & lat. in fol. pingit & describit sub Bugula. Inter appellatas, ait, Solidagines siue Consolidas à recentioribus numeratur: Consolidas à quibusdam horum dicitur, officinis nostratibus Bugula. Ruellius Buglum nominari à Gallis refert. Sunt qui existiment Symphyti illud genus esse, quod à Dioscoride *πρωτόν* cognominatur. Verum hi non parum falluntur. Symphytum siquidem petrarum ramulos tenues habet Origani similes: capitula verò veluti Thymi, & totum lignosum & odoratum est, at talis quidem non est Bugula, quæ nec lignosa, nec odorata, & caules promit differentes ab Origani, & capitula nequaquam habet Thymi æmula. Hæc Dodonæus, qui eius duntaxat Bugulæ meminit, quæ floribus est cæruleis.

Haud statuendum censet etiam Matthiolus Symphytum petrarum eam esse herbam, cuius folia aversa à parte purpurascent, quæ ab Herbariis vulgò Consolidas media nuncupatur, ab aliquibus verò Laurentina, & à Senensibus Morandula. Cæterum, rectius fortè Prunellam à Germanis dici posse putat à foliorum colore, indictam Græcis & Mauritanis. Is olim in prior. comm. contentus fuit solâ figurâ minùs exactâ, sed in post. edit. breuem addidit delineationem, in qua non meminit saporis, nec clematum, quæ nostræ duæ figuræ vnius plantæ expriment, quarum vna sufficeret, si non plantæ huius lusum aliquem naturæ ob oculos ponerent.

Consol. med. multis. Camerarius etiam ad suam Hist. germ. & Epit. Matthioli longè diuersam posuit iconem siue clematibus: Quin & Tabern. huius Consolidæ mediæ duas effigies dedit, quarum prima flore cæruleo, siue clematibus non placet: secunda, quam priori similem ait, sed foliis maioribus, hirsutioribus, minùs serratis, Verbasco maiori similibus, an bona sit, te iudicem expectamus.

Herba sacra. Nomina linguarum. Quam cum aliis, etiam Fuch. Cast. Durantes & Thalus Consolidam mediam dicunt, Lonic. Prunellam & Symphytum medium vocat, Anguill. epist. 13. Arteticam Pandectarum, H. Lugd. p. 1309. Chamæcissum quorundam, Cæsalp. Chamæcissi alterum genus, Gesn. in cat. pl. Verbenacam supinam, Herbam sacram, & *heg. cordium*: German. Guntzel / gulden Guntzell / Belg. Senigroen / Ingroen / Galli *Consolide*, quidam Bugle moyenne: Quercetanus in Sclopet. *Consyre moyenne*, & cum nonnullis *Sophie*: Itali, vt antè diximus, Morandula, *Consolida Mezzana*, & Herba, Lorenza & Laurentina: Boh. Sualnyf prostriduy.

Tom. III.

Saxosis, non rarò quoque humidiorib. pratis: apricis & apertis vineis, quàm opacis locis gignitur: translata ad hortos luxuriat: compluribus regionibus familiaris, Aprili, sed copiosè Maio ac posteriùs florens. Patauij virentem memini in quodam horto Ianuario: Basileæ in vineis propè Moutets ad montē flore purpureo Octobri: Montbelgardi flore albo in horto Illust. E. C.

Locus & tempus.

Aquam Prunellæ scribit Tragus (sic enim Bugulam vocat, vna cum ea quæ aliis vulgò Brunella dicitur): internis corporis affectionibus mederi, doloresque ex calida intemperie profectos sedare: eadem omnia tam inueterata quàm recetia vulnera mundari & sanari comodè posse, maxime tum quando ardor siue inflammatio aliqua illis accesserit. Eandem hodie ardori gula & exulcerationi oris, fauciumque vitijs, quam Germani die breuite appellant, duntaxat adhiberi remedio sanè præstantissimo, si gargaretur, adiecto paulillo mellis rosati: flores, vel folia, vino, vel melle decocta (pro ratione ægritudinis) oris & faucium commemoratis vitijs subuenire. Hæc ille tam de Prunella vulgò dicta, quàm de Bugula, de qua sermo, coniungim. Fuchsius verò priuatim Bugulæ has vires attribuit: Vulnera glutinat, sanguinis grumos ex casu, vel cõtusionib. coactos in corpore difficit & dissoluit, præsens remedium est aphitis & vlcerebus in ore serpentibus, decoctum huius tumoribus illitum, eos dissipat: vsus etiam eius ad intertrigines, & ad vlcera pudendorum & intestinorum exulcerationes prædest. At Matthiolus, tametsi nec hanc, nec Prunellam recentioribus dictam, veteribus siue Græcis, siue Mauritanis cognitam fuisse existimet, eas tamen refert mirum in modum existimari viles disruptis, fractisque internis, & externis corporis partibus: idcirco vtiliter dari potandas ab alto deuolutis, ac etiam iis, qui interna intestinave vulnera acceperint: namque illa, mirificè sanare tradidère nonnulli, qui rerum experimenta profitentur, Consolidam mediam vocatam potu sanguinis grumos in ventriculo, vel in alia corporis parte concretos difficere & dissoluere: illita verò folia, vel eorum succum efficax medicamentum esse prædicant vlcerebus in ore manantibus exedentibusque, ac etiam testium, pudendorumque virilium & muliebrium. Addit Camerarius contra icterum prodesse, & infarctus iecoris & lienis expedire, viinas mouere, succum ad aphthas & putrescentia oris vlcera vsurpari: quibus subscribit Lobelius, nisi quod regio morbo & ictero nigro mederi docet, vesicâ felleâ, hepate & liene ab obstructione liberis. Camerario tamen ad stipulatur Dodonæus ad iocinoris languores scribens mederi, nam præterquam quod obstructions aperiat, viscera etiam ipsa roborare. Calidi verò temperamenti admodum exigui particeps est: resiccat manifestè cum nonnulla adstrictione. Quare commendatur ad disrupta, fracta, conuulsa, cæcæque: idcirco & potionibus vulnerariis additur, in quibus tanta eius facultas commendatur, vt sanguinem concretum soluere ac discutere valeat. Ruellius tandem in Gallia vulgò dici refert, eum vulnerario Medico, aut Chirurghi operâ non egere, qui Bugulam & Saniculam habuerit: nec enim sumptam tantummodò vulneribus mederi, sed & ipsis foris impositam.

Vires & vsus.

Aaa 2

Consolida media Geneuensis.

Descriptio.



Locus & Tempus.

Genevæ virebant Martio, vbi etiam quidam florebant & April. alba quidem rarior, circa Nofodochium in prato dictum *la coul.*

Consolida media carulea Alpina.

Descriptio.



angusti sunt, trium transversorum digitorum longi, per ambitum incisi, leuiter hirsuti, sursum spectantes, cingunt: flores galericulati, carulei (in caulis summitate flores tanquam in spica carulei, in phyt.) è quorum medio filamenta quædam prodeunt, in cacumine quasi spica congesti sunt, inquit descriptionis author Casp. Bauhinus, qui Consolidam mediam [secundam in phyt. sextam apud Matth.] siue caruleam alpinam vocat. Cæterum, figura à Camerario apud Matthiolum in Hist. germ. & Epit. exhibita, similia quædam habet cum Consolida hac à Fratre C. Bauhino hic proposita: nosdamus effigiem à Fratre pictam, & iuxta eam, quæ ab eo nobis communicata. Videtur autem fratris Consolida in eo à Geneuensi differre, quod minùs hirsuta, & folia per caules longiora, & magis, ordinatiusque serrata.

In monte Italiæ Baldo pronenit.

A Vulgari antè scripta nobis hæc diuersa videtur, caules siquidem habet ab vna radice plures, hirsutiores: folia etiam minora, oblongiora, & superiora profundius crenata: flores modò purpureos, modò rubellos, modò albos: an clemata habeat non obseruauimus.

An Prunella quædam Trago?

Genevæ vire-

EUPHRASIA.

CAP. LIII.



Descriptio

PAlmaris plantula est, tenuibus, sebhirsutis virgulis surgens: folia denticulata Chamædryos, sed triplo maiora, crispata & auersa parte hirsuta, bina ex aduerso posita, sapore pingui & subamaro: ex quorum alis flosculi emicant pulchelli, lactei, purpurantibus striis picti, aspersa nonnulla flau-

uedine, labello in tres bifidas lacinias diuiso, superiore folio sursum reflexo, tripartito: radix tenuis, lignosa.

Cum Euphrasia hac eandem statuo, quam Tragus Euphrasiam titulo pingit, quamque Euphrasiam alteram, nobilem, & Argentinensium cognominat, licet ille diuersam à vulgari faciat, semperque omnium præstantissimam iudicet.

Lobelius huius effigiem exhibet sub inscriptione in Obs. pag. 261. Euphrasiam Aduers. pag. 210. In Ic. Plant. pag. 496. pro Euphrasia, siue Euphrosine oculari. Brunfels. Eufragia alba: Schv. Euphrasia candida: Casp. Bauh. phyt. Euphrasia siue officinarum: H. Lugd. pag. 167. Eufra-
Matthioli.

Cæterum, Euphrasia nomen græcam sapit originem, inquit Dalechampius: videtur namque *εὐφροσύνη* appellata fuisse, quia oculos iuuat & delectet, quam vocem imperiti linguæ græcæ deprauantes, in Euphrasiam verterunt, eamque sic corruptam officinæ & plurimi alii retinuerunt. Alii quoque Eufrasiam & Eufragiam. Etsi autem græco & eleganti donata fuisse videatur Dalechampio hæc herbula nomine, nihil tamen de ea, quod sciam, apud veteres Græcos & Latinos, nempe Dioscoridem, Galenum, & Plinium, addere etiam apud recentiores, Actium Paulum, & Actuarium scriptum reperitur: sed à ducentis tantum vel paulò plùs annis posteritati Euphrasie nomine innotuit, ad oculorum caligines & morbos pituitosos peruagata commendationis. Unde Germanis Augentrost, hoc est, Oculorum solamen, siue solatium, ab effectu, dicta fuit, nonnullis hæc quoque ratione motis, Ocularis, Ocularia, Ophthalmica [*ὀφθαλμική*] Oculorum lumen, *ὀφθαλμοδουσία*, & Anguill. teste Luminella, Germ. Augendiens / weisse leuchte / tagleuchte, & weissen leuchte. Belgæ Ooghen trost: Galli Eufraise, & Eufrase: It. & Hisp. Eufragia, & Eufrasina: Angli Eycricht: Boh. Ambrozfa: Hung. Eufrasia. Non est igitur quod posteriores *εὐφροσύνη*, Euphrosynen nominent. Aliud siquidem est *εὐφροσύνη*, ipsum videlicet Buglossum. Eur. Cordus putat esse Adhil Arabum, de qua tamen Neoterici

Euphrasia Dalech.

Descriptio

varias

varias habent sententias, aliis Euphrasiam Cassi-
laginem esse putantibus, aliis Herbam Verulam
interpretantib. Vide Nicol. & Manliū de confect.

Locus. Nascitur locus herbosus, non omnino aridis,
Tempus sed nonnihil humentibus & pinguibus, sed in-
cultis, ut pratis, secus agrorum margines & vias,
nec raro in ipsis quoque viis passim, ut vel hac
ratione facile agnosci queat. Floret autem Æstate
& Autumno: colligitur Augusto ac Septem-
bri potissimum, totaque resiccata deinde reponi-
tur.

Vires & Vitis Euphrasie inflammationibus, & caligini oculo-
rum adhibentur, tussæ ac impostæ, aut succo
eius oculis indito: præstat tamen aqua ex illis di-
stillata aduersus affectiones prædictas vii. Ego
certè, inquit Tragus, Argentinensem Euphra-
siam morbo arquato vtilissimam comperi, vino
decoctam, ac calidam ægro propinatam. Memo-
riam etiam, teste Fuchio, oculorumque aciem
reducta in puluerem, & in vino albo pota, miti-
ficè roborat, amissamque reparat. Dari ad prædi-
ctos affectus commodissime scribit Dodonæus
in puluerem tritam: addique non raro Fœniculi
semen pari pondere & nonnihil Macis, & saccha-
ri tantum, quantum est omnium simul pondus:
huius mixturæ cochlear aut per se, vel cū exiguo
vino exhiberi manè corpore jejuno, & quidem
per continuos non modò dies, sed & menses
quandoque posse & solam, & quouis modo al-
sumptam, videndi potentiam conseruare, adau-
gere, debilem ac deprauatā restituere. Euphrasiam
per se solam masticando, & in ore tenendo, ac
postea deglutendo expertus est Arnoldus mira-
bile iuramentum. Idem auctor est fieri & ex Eu-
phrasia vinum vindemiæ tempore, cuius vsu senum
etiam oculi rejuuenescere feruntur, auferrique
omne oculorum impedimentum, visusque defe-
ctionem, præsertim pituita, crudisque humo-
ribus redundantibus. Dum autem effervescent mu-
stum, Euphrasiam inijcienda. Calida autem & sicca
est herba, sed tamen magis sicca quàm calida.

EUPHRASIA PARVA PURPUREA.

Descriptio. Tota palmarem non assequitur altitudinem,
coliculo aliàs singulari, tereti, hirsuto, aliàs à
radice statim duobus minoribus spicâ vnciali aut
longiore summo ornante, flosculis stipata pur-
purascentibus, alternante cum foliis imbricatis
sitis, cuiusmodi & alia foliola circa imam caulem
conspiciuntur, sed supernis latiora summo tenus,
serratim secta, pro radicibus sunt multifidæ; du-
riusculæ, pili instar tenues fibræ: secundam Do-
donæus fecit, inquit Lobelius in Obs. pag. 22. qui
postea p. 261. eam pro Euphrasia 2. Dodonæi (sic
etiam in Icon. Plant. pag. 496. inscripsit) sine Cra-
tagono altero quorundam pinxit.

Describitur bis apud H. Lugd. binisque iconi-
bus exprimitur, priori p. 1121. pro Sideritide præ-
tensi rubra: posteriori p. 1167. pro Euphrasia secun-
da Dodonæi, quæ icon. melior.

C. Bauh. phyt. vocat Euphrasiam 2. siue prætea-
sem rubram: Thal. Ericoides rubrum, vulgò Tri-
ticum leporinum.

Montbelgardi abundat in agtis florens Julio,
Augusto, & Septembri. Huius varietatem flore
niueo, totamque candidiorem reperi Septembri
inter Villarluxel & Grammont in Burgundia.

De temperamento, aut facultatibus aliis nihil
attulit Dodonæus.

Tem. III.

CORIS MONSPESSVLANA LVTEA.

CAP. LIV.



Simplex & Descrip.
Sigmoides est
radix caulis
singularis cu-
bitalis, ligno-
sus, teres, ramis
aduersis diui-
sus, duris, li-
gnosis: folia
inferiora qui-
dem Hyssopi
foliis similia,
utrunque an-
gustiora, acu-
minata, caduca,
superiora verò
tenuia, Ericæ
arborescentis
æmula: ramuli
longas gestant
spicas hiantium
flosculorum

luteorum, cum multis apicibus, flosculis singulis
subiectum foliolum, sapor acris cum amarore:
Folia & caules interdum omnino rubent.

An Cæsalpino Crista altera ad Euphrasiam
reducenda? An Lobel. in Adu. Sidentis odora
pusilla? Thallio dicitur Ericoides luteus pro Cori
ostensum: H. Lugd. pag. 1121. Sideritis prætea-
sis lutea: Camer. hort. Euphrasia flore luteo, à
Lobelio descripta; item apud Thal. Euphrasia lu-
tea Dodonæi: C. Bauh. phyt. Euphrasia 3. siue
præteensis lutea.

Monspessuli mense Augusto floret in monte
prope Castelnou loco sicco & saxoso, tota rubel-
la: Basilea lutea in monte Marchionatus prope
Leurach Augusto: Frater etiam in pratis proue-
nire ait.

Locus & Tempus.

SYMPHYTUM PETRÆVM veteribus.

CAP. LV.

Symphytum petræum nascitur in petris: ramu-
los habet Origano similes, tenues, capitula
veluti Thymus [καρπία δὲ ἔχει ὅμοια ὀρίανος, λέπτα,
φυλλα: ita κεφάλια δὲ ὡς θυμῶν: & ita legit Orib. iteq;
vulg. Sed Sarr. ex Ald. addit post καρπία vocē, φύλλα
cod. ut lectio sit, ramulos Origano similes, tenuia
folia, capitula verò, &c. Matth. cōtra legēdū suspi-
catur, καρπία δὲ καὶ φύλλα ὡς θυμῶν, hoc est, capita &
folia Thymi: Anguill. tandem legendum vult,
φύλλα καὶ κεφάλια: nos communem sequimur, quam
etiam Ruell. & Marcell. approbant.] Totum verò
lignosum, odoratū & gustu dulce est, saluamque
ciens [πύλον περὶ σκληρῶν. Sic & Plin. & Apuleius.
Et hac certè ratione ἀδύλον esse crediderit Sarrac.
attamen pro iis vocibus apud Orib. legitur σ-
πικόν, quæ lectio Matthiolo in prior. comm. pro-
batur, in post. tamen lectionem Dioscoridis, non
Oribasii retinet:] radice nititur longâ, subfultâ
[καρπία φέρει, Orib. καρπία φέρει, Plin. rutilam descri-
bit, Apuleius fuluam:] digitali ferè crassitudine.
Decoctum in aqua mulsa & potum, quæ pulmōni

**Disce lectio
varie illud
strata.**

Aaa 3

harent excrementa repurgant: sanguinem reu-
ciētibz ac nephriticis cum aqua exhibetur. Bi-
bitur & ad dysenteriam, rubentemque fluorem
muliebrem in vino decoctum, vti ad conuulsa,
ruptaque cum aceto mulso. Quin & comman-
ducatum sitim sedat: faucibus asperis subuenit,
illitum recentia vulnera glutinat, & enterocelas
cohibet. Quin & carnes, dum coquuntur, con-
glutinat additum.

*Symphyton
petraeom cō-
trarius; Si-
ribus Ga-
lena.*

Symphyton petraeom ex contrariis constare
viribus lib. 8. simpl. dixit Galenus: habet liqui-
dem siccandi vim quampiam, quā collectum in
thorace pulmoneque pus expurgare potest: ha-
betque etiam quandam contrahendi vim, quā
eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia insu-
per inest humiditas quaedam non immodicē ca-
lida, per quam gustantibus dulce apparet, & odo-
ratu iucundum. Mansum sitim extinguit, & arte-
riae asperitates sanat.

Hermol. coroll. 618. proponit descriptionem
Symphyti petraei ex Plinio, quasi propria esset:
addens Venetos Cotoneam appellare ex Plinio:
rosae radicis, alibi albae, alibi nigrae. Hic notan-
dum Hermolaum in prima edit. Ital. & in Colo-
niensi legere, rosae, vbi Plinius noster habet
rare.

Cornarius, qui & ipse rare legit, in comm.
med. in Galeni librum 1. caput 5. τὸν κατὰ τόπον,
ab ipso scriptis per Cydoniam herbam Alum &
Symphytum petraeum intelligit, eod quodd Plinius
Cotoneam appellare Venetos Alum prodid-
isset.

Ceterum Symphyti, Solidaginis & Consolidae
nomina plurimae habent plantae. Symphyt. pe-
traeum Matth. Coris caerulea Monspessulana.
Coris lutea Monspessulana. Gypsophyton.
Saxifraga maior Matth. Symph. petraeum Cor-
di. Trachelium minus. Trachel. album. Hys-
sop. vulgare. Polium vulgare montanum. Sa-
nicula. Prunella. Consol. media. Virga
aurea. Centaurium. Flos Solis. Bellis maior.
Symphytum magnum: Radice tuberosa. Pu-
milum repens. Pulmon. Italica. Coralloides.
Helenium. Nicotiana. Tragus verus. Gly-
cyrrhiza.

CORIS MONSPESSVLANA, purpurea.

CAP. LVI.

Descriptio **M**onspessulanae Coris appellatur concinna
planta, quae ex radice crassa, lignosa, nigri-
cante, quamplurimas per terram sparsas emittit
virgulas, vt vix vtraque manu coactas omnes
possis interdum complecti, palmares aut bipal-
mares, tenues, rubentes: per quas folia den-
sissima, Thymi foliis quodammodo similia, sed
longiora, aequabili vsque latitudine, & Thymi
foliis minus nigra, summae virgulae spicas susti-
nent vncias circiter duas longas, Thymi vulgaris
vel Serpylli, crassiores, confertissimis floribus sti-
patas, immortali purpurā caeruleae ariditibus,
hiantibus, è quatuor foliis compositis, bifidis
omnibus: quibus succedunt calyces parui, in
aculeos exeuntes, semen continentes paruum,
nigrum: nullum ego in vlla parte plantae, siue
odorem, siue saporem manifestum sentio.

Coridis huius Monspeliensis figuram de meis



plantis siccis
Gesnero com-
municatam,
apposuit Ca-
merarius in E-
pit. capiti
Symphyti pe-
traei Matthio-
li, itemque a-
pud Matth. in
Hist. germ. v-
bi Symphytū
petraeum, Cō-
solidam pe-
traeam, & Alū
Plinii cogno-
minat, germ.
Steingūnsel.
Mompellia-
ni referente
Clusio Corim
hanc quorun-
dam, Gallo-
rum

sc. & Hispanorum [sic namque is inscribit] eam
esse existimabant quam Graeci καὶ τοῦ καὶ καὶ
appellant, cuius sanè descriptioni multis notis res-
pondere credit.

Lobelius [qui in Obs. pag. 220. itemque Ic.
Plant. p. 402. figuram Clusii habet, ac aliam ex Ad-
uersariis] Corim suam Mompeliacam, nisi aptissi-
mè quadraret, Ericam minimam putasset, aut me-
diae cuiusdam inter Hypericum & Aiugam na-
turae. Iam non aliò quàm ad Corim referri arbi-
tratur, posseque nos adducere ad Symphyti per-
suasione, verum morosis non omnia penitus
quadrare videri. An autem Coris Dioscoridis sit,
vt voluit Lobelius, affirmare nondum ausim, nec
etiam Symphytum petraeum asseruerim.

Coridem Mompeliacam, vt Tabern. quoque
inscribit, vocat germ. Erdiffer von Mompelien.
C. Bauh. phyt. Corim 3. siue caeruleam maritimam
cum Symphyto petraeo Matthioli, excepta radice
lignosiore, optimè conuenientem. Apud Mat-
thiolum Frater longè alterius est opinionis: ait
enim Symphytum Matthioli minimè cum Co-
ride caerulea maritima confundendum esse, siqui-
dem Coris amara sit: flores purpureo caerulei ra-
rius purpurei. Coridis quin potius à Dioscoride
& Plinio propositae notas plures habere credi-
dit.

Florentem copiosè vidi Monspelij apud littus Locus &
maris, Vere, itémque Venetiis: C. Bauh. ad mon- Tempus
tis Ceti radices, Maio. Floret Maio, inquit Clu-
sius, nonnunquam etiam Martio mense, siccis
quibusdam circa Salmanticam & Mompelium
locis maritimis, item Valentinae & Galliae Nar-
bonensis, vbi tota maior, crassior & succulentior
nascitur, vt ferè solent omnes maritimae stirpes, si
cum eis, quae macro & arido solo proueniunt,
comparentur.

GRATIOLA.

CAP. LVII.

Vertim luxuriant huius radices, pennae anse-
rinae crassitudine, oblique reptantes, albae,
crebris geniculis nodosae, à quibus plurimae de-
mittuntur fibrae, albae: caules plures dodrantes
surgunt, teretes, propter terrā rubentes, superius
ex albidis

Matth.
proh.

Lymn.
Corda.

Gratiol.

Gratiol.
citraur.
Varieta.
C. Bauh.

Locus
Tempus



sex albedo vire-
fctes, creber-
rimis genicu-
lis distincti, ad
quorum sin-
gula folia bina
Saponariae mi-
nora, nonnihil
in ambitu cre-
nata, nascun-
tur, & ex eoru
alis, modò sur-
culi foliis Hyf-
sopi minimè
crenatis dona-
ti, modò flores
singulares,
striati, oblon-
gi, colore quà
pediculo se-
minali & lō-
giori commit-

tuntur subflauo, per reliqua albo, excepto folio,
ex quatuor quæ habet, supremo sursum reflexo,
quod interna parte lanuginem luteam ostentat,
insidet autem totus flos calyculo quinque parti-
to, cui bina foliola Hyssopi apposita: porro autē
pericarpium ex rotundo oblongum est, semen
continens minutum: Tota planta insigniter a-
mara est, & inodora, quadam cum obscura adstri-
ctione.

Matth. re-
preh.

Matthioli, si Ruellium intellexisset, facilè ex
eius Gratia Dei descriptione collegisset, eum de
planta à nostra aliena, Elaphobosco scil. scribere.
Crediderunt nonnulli [inquit Commentator]
herbam hanc quæ vulgò ab aliquibus Gratiola
vocatur, ab aliis Gratia Dei, quibuldam etiam, vt
à Foroiulienfibus, *Stanca cauallo*, quod equi eius
pabulo mirè defatigetur, esse Hyssopum illud
montanum, de quo Mesues in suis scriptis men-
tionem fecit. Sed ij omnium ferè iudicio, eu-
identius hallucinati sunt, quàm plaribus demon-
strare sit opus. Qui verò [cum Quercet. & Cor-
do] Mesues Eupatorium esse contendunt, omni-
nò cæcutiunt. Sed & Ruellij sententiam explo-
dendam putauerim, si per Gratiā Dei, eam plan-
tam intelligit, de qua differimus. Hæc Matth. qui
passim gratiolam vocat: Nos dicimus Ruellium
Elaphoboscum per suam Gratiā Dei intellige-
re. Et hæc occasio est, cur Amatus in Diosc. in Ita-
lia longè aliam herbam, quàm in Gallia pro gratia
Dei indicari dicat.

Limnesium
Corda.

Cordus plantam nostram Limnesij siue Cen-
tauridis titulo describit in Hist. vbi pulchra figura
à Gesnero addita. Dodonæo videtur species Cen-
taurij minoris. Anguill. epist. 14. proponit discu-
tiendum, an Gratiola, Semen vomituum hodie
in Syria dictum, sit Papauer spumeum: Gilbe-
nech Auicennæ eius nuncupans semen.

Gratiola

Lobel. in Aduers. & Obs. p. 238. itemque Ic.
Plant. pag. 425. Gesn. hort. Gerard. & Tabern. vo-
cant gratiolam, germ. wild Awin/hegde hyssope:

Gratiola
centauroides
varietas
C. Bauh.

C. Bauh. phyt. gratiolam centauroidem, varian-
tem flore purpurascēte, albō, rariùs luteo: foliis
aliquando integris, frequentius tamen crenatis.
An frater hanc floris varietatem, itēque folio-
rum ipsēmet obseruauit, suo tempore monebit.
Matth. sanè florem in purpura albicantem perhi-
bet, Dod. verò album.

Locus &
Tempus.

Ego flore subcæruleo copiosam inueni Gene-
uz secus viā, & in prato inter Bourdigni & Thuir

florētem Iulio: abundantem in prato Matwillen;
& Bolwillen. Nascitur Ebroduni in locis humi-
dis, præcipuè in pratis palustribus, Iunio, Iulio &
Augusto florēns. Prouenit quoque spontè vligi-
nolis & palustribus locis Germaniæ, nec non Ita-
liæ: Belgis hortensis est, eodēque tempore cum
flore reperitur.

Vires
Vius

Excalfacit, siccat, incidit, attenuat, aperit, dei-
cit, abstergit, aluum vehementer purgat, tam re-
cens, quàm sicca sumpta, bilem pituitamque tra-
hit: vulneribus celeriter medetur, ea glutinando,
trita & imposita, auctore Matthiolo. Est autē,
vt amarissima, ita etiam temperie excalfactoria &
resiccans, eximiam simul expurgandi, cum per
superiorem, tum per inferiorem ventrem potē-
tiam obtinens, teste Dodonæo: Educt verò non
modò lentam pituitam, verū & crassam flauam
bilem. Prodest aduersus diutinos coxendicis do-
lores, & aduersus inueteratas febres, siue tertia-
nas, siue erroneas: iecur & lienem expurgat, ab
obstructionibus liberat, ventris lumbricos pellit,
putredinibus aduersatur: Dosis macerata aut de-
cocta est à drachma vna, vel una & semis, ad duas
vel amplius paulò.

Bouius ad quartanæ febris curationem mirè
extollit eius decoctum. Gesnerus Grauiolæ suc-
ci vsum in *io. Syriacoy* elaterio futurum arbitratus est.
Herbæ verò trita scrupulum vnum & scrup. i. &
semis cum Rob acinorum Sambuci post horas
quinque, copiosè suprà infraque, mirè phlegma
& aquas detrahare retulit, sed non sine molestia:
Et hinc in pilulis cum Zingibere, sale gemmæ, &
Cinnamomo; vt citius agat, & minus offendat
ventriculum, Gratiolam propinandam suadet.
Rulandus ad ischuriam pro potu exhibet deco-
ctum eius. Cordus affirmat eam purgare egre-
giè bilem & pituitam, nihil interanea lædentem:
quoniam horribili isto ac ingrato odore, quo cæ-
tera purgantia medicamēta prædita sunt, careat.
Recitat Bouius in Flagello, historiam de pane,
quo multorum alui commotè, quia fornax repur-
gatus & mundatus Gratiolæ fasciculo fuerat, & in
eo combustus. Medicus quidam haud vulgaris,
non contemnendo consilio, loco pulueris Gra-
tiolæ, eiusdēque decocti, salem extrahendum
consulit, eoque prædictis in morbis vtendum.

GRATIOLA ALPINA.

CAP. LVII.

Vix lescunciam excedit coliculus, qui singu- Descrip-
latis, supernâ parte vbi aliquot flosculi, bifidus,
per quem folia, duo aut tria oblōga, inferiora
latiuscula, vnciam circiter longa, sapore nullo e-
uidente, multis tenuibus fibris radicitur. Floren-
tem inuenimus mense Iulio in monte Braulio
Rhatorum. Locus &
Tempus.

TERTIONARIA ALIIS LYSIMACHIA

galericulata.

CAP. LVIII.

EX Lysimachiarum classe, vt voluerunt qui Descrip-
dam, earum magnitudinem vix vnquam asse-
quitur, contractioribus caulibus breuioribusque,
quadratis, rigidulis, articulatis, in crebras alas di-
uisis: folia ad genicula ortum habent, gemina
aduersa, Betonicæ æmula, minora, perin-
de rugosa, rariùs per ambitum serrata, sapo-
re insigniter amaro: ex quorum alis flores ferè



Tertianaria nomen
unde adeptus.

coningi surrecto tubulo emittant, ex violaceo in pallidum languenter, labeillo punctulis saturatioribus picto, galea alata fibras argenteas occultante, ex calyculo breui, gibboso: radix tenuis serpit, adeoque & caulis ex geniculis demissis fibris denud radicari solitus.

Turnerus insignis Medicus nobis coram affirmavit. Heidelbergæ (vnde

attulit à se ibi collectam) in officinis ob eius vsum ad tertianas usurpatam, Tertianariam cognominari.

Nos eandem planè credimus cum *Lysimachia galericulata* Lobelii in *Icon. Plant.* p. 344. & *Obs.* p. 186. de qua ait. *Riuulorum & fluminum ripas & depressos agrorum margines Londinensis & Antuerpiani agri sequitur hæc: plures emittit quadratos sesquipedales & bicubitales geniculatos pediculos: in quibus folia Lysimachia purpurea similia, Scordii æmulatione atrouirentia, ex geniculis gemina, è quibus instar galericuli flores caruleo-punicantes: radice variè diuaticata repit, vt nullidum hætenus descripta aut depicta, sic vsu neglecta, aut incognita. Hæc ille, qui Lysimachiam suam galericulatam caruleo-purpuream ad *Aduersariorum* paginam 144. refert, licet ibi nihil penitus legatur, quod ei conueniat. Huius demum Lobelianæ galericulatae Lysimachia bini flores ex foliorum contrario situ in cauliculis quadrangulis nascentium, sinibus prodeuntes, semper in anteriorem partem propendent aded æqualiter, & contigui, vt ex eodem situ orti videantur, quod pictor in eius icone teste Clusio, in vnico duntaxat nodo & geniculo obseruauit, plantam delineando.*

Lysim. caruleogaler.
C. Bauh.
Terzolla.
Locus & tempus.

C. Bauh. phyt. vocauit Lysimachiam 15. siue caruleam. Reform. Worm. Tertianariam, Terfoliam, siue Terzollam, sieberfraut.

Tertianariam obseruauimus prope Montbelgardem eundo *Souchaut* loco humido prouenientem cum Scordio, & florentem Iunio mense. Ea enim in aquis & palustribus plurimum gaudet. Nec minus feliciter in hortum Montbelg. translata floruit Iunio Iulioque, vbi tandem neptatu suo Hortulano valde odiola facta, difficulter extirpata fuit. *C. Bauh.* collegit non longè à Basilea Michelfeldensib. humidis locis. Clusius nasci ait copiose in Vngaria, Austria, Stiria, Morauia, Bohemiaque, secundum riuos è montibus defluentes.

CRISTA GALLI MAS ET FOEMINA.

CAP. LIX.

Descriptio.

CRista galli Herbaris dicta, duplex mihi obseruata, mas radice est exili, caule pedali & sesquipedali & recto, tenui, quadrato, inani, in

Crista galli mas.



Crista Galli foemina.



ramos aliquot diuiso, quos aduerso sita posita bina semper ambiunt folia sine pediculo, ad exortum latiuscula, sensim in mucronem desinentia, altius crenata, galli cristam æmulantia, circum plantæ summum magis quam in semina albicantia, sapore nullo insigni: in summo ramorum aut caulis, ex foliolum alis flores vnà cū folliculo compresso hirsutoque & laciniato, è quo prominent, gallinam glorientem incubantemque exprimit: quorum superius folium caput gallinaceum deformat luteum, rostro caruleo, in quo occultantur apices hirsuti quatuor, duab. laciniis excuati: inferius verò intensius croceum in tres lacinias abit stigmatis nigris guttatis: v-

tricoli foliacei modicè protuberantes, hirsuti, valcula continent membranæ, lucida, in quibus semen rotundum, compressum, sinuatum, cum membraneo margine, colore fusco, sapore nullo effatu digno.

Fœmina humilior est, caule minùs robusto, foliis angustioribus, floribus multò minoribus, summitatibus minùs albescentibus, vtriculis glabris.

Figura nostra Fuchsiana minùs acurata, maiorem potissimum exhibet: altera verò ad plantam virentem delineata fœminam demonstrat.

C. Bauhino excepto haud dum aliquem scio, qui *Crista galli* aut sexum, aut varietatem saltem obseruauit. *Pedicularis* 4. siue *pratensis* lutea (inquit in *phyt.*) variat magnitudine & latitudine foliorum: item caubum numero: altera enim est pluribus caulibus donata & angustioribus foliis, quæ rarior. Floribus est luteis, rariùs candidis; semen nigrum aut subluteum.

Vtramque Cristam, marem & fœminam exprimere videtur Lobelius in *Obs.* p. 285. itémque *Icon. Plant.*

Plant. p. 529. per Cristam galli Herbariorum, de qua in Aduers. quærit, num sit *Αλεκτορολοφος* Plinii? annum potius *Alliaria* recentiorum?

Pedicularia lutea Tabern. in Icon. & Hist. *Pedicularia* lutea picturâ maris Gallinaceæ cristæ proponit. Tragus pro *Pedicularia* campestri secunda describit, eamque modò pectori nociuam, modò innocuam ait, non sine hallucinatione, Schvvenkf. *Fistulariam* luteam vocat.

Ruellio (& post eum Anguill. & Tabern.) *Crista gallinacea* propius ad *Plinianam Alektorolophi* picturam accedere videtur. Haud quoque dubitat Clusius quin *Alektorolophi* genus sit ea planta, cui *Cristæ gallinaceæ* nomen indiderunt recentiores. *Alektorolophus*, inquit Dodonæus, similior, quàm *Mimulus*, *Crista galli* nostra videtur.

Germani *Reckrodel* aut *Leuskyraut* nominant: Belgæ *Ratelen* & *geele Ratelen*, & plerique *hancamnekens*: Itali referente Anguill. *Crosta di gallo* & *Centro galli*.

An porro Ruell. lib. 3. cap. 55. dicitur *Cannabis rustica* Herbariorum? An *Cristarum* genera duo in montium pratis Cæsalp.?

Exit passim in aruis, & non rarò in pratis etiam siccioribus, utrobique inutilis & vitiosa; plurima Ætatis parte floret, Dod. & Clusio testibus. Nos in valle Griesbachiana, ubi fontes acidi, utramq; obseruauimus.

Quâ autem *Crista galli* facultate aut potentiâ prædita sit, nulli adhuc curæ fuit, cognoscere, cum inutilis vel Dod. dictatore habeatur. Deme- trius tamen *Pediculariæ granatariæ* cribrata, tribus carnis adiectis partibus accipiti dat per quadraginta dies, ut nunquam destillatione laboret, neque gestatus, neque inclusus.

CRISTÆ GALLI AFFINIS PLANTA Romana, siue *Crista galli* maior Italica.

CAP. LX.

Descriptio



Geniculis per caulem ran. & que hirsutos bina adnascuntur ex aduerso sita folia, *Sideritidis* aut *Cristæ galli*, longitudine sescunciali, latitudine semunciali, hirsuta in acumen desinentia, serrata, longis nervis distincta, à quibus in diuisurarum lacunas venulæ excurrunt: ex vniuscuiusque folij sinu flos exit vnus luteus, paulo recto stam-

ina proferens hirsutis apiculis donata, è calyce longo, vnciali ferè, striato, hirsuto, per extremam oram laciniato.

Circa Romam secus vias copiosam obseruauit I. H. Cherlerus Maio florentem, cuius ramum secum attulit.

Tom. III.

ANTIRRHINVM ALBVM SERRATO folio.

CAP. LXI.

Hæc planta, quam *Antirrhinum album serrato folio* vocare libuit, donec vel melius nomen occurrat, vel apud aliquem autorem eius mentionem inueniatur, vnico, recto, ad cubitum,



interdum duos alto caule assurgit, in quo folia eo ferè ordine quo *Linum* disposita cernuntur, satis dura & aspera, pulchrè ferrata, longa satis & angusta: flores albi ferè similes sunt maiori *Antirrhino*, satis magni proportionē plantæ: calycibus vituli narium æmulis succedentibus.

Montpelij in prato quodam, in quo species duæ *Narcissi*

nascuntur, prouenit, Vere florens.

PEDICULARIS, QVIBVSDAM CRISTA galli, flore rubro, & albo.

CAP. LXII.



Haber hæc planta in florum formâ aliquid cum *Crista galli* vulgò dicta simile: emicant enim ut in illa ex vesiculis laxis glabris, verum non ita compressis, canaliculatis, tantillū cum multo virore rubescentibus: colore sunt rubro, aut carneo, aut albo, folio superiore rostrato, apices luteos quatuor binâ cavitatē,

ut in *Crista galli* vulgari flaua insculptos, stilūque purpurascentem sinu suo occultante: inferiore in tres lacinias circinatas profundè inciso: folia cum *Filipendula* nonnihil habent simile, at longè minora, minutiūque incisa, colore viridi, vel spadicco, in caulibus angulosis, concauis, palmaribus, dodrantalibus & cubitalibus: radix, nonnihil amarat, alba, rugosa, forma radicis

Bbb

Petroselinum vulgò dicti, minimi digiti crassitudine vix attingens, in crassiusculas fibras diuisa. Ex summa porro radice folia exoriuntur lata, crassa, in mucronem desinentia, per ambitum serrata, ex quorum sinu reliqua folia cum caule emergunt. Sic & primogenitæ plantæ folia prima Dryopteris æmula formâ & laciniis, ut etiam aliquos fallere possit. Cæterum, semen fuscum, rotundum, in vasculis magnis falcatis, in rostra desinentibus.

Pedicularis
Lob. Ped.
Alectorolophos.

Lobel. in Icon. Plant. pag. 748. Pedicularem inscribit, in Obs. verò pag. 431. Pedicularem Alectorolophon, eam in Aduers. Pliniano Alectorolopho minùs quadrare, repetit: & inter Filipendulas, aut Millefolium reddendam censuit.

Quod porro Pediculare vocari ait, quod facultatibus sit virosis, pratis infesta, & pediculis hostis, à Dodonæo dissentit, qui hanc pediculos generare tradit. Fistulariam (inquit in Histor. frum. & Lat. in fol.) Germanorum plerique *braun Rodel*, alii *Leusky kraut*, *Braun leusky kraut*, Græcè *ῥαβδον*, Latine Pedicularem ab effectu nominat, quod pecori ac iumentis, quæ in pratis ubi hanc prouenit, pascuntur, pediculorum copiam gignat: Belge *Rode Ratelen* appellant: Et hæc Dod. qui in Hist. gall. Alectorolophon inscripsit, ac gallicè *l'herbe aux pouls* appellauit.

Pedicularia
campestris
Trago.

Tragus Pediculariæ campestris titulo pinxit, ac prioris cognomento delineauit: H. Lugd. pag. 1074. Cristæ galli alterius, seu Phthirii. Geln. in descr. mont. Fracti lib. de Lunar. Pediculariam Tragi vocauit. Clusius in Hist. post. Alectorolophon 3. & tertii genus alterum inscribit, ac Fistulariam à caulis cavitare vocari opinatur. Casp. Bauhin. Pedicularia 1. siue pratensis purpurea.

Locus & Tempus.

Genus flore albo sed crebrius purpureo obseruauit, pedalem, altiore & ramosam, florentem Maio iuxta *Arue*. Prouenit quoque in Michelfelden, inter Montbelgardum & Basileam aliquibus in locis, in valle Griesbach & aliis pluribus locis aquosis circa Montbelgardum, semine maturo Iunio. Nascitur, inquit Dodonæus, in vliginosis pratis: herba non solum parum utilis, sed & noxia, ac pratorum ipsorum virium: Maio ac Iunio mensibus cum flore ac valvulis reperitur.

Vires & Usus.

Creditur, eodem Dod. referente, ad fistulas & sinuosa vlcera utilis esse, nec non menses & aliunde profluentem sanguinem, in vino austero decocta potaque sistere. Quis autem Medicus propter virosam facultatem intus sumendâ præsentibus suauioribus medicamentis suaderet.

PEDICVLARIS MAIOR DA-lechampi.

Descriptio

Plantam siccam ab ipso Dalechampio habemus, quam sic descripsit. Filipendulæ Alpinae affinis est: radice foris nigra, Napi modo gracilescens, rugosa, nonnihil furculosa: caule ferme cubitali, virgato, unico: foliis Filicis in longo pediculo, ordine collocatis, per ambitum crenatis, exeunte per caulem alternatim vnoquoque foliorum pediculo: flore pallido, spicatum in summo caule congesto: semine copioso, in latis corticosis vasculis concluso, Alyssi modo.

Pedicul.
in ior alpina.

Inscribitur apud H. Lugd. pag. 1138. Pedicularis maior Alpina: apud C. Bauh. in phyt. Pedicularis 2. siue Alpina maior folio Filicis. An Alectorolophi 1. alterum genus Clusio,



PEDICVLARIS BVLBOSA.

Descriptio

Complures

emittit caules, pedales, concauos, in quorum cacumine flores multi aceruatim congesti, cucullati, Pedicularis, maiores: folia palmatibus nixa pediculis, pinnata, Filipendulæ diuisurâ, statim ex radice prodeunt, qualia per caules, pauca, præterquam in summitate ubi florum spica incipit,

quo loco satis sunt frequentia: radices capillari-bus fibris intertextæ, multæ, principio angusto, sensim extuberantes, multam Filipendulæ radicibus cedentes: vestigia veterum caulium demonstrant non esse annuam stirpem.

Lobel. 1c. plant. pag. 730. Oenanthe siue Filipendula altera montana.

H. autem Lugd. huius plantæ duas & descrip-tiones & figuras dedisse credimus. Et earum quidem primam p. 784. pro Oenante siue Filipendula altera montana Penæ: Alteram p. 786. pro Oenante alia Myconi, quam Filipendulæ genus esse iudicat ex foliorum & radicum similitudine, eodemque sapore.

Clusio Alectorolophus Alpinus maior siue 1. An Gesnero Herba foliis Aspleno similis?

In altissimorum montium verticibus ut Norbonæ ad Veganium. in Dei paradyso vocato Calcar contermino eruta à Lobelio. Iulio florentem in Gothardo euulsi gener Cherlerus. Clusius utrumque genus in summis Alpibus Durrenstein, Etscher, aliisque celsis & herbosis iugis nasci obseruauit: posterius etiam in inferioribus vliginosisque pratis. Meminit & in Flandriæ pratis humidioribus, etiam Gentilly pago vicinis, non procul Lutetiâ Parisiorum.

Locus & Tempus.

PEDICVLARIS

An est Clusio in Pannon. pag. 707. & Hist. post. Alectorolophi primi alterum genus? de hoc mox capit. de Pedicularibulbosa.

In vertice montis Aurei Gergobiæ Aruernorū propinqui gignitur Dalecham-pio perhibente. Nemausoso misit Cherlerus C. Bauhino.

PEDICULARIS ALPINA FLORE
luteo, radice nigra.

Descriptio



Hæret radi-
ce crassâ,
nigrâ, multifidâ,
folia ex radice
profert longo
pediculo nixa,
quæ foliolis
multis constant,
toto ambitu mi-
nutissimè inci-
sis, ex aduerso
sitis, vt in Fili-
pendula, quæ
causa nominis
fuit: *caulis* pe-
de altior flores
luteos spicatum
ferè congestos
in vertice susti-
net, quibus di-
lapis vascula
succedunt ob-

longa, Anthirini oculis similia, minuto *semine*
plena.

Apud Hist. Lugdunensem pag. 1158. Filipen-
dulæ Alpinae titulo habetur. C. Bauh. phyt. Oe-
nanthe II. siue Filipendulæ similem alpinam lu-
team cognominat.

Locus.

Eam gignūt summa Alpium iuga, pascuis pra-
tis, & vberimo fœni prouentu greges innume-
ros atque armenta saginantia, indeque rusticos
ditantia.

MELAMPYRVM VETERIBVS ET
in genere.

CAP. LIII.

DE Melampyro veteres obiter duntaxat &
obscurè nimis egerunt. In genere Frumē-
torum (inquit Theophr. lib. 8. cap. 5.) Siculum
fatis purum, & præcipuè Agrigentinum siue Lo-
lio exit. Siculo autem, quod priuatim Melam-
pyrum vocant, proprium datur, quoddam innocuum
fit, nec sicut Lolium graue & capitis dolores fa-
cias: Idem c. 8. Lolium ex Tritico & Hordeo
corruptis nascitur: Vel si id minus, nasci quidem
inter Triticum solitum esse, nulli dubio est: vt et-
iam Ponticum illud, Triticum atrum [*μυλάμπυ-
ρον*] cognominatum.

Sed & Galenus simile quid de Melampyro
memoriæ prodidit, ita vt à Theophrasto sua mu-
tuasse deprehendatur. Sic namque Alim. 2. ait:
Ex Tritici mutatione nascitur Melampyron, vt ex
melino nigrum fiat, & tamen tale, multò minùs
malignitatis quàm folium habeat. Item Alim.
1. cap. vlt. Melampyron dictum, fit ex mutatio-
ne Frumenti, sed prauitate quàm plurimùm à
Lolio relinquitur.

Aequiuoca

A Melampyro hoc Theophrasti & Galeni di-
uersum dicimus Melampyrum quorūdam, quod
Dioscorides Myagrum appellauit. Sed fortè illo
loco cum Paulo legendum Melampycnon. Me-
lampyron etiam de quo hîc agimus, Stelephuros
Plinij quibusdā esse videtur lib. 21. cap. 16. A-
liis eiusdem Alopecuros lib. 21. cap. 17. sed malè,
Tom. III.

referente etiam Casp. Bauhino. Hic autem eius
Aëram lib. 18. cap. 17. esse credit, quamuis hoc no-
men Lolio melius fortè tribuatur. Melampyrum
multis hodie videtur esse Triticum vaccinum, de
quo iam iam sermo instituendus.

MELAMPYRVM MVLTIS, SIVE
Triticum vaccinum.



Lignosâ est Descriptio
& exigua
radiculâ, ali-
quot consimili-
bus fibris do-
natâ: ex qua
surgit *caulis* sin-
gularis, quadra-
tus, hirsutus,
purpurascens,
multis alis con-
cauus: *folia* ex
interuallis, ex
aduerso posita,
Linariæ alia, a-
lia lata & pro-
fundè laciniata,
aspera, atro-vi-
rentia, at quæ
in supremo
thyrsu sūt, cre-
briora existunt,

breuia, latiora, digitata, hilari purpurâ tincta:
ex quorum alis galeati *flores* exeunt subhirsuti,
casside purpurâte, labello luteo rubore confuso,
ceruice penitus luteâ, reliquo tubulo purpura-
scente: quibus succedunt in capsella oblonga
turgida, tegmine membraneo in aristas desinen-
te breuiusculas obuolutâ, *semina* duo aut tria tri-
ticeis minora, nigriora.

Triticum vaccinum siue bouinum flore pur-
pureo, candido interdum, sed rarissimè, conspi-
ciendum se præbere legitur apud Tragum, qui
narrat semina purpureo colore tincta, Tritico,
vel Speltæ admixta (quod apud Mediomatrices,
frequenter solet) panem reddere purpureum. a-
gricolas verò *kuuueitzen* à semine Triticum re-
ferente, vocare: quomodo verò in Dioscoride
appelleretur, sibi non constare.

Gefn. de coll. stirp. Triticum vaccinum à Tra-
go descriptum inuile perhibet Medicine, vocat-
que Vitium Tritici, germ. Brand: non desunt ta-
men qui *Brannfleischblumen* & *Mohren vuetzen*
appellent: Belg. *Peertzbloemen*: Galli *Blé noir*,
Blé de vache, *Blé de bœuf & rouge herbe*, Atreba-
tib. h. e. Herba rubra, à comæ colore.

Triticum vaccinum vocat Dodon. gall. lib. 2.
cap. 14. eius figuram quoque habenti lib. 4. cap.
16. Melampyri titulo) & lat. de frum. & in fol. &
Hist. Lugd. p. 419. itemque Cordus. Melampy-
rum Lob. in Adu. Obl. p. 23. & Ic. Plant. p. 37.
ac etiam Tabern. Melampyrum 1. siue purpu-
rascente comâ, Melampyron Galeni & Theophr.
ac etiam Aeram Plinii, Casp. Bauh. in phyt. Me-
lampyrum Belgarum & *σάλερον* Plinii Lobel. in
Aduers. dicens: Melampyrum Dodonæi cogno-
minauit Camer. hort. & Thalius, qui varias pas-
sim eius obseruari species prodidit. Quas eo non
nominato ex eo sic recenset C. Bauh. Variat
floris colore, flos enim infernè candidus, super-

nè luteus: sic ex albo viridique mixtis: item floribus luteis, in summo albicantibus: sic infernè puniceus, supernè luteus, foliis minoribus, & tãdem flos infernè supernèque puniceus, medio candicans, foliisque laciniatis.

Clus. in Pannon. p. 603. appellauit Parietariam siluestrem purpurantè comâ: In Hist. post. Parietariam silu. tertiam. Quo autem nomine veteri donari debeat, se ignorare fatetur. Trifolium maius dicitur Brunfels. tom. 1. Rhaps. 14. pag. 47. Et tom. 2. Rhaps. 16. pag. 59. *Braunfleischkrym*, quam vocem Casp. Bauh. Trifolium purpureum reddidit, quàm rectè tu videris. Schvvenckf. Melampyrum purpureum, & Parietaria silv. comâ dilutè rubescente, Germ. *Vvachtel vneitzen*.

Locus & Tempus. Genevæ, & Montbelgardi, ac in Alsatia inter segetes prouenit, læto potissimum, pingui, ac restibili agro, cum frugibus florens & ad maturitatem perueniens in omnibus ferè provinciis: negligi mauult quàm in hortis coli. Si tamen alicubi exspectatur ob floris elegantiam, Autumno feri necesse fuerit: annua est planta, quæ maturo semine perire solet.

Vires & Vfus. Nullum quod sciamus in medicina vsum obtinuit, sed plerumque negligi solet. Scribit Clusius eam in Occidentali Frisiæ seu Flandriæ parte [ubi copiosissimam ait] panem vitare & attritiorem reddere: quinimò eos, qui eo vescuntur, plerumque capitis grauedine tentari solere, non secus ac si Lolio victitassent. *Ego semine huius sæpius quidem panem tinctum obseruavi, sed nullum prauum saporem ei adferre deprehendi, nec insalubriorem à rusticis idèd haberi animaduerti, nec eam vllò modo separare student. Quin & Tabern. qui admodum sapidum panem ait, se sine vllò nocumento sæpè comedisse testatur. Gratus pastus bobus & vaccis saginandis, vt non incongruè forsan Pabulum bouinum aut vaccinum quis nuncupare posset.*

MELAMPYRO AFFINIS, PARIETARIA cærulea quorundam.

Descriptio



pediculum laciniatorum, mollique lanugine pubescentium, coloris purpurei, nunc dilutioris, modò saturatiore elegantissimi & violacei: inter quæ bini semper inter se oppositi flores nas-

Quadrangolo asurgit caule, pedalis, nodoso, villis quibusdã hirsuto: in quo alternatim ad nodos bina sæper ex aduerso nascuntur longa folia, secundum pediculū lata, & sensim in mucronem desinentia, aliquantulum villosa: summus caulis & rami desinunt in foliorum comam superioribus minorum, ad

cuntur, longiores, concaui, aliquantulum hiantes, superiore labro nonnihil reflexo & villoso, inferiore latiusculo & deorsum propendente, coloris initidè lutei, deinde omnino aurei, omnes tamen, licet alternis contrario situ nascentes antrorsum exporrecti & spectantes, quod pictor in hac Clusii icone delineanda tunc non obseruauit: *radix* candicans, quam subsequens Hiems corrumpit.

Clus. in Pannon. vocat Parietariam siluestrem primam cæruleâ comâ: In Hist. post. Parietariam siluestrem (quorundam, addit ad descr.) primam.

Camer. hort. Parietariam siluestrem vulgò vocari, quod miratur Clusius, refert, elegantissimam herbam hanc, foliorum comâ cæruleâ, vel dilutè rubescente, vel penitè candidâ: flosculis quâ parte suo conceptaculo tenentur, sanguineis, priore verò flauis.

C. Bauh. phyt. nominat Melampyrum 2. siue cæruleâ comâ, Parietariam Lipsiensium Tragi. An verò sit Parietaria tertia Tragi, quam à Lipsiensibus Medicis veram Parietariam existimari tradit, dubitamus.

Schvvenckf. Melampyrum purpuro-violaceum, Triticum vaccinū 2. *Blaugeel tag und nacht*, & *Ringelscheis* vulgò corruptè, cum potius dicendum *Rinder vneitz*.

Agerius obtulit in Austriæ pratis collectam nomine Parietariæ silv. comâ cæruleâ. In Silesiæ siluis & aggeribus montosis Iunio & Iulio frequens. Crescit etiam in Hungariæ, Austriæ, Moraviæ, Bohemiæ, ac quoque Germaniæ sepibus & silvarum marginibus, vmbrosisque locis. Ob insignem elegantiam & colorum varietatē hortis inserendam censet Camerarius, sed locis fruticosis, & circa stipes. Non vult enim in areis coli. Semen maturè colligendum, antequam exiliat è vasculis & statim reddendum telluri, vt spontè excidat. Nudum enim si contrectetur fecunditatem perdere existimatur.

Quidam vulnera sanare & liuores discutere Vires & arbitrantur. Sapore est subdulci, & nonnihil acri, Vfus. simulque astrictiōis alicuius particeps.

MELAMPYRVM CRISTATVM FLORE albo & purpureo.



Tortuosâ nititur radice, parum altè demissâ, lignosâ, aliàs simplici aliàs apophysibus adnatis multifida: *caulis* singularis, pedalis & procerior, aliàs teres, aliàs angulosus, potissimum parte superiore, in ramos plurimum aduersos, inæquali interdum ortu, diuisus: folia plerumque opposita læ-

pè incondita, oblonga, angusta, acu-

minata, Melampyri vulgaris: flores hiantes, eiusdem floribus respondent, coloris vel albi cum rictu luteo, vel purpurei, quos complectitur duo folia latiuscula, figurâ Lunæ falcata, arcu minutis denticellis concinnè crenato cristatâque.

An Melampyrum 4. siue luteum angustifolium Casp. Bauhini in phyt?

Illud, cui flos albus cum rictu luteo, Iulio mense florens inueni inter Schorndorff & fluuium C.B. & Filtz, versus Forndorff. Alterum eodem mense florens inter Balneum admirabile & Nurtin-gam.

MELAMPYRVM SYLVATICVM

flore luteo, siue Saturea lutea
siluestris.

Descript.

Melampyri vulgarioris segetum radices habet, strigosius plerumque, coliculis dodrantalibus, & cubitalibus, quadratis, subhirsutis, in frequentes ramos coniugatim diuisis: folia geniculis adnectantur bina opposita, atro-purpureo colore maculosa, interdum culmum lata, interdum duplò latiora, vncias duas plus minus longa (ingrati & aliquantum acris saporis, Clus.) quorum quæ suprema floribus apposita sunt, vulgarioris Melampyri segetum modo laciniosa existunt: cæteri tubuli formâ flores hiantes alterius Melampyri, toti lutei sunt, conspectiores, bini & in vnam ferè partem vergentes: quib. compressa succedunt rostro aduncò pericarpia, semina tria, alterius non dissimilia, oblonga, comprehendenda. In hac planta obseruauit interdum colorem cæruleum, vel dilutè rubentem.

In Cratægoni Lobelij figura, quæ extat in Obs. p. 22. in Icon. verò Plant. pag. 36. flores requiruntur.

Clus. in Pannon. dicitur Parietaria sil. flore luteo: In Hist. post. Parietaria sil. (quorundam, addit. in marg.) secunda, Cratægonum:

C. Bauh. phyt. Melampyrum 3. siue luteum latifolium, Cratægonon Dioscoridis. Schvvenckf. Melampyron luteum, Triticum vaccinum 3. flore nonnunquam candido, sapore acri ac vehementi: vuid tag vndt Nacht.

H. Lugdun. huius plantæ, ni multum fallimur, duas descriptiones habet & duas figuras: Cratægoni scil. 420. & Satureiæ luteæ Dalechampi p. 899. Et Hyslopi nemorensis & luteæ p. 930. descriptionem tertiam sine figura: quod etiam animaduertit Frater: qui tamen etiam perperam apud Matthiolum duas figuras solo colore differentes tradit. Nec placet apud Tabern. in Icon. itemque Hist. Milij siluatici, siue Alsinæ siluaticæ (huius sc. plantæ) duas poni figuras, colore tantum distinctas.

Crescit in sepibus, & siluarum marginibus, vmbrosisque locis Vngariæ, Austriæ, Moraviæ, Bohemiæ, atque etiam Germaniæ: floret Maio & Iunio, annua planta, Clusio. In siluosis collibus & dumetis, vmbrosis, Norbonæ, Angliæ, & Sabaudie, Pedemontis passim multâ æstate fruticantem obseruauit Lobelius. Abundat circa Montbelgardum in siluis: Geneuæ in colle la Bassie floret Iunio, & Tiguri, ac Basileæ in segetibus.

Milium vaccinum censuit calidum vsque ad 4. gradû Tabern. Quæ si hoc temperamento pollet, existimarim haud temerè eam vsurpandam.

Tom. III.

Semen in folliculo exiguo Milio non dispari, cuius odor & sapor acce nonnihil testantur, vti & folia siccata. Ac tametsi ortum in loco lacunoso & hiantes, tamen semen in pollinem pulcherrimè ductum, esse Veneris incentiuum, & seminis genitalis quasi fermentum quoddam & ceterum non abs re retur Lobelius.

PERISTEREON, VERBENA, EI HIEROBOTANE, siue Herba sacra ex veteribus & in genere.

CAP. LXIV.

Quamuis *ἁγία ῥοή*, h. e. Verbenaca recta, & *ἁγία ῥοή*, h. e. Herba sacra, seu Verbena supina, passim ab auctoribus, figurâ, viribus, & nomenclaturâ discernatur, tamen quia Plinius diuersum videtur innuere, & breuitatis studio vtramque vnâ inuoluere, visum nobis fuit ambas vno capite comprehendere. Verbenaca recta (*ἁγία ῥοή*) in aquosis nascitur: nomen autem grecum ex eo duxillè videtur, quod libenter circa eam [*ἁγία ῥοή* ἐν αὐτῇ] pro quib. vet. ἐν ἁγίῳ βέναν αὐτῇ, in ipsa: columbæ commorentur. Herba est palmi altitudine, aut etiam maior, foliis incisis, subalbidis, è caule prodeuntibus: singulari plerumque ramo [*μονοκλαδὸς τὸ πλῆθος*. Vet. μονόκαυ. Vires] & radice vnica reperitur. Folia cum Rosaceo, aut adipe suillo recenti subdita, vulgè dolorè adimere creduntur. Ipsa quoque herba imposita cum aceto erysipelata reprimat, putridaque vlcera cohibet: vulnera etiamnum glutinat, veteraque cum melle ad cicatricem perducit, auctore Dioscoride.

Sunt autem qui Peristereona rectam, qui Peristereona, qui Trigonion, qui Bunion, qui Sacram herbam, qui Philtridotem vocet: Aegyptij Pempsepte: Magi lunonis lacrymam, siue Mustulæ sanguinem, aut Mercurij iudem sanguinem: Romani Cristam gallinaceam, Feriam, Trixalim, Exuperam, & Herbam sagminalem.

Sed & Herba sacra [*ἁγία ῥοή*] quam etiam nonnulli Peristereona vocarunt, ramulos emit cubitales, aut etiam maiores & angulosos, circa quos folia sunt ex interuallis, quæ nris similia, sed angustiora, minoraque [*καὶ ἥττονα* vet. caret] diuisuris incisa per ambitum, & colore aliquatenus glauco: radicem longiusculam & gracilem, flores purpureos ac tenues. Huius folia cum radice ex vino, illitæ, aduersus serpentes [*πρὸς ἔρπιντα*. Lac. Dio. l. 2. legit ex antiq. exempl. πρὸς ἔρπιντας καὶ ἔρυσιν ἁλῶνα. Jpollent: eadem illa [*φύλλα*] contra morbum regium drachmæ vnus pondere ex vini veteris & calidi hemina vna quaternis diebus ieiuno ventriculo bibuntur. Sed & œdemata diuturna, inflammationesque imposita mitigant, sordidaque vlcera purgant. Tota verò herba in vino decocta, consillarum crustas abrumpit, & oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt si aqua spargatur triclinium, quâ maduerit, latiores, hilarioresque conuiuas fieri. Datur & potandum tertianâ laborantibus, tertium à tertia geniculum vnâ cum foliis circumdantibus, vti & quartanâ, quartum. Cæteriùm [vet. caret sequentib.] Sacram herbam idè vocant, quod in expiationibus sit ad amuleta perutilis.

Porro capiti huic, de Hierobotane [*πρὸς ἁγίαν ῥοήν*] Goupili vterque codex huc titulum, *ἁγία ῥοή* huiusmodi, habet: Antiquus, verò manuscriptus codex *ἁγία ῥοή* legit. Sunt etiam qui Peristeg-

Bbb 3

reona supina nōninent inter nothas appellationes: sunt qui & Erigenion, qui Chamæleucon, qui Sideritum, qui Curitum, qui Persephonion, qui Iouis Colum, qui Dichromon, qui Callesim, qui Ciparillon, & qui Demetriada appellant: Ægyptii Pemphthemphtham, Pythagoras Erylisceptrum, Romani Cinnamulam herbam dicunt.

*Sagmina-
lis.*

Sagminalis appellationis [quæ vox inter supposititia Dioscoridis habetur] ratio, ex Plinio manifestè declaratur, ubi lib. 22. cap. 2. ita legitur. Sagmina in remediis publicis fuere, & in sacris, legationibusque Verbenæ. Certo utroque nomine idem significatur, hoc est, gramen ex arce cum sua terra euulsum: ac semper & legati cum ad hostes clarigatumque mitterentur, id est, res raptas clarè repetitum, vnus utique Verbenarius vocabatur. Nulla tamen (pergit idem lib. 25. c. 9.) Romanæ nobilitatis plus habet, quàm Hierobotane. Aliqui Peristereon, nostri Verbenacam vocant. Hæc est, quam legatos ferre ad hostes indicauimus. Hæc Iouis mensa verritur, domus purgantur, lustranturque. Genera eius duo sunt: foliosa, quam feminam putant: mas, rarioribus foliis. Ramuli utriusque plures, tenues, cubitales, angulosi. Folia minora, quàm Quercus, angustioraque, diuisuris maioribus, flos glaucus, radix longa, tenuis. Nascitur ubique in planis aquosis. Quidam non distinguunt, sed vnum omnino genus faciunt, quoniam eosdem effectus habeat. Vtraque sortiuntur Galli, & præcinent responsa. Sed Magi utique circa hanc insaniunt. Hæc perunctos impetrare quæ velint, febres abigere, amicitias conciliare, nullique non morbo mederi, Colligi circa canis ortum debere, ita ut ne Luna aut Sol conspiciat, fauis antè & melle terræ ad piamentum datis. Circumscriptâ ferro effodi sinistra manu, & in sublime tolli. Siccari in umbra, separatim folia, caulem, radicem. Aiuntque, si aqua spargatur triclinium, quâ maduerit, lætiores conuictus fieri. Aduersus serpentes coneritur ex vino. Idem & hæc sparsim habet. Verbenaca cum Plantagine, in collo suspensa, comprimere dicitur strumas. Insanabilis Podagra non est credendus morbus: quippe quoniam & spontè desit, & in pluribus curâ. Medetur Verbenaca cum axungia trita, & illita: aut si pedes macerentur in eius decocto. Iumentorum febribus in vino medetur: sed in tertianis à tertio geniculo incisa, quartanis à quarto. Fasciculo manûs plenâ decocta in aqua ad dimidias, hydropicos sanat. Morbo regio dysentericæ & calculis confert. Tandem radix eius ex aqua pota, ad omnia in partu & ex partu mala præstantissima est.

Galenus.

Peristereona non modò œdemata antiqua & tumores sistere, & mitigare, sed & tussilarum crustas abrumpere & exsiccare, nimirum calfaciente vi, quâ etiam capitis dolores chronicos discutere ait, ex frigidityte & crassis humoribus ortos, tradidit Galen. 2. de comp. med. sec. loca, his verbis: Omnium verò maximè discutit & perfectè corroborat Verbenaca recta [περιστερεων ορθος] maximè viridis, imò & arida cum radicibus & simul cum Serpillo oleo incocta. Idem de simpl. Peristereon nominatus est, quod columbæ in ipsa versentur. Vim habet in tantum resiccantem, ut vulnera glutinet.

Verbenacæ, quæ & vltimâ detractâ syllabâ nunc communiter Verbenæ dicitur, inquit Humelbergius, historiam satis succinctè tradit A-

puleius. Quare copiosius de illa dicendum, præsertim quia nulla in toto herbarum censu Romanæ nobilitatis plus habet, utpote quæ vna auctoribus Romani imperii, conditoribusque immensum quiddam dedit. Sunt autem duo ipsius genera, diuersis tamen notis, ceu fusiis indicatum antè est, discreta. Græci, ut Dioscorides, quem sequutus Apuleius, à plantæ habitu illam in rectam & supinam diuidentes, de iisdem diuersis capitibus agunt, qui mos & circa alias herbas non infrequens est Apuleio. Capite enim tertio sub Hieras botanes & Verbenacæ nomine de supina cognominata agit: de recta verò dicta cap. 65. sub Peristerei titulo. Plinius porò cum Latinis in matrem & feminam distinxit. Cæterum quod nominis rationem concernit, Verbenaca dicta est, quod sola & per se verbenas faceret. Præterea quæ illi adiecta sunt specierum discrimina, supina & recta, hanc rationem habent. Hæc quod recto caule rigeat: illa quod humilioribus, & deiectis in terram ramulis quasi iaceat. Adduntur autem ambabus per tempora & ex aliis causis aliæ ab aliis gentibus appellationes. Hiera botane, id est, Sacra herba, enim vocatur autore Dioscoride, quod in lustrationibus suspensa, alligatæ, felicem habeat vsum: Vel autore Plinio, quod ad Iouis mensam verendam, præparandamque ad sacrificium adhiberetur. Peristereona hyption, hoc est, Columba supina quoque nuncupatur: ὑπτιος enim Græcè idem est, quod supinus Latinè: ὑπτιος verò Columba, à qua tum apud Latinos, tum apud Græcos nomen adepta est, eò quod, ut Apuleius ait, columbis esca sit admodum iucunda & familiaris: seu ut Dioscorides dicit, quod columbæ inter eam versentur. Plinius id nec ad cibum, nec ad conuersationem refert, sed simpliciter columbis familiarem esse ait, ideoque nomen id indeptâ. Dioscoride verò dicta quasi Iouis Columbus. Διός enim idem est quod Iouis: & λαμβάνει colus dicitur. Vocata est etiam Panchromon, quasi tota speciosa & nitida: παν enim Gr. omne & totum significat: χρῶμα verò eisdem color est & nitor. Colletis dicitur quasi conglutinatrix ab effectu, quia vulnerum sit conglutinativa, à verbo κολλάω, q. e. conglutino. Aristereon appellata est quasi glutinata vulnera firmans ac solidans, à verbo στερεώ, quod est, firmo ac solido, & à dictione ἀεὶ, quæ quamuis per se nihil significet, in compositione tamen aliis dictionibus addita, illis augmentum addit, & valde significat. Cyparissos dicta est, quod folia illi sint per ambitum secta, quemadmodum in Cyparisso. Demetrian, hoc est, Cerealem nonnulli appellant: δημητριάς id est, Demeter, enim Ceres est, à qua & nomen inuenit, quod ut Ceres inuento frumento & traditis legibus homines feros cicurauit, & mitiores ciuilioresque reddidit: ita, ceu Magorum vanitas perhibet, & Plinius refert, hæc perunctos amicitias conciliare, nullique non morbo mederi, & si aqua eius spargatur in triclinium, lætiores conuiuas fieri creditum esse. Siue quod in agro iuxta fruges quas Ceres inuenit, ac etiam quarum Dea habita est, lubens etiam ac frequens nascitur. Æsclepij nomen ab Æsculapio vetustissimo medicinæ inuatore, ac plurimorum valetudini hominum vtilium autore, adinuenit, propter multiplicem vsum & virtutem. Sic & Alceas, id est, Medicam, & contra morborum iniurias validam & efficacem auxiliatricem

liatricem dixerunt, *ἄλκη* enim vis est & efficacia, auxilium & remedium: unde & hæc herba præ aliis nomen hoc sibi ascivit. Erysisceptron appellata est à calathis & virgis. Nam Græci *ἔρυσον* calathum vocant & sportam: *σκεπτήρον* verò sceptrum & virgam. Sicque dicta est, eò quod caulibus & virgæ ipsius virides lentore suo in calathos, sportas, tegetes, & id genus alia, texti & in nexus circumagi possint, quemadmodum & Cyperus & Aspalathus [quibus Erysisceptri nomē etiam commune & peculiare est] & Tiliæ & vitillia alia texēdis calathis, & corbibus, fuscillisque sunt idonea. Quæ ratio etiam fecit ut Licinia dicta sit Latinis, à verbo Licio, quod est implico, vel à nomine Licium, quod est filum, quo textrices stamen in tela implicant. Nisi Licinia legere, quis maluerit, eò quod oculorum luci & visui prodest, à Lucina quæ Iuno est. Heras dacryon, i.e. Iunonis lachrymam sunt qui nuncupent. *Ἡρά*, i.e. Hera enim Iuno dicitur; *δάκρυον* verò lacryma: sicque fortassis dici potuit, quod oculos & visum iuuet, illorumque illachrymationibus destillationibusque prodest. Iuno enim à iuuando dicta est, & quia oculis lucique præest, Lucina vocata est. Lustrago dicitur, quod lustrationibus adhiberetur. Nam, quod Plinius testatur, hac domus purgabantur, lustrabanturque. Lustrare autem expiare, purgare & purificare est, sic dictum à luendo, i.e. soluendo & liberando. Et inde lustratio, i.e. expiatio, purgatio, solutio, & liberatio purificationis. Militaris vocata est, quod hæc coronati feriales ad hostes legati mitterentur ad bellum indicendum, pacem componendam, clarigatumque repetendum. Siue quod herbæ Achilleæ, quæ Militaris etiam appellatur foliorum formâ sit aliquo modo similis. Verripedium dicta est, quod virgis eius domus & paupercula verterentur, purgarenturque. Verrere enim trahere est & munda, quod sordes trahendo mudentur: Peditum verò pastoralis baculus est & virga. Crista gallinacea nuncupata est, quod folia illa sint ferrata & incisuris diuisa, ceu cristatus galli apex. Trygonion, i.e. Turturina, quasi Columbina, à rulture, quæ græcè *τρύγων* dicitur, è genere columbino, dicta est, & eadem ratione quâ Peristereō & Columbina, utpote quod turtures sicut & columbæ libenter inter eam versentur, aut ipsâ vescantur. Chamelygos dicta est à caulibus & virgarum ramulorumque in terram deiectione, & eorundem ad ligandum aptitudine, de qua in Erysisceptri nomine iam dictum est: *χαμαί* siquidem humile & humi depressum; *λύγος* verò vimen significat. Dicta etiam est Sideritis, hoc est, Ferraria, à foliorum forma & similitudine quadam cum Sideritide herba, cui peculiare & proprium hoc nomen est. Siue à ferro, quod Græcis *σίδηρος* est, quod glutinandis vulneribus ferro factis in bello usum præberet, unde etiam teutonice *Isenkrant*, h.e. Ferraria nuncupata videtur. Ad eundem modum & Curitis, quasi Hastaris, ab hasta, quæ Sabinorum linguâ curis vocatur, appellari potuit. Humelbergius tamen nomen hoc inuenisse narrat ab eo, quod quemadmodum olim hasta, quam sceptrum Græci dixerunt, regij fastigij insigne diadematis loco fuit: sic etiam herba hæc, quæ multum laudis ac plurimum Romanæ nobilitatis habuit, & quæ semper legati ad hostes missi coronabantur & ornabantur. Nominata est & Phersephonion ab infernali numine Proserpina, quæ græcè Phersephone dicitur. Nominis autem causa est, quod cōtra ipsius veneficiorū maleficia

Tom. III.

vim habeat & amuletum sit. Credebatur enim antiquitus Phersephone pueris & aliis veneficiis suis nocere. Herbam sagminalem dixerunt, quod inter sagmina primum hæc honorem haberet. Et hæc de nomenclaturis Hieras botanes, h.e. Herba sacra, siue Verbenacæ supinæ.

Peristereon orthion, i.e. Columbina recta, etiā Trigonion, quasi Turturina nuncupatur, quorum nominum, ut & Hieras botanes, Heras dacryos, Cristæ gallinacæ, Columbina & Ferraria, ratio reddita est iam antè. Alij etiam Herculaniæ, Ægyptij Thiophenges, Hamagales alij, i.e. sanguinem mustelæ, alij Hama hermus, h.e. sanguinem Mercurij, Punici Zimicum, alij Azirgozol vocarunt: nonnulli Bunion, si non potius legendum sit Bomion, à dictione *βουρεός*, quæ aram significat, cuius nominis ratio fuisse potuit, quod herba hac Iouis mensa & ara ad sacrificiū verrebatur. Philtradores appellata quoque est, quoniam lustrationibus adhibebatur feliciter, & philtis amolendis erat accommodata. Exupera matricalis etiā dicitur. Exupera quidem, quod omnes alias dignitate antecellat. Nulla enim quæ Romanæ nobilitatis plus habeat quàm ista: Matricalis autem quod muliebrium locorum & matricis indolentiam faciat apposita: siue ad discrimen Heracleæ Sideritidis, quæ Exupera etiam dicitur, sed cum adiuncto matricalis, ut Apuleius tradit c. 72. cui & hæc nonnihil folio assimilatur: quæ ratio & causa etiam fuit, ut Herculanea sit dicta. Plura nomina inter Dioscoridis nothas appellationes antè adscripsimus. Sunt tandem qui Petonomon à volucrum pastu nominent. Item Ferrariam, non Feriam, ut malè inter nothas Dioscoridis legitur, teste Hermolao.

Verbenæ tandem, siue Verbenacæ, Peristereō. *Equiuora* nis, Hierobotanes, siue Herba sacra nomine sequentes plantæ donatæ sunt. Verbenæ vulgaris. Verbenacæ supina. Verben. odiflora. Verb. Peruana. Euphrasia purpurea Dod. Verbesina flore minus specioso. Chamædryos falsæ species, Erysimum Tragi. Senetio. Scabiosa. Consolida media. Gallitrichum. Marrubium palustre Tragi.

VERBENA VULGARIS.
CAP. LXV.



Vulgaris Descriptio
Verbena pluribus ab vna radice minimo digito tenuiore, fibrosâ & subamarâ caulibus cubito longioribus assurgit, quadratis, subhirsutis & subinde purpurascentibus: folia ferè opposita, oblonga, incisurâ quodammodo foliorum. Quercus, infimis duabus incisuris profundioribus: sunt ea autem vtrinque

hirsuta, sed colore saturatiore superius quam inferius virefcunt : *flosculi* in thyrsulis exigui, quinqueparti ex pallido purpurascetes.

Varia nomina.

Περὶ σπίνης & ἰσπιδόρου vocatur græcè, Verbenaca, Verbena, Columbaris seu Columbina, Herba sagminalis & Ferraria, quorum nominum rationem, præcedenti capite ex Humelbergio adscripsimus. Verbenaca supina Dioscoridis, & *Cinnamalis* fœmina Plinii, Romanorumq; Cinnale : Blattaria Plinii, Columbaris, Lucinia, Lustrago, Militaria, Petonomos, Panchramos & Vermenaca Hermolai. Tragus vocat Verbenam, & Verbenam 1. siue rectam : Brunfels. Verbenam masculam, Corn. Verbenam officinarum : Verbenam vulgarem Cæsalp. Verbenam 1. siue communem, flore cæruleo & albo C. Bauhin. phyt. Verbenam communem, Clus. Verbenam communem siue sacram 1. proceriorem rectam Lob. in Aduers. Verbenam Gesner. hort. Idem de coll. stirp. Verbenam albam in locis vmbrosis : Item Verbenam rariorem, pulchriorem & maioribus floribus è Prouincia Verbenacam Matth. Lac. & Cast. Verbenacam rectam, & Verb. marem Tab. Verbenacam rectam Dodon. gall. & lat. in fol. Verbenacam rectam Dodon. Hist. Lugd. p. 1336. Verbenacam rectam, siue Peristereon Dioscoridis & Verbenacam marem Plinii Corn. Verbenacam supinam, siue fœminam Fuchsius : Hierobotanem siue Herbam sacram Dioscoridis, eiusdemque Peristereon supinum quorundam, & Verbenacam fœminam Plinii Cæsalp. Herbam sacram Anguill. & Turn.

Nom. ling.

German. *Eisenkraut*, *Eisenhart*, & *Eiserich*, h. e. Ferrariam, a ferri duritia appellant : itemque *taubenkraut* h. e. Columbinam, pro qua voce malè Apollinaris *taubenkropff* legit, quæ Fumariæ propriè debetur : Belgæ *Isercruyt*, & *Iserhart* : Galli *Vernaine* : It. *Verminalula*, *Berben* & *Berbenaca* : Hisp. *Verbena*, *Vergebaom*, *vverbena*.

Communem Verbenam vbique secus pagorum viarumque margines, & vrbium areas, ac non rarè in ipsis etiam rudibus nascentem, florentemque mensibus nunc æstiuis, nunc autumnalibus, ac quandoque Nouembri, virerèque incipientem vidi mensis Februarii principio. Locis incultis, inquit Dodonæus, sed tamen decliuibus ac humidioribus, in vtraque Germania, Gallia, alibique iuxta sepes, semitas, & scrobes frequenter reperitur : Iulio ac Augusto floret. Sunt alii qui ad hydropem puluerem foliorum exhibeant felicissimo successu, Cæsalpinus. Cæterum, validè desiccantem facultatem habet, adest & adstringendi ac refrigerandi mediocris vis : Commendant Recentiorum plerique teste Dodonæo eius decoctum vel succum ad pestem : puluerem verò ad hydropem.

VERBENACA SUPINA.

CAP. LXVI.

Descript.

Hic quaterni aut quini sunt *cauliculi*, angulosi siue quadranguli, vti in vulgari Verbenaca, tenuiores tamen (& complures Dodon.) supini & in terram procumbentes : folia quoque ex viridi cæsia, vulgari similia, sed magis incisa & multifida, Dodon. profundiori-



bus incisuris diuisa : *flos* in summis virgis vulgari similis, ex cæruleo purpureus, minor tamen : Dodon. *flosculi* in summis alis parvulus, eodemque modo ac ordine digestus : *semen* idem : *radix* tenuis (oblonga, Dodon.) & vulgari similis, authore Clusio, cui *ἰσπιδόρου*, i. e. Sacra herba

& *Περὶ σπίνης ἰσπιδόρου*, i. e. Verbenaca supina dicitur.

Clusii iconem & descriptionem habet Hist. Syon. Lugd. p. 1337. hoc titulo : Verbenaca supina & tenuifolia Clusii : Lobel. in Obseru. pag. 290. in Icon. Plant. p. 535. inscripsit Sacram Verbenam Hispanicam minorem : C. Bauh. phyt. Verbenam 2. siue tenuifoliam Hispanicam. Dod. lat. in fol. Verbenacam 2. & supinam.

Agro Salmanticensi frequens, florens Iulio & Locis. Augusto : Belgis ac reliquis Germanis hortensis Tempus est : & quidem Hispano lata semine.

Eiusdem est cum vulgari temperamenti, quare Viri. ad eadem utilis, & aliquantò efficacior.

VERBENACA NODIFLORA.

CAP. LXVII.



Verbenaca. Descriptio
cæ nodifloræ nomine ad fratrem meum C. Bauh. ex Italia missa planta, quam supra terram spargi existimamus, *foliis* est Ageratis, ex aduerso sitis, vncialibus & breuioribus, paulò quadrante vnciarioribus : *flosculi* perpilli, acervatim congesti è glomere e-

micant ramo extremo hærenti.

VERBENA PERVANA PERPETVO virens.

CAP. LXVIII.

Scripsit Nicolao Monardo nobilis quidam vir Locis. Sex Peru, secundum flumina è montibus eorum regno-

regnorum delabentia plurimam Verb. crescere, illi quæ in Hispania nascitur similem, perpetuò virentem, quæ Indi in multis morbis curandis vtantur, præsertim ad omnis generis venena, & in his, qui in cibis toxicum, aut simile aliquid hauserint. Sed & nobilis quædam matrona ex Peru rediens eidem Manardo asseruit, sed multis annis ægram fuisse, cumque plurimorum Medicorum operâ vsa fuisset, Indum tandem quendam accessisse, qui in plantarum scientia celebris habebatur, quique inter Indos Medicum agebat; Verbenæ succum depuratum illi propinasse, seq; ab eius vsu post paucos dies lumbricum eiecisse [colubrum ipsa nuncupabat] hirsutum, pede longiorem, crassum, caudâ bifidâ, deinde omninò conualuisse: Ipsam porro Nobili cuidam viro in Peru, qui continuè ægrotabat, singulis dieb. manè eundem succum saccharo permistum vt sumeret, persuasisse [ita enim ipsa hauserat ab amaritudine] illum deinde plurimos lumbricos reiecisse, longos, tenues, atque inter cæteros, vnum albi cinguli instar, longissimum, & tum demum integram valetudinem recepit. Id postea consilium plurimis aliis, qui malè affecti erant, & quos lumbricos habere suspicie erat, se dedisse, ac omnes sumpto Verbenæ succo, multas ventris tineas eiecisse, & sanatos fuisse. Illud porro remedium adeò certum affirmabat, vt vnum è suis famulis ostenderet, qui ob morbi gravitatem philtum aut medicata pocula hausisse diceretur, quique epoto Verbenæ succo, vomitu multa variis coloribus distincta ex ventriculo reieciisset, quæ medicata pharmaca esse asseriebant, deinde conualuisse, &c. de quib. prolixius Hist. Lugd. Clusio etiam duo miri Verbenæ effectus exemplâ referre, quæ hic breuitati studètes prætermittimus.

Synon. C. Bauh. phyt. vocat Verbenam 3. siue Peruanam, Hispanicæ similem.

VRTICA ROMANA SIVE MAS cum globulis.

CAP. LXIX.



Primæ inter Vrticas commendationis est, quam Romanam à feminis prærogatiua indicant, quod in vtriculis glomeratim conjunctis mordacibus reclusum continetur, quod & compressa laterum formâ & lubrica superficie semen Lini æmulatur, sicuti præcedentibus fibrosis luteolo puluisculo plenis, pediculo

vnicali aut longiore appensis: radix non alia quàm Vrticæ vulgari: caulu verò rigidiorib. pungentibus spinulis, pro vrida vulgatæ lanugine, donatur, perinde vt & folia, quæ quàm in illa altius multò incisa sunt: tota planta hominis altitudinem interdum multum superat.

Synon. Hæc est illa Dioscoridis Vrtica, aliis Cnide dicta. Tom. III.

ta, & quidem agrestior (ἀγροτέρα; ἀγροτέρα) asperior, latior, nigriorque foliis, semine Lini, at minore.

Plin. Vrticam siluestrem foeminam facit, & mitiorem esse refert. Tragus vocat Vrticam Romanam quartam, peregrinam, & elegantissimam: Fuchf. Vrt. græcam siue romanam, & asperam Diosc. Bayrus. Dod. gal. & Lob. in Adu. (vbi & romanam officinarum, semine Lini.) Vrticam siluestre. Idè in Obf. & Ic. Plan. Pl. Vrt. Romanâ & Vrt. siluestre semine Lini: & sic etiam inscribit Taber. Matth. Vrticam primam: H. Lugd. p. 1243. Vrticâ 1. Matthioli: Dot. lat. in fol. Vrticam vrticem priorem: Vrticarum vrentium maiorum primam: Vrt. marem nonnullorum: Vrt. silu. asperiozem Diosc. & Vrt. silu. foeminam mitiorem Plin. C. Bauh. phyt. Vrt. 4. siue pilulas rotundas ferentem.

Αγροτέρα, auctore Athenæo lib. 3. Deipn. dicta est Vrtica vrentu cōmunia nomina. bono omine per antiphrasin, neque enim tactu suavis & mollis, sed aspera & iniucunda: Vel, quod iniucundo sit tactu, pruriginem ciēte. Κνιδῆν autem quod lanugine noxiâ vellicet, pungat, & suo morsu sensum lacescit, à verbo κνίς, quod pungere & vellicare significat. Vrtica ab vrendo, quod pruritum, postulasque igni similes excitet: vnde, & Macer ait:

-- Nec immerito nomen sumpsisse videtur,

Tacta quod exurat digitos Vrtica tenentis.

Præter iam dicta vrentium Vrticarum genericæ nomina, sunt & hæ linguarum appellationes: germanica Nessel: Belg. Nectelen: Gall. Ortie: Italica, Ortica: Hispan. Hortiga. Angl. Nettle: Boh. kopri- vva: Ægyptia Selepsio, vel Selepsion: Arab. Humure vrath, Dacica Dyn.

Particulariter verò Vrticam præsentem Germ. vocant Vrtelch Nessel, Italicam Vrticam, & Römisch Nessel Vrticam Romanam: Belgæ etiam Romsch Nectelen: Galli Ortie Grecque: quod rarior sit, neque vbique occurrat, at semine aliunde misso, subinde spectaculi causâ, in hortis feratur, vnde & hortentem cognominavit Tragus.

In densis siluis nō raro apud Belgas reperitur. Locus & Aestate vigens, & semen Iulio & Augusto maturans, Dod. Ego Vrticam globulis celebrem Montspelij passim in sepib. obseruari, florentem & foemina ferentem mentib. Aprili, Maio & Iunio. Basileæ in pratis, Geneuæ & Montbelgardi in horto meo proueniebat, sed Hiemem non perferebat.

VRTICA VULGARIS MAIOR.



VRtica maior, vrida lanugine, quæ caules quadrati cubitales, foliaque acuminata serrataque atro-virentia aut subflavescentia obsita sunt, notissima, rubentib. non-nihil radicibus nititur: flores racematim in ligulis ex foliorum alis profertens, lanuginis incanæ instar, semen perquam minutum.

Ccc

Tragus duas habet figuras, non tamen duas, sed vnam hanc Vrticam denotantes, Vrticarum vrentium vulgarium inscriptione: prior florentem & vigentem, posterior verò iam declinantem deflorescentemque demonstrat: non est itaque verum, quod quidam ineptiunt, cum duas figuras solo foliorum, nunc spadiceorum, nunc nigriorum, colore variantes exhibuisse. Ipsemet enim duas has Vrticas, quas magnas & vrentes appellat, vnius generis esse scripsit.

Eius frustra duas figuras expressit Tragus vtpote solo colore differentes: quod non monuit Frater, nec fortè animaduertit. An etiam hæc sit Diosc. altera illa ἀκαλὺφν, quam Cniphon vocant, *C. Bauh. not.* Romani verò Vrticam mollem, minuto semine [fructu, Ald.] non æquè aspera, vt vult frater, aliis diiudicandum relinquimus. Fuchsius refert eam se nunquam videre potuisse: nostram autem Vrticæ maioris titulo pingit, ac passim in Germaniæ dumetis ac sepibus gigni scribit. Lobel. in Adu. Obs. pag. 281. & Ic. Plant. pag. 521. appellandam duxit Vrticam siluestrem asperiolem, siue Vrticam communem, siue maiorem, aut Vrticam fœminam. Pro Vrtica pingitur ab Apollinari: pro Vrt. maiore à Brunfels. & Dod. gall. ad differentiam minoris: pro Vrtica vrente altera à Dod. lat. in fol. qui vulgò fœminam cognominari refert. Germanis dicitur *Gemein Nessel*, *gemein brennend Nessel*, *groß Nessel*, *gros brennend Nessel*, & *heyter Nessel*: Belg. *Groote Neten*: Gall. *Ortie commune*: Angl. *Nettel*.

Locus & tempus. Exit locus incultis: frequentior autem est iuxta sepes, dumos, veteresque parietes spontè nascitur quandoque etiam neglectim in hortis, odiosa nimis suo reptatu, & viuida radice. Viget præsertim Æstate: semen Iulio & Augusto maturum legi potest.

VRTICA MINOR annua.

Descript.



Tota est hæc minor: neque enim pari altitudine vnamquam exsurgit, neque folia Vrticæ maioris molem assequuntur: vrentior tamen est, folio atrouirente & rotundato ferè: flores racemosi, albi: radix non dissimilis, nisi quòd minor.

Falsò maioris Vrticæ titulo donatur à Trago, id quod ex sequentibus

eius verbis colligere quilibet potest. Tertia vulgaris Vrtica, inquit, quam *heyter Nessel*, hoc est, causticam, siue ardentiolem Vrticam, Germani dicunt, admodum exiguae quantitatatis est, rarò enim ad altitudinem trium palmorum assurgit, caulis eius rotundus, radix brevior, folia angustiora, semen verò maius, Vrtica

est aliofosa, hyemis impatiens: quare singulis annis, ex semine deciduo repullulascit, hortorum omnium singularis pestis. Hæc ille. Tu verò ex his colliges, tertiam hanc suam vulgarem Vrticam, minorem inscribi debere, præsertim quòd rarò ad altitudinem trium palmorum assurgat, prior verò colore foliorum ludens ad trium cubitorum altitudinem excrescat.

Fusch. Cord. Tabern. Dod. gall. & Lob. in *Synony. Adv.* (vbi tamen & Caniam Plinij acriorem vocat) itemque Brunfels. Vrticam minorem appellant. Lobel. in Obs. pag. 522. Vrticam minorem acriorem: H. Lugd. pag. 1244. Vrticam 3. Matthioli: C. Bauh. phyt. Vrt. 3. siue vrentem minorem. Dod. lat. in fol. Vrticam vrentem minimam, & Vrt. vrentem tertiam: Tragus Vrticam maiorem inscribit, sed falsò, vt ex descriptione constat. Germani *Heyter Nessel*: Belgæ *Heyte Netele*: vtrique à mordaci eius contactu appellant. Illi etiam *Huber Nessel*, quod nimirum in Avena nasci multum amet. Galli *Ortie gresle*. Sitne autem hæc, quam Plinius Caniam nominat, vel potius prior, studiosi obseruent: Est in siluestri, inquit, quæ Cania, acrior, caule quoque mordaci, simbratis foliis.

Vrtica hæc minor annua quanquam à maioris *Locus & tempus.* natalibus haud abhorreat, tamen & ad hortos, & humidiora arua descendit: eodem tempore quo illa & viget & floret, & etiam alibi, vt Genevæ, citius.

Quælibet vrentium Vrticarum innatam *Vires & Vtus Vrticarum omnia.* malitiam infinitis commodis & vtilitatibus pensat. Vtriusque (Vrticæ asperioris, & mitioris) enim folia imposita cum sale canis morsus sanant, inquit Dioscorides, gâgrænas, carcinomata, ac sordida vlcera, & cacoethe: item luxata, tubercula, parotidas, panos, abscessus. Eadem lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt & ad sanguinis e naribus eruptiones folia cum succo trita indita. Menses cient trita cum Myrrha subdita. Vterum prolapsum restitunt folia recentia admota. Semen ex passo potum ad venetem concitat, & vterum aperit. Idem cum melle delinctum Orthopnœæ, pleuritidi & peripneumonix prodest. Educit & quæ in thorace hærent. Admiscetur quoque erodentibus medicamentis: at folia cum conchis cocta aluum emolliunt, vrinas mouent, inflationes discutiunt, verum cum ptisana cocta, quæ in thorace hærent, educit. Decoctum foliorum cum modica Myrrha menses mouet. Succus gargarizatus vuluam inflammata reprimat [malè exprimit vertit Ruellius.]

Plinius Vrticæ vires & vsum medicum exponit planè ex Dioscoridis sententia, sed fusiùs, vt Dioscoridi intelligendo non parum lucis adferat. Vrtica, inquit, quid esse inuisus potest? At illa præter oleum, quod in Ægypto ex ea fit, vel plurimis scatet remediis, &c.

Galenus euidentius & vires & effectus Vrticæ *Galenus.* tradit, tanquam de vno genere loquens. Vrticæ herbæ & semen & folia [nam hæc potissimum sunt vsui] admodum digerentis sunt facultatis, aded vt & phymata, & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & venerem extiment, maximè si cum passo semen bibatur. Porrò quod non vehementer exalfaciat, sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque humorum ex pectore, pulmoneque eductio, tum quod partes quas contigerit, pruriant. Porrò flatuosum eius, cuius esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur.

nascitur. Non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem autem subducit modicè, ipsâ duntaxat absterrione, ac veluti titillatione, non purgatione. Et gangrenosa & cancrosa, & in totum quæ exsicari citra mordacitatem postulant, ea conuenienter sanat nimirum cum subtilium sit partium, & temperaturæ sicca, non tamen tantum habens caliditatis, vt mordicer. De Vrtica apud Macrum extat poëma:

*Græcus Acalephen, nos Vrticam vocamus,
Fervida non modicè vis illi dicitur esse,
Vnde nec immerito nomen sumpsisse videtur,
Tacta quòd exurat digitos Vrtica tenentis.*

*Juniorum
dogmata.*

His ita traditis ex veterum sententia, reliquum est, vt & Juniorum nostri sæculi Medicorum de vrentium Vrticarum facultate & vsu dogmata an-
notemus. Omnes tres, inquit Tragos temperatu-
râ suâ sicca sunt, quamobrem reioluunt, discutiunt, & incidunt duros tumores ac pustulas, & si quæ alia à pituita deriuantur, idque tam in internis, quam externis corporis partibus efficiunt. Minor verò, quam Germani *Vetter Nessel* vocant, viribus duabus reliquis inferior est extrinsecus adhibita, nisi recens adhuc illa fuerit. Omnium itaque folia vino decocta & pota, aluum emolliunt, discutiunt flatus, cohibent tormina, maxime ea, quæ non à constipatione ani orta sunt, vrinam cient, purgant lumbos, Venerem stimulant. Tusa, & cum sale, ritu emplastri, imposita, vulneribus & canis rabidi moribus medentur, experientia id attestante: Pari ratione sordidis, putridis, gangrenosis ac malignis vlceribus auxiliantur. Quin & talia cataplasmata incidunt collectiones omnes, & duritias, abscessus, frigidòsque tumores, siue ij sint in articulis, siue in liene, aut secundum vires. Semen in ijs morbis, quibus folia ex vino decocta conueniunt, efficacius est, si sapâ decoquatur, aut ex illo cum melle eclegma fiat. Sed aqua destillata in memoratis ægritudinibus vsu commodior est, & aliquantò mitior: purgat enim & abstergit omnia vulnera tam interna, quam externa, si bibatur, vel si ex illa abluantur. Radix magnæ pungentis vino & melle decocta, haud vulgare medicamentum est contra frigidas ruses, & orthopnoeas: purgat namque fistulas spirituales pulmonis, & quæ in thorace sunt educit, pectoris vitia emendat, discutit pleuritides, & vix affectiones curat, aliòsque morbos, qui ex viscoso humore suboriuntur, mensurarium, vel quatuor ligularum pota ac gargarizantia.

Semen.

*Temper.
Dosa.*

Temperamento autem Vrticam siccam quidem Dodonæus quoque statuit, calentem verò exiguum, & vix primo ordine vim tenuium partium simul obtinentem. Neque enim ex eo vrere, aut mordicare nouit, quòd impensè calida sit; sed huius causam esse admisit lanuginem eius rigentem ac duriusculam, aculeorum instar pungentem, cutimque vellicantem: siquidem flaccida facta ac decocta Vrtica, haudquaquam vrit, lanuginis nempe remisso rigore.

Vrtica frigida.

Sed & Langius libro secundo epistola 33. virtutem Vrticæ adurentem superficie tenus manere testatus est: intus verò tantum frigoris latere, vt ea contusa arteriis metacarpis ac temporum applicata, febris feruorem extinguat in corde.

Cæterum, Vrticis bene contusis, emplastri vice ventri impositis, neque citò inde dimotis, se matricem & retrahere, & reductam vsque continere, quidam certo experimento jactant, vt vi-

Tomus III.

dere est libro 6. cap. 9. de conceptu apud Iacob Rueff Bayrus de morb. distinct. 1. tract. 5. cap. 3. Vrticam cum vino potatam epilepsiæ conferre scripsit. Quin & apoplectico loquelâ destituto, vt quamprimum sermo redeat, Vrticæ semine linguam fricandam præcepit Empir. Wirtembergicus. Bonius ad arthritidis dolores mitigandos, & humorem peccantem per euaporationem resol-
uendum reprobat narcotica, laudatque potissimum forum cum decoctione Vrticarum viridium, aut siccarum, vel etiam radicum. Corpus hominis Vrticis perfricare, melancholiam non parum iuuare scribit Cardanus. Nunc si velis manus simul atque faciem teneram, albamque efficere: cape, auctore Fallopio, Vrticæ folia & radices, decoque in aqua, iisque manus faciemque ablue, tum pulchram reddes, albam, tenellamque. Vrticæ radicibus deaso cortice virente vtuntur Chymici ad purificandam aquam vitæ, imponuntque eas in cucurbitam cum secundò distillant.

Ille tandem, qui semen Vrticæ comederit, oris, linguæ & gutturis excoctionem patietur (referente Petro de Abano de remed. venen. cap. 50.) itemque arsuram & ardorem in mictu: Horum autem malorum curam esse ait, oleum Amygdalarum dulcium epotum, Bezoar, & grana Citoniorum trita & pota cum aqua calida.

Nouimus iuueni cuidam ab adultera & lasciuia meretrice semen Vrticæ propinatum, quo tardior aliàs ad actum venereum excitaretur. Vnde Iuuenalis: Irritamentum Veneris languentis, & acres Vrticæ.

Præter prædictos illos vsus, autor est Alpinus, mulieres Aegyptias nihil habere quo valentiùs vrerum calefaciant, mudent, atque ab obstructionibus liberent, quam vrticam, ex qua ad mouendos menses seminis decocti atque suffiri vsus est apud ipsas frequentissimus: maximèque addita myrrha.

Cæterum, æstum & pustulas ab Vrtica excitatas restinguit & sanat oleum Rosarum, itemque Oliuæ. Sed & Nicotianæ succus, aut spissamentum, aut folium viride ex fricatione madens confestim lationis dolorem amouet & prorsus tollit, si quis loco ex Vrticæ contactu adusto, horum vnum applicauerit.

*Vrtica
morsus
medelæ*

CANNABIS MAS ET FOEMINA.

C A P. LXX.

DVum generum Cannabis passim obseruatur *Descri-
ptio.* culta, mas videlicet & foemina, siue fecunda & sterilis: surgit vtraque homine altior (licet foemina mari altitudine cedat) caule quadrato, cauo, cortice in fila ductili recto, singulari, interdum superius diuiso: folia in quatuor, quinque aut plura segmenta ad pediculum vsque subdiuiduntur, serrata, atroviuentia, aspera, odore caput tentanti: flores vni muscoli luteoli in puluisculum leui concursu abeunt, nullo post se relicto semine: altera species nullo præeunte flore semen copiosum fert, nudum, secundum caules, ramòsque, oleaginosum.

Icon nostra, quæ ex Fuchianis est, foeminam Icon. demonstrat.

Cannabim satinam marem Dioscorides folia Fraxini [τῆς μελίας, pro qua voce malè interpretatus est Marcellus τῆς μελίας, Mali:] gerere *Cannabim
satinam
Dioscor.*

scripsit, sed fœdi odoris, caules proceros, inanes,

Cannabis fœmina.



semen rotundum. Galenus similem Vrticæ facit non solum figurâ, sed & facultate. Plinius inter Cannabin hanc satiuam & filustrem minùs ingeniosè distinguit, & vires vtriusque miscere videtur.

Quoniam porrò in syluestris Cannabis mentione incidimus, meritò quoque eam ex Dioscoride consideramus. Syluestri Cannabis, in-

quit, virgas fert Althææ virgis similes, sed nigriores, asperiores, & minores, cubiti altitudine: folia satiuæ similia, asperiora tamen & nigriora: flores subrubicundos. Lychnidi similes: semen & radicem Althææ similia. Radix cocta & imposita vim habet inflammationes mitigandi, & tumores discutiendi, & tophos in articulis dissoluendi. Sed & ex hac cortex est idoneus ad funes texendos. Et hanc Dioscoridis Cannabin syluestrem nobis adhuc ignotam ingenuè fatemur. Illud nobis liquidò constat quosdam Vrticæ inerti affinem plantam fecisse: alios verò Clinopodij alterius Matthioli genus album constituisse: sed nec de esse, qui Alceam vulgarem maiorem credant: reperiri tandem nonnullos, qui Alceam Pentaphylli folio esse sibi persuadeant. Et hæc de Cannabe sylvestri hic nobis dicta sunt.

Syluestrem Cannabin, Hidrafinam & Terminalem cognominatam, nos non habemus [inquit Tragus] nisi per illam subintellexerit vnam satiuæ speciem Dioscorides, aut certe, quod puto, caput illud redundet. Nam syluestrem Cannabè primò cõtra cõsuetudinẽ suam ponit loco, deinde satiuam. Sed & Pliniũ tria Cannabis genera describentẽ, quarũ primam & optimam Mesam, Milesiam alteram, tertiam Roseam nũcupat, de satiuâ dũtaxat Cannabe loqui, vel hinc liquet, quòd sylvestris nusquam mentionem faciat. In libro quidem 20. cap. 20. rem paucissimis attingit verbis. Sed de nostra vulgari intelligi ea verba commodè possunt.

Sed reliquã Cannabe sylvestri, ad satiuæ historiam redeamus. Duorum itaque nascitur generum ex vno eodemque semine, Mas & fœmina, quæ vtraque pingitur apud H. Lugd. p. 49. Marem inscripsit Lobel. in Obs. p. 284. in Ic. Plant. pag. 526. Cannabem 2. siue maiorem, semen ferentem, masculam, & Cannabem Dioscoridis: Dod. lat. fol. Cannabem fœcundam, flore non conspicuo: C. Bauh. phyt. Cannabem 3. siue satiuam: Fœminam Lobel. modò citatis locis, Cannabem erraticam paludosam syluestrem, sed falso titulo: Tragus Cannabem satiuam inscri-

psit, ac primã siue fœmellam, tenuem, & semine destitutam vocauit: Dod. in fol. lat. Cannabem sterilem, flores inutiles & vanescentes proferentem: Cas. Bauh. phyt. Cannabem 2. siue erraticam: Miror autem Fratrem non meminisse Cannabis fœminæ, quã sub falso titulo Lobelius exhibuit. Vtramque etiam vnã iconẽ Cannabis inscriptione cur comprehendat Tabern. rationem non video: is sapius solo colore differetes iconibus separat. Sed & Camer. apud Matthiolum iconem nouam ex mare & fœmina compositam, Cannabis titulo dedit. Cord. Corn. & Brunfels non distinguunt.

Κανναβις, κανναβιον, ας επιον, & σχοιον, σχοιον, à texendis ex ea funibus, Græcis dicitur: Hebræis seu Thalmudistis græcam vocem imitantibus, teste Elia in Nomencl. *Kannafos* vocatur: Arabibus *Canab* & *Sphedenegi* appellatur: Medici tamen differentiam cõstituunt inter *Scehedenegis* quod est semen Cannabis, & inter *Scedenegi*, qui est *Æmatites* lapis, qui sanguinẽ silit, & inter *Sceheretegi*, qui est *Fumus* terræ, vide Aui-cẽ. lib. 1. cap. 174. & 665. Latini *Cannabẽ* dicunt: officinæ nomen retinent: Sunt autem Græcis *κανναβις* fonticuli, *σπαρκα*q; *σκατιριγινες*, quibus locis cum lubens ipontẽ & sata luxuriat, videtur id nominis Lobelio indepta: Germanis *Bampf* Belg. *kemp*: Gallis *Chanure* & *Cheneue*: Ital. *Canape*: Hispan. *Cannamo*: Angl. *Bimp* & *Beinp*.

Porrò ambæ Cannabes, ex vno, vt diximus, semine procreantur, sed quã ratione hoc intra terrã perficiatur, vt altera ex illis fructifera, altera verò sterilis sit, nemo est qui scire possit, id eoq; cum alia multa, tũ etiã hoc ipsũ naturæ esse miraculum necesse est vt dicamus. Vtraque autem quotannis Vere passim in agris & hortis plantari consuevit, nec vnquã sua sponte syluestrem obseruare nobis contigit, & pluribus alis luxuriantem, qualem Dodonæus commemorat.

Solum, vt Columella scribit, pingue, stercoratumque & riguum, vel planum atque humidum & altè subactum deposcit. In quadratum pedẽ feruntur grana sex eius seminis Arcturo exoriente, quod est vitimo mense Februario circa sextum aut quintum Calendas Martias. Nec tamen vsque in Æquinoctium vernum, si pluuius cœli status, improbè feretur. Fœmina prior maturefcit, meliorque ac præstantior est ad pannos conficiendos: mas verò apta ad sui generis conseruationẽ. Fœmina matura Iulio vellitur. Maris semen fine Augusti, vel Septembri mense, maturum legitur.

Cannabis plantam in vita admodum vtilem pronunciauit Dioscorides, ad robustissimos funes texendos: Semen verò si copiosius edatur, extinguere genituram: succum è viridi semine expresũ ad aurium dolores commodè instillari. Cannabis autem semen olim in cibo homini fuisse, docet Galenus 1. Alim. his verbis. Non quemadmodũ plãta ipsa Cannabis Vitici quodammodò est similis, ita semen semini facultate est simile, sed plurimũ ab eo dissidet, vt quod concoctu sit difficile, stomachoque ac capiti noceat, prauique sit succi. Sunt tamen qui eo quoque frixo cũ alijs tragematibus vescuntur. Tragemata autem voco ea quæ post cœnam voluptatis inter bibendum excitandæ gratia manduntur. Multũ autem calfacit, ideoque sumptum paulò

Mirum naturæ.

Locus.

Vires & vñs.

paulò largiùs caput ferit, vaporem fursum ad ipsum mittens calidum simul ac medicamento-
sum. Semen (addit 7. simpl.) status extinguit,
adeoque dissipat, vt si plusculum edatur, geni-
turam exsiccat. Sunt qui ex eo viridi succum
exprimentes, ad aurium dolores, ab obstructio-
ne, vt opinor natos, vtantur.

*Simeon
Serhi.*

Non est silentio prætereundum, quod de se-
mine Cannabis Simeon Serhi prodidit. Come-
stum, inquit, idem nocumentum quod Corian-
drum affert: immodicè enim si estur, vt illud de-
lirium facit: folia verò arida in potu sumpta fa-
rinæ modo, ebrietatem quandam hospitalem &
innoxiam faciunt, quæ ab hauriente non senti-
tur. Apud Arabas pinfitur, subigiturque pro vi-
no, & inebriat. Desiccatur verò semen genitale, vt
Caphura.

*In cibis
venit.*

In Francia Orientali, referente Trago, aliisque
nonnullis regionibus semen Cannabis quotidie
inter cæteros cibos decoquitur, non aliter quam
Hordeum, sed reuera qui continuò huiusmodi
semine in cibo vsus fuerit, is non parum læde-
tur, namque semen Cannabis stomachum frigi-
dum & debilem reddit, & genituram extin-
git. Idem semen lacte decoctum & calidum po-
tum, aridam calidamque tuum emendat & ex-
pellit.

*Matth.
Gallina
feracior.*

Cannabis semen in gallinis contrarium, ac in
nobis, ethere, tradit Matthiolus, siquidem gal-
linas ouorum feraciores reddit, experientiaque
sefe comperisse ait, gallinas, quæ Hieme sequi-
te, quo tempore oua rariùs pariunt, Cannabis semi-
ne pascantur, oua frequentius multò ponere.
Cannabis recentis decoctum expressa validè her-
bâ, terrestrium lumbricorum cauernulis insper-
sum, statim eos euocare idem affirmat, quod pi-
scatoribus acceptum referendū est, qui hac arte
vermiculos capiunt suis hamis affigendos, vt re-
ctè scripserit succum ejus vermiculos ex aurib.
ejicere. Ex his etiam colligi potest, ejus vires ad
interaneorum vermes haud imbecilles fore. E-
quorum etiam sedi hærentes tænias, succus aut
decoctum ejicit. Sunt etiam qui foliorum pulue-
rem dysentericis propinent. Quod Plinius de
radice dixit ambustis sæpiùs adinuenda, & a-
inuenda, commodius præstabitur, si recens in
mortario tundatur, cum recente butyro &
subinde applicetur.

Rustici Belgæ apud H. Lugdunensē, feminis
contusi medullam liquore aliquo expressam i-
ctero laborantibus initio ipsius mali exhibent,
& sæpe non sine successu, si quando ex sola ob-
structione & citra febrem exoritur. Aperit enim
fellis meatum, & bilis per corpus digestionem
promouet. Empirici quidam asserunt sanguinē
ex quacunque parte corporis fluentem sisti, si
qui exit sanguis cum foliis Cannabis minutim
concisus, frigatur, & ægro pro cibo detur.

Cunctis populis denique Lobelio teste, pe-
nuriâ Lanæ, Lini, Xilique refarcit, ad vestium
stragula, velorum, papyrum, quamlibet denique
suppellestem. Mas robustior rudentibus & ca-
pistris torquēdis nata habetur, mulierculis ada-
gio iocantibus dicentibusque esse feminam po-
torem mari. Hujus autem sententia est non parum
ad multa proficuum: ex eodem oleum pressum
tumoribus & scirrhis opitulatur, lucernis alit
lychnia & lucem. Lac etiam vel pulres ejusdem
macerati, aut jusculis decocti, fluxiones sistit diu-
turnas, dolores, repentinōsque flatuum vortices,
& humorum fluctuationem compescit: somnum

Tom. III.

conciliat. Vfus tamē nimius molesto sopore per-
fundit, tritum capiti, vel pedib. imis admotum,
haud abs re icteri humores, vaporesque tenues
à centro auertere & euocare putatur. Radices
podagricis tophis proficua. Odorem grauem &
nonnihil virosum eructat, & vel capitis in eo
decubitu temulentos facit. Succus verò folio-
rum certa pernicies insectis interaneis, & vul-
nerum putridorum alumnis: non quā facultate
idem foliorum Persicæ, aut Iuglandium putami-
nis succamentum efficit: sed vapidò, tetroque
situ, odore & exsiccandi vi, quā alimentum præ-
ripit illis & populatur excrementis dissipatis:
multum alimonie suggerit gallinis, cortalibus-
que: sed Hyeme fecundiores, postea steriles, &
quasi pinguedinis mole obrutas reddit. Auicu-
lis etiam cibus est, ac tantum saginæ adfert, vt
aut enecet, aut cantillandi adimat alacritatem
& facultatem, vt carduelibus, linottiis. Lacunis
aut scrobibus aquæ plenis merguntur vtriusq;
sexus fasces & manipuli, vbi macerantur, eluun-
turque multum & diu: deinde siccantur in So-
le, vt tundantur, ac demum cortices staminei
tundendo velluntur, vt Lino fit ad filum & te-
las. Sed lacustris aqua, cui intabuerit, tantopere
viru nocet, vt epota presentissimo sit sitientibus
exitio, cuique antidotis præstantissimis, tempe-
stiuè etiam datis, occurrere non possit.

Noxæ.

BANGVE CANNABI SIMILE.

CAP. LXXI.

BAngue planta est Cannabi haud absimilis, *Describe*
nisi quodd hujus semen canabino minus est, *Garcia*
nec ita cādicans vt illud: deinde hujus stolones *Semen.*
lignosi, nullo ferè cortice vestiti, contra quam
cannabini, auctore Garcia, qui ab Acoſta in qui-
busdam discrepat: Banguè simile ferè est, ait hic,
Cannabi: caulem habet quinque palmorum al-
titudine, quadrangulum, colore dilutiùs viren-
te, fractu contumacem, nec adeò concuum, vt
cannabinus caulis, cujus cortex non minùs
quàm illius in fila diduci potest: folia cannabina
supernè virentia, infernè incanà lanugine pu-
bescentia, gustu terrestri & insipido. Nos à Tho-
ma Platero semen accepimus nomine Banguè,
quod ad Strammonie primæ semen aliquate-
nus accedit, rufum, ac ferè spadiceum, compres-
sum, acuminatum.

Nonnulli in ea opinione fuerunt, vt Banguè *Nomina.*
Indorum, auctore Garcia, ab Opio differre non
putarent. Acoſta tamen dici refert Arabibus A-
xis, Turcis Asarath, Persis, Decan, plurimarum
aliarum regionum incolis Banguè, quod pluri-
mam affinitatem habere videtur Clusio cum
Turcarum Constantinopoli degentium Maslac,
quo ad varios affectus vtuntur, nonnulli
etiam vescuntur excitandæ veneris gratiâ.
Dubitatur tandem Fragosus, an herba hæc ab In-
do allata, illa sit, cujus meminit Theoph. lib. 9.
cap. 20. pl. Hist. sed quàm aptè, nescit ipse Clu-
sius. H. Lugd. pag. 1914. Banguè inscribit: C.
Bauh. phyt. Cannabem 3. siue Cannabi similem
exoticam. Huc autem reducitur propter folio-
rum cum Cannabi, & corticis in fila ductilis si-
militudinem, alias enim auctores contrarias fa-
cultates huic tribuunt, videlicet, quod genitale
semen multum iuuat.

Indi, inquit Acoſta, semine & foliis vescuntur. *Vires, &*
cum vt validiores in re venerea fiant, tum ad *Vfus.*

excitandam cibi appetentiam. Fit ex hoc Banguæ compositio vulgaris admodum vsûs, in ijs regionibus, ad varios effectus: etenim magnates & militiæ præfecti, ut laborum obliti securius & liberiùs dormiant, seminis & foliorum in puluerem redactorum, quantum videtur, sumunt, illique addunt Arecam, siue Auellanam Indicam viridem, & Opij nonnihil pro arbitrio: omnia saccharo excepta deuorant: si verò in somno varias rerum species sibi obuersari cupiunt, addunt selectissimam Camphoram, Caryophyllos, Nucem moschatam & Macis: si verò hilares esse volunt & faceri, & præsertim in venerem procliuiores, Ambaro & Moscho additis saccharo excipiunt, & electuarium faciunt. Multi autem affirmant, huius semen & folia ad libidinem ciendam miræ esse efficaciz: unde colligere licet, nihil affinitatis habere cum Cannabi, licet illi admodum similis sit: quandoquidem auctore Dioscoride, Cannabis calida & sicca est, & genituram exinguit.

TOCCON, HERBA BRASILIANA, cortice cannabino.

CAP. LXXII.

Descriptio.

Brasilianorum herbæ Toccon cortex, Cannabis modo detrahitur, cannabino fortior, filo, cui spinam subjungant ad piscandum, parando accommodus. Ex eodem arcum funes fiunt, qui licet tennes sunt, equis tamen ad sua pondera vehenda, fortitudine sufficiunt, Leri auctore, cap. 12. & 14.

CARBASVS VETERIBVS.

CAP. LXXIII.

Lini generis.

Anequam de Lino verba faciamus, Laconicam de Carbasa tractationem instituere placuit. Et Hispania citerior habet (inquit Plin. lib. 19. cap. 1.) splendorem Lini præcipuum, torrentis ibi quo posita natura, qui alluit Tarracorem. Et tenuitas mira [magna M.] ibi primum Carbasis repertis.

Carbasum autem esse Lini genus miræ tenuitatis palam fit ex jam relatis Plinij verbis. Quin & Dalechampio Carbasus à Lini genus quo texebatur vestis magni pretij, antiquis in delitijs habita. Et confirmatur hoc auctoritate plurimorum scriptorum. Carbasina enim vela primus in Amphitheatrum duxisse traditur Lentulus Spinter in Apollinibus ludis, mox Cæsar Dictator, teste Plinio. Verres, ut Cicero perhibet, Astate summâ tabernacula carbaleis intenta velis in litore collocari iussit, ut totos dies cum impudicis mulieribus perpolaret. Virg. 11. Æneid.

--- tum croceam chlamydemq; sinusque crepantes.

Carbaleos fuluo in nodum collegerat auro.

Item 8. Æneid.

--- cum tennes glauco velabat amictu,

Carbasus, & crines umbrosa tegebat arundo.

Lucanus lib. 3.

Fluxa coloratis astringunt Carbasa gemmis.

Propertius.

Exhibuit viuos Carbasus alba focos.

Ex quibus locis, atque etiam ex Quinto Curcio lib. 8. de Indis loquente, intelligi potest, hoc quoque virile esse vestimentum. Sed & muliebre esse satis constat ex Val. Maximo, loquente de Emilia virgine Vestali lib. 1. cap. 1. quæ adorante,

cum Carbasum, quam optimam habebat, foculo imposuisset, subito ignis emicuit.

Nunc & Linum candidissimum ex Ægypto, Xylon. Cottonem nonnulli & Carbasum per conjecturam vocant, &c. Vide Xylon, siue Gossypium.

Carbasum quidam id genus linei panni esse putant, quod Telam Baptistæ, & Telam Holandicam, & Telam Cameracensem vocant. Hæc postrema aduehitur ex Hispania. Tela Baptistina.

Carbasus est pallium, quo quis amicitur opulentiz causa, ut ex Serico, aut tenui Lino. Vide Andr. Tiraguelum comm. de leg. connubialibus leg. 1. gl. 1. part. 3. Pallium.

Carbasus tandem de velo, instrumento nautico, habetur, ut ex locis hinc annectendis colligitur. Virg. 3. Æneid.

Velæ vocant, tumidoque inflatur Carbasus Austro, Item 4. Æneid.

--- vocat iam Carbasus auras:

Puppibus & læti nauta imposuere coronas.

Ouid. 11. Metam.

totaque malo.

Carbasa deducit.

Item 13. Metam. Mota se: undo flatu sonant Carbasa.

Epist. Præbere ventis Carbasa.

Fast. 3. Toris subducere carbasa Lino.

Statius 4. Silu. Aurâ ventitantur Carbasa,

Martial. lib. 12. epig. 29.

Festinant trepidi substringere Carbasa, nauta.

Carbasus Carbasi penultimâ correptâ est feminini generis secundum Priscianum: masculini secundum Phacum. Probus verò & Caper dicunt esse masculini & feminini in singulari: in plurali verò neutrius. Græcè dicitur, ἀρμενος καὶ ἀρμενον, & τὸ, velum.

LINVM.

CAP. LXXIV.



Vulgò notum Lini generis.

num tenui, radiculâ, nititur, caule, tereti, pluriùm simplici, inani, cubitum, aut sesquicubitum alto, alis circa summum diuiso: folia, acuminata, culmum lata, viciâs duas plus minus longa, alternatim caulis apposita: flores, carulei, quinque partiti, striati, quos capsula, exci-

piunt rotunda, in quibus, semen fuscum, lubricum, latum.

Alii, Græci vocant, Linum Latini & officinæ: Synonyma cum nominibus linuarum. Linum germanicum Tragus: Linum satium vulgare caruleum Lobel. in Adu. & Ic. Plant. p. 42. In Obs. pag. 225. Linum Aduersatorium: C. Bauh. phyt. Linum 1. siue satium. In Dioscor. Annon, Pænis, & Zersaphoes cognominatur. Quemadmodum

Quemadmodum autem lingua Latinâ & græca Tela lineæ, & ipsa Lini herba communi nomine *linum* & Linum dicitur, ita apud nos Germanos Linum siue in agro, siue domi ad texturam, & telam apparatus commune nomen retinet *flachs*. Tamen non desunt, qui Linum nondum euulsum, Linum agreste, & Linocalamum; contra verò telam ex Lino textam, Linum domesticum seu vrbani vocitent. Belgæ nominant *flachs*, Galli *lin*, It. *lino*, Hisp. *lino*, Angli *flax*, Bohemi *lin*, & vt Hungari. Arabes seminis tantum meminere, vocantes illud *Bizchichitum*, seu vt Serap. placet, *Bazarichichen*: Hebræi *Pistah*, Chaldæi *Chisna*: Exod. 9. Onkeli: Græci *λινάριον* & *λινωσπύριον*: Germani *flachs* *Linjamen*.

Locus. A Lino varia ducuntur adagia, v.g. *Linum lino connectis*, cuius duplicem apud Græcos interpretes sensum inueniri perhibet Erasim. Roterodamus: Horum alter est: infirmis infirma copulas, friuola friuolis. Alter: eadem non iisdem rationibus facis, aut dicis. *Vltra Linum* dixit Lucianus in Ioue redarguto, pro eo, quod est extra decretum fatale. Est & tertium prouerbiū *Candidum Linum lucri causa ducis*, quod in eum quadrat, qui dotis causa ducit vel deformem, vel anum. Est & quartum: *Qui canem alit externum præter Linum nihil habet*, i.e. præter funiculum ei nihil sit reliqui. Qui beneficium collocat in ingratum, perdit operam. Nam canis alienus relicto fune, quo alligatur, pristinum dominum reperit.

Theophrasto visum fuit, Linum degener factum, in Lolium abire. Nostrates coloni sibi visum pernegant, aut auditum.

Latit. Pinguissimum, vt Columella ait, locum & modicè humidum poscit. Aliqui, inquit Palladius macro solo spissum ferunt, atque ita assequuntur, vt Linum subtile nascatur. Plinius scribit feri fabulosis, maxime vno sulco, nec magis festinare aliud, vrereque agrum, & deteriore ipsū facere, quod & Virgilius in Georg. attestatur:

*Vrit Lini campum seges, vrit Avena,
Vrunt lethæo persusa Papauera somno.*

Seritur linum Vere: Maio & Iunio mensibus floret. Linum (inquit Crescent.) desiderata ærem temperatum, & terram solutam & pinguem, & quantò pinguior fuerit, tantò ipsius stuppa erit grossior, quantò verò macrior, tantò eius stuppa subtilior erit. Sed ex eo parum & breue in tali terra nascetur. Huius autem seminatione terram satis macrari & lædi creditur, ideoque auxilio leguminis eget, si tale semen recipere assuescit. Eius terra ante Hiemem debet arari, vt glebæ propter gelu sequentis Hyemis in puluerem reducantur: deinde post Hiemem, cum primum poterit, secundâ vice arabitur, deinde aspergatur & iterum aretur quinque vel sex vicibus, in tantum vt in puluerem redigatur, ita tamen quod primâ vice profundius aretur, secundâ minus profundè, & sic semper profundatio vsque ad vicem vltimam minuat: deinde à medio Aprilis vsque ad finem eius satio ipsius est optima, satioque in summo terræ sit minus vno palmò, terrâ super semen aratro reuolutâ.

Tres corbes huius seminis, vel parum plus sufficiunt iugero, cui multum proderit si talis ager expexetur postquam fuerit seminatus, quod si tempus fuerit magnæ siccitatis, ei valde proderit, si poterit irrigari. Potest etiam feri ante Hyemem in locis calidis, in quibus Linum natum frigore non læditur, & tunc melius prouenit in

Tom. III.

terra mediocriter cretosa, quàm nimis soluta, nec est necesse quod sit pinguis, & quod vltra duas vices aretur, dummodò terra puluerifetur, & cum fuerit seminatum, melius est quod cum expexe solummodò de quibusdam spinis facto semen operiatur, melius etiam est quod homo vnus cum fune trahat expexem, quàm boues, propter nocumentum, & hoc est cuiuslibet homini facile.

Hæc verba bis mundanda est cum maxime suffocetur, ideoque extripandum est noxium antequam circa Linum inuoluatur, licet per ipsum ambulando lædatur cum magnum est, & ideo mundatur, & debet ante se manibus aperire, & ire per eum optimè eleuatis pannis. Sed cum primâ vice mundatur, quia tunc paruum est, & conculcatum releuatur, non læditur ambulando per eum.

Colligitur autem cum maturo colore flauescit, & eodem die ne rore tangatur, sub tecto ponatur in fascibus, deinde malleolis ligneis excutitur semina, & ipsum Linum ad maturandum in aqua ponitur, in qua quatuor vel quinque diebus, si putrida sit, sterile sufficiat, si autem aqua non sit corrupta, vsque ad septem dies stare in eadem oportet, vt putrefiat caro herbalis, & cortex ex quo sit stuppa.

Erit autem signum temperatæ maturationis, quando maceratur in aqua, cum tactu mollescit, adeò quòd omnem rigiditatem amiserit, cognoscitur etiam si ex eo aliquid extrahatur de aqua & siccatum probetur, si caro herbalis à stuppa facile separatur. Veruntamen si minus, quam expedit, maceretur, erit stuppa fortior & alior, sed non perfecte separabitur caro herbalis, & erit durior ad filandum.

Deinde optimè lauatur & in aqua excutitur, concutitur malleolis ligneis, vt eius caro rumpatur, & deinde ad Solem calidum ponitur, & cum fuerit calefactum in pannis calidis in domo simul ponitur, & cum per aliquas horas sic steterit, gramolatur, hoc enim modo mundatur optimè, nec stuppa rumpitur gramando, quod heret si statim gramarentur cum eleuantur de Sole. Quod si tempus fuerit humidum cum multis pannis madefactis ad ignem præparatur gramen, deinde spatulis eius mundificatio completur, deinde pestinatur, & filatur.

Lini semen, inquit Dioscorides, eandem vim habet, quam Fœnum græcum, discutiens ac molliens omnem internam & externam inflammationem, cum melle & oleo & modica aqua coctum: aut cocto melle exceptum. Tollit maculas solares crudum, & varos cum nitro & Ficibus impositum. Cum lixiuio verò parotidas, iuxta aures abscessus, & duritias discutit. Herpetas, & duritias discutit. Herpetas, atque vicera, cum vino coctum expurgat. Scabros quoque vngues remouet, cum pari Nasturtio & melle. Educt *Plin.* etiam ea quæ in thorace hærent, cum melle eclegmatis vice acceptum, & tussis mitigat. Stimulat item ad venerem, si mixtum melli & Piperi placente modo largius sumatur. Sed & decoctum ipsius infunditur ad intestinorum & vteri rosiones, & excrementa educenda. Commodum est etiam ad infellus, quemadmodum Fœnum græcum, ad vteri inflammationes.

Velorum ex Lino in nauibus vsus in mari, velut admirans Plinius, decimi noni libri principio ait: Atque vt à confellis ordiamur vtili-



tatibus, quæque non solum terras omnes, verum etiam maria repleuere, feritur, ac dici neque inter fruges, neque inter hortensia potest Linum. Sed in qua non occurrit vitæ parte? quodve miraculū maius, herbam esse quæ admoveat Ægyptum Italiæ? herbam esse quæ Gades Herculis columnas septimo die Ostiam afferat, & citeriorem Hispaniam quanto, Prouinciam Narbonensem tertio, Africam altero. Audax vita, scelerum plena, aliquid feri ut ventos procellasque recipiat: & parum esse fluctibus solis vehi. Denique tam paruo semine nasci, quod orbem terrarum vtrò citroque portet, tam gracili auenâ, tam non altè à terra tolli: neque id viribus suis necti, sed passum, tustumque, & in molliem lanæ coactum, iniuria naturæ, ac summa audacia, & quò peruenire nulla execratio sufficit, contra inuentorem dictum suo loco à nobis. Cui non satis fuit hominem in terramori, nisi perierit & insepultus. At nos priore libro imbres & flatus cauendos, frugum causâ fructusque præmonebamus, ecce feritur hominis manu, metitur eiusdem hominis ingenio, quod ventos in mari optet. Præterea ut sciamus fauisse poenas, nihil gignitur facilius: ut sentiamus nolente id fieri naturâ, vrit agrum, deterioremq; ipsum facit. Hæc Plinius.

*Utilitates
Lini.*

At quanta censenda est velorum ex Lino utilitas, si ad reliquum Lini vsum per omnem vitam conferatur? Hoc loti detergemur, hoc sordidi defricamur. Ex hoc factâ veste totum corpus extrinsecus ad cutem integre omnes interdiu vestimur: noctu stragulis inde factis incubamus ac integimur. Rusticana gens vtriusque sexûs pallia, & tunicas ex ipso gestat: & mundus muliebris magna ex parte ex hoc constat. Sed omnes has necessarias vitæ utilitates facile superat Linum chartarum dono. Hæ ex ipso penitus detricto & nullius amplius vsti: reiculo fiunt, tot hodie vbique officinis, ut multa hominum millia ex præparandi chartas opera, in papyraceis, ut vocant, molendinis, se nutriant. His chartis & literarum notis, omnes bonæ artes, leges, tota Philosophia, & vitæ piæ ac recte degendæ rationes excipiuntur, habentur, conseruantur. His chartis hanc materiam medicam, & totius ferè naturæ plantas descriptas commendamus orbi. Harum utilitatem vix a nimo quis concipere possit, nedum pro dignitate explicare, quantumuis longâ institutâ oratione.

Galenus. Verum Galenus 1. de Alim. Quidam, inquit, vtuntur semine Lini tosto, velut obsonio cum Garo. Vtuntur etiam melle ammixto. Aliqui etiam panibus inspergunt. Sed stomacho incommodum est, & ægrè concoquitur, & modicum alimentum corpori præbet. Ad ventris autem egestionem neque laudari, neque vituperari meretur. Exiguum tamen quid habet de ciendi vrinam facultate, id quod magis manifestum fit, vbi tostum editur. Tunc autem sistit quodammodò magis aluum. Idem 7. simpl. Semen Lini, si editur, flatuosum est, etiam si tostum fuerit. Ita superflua humiditate refertum est. Calidum est, ordine primo: verum inter humiditatem & siccitatem medium obtinet. Pinius lib. 20. cap. 22. feminis Lini vsum medicum longius describit, & multa Dioscoridis declarat.

*Linum
calidum
& hu-
midum.*

Linum, apud Tragum, communi Medicorum consensu calidum & humidum esse traditur. Semen autem tustum ac in puluerem redactum adiecto modico mellis, & Piperis, ita ut eclegma ex

his fiat, & per diem quantitate Nucis moschatæ sumptum, tussim mitigat & venerem stimulat. Qui internis inflammationibus infestantur, his semen Lini aqua decoctum, admixto melle, in potu exhiberi potest, & foris emplastri instar imponi, quæ medicina plurimum prodest, & quousvis finit dolores. Ad emolliendas vulgæ & interaneorum propter lentam humiditatem obstructions, in colica etiam passione prodest, corpus oleo Lini inungere, aut semen decoctum calidum foris imponere, aut ex iure seminis decocti & oleo clysteres iniicere, prout vnicuique visum fuerit. Semen Lini, necnon oleum eius illitu & impositum ambustis conducit. Quantopere porro flatuosum & recrementitiâ humiditate plenum semen Lini sit, paucis ab hinc annis Middelburgi in Zelandiis animaduerti potuit, cum propter frumenti aliarumque frugum inopiam, plerique ex ciuibus pane & cibis ex hoc coctis vescerentur. Distenta enim his valde citò hypochondria fuerunt, & facies aliæque partes tumidæ factæ, quorum non paucis affecti, etiam mortui sunt. Neque enim aliunde hæc symptomata, quam ex recrementitiâ seminis humiditate, quæ flatulentiam parit.

Oleum quod ex semine eius exprimitur, multiplicem vsum habet, nec enim à pistoribus, aut statuariis, aliisve artificibus expetitur solum, vel ad lucernas tantum utile est, sed etiam medico vsui seruit. Nam & duritias omnes mollit: nervorum tensiones contractionesque laxat, dolores illitum sopit. Sunt etiam qui bibendum exhibeant lateris aut coli dolore laborantibus, verum recens sit oportet, rancidum enim factum & nauseam excitat, & plus, quam par est, calefacit.

LINVM SILVESTRE, SATIVVM planè referens.

Linum silvestre, sativum planè refert formâ, nisi quod caules habet & folliculos crassiores, & maiores, & in summo furculis multis brachiatos. Et maxima inter hæc duo Lini genera in eo consistit differentia, quod folliculi silvestris Lini calore Solis non aperiuntur, perinde ut alterius, nam quamprimum exsiccati Sole fuerint, excutere semen ut aliarum frugum oportet, auctore Trago, qui Linum 2. & silvestre vocat: C. Bauh. phyt. Linum 2. siue alterum folliculis crassioribus.

Apud Mediomasitres hoc sylvestri Lino ad-
Locus &
uentante Æstate integri agri conseruntur, & in-
Tempus.
uenitur etiam quandoque inter segetes Auenæ.

LINVM SILVESTRE ANGVSTIFOLIVM, flore quasi cinereo, capitulis magnis.

C A P. LXXV.

Miram in Lino silvestri conspici varietatem satis ex Clusii Hispanicarum, Pannonica-
Lini silv.
rumque stirpium historia patet: Cum verò Li-
mirum
num silvestre dicit, Linariam non intelligit, quæ
varietat.
aliquibus etiam hoc nomine appellatur, sed
plantam floribus Lini similibus, eodemque modo fugacibus, nonnunquam etiam Lini folia habentem.

Linum igitur silvestre angustifolium flore cinereo, Lino silvestri angustifolio albo cum purpureis lineis omnino simile est cauliculorum &
foliorum

foliorum gracilitate, ténuitate, *foliorumque* formâ & *radice* : in florum duntaxat colore est differentia, qui niuei non sunt, sed cærulei in candidum languescentes, & quasi cineracei : capitula etiam floribus succedentia longè ampliora, nec minora quàm in satiuo.

Locus. Lini siluestris quinti, angustifolij secundi varietas hæc in Austriacis Alpibus præsertim verò Sneberg inuenitur : Floret verò isthic sub finem Iunij, semen extremo Iulio & Augusto maturum.

LINVM SILV. ANGVSTIFOLIVM.

Descript.



D Vram lignosamque possidet radicem, satis crassam, ex qua germinant multi simul caules tenues, qui ad cubitalem altitudinē ascēdunt, *foliis* stipati cōfertissimis, tenuissimis, longitudine ferè Lini satiu: ex calycibus longiusculis flores extremis ramulorum breuium nascuntur, magni, albi, vel quasi

cinerei, fortuitis cæruleis striis sublucentib., tam caduci vt vix attingi possint, quin delabantur, vascula minora quàm Lini satiu, quadripartita, *semine* Leni, minore. Figura Fuchiana non satisfacta.

Itiner.

Lini silv. cit.

tenuifol.

Camer. hort. dicitur Linum silv. tenuifolium, flore albo, cæruleo intensè, & dilutè purpureo. Et aliud pusillum candicantibus floribus spontè vbique occurrens, circa vineta Franconiæ. Gerardo Linum silv. tenuifol. 1. & 2.

An Linum

silv. an ust.

Clus.

An Clus. Hispan. Linum silv. 2. siue angustifolium?

An Trago Linariæ species quarta?

Linariæ foliis

capillaceis,

tenuifolia,

Caspar. Bauhinus phyt. Linaria 14. siue foliis capillaceis, tenuifolia H. Lugdunensis. Item, Linum 7. siue silv. angustifolium, flore minore primum.

Locus &

Tempus.

Variis circa Viennam Austriæ locis spontè nascitur, præsertim in gramineis accliuatibus, & iuxta vias. Floret Maio & Iunio, interdum etiam tota Æstate : semen verò maturum est Iulio.

LINVM FRVTESCENS FLORE omninò candido.

CAP. LXXVI.

Descript.

Fruticosum atque dodrantalibus pedalibusque ferè ramulis semper virentibus præditum est, quos numerosa *folia* exornant, mediæ inter Thymi & Psyllij magnitudinis, subalbida, flores deinde superiori paulò maiores, quinque foliis vi illi constantes, omninò niuei, sum-
Tom. III.

mis ramulis insident, quibus succedunt capitula *semine* plena : *radix* dura & lignosa est.

Clusio descriptionis authori dicitur in Hispan. Linum 3. siue silv. fruticans : In Hist. post. Linum silv. 7. fruticosum.

Exit desertis quibusdam Hispaniæ locis, Sole illustratis : floret Iunio & Iulio, arque subinde semen profert. In Belgio satum, tertio duntaxat à satu anno seriàs floruit, nec semen tulit.

Locus & Tempus.

LINVM SILV. ANGVSTIFOL. ALBVM, lineis in vmbilico purpureis.

CAP. LXXVII.



D Odrantales, nonnunquam etià pedales habet cauliculos, graciles, firmos, rectos : *folia* satiu Lini, angustiora, dura, mucronata, vi-rentia, amari-cantia : *flores* in summis cauliculis multos, magnos, quinque foliis albis præditos, circa vmbilicū quinque purpureis lineis distinctos, totidem staminibus, &

Descript.

quinque separatis apicibus ex medio vmbilico prodeuntibus, odoratos : *semen* in rotundis vasculis planum, nigricans, splendens, satiuo Lino simile : *radicem* candicantem, duram, aliquot fibris donatam, perennem, & singulis annis novos cauliculos proferentem, authore Clusio, qui in Pannon. p. 303 & 304. Linum silv. 4. siue angustifolium flore albo cognominat : In Hist. post. Linum silv. 5. angustifolium secundum : flore ex diluta purpura candicante, & quasi carneo.

Synon.

Linum silv. florens obseruauit Monspeisuli mense Aprili & Septembri : Basileæ prope Krenzach Octobri : prope Leurach in monte Augusto : Linum silv. 6. angustifolium Clus. in Hist. post. primum obseruatum in anteriore Madritianæ siluæ parte, quæ secundo ab vrbe Lutetia lapide distat, inter gramina, loco aperto, & nullis arboribus obsito, florens Iulio, maturum semen proferens Augusto : deinde agro Viennensi aridioribus gramineis locis.

LINVM SILVESTRE LATI-folium hirsutum flore cæruleo.

CAP. LXXVIII.

Ramus nobis datus Argentinæ anno millesimo-quinquagesimo-nonagesimo quinto, ex plantis Agerij, cubitalis, satis crassus, firmus, hirsutus, in quo *folia*, semunciam circiter lata, paulò longiora, acuminata, pilosa,
D d d

Descript.

venosa: flores extremis ramulorum, in quos superiore parte caulis diuiditur, hærent simul multi, Alceæ floribus pares, coloris cærulei, aut ex cæruleo pallescentis, quorum imum obuoluit foliaceus calix hirsutus: supremæ partes Heliotropii modo flectuntur. Anno 1600. nobis dati alii rami singulares, cubitum excedentes, sub inscriptione Lini siluestris latifolii floribus rubentibus, foliis & caule viscosis ex Sumano monte prope Bassanum oppidum & circa Bononiam. Huic Lino caules & folia hirsutiora, vnciam longiora, acutiora, flores magni quidem, sed minores, purpurascens, saturatioribus lineis insculpti: in foliis sapor nullus manifestus.

Synon. Clusio Pannon. pag. 298. Linum silv. latifolium flore cæruleo: item pag. 299. ad figuram Linum silv. 1. In Hist. post. Linum silv. 1. latifolium: Lobel. Obs. pag. 226. Linum latifolium, foliis hirsutis, Tithymali Heliotropij paribus: Num autem hæc eadem sit planta cum Latifolio Clusii siluestri Lino Ascyri folio, assermare dubitat. Icon. Plant. pag. 414. Linum silv. latifolium. C. Bauh. phyt. Linum 4. siue silv. latifol. flore cæruleo magno.

Locus. Frequens est multis Pannoniæ superioris & Austriæ inferioris locis editioribus & siccioribus, gramineis tamen. Floret Iunio & Iulio: semen maturum Augusto. Rantzius, qui Lini latifolii alpini purpurei titulo portionem nobis communicauit, in Baldo prouenire retulit.

Linum silv. latifolium lanuginosum, flore candido, purpureis lineis striato.

Descriptio Pedales, graciles, lanuginosos, ternos, aut quaternos ab vna radice promit caules, in quibus Lini latiuscula folia trineruia, ad Ascyri formam ferè accedentia, nec multum à prioris foliis discrepantia, lanuginosa: extremi cauliculis in binos, aut ternos ramulos diuisi, & Heliotropii maioris quodammodò instar circumflexi, pleni sunt floribus, qui ab imo aperiri incipiunt, Lini florum diuisurâ, sed maioribus, superiori æqualibus, candidis, quos multæ purpureæ venæ intersecundant: semen & capitula Lini similia radix perennis est, crassiuscula, longa, candicans raris fibris septa.

Synon. Clusio, descriptionis auctori, est in Hisp. Linum silv. 1. siue latifolium: In Pannon. pag. 295. Linum silv. 1. Hispanicum. Hist. post. Linum silv. latifol. secundum, sine icone.

Locus & Tempus. Apud Colibriam Lusitanæ urbem hanc stirpem duntaxat obseruare meminit Clusius, ad desertum quoddam & solitarium templum mense Nouembri repullulantem, è cuius cauliculis semen collectum in Belgicam attulit, quo terræ commisso, vnica planta nata est, cubitalem excedens altitudinem, & latioribus natali solo foliis, quæ singulis annis sub Æstatis finem quidem floruit, sed nullum semen præbuit.

LINVM LATIFOLIVM luteum.

CAP. LXXIX.

Descript. Linum latifolium luteum caulibus adulescentibus angulosis, firmis, cubitum altis, pluribus ex vna radice ortis, & superius in ramos breues diuisis, quos folia vestiunt alternata, glabra, vnciam

longiora, semunciam lata, in obtusum mucronem desinentia, sapore amaro prædita: flores numerosi extremis ramulis innascuntur, magni, è quinque foliis compositi, lutei coloris, quinque staminibus, totidemque villis luteis, medium obfidentibus: semen, teste Clusio, in capitulis com-

pressioribus, reliquis paulò minus, nigricans quidem, sed non splendens, quemadmodum illorum: radix satis crassa, contorta, albicans, aliquot fibris donata, singulis annis repullulans, nouosq; caules producens.

Clus. in Pā. **Synon.** non. pag. 300. vocat Linum silv. latifolium flore luteo: pag. 301. Li-



num silv. 2. In Hist. post. Linum silv. 3. latifolium.

Tabern. Icon. & Hist. (vbi primum) Linum silv. Pannonicum: Caf. Bauh. phyt. Linum 5. siue silv. latifolium flore luteo magno.

Gerardus ineptè pro Lino satiuo posuit iconem Lini silv. Pannonici Tabern.

Exit abundè in monte Badēnsibus Austriæ thermis imminenti, locis gramineis secundum sepes, & plerisque aliis in montium illa serie ad Danubium vsque excurrente, locis: ad siluulam item Lachn. pago vicinam: Floret Iunio & Iulio: semen maturat Augusto.

LINVM LVTEVM NARBONENSE.

CAP. LXXX.



Descript. Ab vna radice surgunt plures, cubitales, qui superius in ramos diuiduntur, per quos folia mollicella, latiuscula, breuiora quam Lini satiuui, insipida: flores extremis hærent ramulis, Lini, sed coloris lutei, amaricantes, quibus succedunt capitula minora quam Lini satiuui, satis amara, semen continentia.

Monspelijs

Monspelij iam descriptum Linum à nobis obseruatum, florens Septembri. Verum ibidem in maritimis Autumno aliud longè maius obseruauimus, ad duos cubitos excrecens & ultra, ramis crassioribus, firmioribus: foliis longioribus & latioribus, salsi saporis: floribus luteis, facillè deciditibus: capitulis amaris, sine falsugine.

Simile nobis prouenit Montbelgardi in horto Ill.E.C.excedens duos cubitos. Qui stirpium diligentes indagatores haberi volunt, Monspelij obseruent, an sit differentia aliqua, vel varietas tantum ratione loci.

Matthiolo in post.comm.vti existimo, est Linum siluestre. Sed & Dod. lat.in fol. Linum appellat siluestre, quod non satum, sed spontè exeat, & Marinum Linum, quod maritimis gaudet, in stamina diduci & istud posse credidit. Lobelio in Adu. dicitur Linum marinum luteum, quibus in Obs.pag.225.& Icon.Plant.pag.312. vox Narbonense additur. Casp.Bauh.phyt.Linum 3. siue maritimum luteum. Camer.hort. Linum silu. Matthioli latifolium flore luteo, in agro Bononiensi vbique proueniens. Haud procul à mari (inquit Dod.) in pratis ac herbosis locis, in nonnullis regionibus gignitur, veluti in Narbonensi Gallia.

LINUM PYMILVM FOLIIS SEMPER
binis, albo flore, vel luteo
pallente.

CAP. LXXXI.

Descriptio



Exili, rotundo, dodrantalique, aut paulò maiore assurgit cauliculo, quem aduerso situ, vt in Hyperico, bina semper amplectuntur foliola, Lini satini foliis ferè paria: supremus cauliculus in aliquot ramulos diuiditur, qui in oblongis pediculis exiguos flosculos, quinque fo-

liolis albis constantes, proferunt, luteis intus staminulis: flosculis succedunt parua capitula, Lini vasculis non absimilia, minora tamen, in quibus semen: radix tenuis, aliquot exilibus fibris donatur, sed an perennis & rediuiua ignoratur à descriptore Clus. qui in Pann. p.305. & 306. Linum silu. 5. siue Chamælinum Pannon. vocauit, & in Hist.post. Linum silu. 8. Chamælinum, & silu. 8. angustifolium, Lobel. in Icon. Plât. pagina 413. nomine Chamælini eandem cum Clusio habet iconem, quæ occasio, vt non separemus, quamuis in Obseru. pag.227. ei alium colorem adscribat.

C.Bauh.phyt. Linum 9. siue silu. minimum flore & candido & luteo vidit.

Locus & Tempus. Prouenit in herbosis collibus & montanis Austriz atque Pannoniæ: floret verò Iunio & Tom. III.

Iulio. Similem aliquando ad Clusium Machliniam, è Tornacensi vrbe Ioannes Moutonus misit.

ALSINE VERNA GLABRA, FLOSCVLIS
albis, vel potiùs Linum minimum.
CAP. LXXXII.



Ex radice tenui, sed rigidula, exiguis, sed multis filis capillata, coliculos emittit nonnihil reptantes, mox humo ad palmum, aut altius sese attollentes, fastigio sursum ramoso, nutante, teretes, tenues, geniculatos, propter terram rubescentes: foliola infima Alfine mino-

Descriptio
Radix.
Coliculi.

Folia.

Flosculi.

ris, ferè rotundata superiora, quæ in caulibus bina opposita ad articulos nascuntur, paulò longiora, sapore subamaro & subacri: flosculi candidi, è quinque foliolis compositi, apicibus intus luteis: vascula succedunt Lini, parua, canaliculata, in quibus semen lucidum & lubricum, Lini, compressum & oblongum.

An Linocarpus Thalia? Camer. Linum silu. exiguum in hortorum arcolis sæpè prorumpens. H.Lugd. pag.1234. Alsine verna: C.Bauh. phyt. Alsine 20. siue pratensis glabra. & Belvedere quorundam.

Alsine verna Dalechampii circa Geneuam in Locis & segetibus floret mense Martio: Montbelgardi in Tempus prato sicco vbi olim fuerunt horti ferarum, ante pontem & passim Maio, Iunio, Iulio & Augusto.

PASSERINA LOBELII.
CAP. LXXXIII.



Folius est Descriptio per caulem dodrantalem confertis, Lini similibus, viridantibus, acuminatis, vncialibus, circa superiora rarioribus: floribus in summis ramulis breuibus, acervatim congestis, luteis, quos excipiunt vascula exigua, turbinata, Lini, dimidiò, aut triplò minora, foliolis quibus-

Ddd 2

dam acutis vndique obuoluta, *femine* plena lubrico, lucido, fusco, multò Lini feminibus minore: radix satis longa, tortuosa, alba, lignosa.

Synon. Lobel. in Icon. Plant. pag. 411. vocat Passerinam Linariæ folio, & sic etiam in Obseru. pagina 224. vbi & Chrysocomen alteram Mutoni.

G. Bauh. phyt. Lithospermum 7. & Passerinam alteram Monspeliacam, non semper vno caule exsurgentem.

Locus. Basileæ anno 1594. vidi plantam siccam apud C. Bauhinum, quæ ei missa fuerat per D. Paschalem. Gener. Io. Henr. Cherlerus attulit Monspeliæ. Meminit Dom. Schvartz Passerinæ cuiusdam arborescentis Candia cuius semen ei missum per Casabonam. Nos nondum vidimus.

PASSERINA TRAGI.

CAP. LXXXIV.

Descript.

Lingua passerinæ nomen fecerunt *foliola* acuminata auiculæ iam dictæ linguam imitantia, alternatim, rariùs aduersa, *cauli* dodrantali & altiori recto, tereti, sæpè simplici, interdum ramoso, sine pediculis adnata, sapore viscido prædita, ex quorum alis *flosculi* plures pusilli oriuntur, calathisci formâ, ex herbaceo

fluascentes, oris in quatuor lacinias diuisis: *femina* parua, turbinata, nigra, Lithospermi feminibus multò minora.

Passerina Tragi. Tragus Passerinæ nomine depingit & describit, ac tertium Lithospermi, vel Milij Solis genus facit, indeque germanicè *vuilden Meerhirs* vocat, & Dyospyron Theophrasti esse somniat.

Lobel. in Adv. Passerinam Herbatiorum appellauit: Camer. hort. Passerinam Tragi: H. Lugd. pag. 1152. Passerinam, Linariæ folio Lobelij. Tabern. Icon. & Hist. linguam passerinam *Spatzenzung*: Dodon. gall. Lithospermum minimum Tragi, *Gremil sauuage fort petit*: Casp. Bauh. Lithospermum 6. siue minimum Passerina dictum.

Locus & Tempus. Prouenit Montbelgardi in agris, Augusto semine maturo: item inter Taillecourt & Audincourt, versusque Matthai castellum. Inter segetes Basilienses obseruauit Casp. Bauhinus: In agris Franconiæ inter Herbipolim & Francofurtum copiosè Camerarius: Inter oppidum *Altzeim*, & montem tonitru post messem in agris frumentariis Tragus.

LINARIA LVTEA VVLGARIS.

CAP. LXXXV.



Priusquam Descript. *flores* producat Linaria, adeò Tithymalum cyparissiam mentitur, ut nisi lac deesset Tithymalli, difficile futurum esset iudicium: tanta est foliorum similitudo: at *flores* in thyrsum digesti, ut vel primo intuitu ab errore prohibeant, qui huic posticâ parte corniculum Consolidæ regis proferentes,

anticâ parte Anthirini ricum imitantur, colore luteo præditi, apiculis concoloribus: reperitur interdum flore albo: *semen* in capitulis rotundis latum: *radix* lignosa, dura, alba: varias hinc inde fibras emittit, ac suo reptatu in hortis odiosa sapor plantæ amaricat.

Linariæ herbæ plura sunt genera, quæ singula seorsim recensenda. Vulgarissimam autem hanc Linariam à vulgari exigua Esula, cui plurimum propinqua, vel sequens discernit versiculus:

Esula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Existimatur à multis esse Osyris: sed Osyris ab hac differens est stirps, ex qua videlicet *νοσηματα*, est. h. e. scopas hac ætate, in Italia componunt: ut & olim Galeni seculo: quam vulgò Itali *Belvedere* nuncupant.

Tragus Osyridis & Linariæ titulo eam donauit, & primo loco pro vulgari Linaria descripsit. Videtur autem ei hæc planta rectiùs Cynocephalia dici posse, quæ in Ægypto (ut prodidit Apion Grammaticus) Osyrites cognominatur, & aduersus veneficia à Magis usurpatur.

Sed & Lobelius, qui in Ic. Plant. pag. 406. Osyridem, Linariam & Vrinariam (ut & in Obs. pag. 222. vbi etiam Chrysocomen Gesneri Dalech. vocat) inscribit, in Adu. Plinii Antirrhinum facit. Dodonæo etiam gall. & lat. Antirrhini species videtur, licet in Hist. gall. eam Osyridis: & in lat. Linariæ primæ titulo pingat. Fuchsi quoque constans est opinio Linariam esse Osyridem. Hunc tandem Adrian. Spieg. Isag. lib. 1. cap. 23. sequitur: itemque Eur. Cordus, cui Herba vrinialis est hæc ipsa Linaria, contra vulgares Herbarios, qui has quasi duas distinguunt.

Clusio dicitur Linaria vulgò nota, & omnibus ferè prouinciis familiaris: Camerario hort. Linaria vulgaris. Hist. Lugd. pagina 1151. Linaria vulgaris flore subluteo: Casp. Bauhino phyt. Linar. 1. siue vulgaris lutea flore maiore: varians floris colore, luteo-pallido, magis luteo, aliquando albo.

Ponit

*Compil. no-
tatur.* Pont. Compiler Tabern. tam in Icon. quàm Hist. figuras duas, Osyridis maioris vnam, alteram minoris, nullo appposito discrimine, quàm magnitudinis.

*Givard. la-
fus.* Gerard. ambas assumpsit, sed præter rationem exhibet pro Linaria Valentia, eam quam Tabern. pro Osyride minore ostendit.

*Dorff. va-
preb.* Dorst. Osyrim, Linariam, quam Esulam adulterinam vocat, & Herbam vrinalem confundit, & commiscet. Non probamus autem eum p. 149. ponere duas icones pro Herba vrinali & Osyride: & postea p. 173. eandem locare pro Linaria & Osyride, vbi etiam non bene germanicè, *vwild vvolffs milch*, hoc est, Esulam filu. & *Scheiffkraut*, hoc est, Cacariam vocat, siquidem non purgat.

*Nomina
linguar.* Linariam Germani appellant *lynkraut*, *flachs-
kraut*, *vvald*, & *vwild flachs*, h.e. Linum siluestre, vel etiam Pseudo-Linum: *harnkraut*, i. e. Vrinalem, quæ vox magis propriè aliis plantis debetur. *Vnser fravven flachs*, vel *harr*, i. e. vt Pannoniæ mulierculas rhizotomas interpretemur, Diuæ Virginis Linum, vel capillū. *Nabelkraut* Herbam umbilici, aut umbilicalem. Multi *Gal Ritter sporen*, h.e. Consolidā regalem luteam *krotten flachs*, h.e. Linum bufonum. Belgæ *vuilt vvolas*. Galli *Linaire* & *Lin sauage*. Angli *toade star*. Boh. *len mirky bozj*. Hung. *Vad len* & *Vad fravv*, Itali & Hispani Linaria.

Linariam autem dixerunt recentiores à foliis quæ Lini faciem referre videntur.

*Locus &
Tempus.* Nascitur passim in Germania ac Belgio secus agrorum margines, & aliis locis. Floret Iulio ac Augusto, ac etiam seriùs, vt Septembri & Octobri.

*Vites & v-
sus.* Vulgaris Linaria,alui turbatrix est, inquit Tragus, temperamenti humidi & calidi. Extrinsecus maiorem habet vsum, in iis quæ refrigerationem potiùs, quàm calefactionem requirunt. Aqua enim in linteolis imposita id præstat. Aquæ quantum vitrum exiguum capit, admixta drachma corticis ebulli in puluerem redacti, sumpta potio, vrinam potenter cit, quare hydropicis tantum id medicamenti exhibendum erit. Eadem aqua distillata ac pota, aluum laxat, morbum discutit regium, aduersus quem herba ipsa vino decocta ac pota inprimis facit, sicut & iecur obstructionibus liberat. Aqua distillata aut succus oculis inditus, inflammationes eorum & ruborem tollit. Linaria, aqua eius, & succus, quæuis vlcera mundant, cuiusmodi sunt cancer, & fistulæ, linteolis imposita, & si cum aqua loci affecti colluantur. Succus idem maculas & vitia faciei emendat, quare superbis mulierculis, quæ puram & immaculatam faciem affectant, conuenit. Fuchsius vehementer errare eos scribit, qui Linariam frigidā & humidam esse asserunt. Et certè vel hoc vno argumento erroneam illorum sententiam confutare omnium maximè licebit. Cum etenim Linariæ vrinam mouendi facultatem inesse scribant vulgares etiam herbarij, colligitur illam non esse frigidam & humidam: quādo Galeno lib. 5. simpl. c. 12. attestante, omnia quæ vrinam ducunt ex acrimia atque aded calidorū & siccorum sint genere. Est igitur Linaria calida quidem & aliquantulum sicca temperie, & aperiendi potentiā prædita, teste Dodonæo. Quod verò multi regio morbo laborantibus eam prodesse dicant, id ab Osyride huc translatum esse perhibet.

* *

Tom. III.

Linaria vulg. lutea flore minore.

Alterum hoc Linariæ genus, iam descripto per *Descript.
& Synon.* omnia simile est, nisi quod flores habet multò minores, subluteos, autore Trago. Et hinc C. Bauh. in phyt. nominavit eam Lineariam 2. siue vulgarem luteam flore minore.

Hæc in agro VVormatiensi è regione oppidi *Altzen* inuenitur.

LINARIA LVTEA PARVA SERPENS.

CAP. LXXXVI.

*Descript.
Virgula.
Folia.
Flores.
Radix.* **P** Almaribus exit virgulis, frequentibus, humi sparsis, quas vestiunt folia vulgaris foliis similia: extremos ramulos occupant multi flores flauis, vulgari minores, veluti in spicam congesti, quibus succedunt capitula minora quàm in vulgari, exiguo semine nigro plena: radix tenuis est & candida, vulgaris modo serpens.

Clusius, cuius descriptionem assumpsimus, in *Synon.* Hisp. nuncupat Linariam pumilam: In Hist. post. Linariam Hispanicam quintam. Hanc, quia valde amara est, & plerumque cum Chamæpiti nascens reperitur, adeoque pumila est, Salmanticenses Chamæpityos genus esse censebant. Lobel. p. 223. vocat Linariam pumilam Clusij minorem, sed non absimilem: In Icon. Plant. p. 410. Osyridem flauam siluestrem: C. Bauh. phyt. Linariam 3. siue luteam pumilam lupinam.

Salmanticensi agro, aridis locis hoc genus pumilum inuentum ab authore, vbi tota ferè Ætate Tempus
te florebat.

LINARIA LVTEA PARVA ANNUA.

CAP. LXXXVII.



*Descriptio.
Radix.
Caules.
Folia.* **M** Agnitudine varia mihi creuit, aliàs sesquipalmari, aliàs plusquam dodrantali, ex radicibus paruis, albicantibus, pluribus: sunt autem caules, qui tenues & numerosi existunt, & folia quæ teneriora, angustiora, crassioraque quàm in vulgari Linaria, colore glauco, terna, vel quaterna, aut quin-

na, ex certis intervallis, aliàs verò incondita, subamaro sapore: *flosculi* in ramulorum fastigiis, Linariæ forma, crocei, sed quadruplò minores, odore nullo, quos excipiunt globuli oblongi *semen* continentes paruum, orbiculatum, compressum: radix tenuis est & annua.

Clusius vocat Linariam Pannoniæ & vicinarum regionum secundam, & Morauicam primam.

Montbèlgardi in horto Ill. E. C. provenit ex fe-

*Linaria
Morauica*

*Locus &
tempus.*

Ddd 3

mine Heidelbergæ in horto Sprengeri, vbi deciduo quotannis se propagat, collecto. Lutetia extra portam Honorii in aruorum marginibus & colliculis collégit Gener Cherlerus Iulio: Clusius verò in variis Moravia collium accliuatibus: Floret quasi tota Æstate, etiam in Autumnum vsque.

LINARIA PANNONICA FLORE LVTEO
minore quàm in vulgari.

CAP. LXXXVIII.

Descript.

Synon.

Locus.



EX plâtis ab Ageriomissis ex Pannonia mihi delata pulchra hæc species floribus aureis, minorib. quàm in vulgari: foliis quinque ab illa differentibus, latioribus & brevioribus.

Clusio, qui describit, est in Pannon. & Hist. post. Linaria Pannonica 1. (sic etiam Tabern. in Icon. & Hist. inscribit) siue maior. Gerardus ineptè Tabern.

iconem Linariæ Pannonicæ 1. quæ lutea est, pro Linaria purpurea altera pingit. C. Bauh. phyt. vocat Linariam 7. siue pallidam minore flore.

Crescit in montium decliuibus secundum publicas vias, & gramine nudis locis, supra Posoniũ ad Danubium, Gumpostkirchen, Leytenberg, atque etiam in Moravia. Floret Iunio & Iulio, ac interdum etiam Augusto, & subinde semen profert.

LINARIA MAXIMA FOLIIS LAVRI
Dalmatica.

CAP. LXXXIX.

Descript.



Folia maxima hæc profert, & ad foliorum formam accedentia, vncias duas, aut etiam tres longa, vnciã quædam ferè lata, in summitate cauliũ semper breviora & angustiora, omnia autem in acutum desinentia: caules multos, cubitales ac bicubitales, ramosos: flores luteos: magnitudine Anthirrhini maioris.

C. Bauh. phyt. Linaria 19. siue Americana. An Camer. hort. Linaria altera flore maiore & magis luteo?

Montbelgardi in horto Ill. E.C. & mes ex se. Loc. mine mihi prouenit.

LINARIA TRIFOLIA.

CAP. XC.



Nihil mi- nus quàm Linariæ folia habet, quæ per ramos pedales & longiores, crassiusculos, succulentos teretes, inferiore parte rubescentes superius viridates, ex certis intervallis pulchrè disposita, ex eodem loco terna caulem amplexantia, potissimum parte inferiore, circa fastigium enim sparsim nullo ordine

digeruntur: accedunt ea verò nonnihil ad Fabæ inuersæ folia, quibus minùs crassa, succulenta, minimè tamen per ambitum incisa, circa exortum latiuscula, in obtusum desinentia, pari ferè latitudine cum longitudine, sinuatis nervis, ad modum ferè Plantaginis, posticâ parte minimè apparentibus, donata, acetabuli instar concava, celestemque aquam exceptam continentia, sapore amaricante: Verùm flores serie longâ dispositi, Linariæ vulgaris similes sunt, lutei, tinctiori tamen labello & rictu lanuginoso, corniculo purpurascente extra folia viridantia, quæ floris basin ambiunt, porrecto: floribus succedunt capitula rotunda, in quibus semen, quod nobis videre non conrigit: radix subest singularis, crassiuscula, caules plures emittens.

Clus. in Hisp. inscripsit Linariam Valentiam: In Hist. post. Linariam Hispanicam 1. Lobel. in Obs. p. 213. & Icon. Plant. p. 408. Linariam Valentiam Clusii.

Casp. Bauhini in phyt. Linariam 4. siue luteam folio Centaurii, & Linariam 5. siue luteam latifoliam peregrinam, Linariæ latifoliæ Valentiniæ Clusii nomine à Doldio missam: duas non facio distinctas, sed vnam, culturâ tamen variantem.

Circa Valentiam Hispaniæ in pratis & locis umbrosis Martio florentem obseruauit Clusius. Montbelgardi verò in horto Ill. E.C. VV. prouenit, florens Iulio & Augusto, semen verò maturans Septembri.

Linariæ nomen huic idem indidit, non à foliorum similitudine, quæ non conueniunt, sed quia eius flores vulgari formâ similes, & eiusdem ferè temperamenti sunt, nam commandata manifestam acrimoniam, cum quadam amaritudine coniunctam exerit ipsa planta.

LINARIA

LINARIA ODORATA
Monspeffulana.

CAP. XCI.

Descript.



Rectis & rigidis stat caulis, bicubitalibus, iuxta terram rubescentibus, quos Linaria vulgaris folia angustiora, denso stipatu ornant, sapore amaricante: summum caulis fastigium in surculos aliquot abit, qui flores sustinent eodem quo in Linaria vulgaris dispositos ordine, calcari longè breuiori, & parum apparente, quâ in re differunt à planta Linariae aliquatenus simili, sicuti & in eo quod flores sunt maiores, odore gratissimo, superiore folio pallido, purpurascens striis variegato, inferiore in tres laciniâs albas diuiso, rictu lanuginoso, amethystino croceoque colore picto: semina parua in vasculis subrotundis, herbae Linariae iam dictae similibus, sed maioribus, sapore, ut mihi videtur, adstringente: radix viua in laeuis serpit, colore candida. Flores in figura hic exhibitâ minùs bene expressi sunt.

Caryophyllata.

Camer. in horto vocat Linariam flore albicante, & ob odorem, quem spirat, Caryophyllatam, atque radicibus admodum se propagare, & diu durare in hortis.

Lin. odorata. H. Lugd.

H. Lugd. pagina 1151. Linariam odoratam vocat flore ex caeruleo albicante, suauissimè olentem.

Clus. n. s. s. s.

Clus. in Hisp. & Hist. post. Linariae odoratae nomine pingit, & describit tantùm flores: cetera sunt alterius plantae, nempe Linariae folio Bellidis: miror eum in Hist. post. non emendasse errorem illum, & veram Linariae odoratae figuram posuisse.

Locus & Tempus.

Ex semine à Zvingero misso Linariae albae nomine prouenit Montbelgardi in horto Ill. E. C. insigniter repens: reposita Hiemem perfert, florétque Iulio, Augusto, & Septembri: minùs verò odorata est, quàm Monspelij proueniens.

LINARIA ALBA, VEL ALBICANS
INODORA.

CAP. XCII.

Descript.

OSyridis alba, ut Lobel. in Icon. Plant. p. 408. inscribit, descriptionem nullam adscribimus: quia eam nondum apud quemquam reperimus, nec ipsi etiam plantam, quantum recordamur, obseruauimus. C. Bauh. phyt. vocat Linariam 6. siue albo flore. An Camerar. hort. Linaria flore albicante, inodoro, sed eleganti, & penè æqualis magnitudinis, &c. vide antè.

LINARIAE ALIQVATENVS SIMILIS,
folio Bellidis.

CAP. XCIII.



EX vasculo-
tū & superiorū foliorū argumento in Linariarū classem refero: radix subest crassiuscula, lignosa, alba, contorta, simplex, interdum multifida: ex qua germinant multa per terram sparsa folia, ferè Bellidis maioris aut Agerati, profundè in ambitu serrata, glabra, amara, reliqua per ramos tenuia, angustissima, longiuscula: caules ex radice statim plures oriuntur, cubitales, teretes, multum ramosi: quos ferè totos vnâ cum ramis ornant longâ serie florum ex foliorum sinu prodeuntes, exigui admodum & quodammodò hiantes, partim caerulei, partim albi, nullo calcari donati: vascula delapsis floribus succedunt, multa, parua, subrotunda, & veluti bipartita, quibus semen clauditur copiosum, minimum, subruffum, amarum.

Compiler Tabern. non contentus assumere figuram Osyridis odoratae purpureae, vult. notatur. riechend purpur harnkraut, compositam ex duabus plantis, confundit cum tertia. Gerardus quoque imitatus Tabern. habet figuram falsam ex duabus compositam, confundens cum duabus plantis etiam tertiam.

Descriptio Clusij Linariae odoratae conueniret plantae à nobis descriptae, si non diceret florem habere hamulum incuruum: sed & flores in calcaribus non conueniunt, nec etiam titulus odoris. Quare existimo vnâ descriptione & vno titulo duas plantas esse ab ipso traditas. Miror autem, eum in Hist. post. meliorem iconem non exhibuisse.

Vnius nostrae plantae H. Lugd. duas habet figuras, quarum vna extat pag. 1151. Linariae caeruleae Dalechampij titulo, cui folia adscribit proximè radicem Bursae pastoris, caulem verò vestitum foliis Linariae similibus, angustioribus, florem ex caeruleo albicantem. Alteram ibidem inscripsit Linariam odoratam Dodonaei, cui folia Bellidis.

Hæc autem figura ex duabus diuersis composita est: folia enim inferiora Bellidis forma rectè pinguntur, superiora verò non item, quæ oblonga esse debent, angusta, Lino similia, ut in descriptione nostra habetur: flores etiam in viua planta corniculis destituuntur: quare ex planta viua Monspelij collecta nouam figuram damus. Et hic error à Clusio prius commissus à me obseruatus, quod indicare debebat Frater in Animadu. suis in H. Lugdunensem: Is eius in phyt. non meminit: nec etiam ostendit Linariam caeruleam Dalechampij esse summitatem Linariae odoratae Dodonaei: & vicissim, Linariam odoratam Dodonaei esse in-

H. Lugd.
duas figuras, vnaque imperfecta.

feriorem partem Linariæ cæruleæ Dalechampii, sed malè duas diuersas plantas constituit. Linariam odoratam Clusij, siue Dodonæi vocat Linariam 8. siue purpuream Bellidis folio : Linariam cæruleam Dalechampii, Linariam 13. siue cæruleam angustifoliam. Frater igitur qui secutus est meam opinionem, non animaduertit in H. Lugd. vnus plantæ duas dari icones.

Lobel. res
preh.

Lobel. in Icon. Plant. p. 407. inscribit Linariam purpuream odoratam. Miror autem eum hanc figuram incommodam assumpsisse : præterea purpuream odoratam cognominare, ac in Obs. p. 222. ad Aduersaria referre, cum ibi non fiat vlla mentio Linariæ odoratæ : & Clusius loco proximè citato addat, in calidis regionibus aliquantulum duntaxat esse odoratam, in Germania verò & Belgicis hortis inodoram, & Linariæ purpureæ florem non nihil æmulari : Sesamoides maius Salmanticenses nuncupare, quamuis descriptioni non conueniat.

Locus &
Tempus.

Montepessuli florentem & semina matura ferentem reperi mense Octobri in montibus circa Esperor. & Gangen. Eadem mense Iulio mihi occurrit in agris inter Valentiam & Lugdunum. Gigni in aridis, squallentibus & apricis : florere Maio desinente in H. Lugd. perhibetur.

Refertur apud eandem H. Lugd. vlcera sordida purgare, lumbricos interficere, obstructions expedire.

LINARIA PURPUREA MAGNA.

CAP. XCIV.

Descript.



Sesquicubitale est longæ, nigra, contorta, lignosa radice caulem emittit, eumque teretem, glabrū, firmū in ramos prælongos diuisū, foliis ornatum longioribus, latioribusque quàm Linaria lutea, sapore nullo euidente: flores longæ serie per ramos nascuntur, antrorsum hiantes, posticâ parte calcar promittentes, colore purpureo præditi, minores multò quàm Linariæ luteæ: semen in vasculis paruis bifidis continetur.

Dodon. in Hist. lat. Linariæ alterius nomine describit, dicens in lib. de Florib. flores habere in cæruleo purpureos : in fol. verò lat. purpureos: viderique sibi speciem Antirrhini : sed nullibi depingit. Lobel. in Adv. Linaria purpurea, vt fruticosior sic elegantior multò & rarior. Eidem in Obs. p. 223. & Icon. Plant. p. 407. Linariæ purpureæ varietas.

Linaria
altera
Dod.

C. Bauh. phyt. vocat Linariam 9. siue purpuream maiorem, Oxyridem alteram Dodonæi, & Linariæ purpureæ varietatem Lobelii, variantem

flosculis purpureis, purpuro-violaceis, albis & cæruleis : foliis item latioribus & angustioribus: Item, Linariam 13. siue cæruleam angustifoliam, & cæruleam Dalechampii. An verò Dalechampii separanda sit à Lobeliana considerandum. An Camer. hort. est Linaria flore cæruleo?

Geneuæ florebat in horto meo Iunio, Mont-belgardii Iulio : Stutgardia in horto Ill. C. Linaria violacea magna Iunio.

Tempus

LINARIA PURPUREA PARVA. CAP. XCV.



Subest radix tortuosa cū fibris longiusculis: caules complures, palmares & maiores, in terram reclinati, ramosi, foliis amicti veluti ex geniculis, modò singularibus, modò ternis aut quaternis, vix quadrantem viciæ æquantibus angustis : extremis ramis flores multi congesti herent Linariæ vulgaris, minores, longis calcari-

Descript.

bus præditi, cæruleo-purpurei, folio superiore bifido, apicibus in rictu luteis, concolori etiam labelli portunculâ penitiore : succedunt vascula penè rotunda, calyce ex quinque foliolis excepta, quæ continent semina longiuscula compressa; qualia sunt Alyssi Dodonæi.

Clus. in Pannon. pag. 307. & 309. vocat Linariam Pannonicam 2. siue Alpinam pumilam : In Hist. post. Linariam 3. Stiriacam. Tabern. Linariam Pannonicam. 2. Vngerisch Linkraut. Gerard. Oxyridem albam rubite tone flaxe. An verò iconem Tabern. legitimè albam faciat, considerent lectores. Imago apud H. Lugd. pag. 1151. Linariæ minoris Dalechampii, quod folia inferiora attinet, non in omnibus placet : C. Bauh. phyt. est Linaria 10. siue pumila ex violaceo purpurascens. An Gesn. hort. Linaria Alpina minor? An Camer. hort. Linaria flore cæruleo, in aruis reperta, semè Antirrhino minimo similis, & vt existimat, tantum annua?

Geneuæ circa fluuium Arue floret mense Maio : in monte Thuri loco arenoso & decliu ad meridiem sito, mense Iunio. Reperi eandem in Narbonensi Gallia apud tres pontes inter Nemausum & Auinionum. Clusius inter saxa & præcipitia montium Austriæ collegit, ac in horto coluit.

Locus &
Tempus

LINARIA PARVA PURPUREA, foliis sine ordine dispositis. CAP. XCVI.

Tenes & humi diffusos habet cauliculos, valdè frequentibus, angustioribus, sine ordine

Descript.

dine dispositis, crassiusculis, & coloris cæsi foliis obritos, in plures alas nonnunquam diuisos, quarum fastigium occupant multi, spicæ instar confertim nascentes, flosculi, colore superiori ferè similes, sed multò minores: quibus succedunt parua capitula semine plena, de cuius forma & colore nihil asserit Clusius, quandoquidem florentem, & capitulorum rudimenta duntaxat præbentem in Morauia collibus inueniebat: radix multis fibris constat, & perennis apparet.

Clusius, cuius descriptionem damus, intitulat Linariam 4. & Morauicam secundam. Lobel. in Adu. & Icon. Plant. p. 410. Oxyridem purpureo-cæruleam repentem. C. Bauh. phyt. Linariam 11. seu purpureo-violaceam repentem.

Meminit idem Clusius Linariæ tenellæ ex purpura nigricantis, vt & Linariæ parue carnosæ foliis, floribus cæruleis ad cinereum tendentibus.

Linariam Hispanicam quartam Clusii, siue Linariæ Hispanicæ quartum genus Clusio primò videre contigit anno 1590. in cultiss. horto Illust. Principis Cattorum Vilhelmi: semine peregrè misso natum Cassellis, Augusto mense suo flore onustum, & maturum semen in vasculis continens: Semine inde accepto auctori data sequenti anno, totâ Æstate & Autumno floruit, & maturum semen tulit.

LINARIA CÆRVLEA, CALCARIBVS longis.

CAP. XCVII.



Radix tortuosa, dura, alba, fibrata: caulis singularis, simplex, pedalis, glaber, teres, gracilis: folia alia aduersa, alia alternata, vncialia, angusta, acuminata, læuia: flores per summum scapum eo ordine quo in Linaria vulgari, eademque formâ, dimidio minores, calcarum ferè longiore, cærulei, quinque, her-

bacei coloris, angustis, longisque foliolis basin suffulcientibus. vascula minora, quam Lini vulgaris.

Gener Cherlerus attulit collectam in Italia in vicijs prope Viterbam.

LINARIA ODORATA MONSPES-fulana minor cærulea.

CAP. XCVIII.

Dodrantalibus & breuioribus ex radícula fibrosâ mox ortis caulibus, tenuibus, rigidis, quos folia vestiunt rara, alternatim ex longis intervallis, sili instar tenuia, semicâ longiora, flores in cacumine serie quadâ sibi inuicè succedunt. Li-
Tom. III.

narie odoratæ maioris, cærulei, calcarum longò præditi. Icon est in præcedenti tabula.

LINARIÆ SIMILIS.

CAP. XCIX.



Radice nixa lignosâ, satis crassâ, modò simplex, modò in capita plura diuisa: caules statim è radice plures emittit, palmares, aut etiam cubito longiores, ramosos, & non ramosos, angulosos: per quos folia Lini, glauca, longa, angusta: ex quorum sinu in ramulorû summitate flosculi emergunt parui, quos sequuntur vascula parua.

Huic similis admodum est, si non eadem, Anonymos Lini folio Clusii, quam sic describit: Pedales habet ramulos, duos, ex viridi pallescentes, & in his multa folia temerè sparsa, nulloque ordine disposita, dura, angusta, longiuscula, Li-

ni foliorum æmula, eiusdè cum ramulis coloris, qualis in Ruta montana elucet, h. e. ex viridi pallescente, gustu nonnihil acido primùm, deinde amaricante: extremi cauliculi in multos ramulos siue pediculos diuiduntur, qui flosculos albicantes sustinent, quinque foliolis stellatim decussatis, constantes, cum aliquot interioribus staminulis, qui tandem in singularia semina efformantur, pentagona, duro corio siue putamine medullam albam continentia: radix candicans, multifida, perennis & viuax, annuatim nouos ramulos, siue virgulas producens: nonnunquam etiam serpens, Linariæ repentis instar.

H. Lugd. p. 1150. figuram proponit plantæ, quâ intitulat Anthyllidem montanâ, quæ multa habet communia cum nostra planta.

Caspar. Bauhinus phyt. Anonymon linifolium Clusii, Linariam 15. siue montanâ flosculis albicantibus cognominauit, & eandem cum Anthyllide montanâ Historiæ Lugdunensis fecit, qua de re nihil certi pronunciamus, sicut neque

E e e

Anonymos
Lini folio
Clusii, de-
scriptio:

an eadem sint cum nostra Linariæ simili.

An Tabern. in Icon. & Hist. dicitur Linaria adulterina, falsch linfraut: An Gerardo Linosyris nuperorum Busch tode flare.

ocus &
tempus.

Linariæ similem variis in locis obseruari, vt pote Geneuæ, Basileæ, in monte prope Birsbeck, & Montbelgardi. Anonymos Lini folio Clusii copiosè nascitur editioribus herboisique locis agri Viennensis: tum etiam herbois collibus Posenio vicinis, in accliuitate Hamburgensis montis, quâ Altenburgum spectat, aliisque præterea plurimis Austriæ & Pannoniæ montibus, etiam interamnibus ultra Drauum. Floret Maio. Meminit & Clusius Madritianâ filuâ, secundo ab vrbe Luteriana miliari colligere, sed longè exiliorem.

LINARIA BELVIDERE DICTA.

CAP. C.

Multum fibrosam radicem habet, & perquam furculosa planta, rigidula, sed fragilis: folia quam vel Lino, vel Linariæ vulgatæ longiora, frequentiora, incondita, sapore subamaro: flosculi secundum caulem & alas herbaei, obtutum præ paruitate propemodum fugientes, vel etiam purpurei, quibus succedunt exigui loculi, in quibus semen

Descriptio.

Linaria Belvedere dicta.



Icones.

Belvedere altera icon.



Tres figuræ, quas ponimus, sunt ex iis, quæ paratæ erant, quasque emimus.

Dodon. de Floribus huius Linariæ meminit, cum ait Campanulam hortensem maiorem [Campanulam cæruleam Rapunculo similem, vel angustifoliam] plerique Belvedere nunciant: sed Italici Belvedere, Græcorum est Osyris, cum qua Campanula nihil omnino habet similitudinis. In fol. lat. pingit & describit Osyridis titulo, eamque à Linaria, quam multi Osyridem faciunt,

distinguit, vt ex qua videlicet *νομήματα*, hoc est, scopæ hac ætate in Italia componantur, ceu & olim Galeni seculo. Apud Italos *Belvedere*: in Græcia modò *αὐξήσις* dicitur, voce corruptâ, teste Anguillarâ: nam olim *ὀσύρις*: Latinis quoque Osyris nominabatur.

Hanc, quam Dodonæus Osyrim esse existimat, Ges. hort. *Belle videre* Ital. & *Belvedere* Italoꝝ vocat: item Scopariam aliquorum, ac aliorum Herbam studiosorum.

Belle videre.

Lobel. in Adv. cap. de Osyride, ostendit descriptioni Osyridis minùs conuenire Scopariam, *Belvedere* Italoꝝ [ita in Adv. proprio capite, inque Obs. p. 223 inscribit.] in Icon. Plant. p. 409. Scopariam & Osyridem Græcorum Dodonæi inscribit: Tabern. in Ic. & Hist. Herbam studiosorum, *Studenten fraut*: C. Bauh. phyt. Linariam 18 siue Scopariam: Gerard. Scopariam siue Osyridem Græcorum: Item Hyssopum albis floribus. Quamuis autem Gerardus aliquam in floris colore differentiam assignet, tamen Linariam Belvedere repræsentat. Tabern. quoque licet pro Satureia Romana 2. eam iconem dederit, tamen nec vlli Hyssopo, nec vlli Satureiæ competit.

Osyris non est.

An Linaria Belvedere effigies 3?

Geneuæ in Locus & Tempus.

horto ex semine deciduo prorumpit Aprilis, vegeta Maio. Lugduni & Montbelgardi Iunio & Iulio in vigore. Plerisque Græciæ locis spontè gigni: Æstate virere ac vigere: sub Autumno semen maturare, author est Dodon. Non perinde bellulam hanc aut speciosâre, atq; Italico nomine, propter raritatem exoticam apud Italos in



hortis & pensilibus figulinis vasis ali solitam, hodie perquam vulgatam pronunciat Lobelius.

Belvedere in arborem formatur altitudinis hominis, cuius pulchritudini iungitur gratus color viridis: folia similia Hyssopo: ex India retulerunt: propagatur semine & radice: à frigore facillè læditur, ideo serenda ad meridiem, vt tuta sit ab Aquilonio vento, & tutius in vasis terreis, aut cistis. Et hæc in Theatro Agt. de Serres scripta reperiuntur. Ego tamè haud crediderim radicib. posse propagari: annua siquidem herba est, quæ ad radicem nullos oculos habet ad propagationem aptos: itaque potiùs ex solo semine deciduo se propagat, vt etiam Montbelgardi experti sumus.

In Arborem formatur.

ANTIRRHINVM VVLGARE.

CAP. CI.

Nullam ferè humum spernit Antirrhinû, & ex parietinis ficcisque maceris in cultius solû descendens, & hinc illuc translatus, de fecunditate haudquaquâ remittens: radice lignosâ, albâ: caulibus

Descriptio.



lo trifido antequam in lacinias diuidi incipiat nonnihil luteo, fimbriâque villosâ donato: pericarpia simiæ aut vituli caluariam egriè mentiuntur, in quibus semen pusillum nigrum.

Anthirrhon
Dioscoridi
Lychnis sil.

Icon. 2.



Anthirrhon
Plin.

Anthirrhini vulgaris Icon. 3.



gloriam consequi creditur. Verû Dioscoridi cum
Tom. III.

caulibus pluri-
bus, cubitalib.
sesquicubita-
libus & altio-
ribus, intus iu-
ceâ medullâ
farctis: folia fe-
rè alternatim
exerunt, Leu-
coij lutei, quod
Cheiri vocant,
sapore subacri:
flores in sum-
mis scapis in
thyrsi morem
dispositi colo-
re carneo albô-
ve, oblongi, ri-
ctum leoninû
exprimentes,
bifido folio
surrecto, label-
lo trifido antequam in lacinias diuidi incipiat nonnihil luteo, fimbriâque villosâ donato: pericarpia simiæ aut vituli caluariam egriè mentiuntur, in quibus semen pusillum nigrum.

Anthirrhon si-
ue Anarrhinon,
quod aliqui etiâ
Lychnida silue-
strem vocauerunt,
Dioscoridi herba
est caule, foliisq;
Anagallidi simi-
lis: floribus Leu-
coij, minoribus
tamen, purpu-
reis, idè etiam
siluestris Lychnis
nominata est.
Fructum verò ge-
rit vituli narium
similem, aspectu
russcum.

Anthirrhon
vocatur (inquit
Plin. lib. 25. c. 10.)
siue Anarrhinon,
siue Lychnis a-
graria, similis Li-
no, radice nullâ
(minimâ, Gaza-
pud Theoph. l. 9.
hist. cap. 21.) flore
Hyacinthi, semine
vituli narium.

Dioscoridi &
Plinio dictû An-
tirrhinû, Theo-
phr. loco proxi-
mè citato, Antir-
rhizum nomina-
tur, utilis herba
ad gloriam com-
paradam, Apari-
nè similis: radice
nullâ. fructui in-
sunt tâquâ nares
vituli, quo perû-
cto gratiâ, vitæq;

Plinio cõuenit in nomine, ita ille in descriptione,
dissentit tû à Plin. tû etiam à Theophrasto. Plin.
namq; tribuit Anthirrh. folia Lini, rectiori simi-
litudine, quàm Diosc. Anthirrh. folia & caules
Anagallidi comparat. Hermolaus autè corruptè
apud Plinium pro Aparine, Linum eo loco scribi
putat. At verò quæ affinitas Anagallidi, vt Dio-
scorides comparat, cum Aparine, aut Lino?

Quod à Plin. describitur copiosè in Anglia, au-
thore Turnero, nascitur in segetib. primo aspectu
Lolio simile est, quoad florè, partim etiâ folij co-
lore accedit, quod maius & longius est Lini folijs,
formâ tamen non ita absimile. Hæc herba posset
Angl. dici *Calfs Sow* vt. Anthirrhinò autem à
Dioscor. descriptâ, in Anglia non prouenit, quod
quidè Turnerus viderit, nec vllâ adhuc plantâ se
vidisse ait cui Diosc. descriptio cõueniat, nullâq;
etiâ quæ theophr. descriptioni possit accomodari.

Græcis igitur ἀντίρρινον, ἢ ἀντίρρινον, si non vi-
tiosû Theophr. exemplar. & ἀντίρρινον dicitur Lati-
nis similiter Anthirrhinum. Auctore Galeno etiâ
βουράνιον, & Lychnis agraria siue siluestris, λυχνίς α-
γρία nominatur. Apuleius etiâ αἰθυσεν, αἰθυσεν,
κυνκεφάλιον, Canis cerebrû, Herbam Siminiam,
Venustâ minorem, & Opalim gratâ appellari re-
fert. Creditur quoque esse Leo herba, quem inter
flores Columella lib. 10. refert, sic scribens:

Narcissique comas, & hiantis saua Leonis

Ora feri. Item & infra: Oscitat & Leo.

Et huius sententiæ videtur fuisse Casalpini, qui
Anthirrhinû, Os leonis vulgò, appellari prodidit,
herbam folijs Linariæ, florib. capitulis effigie ca-
nini capitis, in mœnibus Eloquentiæ copiosam: Et
quandâ in præruptis scopulis, folijs breuiorib. la-
tiusculis, subhirsutis, florib. pallescentib. Aliam
in montib. similiorè Linariæ, recticaulè, flore cæ-
ruleo: In vineis quoq; recticaulè, flosculis pur-
pureis. Et has omnes Pliniû intelligere credit, ap-
pellantè herbâ Cynocephaliâ, quasi caninû ca-
put, quâ in Ægypto Osyritem vocari dicit, diuinâ
herbâ, vt Appion Grâmaticus assererebat, & contra
omnia veneficia: Meminisse & Canini capitis in
Pysyllio. Dioscoridè eam quæ roseo flore constat,
Chamæpeucem appellare quasi humilem Lari-
cem, quo in loco deprauati quidam codices le-
gunt Chamaleucen: Plinium tamen Chamæpeu-
cen quoq; legere. Esse qui ad Anthirrhon has
referat, quod à Plinio tribuantur folia Lini An-
tirrhino: Osyritim dictam videri apud Ægyptios:
quia ob similitudinem capitis vitulini dicata sit
eorum Deo, vt bos.

Gesnerus contrâ, Leonem Columellæ, Aequi-
leiam esse existimauit, quam ea de causa Leon-
tostomium nuncupauit: sed hoc nominis Antir-
rhino maiori (cui de hort. flores luteos, albos, ru-
bros & roseos adscribit) magis conuenire, quàm
Aquileiæ, Dodonæo videtur. Nam Anthirrhini
hians flos, leonis rictum citius, quàm Aquileiæ
refert. Est verò & alius Leo, qui ὀσπριον & legu-
minum Leo dicitur, alio nomine Orobanche:
de quo suo loco egimus. Est & alia Amethystos
herba, cuius Plutarchus meminit, πρᾶμῶν videli-
cet: de qua alio loco agetur.

Anthirrhinum quod à floribus rictum vitulini
vel Leonini oris æmulantibus, potiùs Leonto-
stomos nominandum censuit Macantha, Ger-
mani Stercktraut / Drackenhaupt: hende-
kopff, hoc est, caput canis, falsch kopff id est, Ca-
put vituli, falsch nase / Nasum, vel Nares vituli,
Lewenmaul Os leonis, & Drant, cum Bel-
gis appellant, quàm aptè consule Turnerum:

Ecc 2

Anthirrh-
num Plinij
Turnero.

Bucranion
Lychnis silu-
Amethystos
Pithicion.

Leo.

Os leonis.
Casalp.

Leo Columel-
la est Aequi-
leia Gesneri.

Nomina
Leonostomos.
Caput canis.
Caput vituli.
Nasus vituli.

Galli *Mouyon violet*, & *Oeil de chat*. Itali *Antirrhino*: Hisp. *Veserra yerua*, & *Cabeza detenera*: Angli *Calfes snout* / vel *Snap dragon*: Bohemi *hšedvš*.

Synon.

Lobel. in Icon. Plant. vocat p. 404. Antirrhinum, vulgò Caput canis, & Caput vituli Apulei, Cynocephalin: Item Anthirrhinum floribus luteis. Hort. Lus. Antirrhinum maius purpureum satium, Schvvenkf. Antirrh. maius, αὐτίρρηνος Diofcoridis flore varians, incarnato, candido, luteo.

Icones.

Figura Fuchsianæ quas posuimus non multum placent, verum iam sculptæ emptæ erant. Matth. in post. comm. & Hist. germ. picturas duas Antirrhini exhibet, nempe primi & secundi, quæ qua in re differant ab invicem, ex figuris colligere non possum, nec etiam ex eius verbis, cum omnia Antirrhinorum suorum genera distinguat tantum coloribus.

Camer. in Matthioli Hist. germ. & Epit. duas habet Anthirrhini figuras, nomine primi & secundi, cui flores ex purpura albicantes, seu incarnatos, & rictum luteum adscribit. Idem in Hort. vocat Antirrh. maius flore roseo, in agro Monspeliensi & Nemaufensi. Item Antirrh. flore incarnato, luteo, candido: Adhæc, Antirrh. pulcherrimum flore luteo grandi, spontè inter Sauonam & Genuam.

Lobel. in Adv. Antirrh. florib. purpureis, ex rubro violaceis, vel roseis & albis: Item Antirrh. luteum foliis latiorib. brevioribus.

H. Lugd. 3. icones.

H. Lugd. pag. 1340. huius plantæ figuram habet sub titulo Antirrhini 1. Matthioli. Alteram pag. 1341. sub inscriptione Antirrhini magni Dodonæi. Et tertiam pag. 330. pro Cynocephalo Plinij.

Tabern. 3. icones. Antirrh. ignotum.

Tabern. in Icon. & Hist. Antirrhinum: Item, Antirrh. album: Et Antirrh. luteum.

Antirrhinon quid sit, fatetur se ignorare Bacchanellus, Sed & Anguillara Antirrh. Diofcor. non novit: Theophrasti verò & Plinii in Italia nomine *Cazzugelli* passim notum affirmat. Quamvis autem vnius tantum meminisse videantur Veteres, Recentioribus tamen plures sunt differentia.

C. Bauhin. not.

C. verò Bauhini in phyt. Antirrhinum 1. siue maius rotundiore folio: Et Antirrh. 2. siue maius alterum folio longiore, quod flore roseo haberi ait, rubente, aliquando maculato, ex candido dilute purpurascens, & candido: Itemque Antirrh. 3. siue luteo flore: ad vnum hoc vulgare Antirrhinum referimus.

Ceterum inter Antirrhina numerantur, & Antirrhini nomine sequentes insigniuntur plantæ. Antirrh. angustifol. silvestre. Antirrh. minimum. Antirrh. fol. serrato. Linaria. Linar. purp. maior. Linar. odorata. Linar. Valentina. Lurea. Alsine fol. serrato. Hyppoglossum. Cyanus. Hippuris.

Antirrhini vulgaris locum & tempus.

Ceterum, planta quæ solet Antirrhinum vocari copiosè provenit in via quâ itur ad sylvam Aigremont, & aliis in locis: Basileæ in horto D. Plateri & patris mei florèt Augusto, & Septembri semen maturat. In horto Ill. E. C. mihi provenit purpureo, vel roseo, albo, & luteo, ac etiam mixto colore. Ex his purpureum Antirrh. occupavit muros, & Hiemem perfert: præterea decido semine, quamvis non annua herba sit, se propagat, florens Iunio & Augusto. In arvis & collibus Matthiolas reperit: Camer. in Italiis & Galliis, præsertim Prouinciali & Narbonensi inter

Oliueta. In hortis, inquit Dodonæus, apud Belgas, Italos, Germanos & alibi feritur, & Maio mense, quod Hiemem superavit, & reliqua deinde Æstate, floret: serius verò & sub Æstatis finem, eiusdem anni Vere satum. Hiemem autem nisi clemens admodum fuerit, aut in cellis viniis repositum, absque iniuria in Belgio non sustinet, Dodonæus.

Antirrhini semen inutile in medicina, ut Galenus ait, est: herba verò ipsa assimilis cum Bubonio facultatis, sed multò minoris: ex qua de hac coniiciendum, quod in Diofcoridis libro fortè periit. Apuleius radicis in aqua decoctum, foru epiphoras oculorum, celeriter lenire refert. Narrant, inquit Diofcorides, appensum veneficiis aduersari: & gratiam conciliare, si quis eo perunctus sit, cum oleo Liliorum, aut cyprino. Tradunt alij huius semine perunctos ex oleo venustiores fieri, nec villo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit. Quinetiam Principum gratiam sibi conciliari posse putant, hoc tantum amuleto.

Vires & usus.

ANTIRRHINVM ANGVSTIFOLIVM sylvestre.

CAP. CII.



E Legatula est plantula, tenui albicanteque radice: cauliculis palmatibus, aut cubitalibus, teretibus, hirsutis, quos alternatim ornât filia Hyssopi paria, simul plura, inferius nonnunquam rubescētia, pingua & nonnihil acris, subamara: flosculi ex foliorum alis bicolores, partim albi, partim purpurascens, Antirrhini maioris, sed multis numeris minores, quorum basin obuallant quinque, vel septem folia viridantia, hirsuta, quædam longa, quædam breuia: pericarpium caluariam catelli egregiè refert, ac oculorum fossas, naresque corniculo inductas, in quo semen.

Nonnullis hanc plantâ Pliniano Antirrhino eandem esse visum fuit. Agricola autem eandem cum Cynocephalia esse suspicatus fuit. Matthioli contra istud Antirrhinon pro legitimo olim exhibuit. Habet autem Antirrhini figuram fictam, quod flores attinet: folia etiam videntur nimis ad Linum accedere. In post. comm. cum mag. fig. & Hist. germ. priorem effigiem omisit, & meritò aliam substituit, sub titulo Antirrhini quarti, quod non describit, nec ostendit qua in re à cæteris suis Antirrhinis differat. Neque mirum si in prioribus comm. de Antirrhino, eiusque foliis dubitauerit, siquidem tunc non nisi vna tantum Antirrhini planta ad manus ipsi fuit, ut in epistola ad Heroldum perscripsit.

Antirrh. Plinianum.

Lacuna

Lacuna. habet figmentū Matthioli primò exhibitum. Sed nec figura Loniceri multum placet.

H. Lugd. tres habet figuras. Harum prima est p. 140. Anthirrhinum Matthioli, fictitia vti dictū. Altera p. 1341. Anthirrh. 4. Matth. Tertia ead. pag. Anthirrhinum paruum Dodonæi, siue Orontium.

Euch. Roelslin sub nominibus *Orant / teu / felsband / sterckfraut / falsbmaut /* Obris, Anthirrhinon, *Lychnis silvestris*, pingit Anthirrhinum minus, & præterea Luteam sub nomine *Sterckfraut*, confundit.

Dodon. gall. dicitur Anthirrhinum alterum, & Anthirrhinum minus. [Et sic etiam Gesnerus hort. & de coll. stirp. ubi & Anthirrh. foliis Hysopi, itemque Tabern. in Icon. & Histor. ubi quartum facit.] Eidem de Florib. Anthirrhinum silu. siue minus: Hoc Lat. in fol. Anthirrhinum silvestre inscribit, melioremque figuram, quam in gall. Hist. habet, describitque etiam.

Lobel. in Adu. Obs. p. 222. & Icon. Plant. p. 405. Anthirrhinum minimum appellauit: Camer. in Matth. Hist. germ. & Epit. Anthirrh. quartum: In Horto Anthirrh. medium, & Orontium aliorum: Castor, qui plus habere similitudinis affirmat cum Phyteumate quam satium, cum Pona Anthirrh. silvestre vocat: Thal. Anthirrh. rubrum aruense: Schvvenckf. Anthirrh. medium, Anthirrh. silu. maius, Anthirrh. Plinij, & Orontium Archigenis: Hort. Luf. Anthirrh. medium silvestre: C. Bauh. phyt. Anthirrh. 5. siue aruense maius, vno loco procerius altero breuius: Honor. Bellus Phyteuma.

An Cæsalp. Os leonis, similis Linariæ, recticaule, flore cartuleo, in montibus? An Turn. Anthirrh. Plinij?

Monspelij repetitur mense Octobri semine maturo: inter Viennam & Valentiam florens Iunio: Basileæ etiam Maio, Iulio Augusto & Octobri: Genue iuxta Rhodanum versus castellum *la Bastie* florens Iunio: Montbelgardi in agris prope Audincourt virens & florens Octobri. Vbiuis tandem hortorum, inculcorumque marginibus sponte plurimum innascitur.

Anthirrhinum porro hoc silvestre nullius qui dem est vsus: si autem verum Phyteuma fuerit, ad amores profuerit.

ANTIRRHINVM MINIMVM. CAP. CIII.

TOta minor est hæc plātula Anthirrhino minori dicto, radice parua, dura, fibrata: caule crebris alis concavo: in quib. folia haud multo minora iam dicto, sapore non dissimili: flos corniculatus posticā parte, anticā hians, dilute violaceus: capsellæ oblongæ, ventriosæ, septi crassiusculi beneficio in duos loculos dissep-



cuntur, semen continentes copiosum, minutum, atrum.

Nisi hoc sit Anthirrhinum 3. Matthiolo, nescio quale intelligat, pingit tantum & non describit in post. comm. cum magn. fig. lat. & Ital. itemque Hist. germ. Camerario apud Matthiolum in Hist. flor. germ. & Epit. est Anthirrhinon tertium, floribus albis pusillis: H. Lugd. pag. 1340. Anthirrh. 3. Matthioli: Camer. hort. Thallio, Schvvenckf. & Hort. Luf. Anthirrhinum minimum: Gesn. de coll. stirp. Anthirrhinum aruense foliis perangustis. Anthirrhini genus paruis foliis. C. Bauh. phyt. Anthirrh. 6. siue aruense minus, Lob. in Icon. Plant. p. 405. Anthirrh. alterum minimum repens Sed cur dicitur repens? figura eius siquidem repentem plantam haud repræsentat. Nostra autem figura ex emptitiis non placet.

Basileæ copiose in agris prouenit: Montbelgardi abundat florens Iunio & Augusto, in aruis & vinetis.

LVTEA PLINII QVIBVSDAM.

CAP. CIV.

Secus vias & in rudetibus nascitur Luteola, radice lignosa, minimi digiti crassitie, interdum plusquam pollicari, albâ, sapore Nasturtij acris: caulibus compluribus, & admodum ramosis, viridantibus, striatis, arctiori tubulo petusis, ad cubitum vnum aut alterum excrecit: folia, ante-

Locus & Descriptio



quâ caulescat, humi in orbem pōst in caulibus & ramis nullo ordine crebra nascuntur, atro-virentia, semuncia circiter lata, palmum longa, interdum crispa, aliàs æquabili superficie nitentia, sapore subacri cum lentore: florum thyrsi longi magnam caulium & ramorum partem occupant, luteis apiculis con-

stantes, quibus setacea succedunt vascula, hiulca, ternis intrò inclinantibus prominulis punctis, extrinsecus crispa, semen continentia pusillum, rotundum, nitidum.

An ruellio lib. 2. cap. 115. Herba nostræ ætatis, quæ cortinis suffectoriis indita luteum lanis præbet colorem? Gaudum nostra rura vocant, vel Gaisdum ex colore, quem siccata præfert, quæ ex decocto, quod lanæ resorbentes imbibunt, Lutea meritò vocari potest.

Gesn. hort. authore Lutea, vel Luteum Vitruuij eruditis quibusdam existimatur hæc, quam aliqui Resedam Plinij voluerunt.

Herbam luteam apud Dodonæum gall. aliqui Florem tinctorium vocant, & Belgæ nonnulli Orant, sed nō sine errore: Alia enim est Orant, cui nihil cum hac planta affine est. Lat. in fol. Lutum Herbam inscribit, ac Plinium eius lib. 33.

Lutea Gesn. Reseda Plinij.

Marcelli lapsus.

cap. 6. obiter meminisse, & Luteam appellasse tradit: Vitruuium verò lib. 7. Luteum: sed Virgilium in Bucolicis Æcloga 4. Lutum nominasse;

*Ipse sed in pravis aries iam suauè rubenti
Mureæ, iam crece mutabit vellera Luto.*

A Luto autem luteus color & Lutea dicuntur, veluti à Croco crocea, & à purpura purpurea Belgæ hanc vulgò *vonwe* nuncupant.

Marcell. Virgilius Vitruuij libri 7. locum inferius allegandum omninò mutilum adducit, existimans eandem cum Isatide Lutum, siue Luteum herbam esse, atque eâ cæruleum tingi: in quò à vero recessit: Differt siquidem Lutum herba ab Isatide, & nequaquam cæruleo sed luteo, aut viridi colore, vt dicemus, inficit.

Lobelius, qui in Icon. plant. p. 355. & Obs. p. 190. [vbi Gallobelgis *maude*, & Germanis, quod nomen tamen non conuenit, *Asterisfranten* vocari ait.] Luteolam pingit, & in Aduers. tertiam Glasti speciem rectè constitui posse putat. Sed quæ Luteolæ cum Glasto intercedit similitudo?

Camerarius in Horr. vocat Luteam Plinij, & *χρυσάνθη* Græcorum modernorum. Ad Epit. Matthiol. eiusdemque Hist. germ. posuit figuram, quæ arridet, cui adscribit *Stercrastrum*, Pseudo-Struthium sicut Lanariam nominant, sed non conuenit cum Theophrasti lib. 6. cap. 3. de Hist. plant. Struthio, nec etiam cum Plinij: quidam Theriacariam vocant: vt rectè annotat Matthiolus. Præterea Struthion non esse, ac multò minùs Parmicen manifestius est quàm vt referri debeat: Folia siquidem huius magnitudine Oleæ folia superant: at Parmice à Dioscoride, & Struthion à Theophrasto Oleæ similia folia habere traduntur.

Tragus lib. 1. cap. 118. haud rectè Antirrhini nomine pingit ac describit: vnde Thallio dicitur Antirrhinum Tragi. Alij Phyteuma esse contendunt. Herbarum icones Egenolphi p. 69. in edit. 1551. & Lonic. in Dioscor. vocant Catanancem.

Sed & Tabern. in Ic. inscribit Catanancem, Arcopodiū & Leuteolā *Stercrastrum*, *Stercrastrum* Errant (inquit in Hist.) qui Antirrhinum volunt: A solo Dioscoride & Plinio describitur & græcè dicitur *κατάνανθη*, *δαμνάνθη*, alijs Iouis radius, Datisca & Crepula: Vitruuius Luteum, Plinio Lutea, & lib. 27. cap. 8. Catanance, Herbarijs Luteola, Vnguis miluinus, & Vnguimilua: It. *Vnge de Gatto herba*. Hisp. & Port. *Vnhas de Gato yerua*, Selaon. Carophitta Anglicè dicuntur.

Basileæ copiosè floret mense Iunio: Montpelij & Lugduni Maio: Geneuæ viret Ianuario. In Belgio magna copia, tametsi alijs etiam plerisque locis Galliarum & Angliæ rudibus & similibus occurrat, Lobelius. Seritur pingui ac restibili gleba, pluribus in Belgio locis nascitur, & spontè non modò in Belgio, verum & in Pannonia, Bohemia, tum & alibi. Maio mense floret: semen deinde adfert: postea collecta herba siccatur in vsum tinctorium, Dodonæus.

Hoc apud nos Mediomatrices (inquit Tragus) non nisi linamentis lectorum luteo colore tingendis vsurpatur, & si quid iudico, calidæ & humidæ temperaturæ est. In exterioribus tantum corporis partibus vsum suum hodie habet. *Es paulò post*: Mulierculæ hanc herbam siue sicca sit, siue recens, in aqua cum alumine decoquunt, tingendis linamentis. Magno vsui & emolumento, Lobelio in Adv. assentiente, est Luteola,

recentioribus tantum cognita, ad colorem fuluū aureūve pannis conciliandum valde expetita, præsertim in Belgio, vbi magna copia. Inficiuntur [pergit Dodon.] hac Luto herbâ panni lanei, aliæque ex lana opera, & lineæ telæ colore luteo & virenti: luteo quidem candida, & nullo alio prius imbuta: virenti verò cæruleo antè tincta: Nam Luti herbæ color cæruleo superinductus viridem efficit: Id quod & Vitruuius cognitum habuit lib. 7. de architect. cap. 14. Qui nō possunt ait, Chrysocollā propter caritatem vti, herbâ quæ Luteum [aut potius Lutum] appellatur, cæruleū inficiunt, & vtuntur viridissimo colore. *Camerario* apud Matthiolum referente, aduersus venena & morsus venenatos præstantissima creditur, inde quibusdam Theriacaria dicta: verum nihil certi habet, cum eius nullum fecerit periculum, acer radiceis sapor arguit calfacere, rarefacere, dissipare, aperire, vrinas & sudores citare. Lanarum porro insectoribus vsus magni esse testatur quotidiana praxis: rudes enim & albas cum alumine decocta colore luteo tingit: cæruleas autem viridi, idque magis minusve intenso, quò saturatior dilutiorue fuerit color cæruleus. Ita panni bicolores vno eodemque tempore, vno eodemque decocto ex eadem cortina extrahuntur.

LVTEA MAXIMA CRETICA HONORII Belli.

C A P. C V.



Luteam Cre-
ticam maxi-
mam à Cl. D.
Honorio Bello,
viro tum in arte
medica, cuius
nomine in Can-
dia clarus excel-
lit Medicus, tum
in omnibus disci-
plinis, potissi-
mum verò in
studio Botanico
versatus, cum
alijs multis cre-
ticis ad nos mi-
sit, adiunctâ hac
descriptione, in
data ad nos epi-
stola. *Lutea Cre-
tica maxima:*

planta pulcher-
rima est: neminique cognita: ea namque vni-
co tantum loco inuenitur, qui vocatur *ὀψιδορ-
μα* tertio ab vrbe Cydonia lapide inter montes.
Nascitur in aquis & locis humentibus: ibi enim
riuulus quidam è fonte scaturit, qui per angus-
tam vallem discurrit in quo inuenitur, &
etiam iuxta eius ripas: an alibi nascatur, igno-
ro. *Radicem* maximam profert, lignosam, in
multas diuisam, crasso & lento cortice vestitam.
Stolones plures ab vna radice nascuntur, brachiali
crassitudine, qui ad quinque, sex, atque etiam ad
decem vsque cubita attolluntur, qui Hieme ex-
siccantur. *Folia* fert magna, pinnata, ex multis
folijs magnis constantia, longis, serratis, vt Can-
nabis, alterno positu hærentia, sine tamen ordi-
ne certo. *Flores* minimi ex viridi palleſcunt,
Trunci

Lobelij lap-
sum.

Tragus re-
preh.

Locus &
Tempus.

Vsus.

Descriptio.

Descriptio.

Descriptio.

Descriptio.

Descriptio.

Descriptio.

Descriptio.

Trunci pars superior in marinam spicam fastigiatur, duos & amplius cubitos longam, ex vasculis quibusdam longis & angustis, densisque conflata, similibus eis, quæ Reseda vulgaris gerit, semine plenius ad rufum tendente. Procūl intuentibus Cannabis esse videtur. Tota herba & radix ita amara est, ut Aloem etiam & Colocyntidem ipsam, meo iudicio, superet. Colore luteo inficit Autumno, ideoque Lutea vocauere. Antiquis ignotam puto, & nemini cognitam, quam Siluerio Todeschini Fundano Cydonia Pharmacopæo, viro in cognitione stirpium exercitatissimo, vestrique nominis studiosissimo, qui primus his diebus inuenit, mihi ostendit. Huius tam raræ stirpis eiconem à me delineatam mitto, ut vestrae historiae generali [si lubet] adnectere possitis. Hæc Bellus. Nos huius plantæ semina terræ concedidimus Montbelgardi in horto Ill. E. C. verum non prouenit.

RESEDA LVTEA.

CAP. CVI.

Tenuem quidem, sed longam satis radicem habet Reseda nuperis dicta, lignosam, notabili acimonia præditam: à qua caules procedunt fistulosi, sesquicubitales, striati, subhirsuti, ramosi: folia Ca-

kiles Serapionis diuisurâ profundâ, inordinata, crispata seu undulata, sapore oleraceo: flores in thyrsum spicamve digesti longam, lutei seu herbidi, foliolis ex umbilicis oris extantibus, in tria segmenta (quorum duo lateralia latiora mediū fili instar tenuis & breuius utrinque



stipant) partitis, intra quorum septa apices multi sessiles, luteoli, & stilus triceps: capsulae seminum effigie vrceoli inferius hiant, semen continentes paruum, nigrum.

Reseda, à sedandis doloribus dicta censetur: collectiones namque & inflammationes omnes discutere ipsam Resedam scribit Plinius.

Lobel. in Icon. Plant. p. 222. Resedæ maximæ titulo pingit, itemque in Obs. p. 110. An verò eam ab alba rectè distinguat, videat alii. Lucas Ghinus, Gesnero de hort. teste, Sesamoides maius nuncupat: Resedam luteam Dalechampi: Resedam Plinii, & Erucam peregrinā, welschen Raucken / Schvveckf. quem miramur hanc inter hortenses recensere: Resedas C. Bauh. Erucis subiecit, propter saporem Erucæ similem, deinde etiam eo quod à quibusdam Erucæ dicantur, & ex Erucarum siluestrium genere censeantur. An Reseda latifolia Tabernamontano?

Genevæ in muris florentem maio vidi, itemque in horto meo Hiemem etiam perferentem.

Tom. III.

Montbelgardi copiosè prouenit iuxta segetes in planitie inter Bechan & Audincourt, florens Iunio, Iulio, & Augusto, ac etiam ultra pontem Vauiaucourt.

RESEDA ALBA,

CAP. CVII.

Minùs frequens est Reseda alba, cetera Luteæ frequentiori similis, nisi maior paullo videretur, id quod fortè culturæ tamen impet: verum florum thyrsi albicant, quorum singuli quinque simbriatis foliolis candidis contexti, apices tamen luteolos possident.

An Lobel. in Icon. Plant. p. 222. Reseda Plinii Neotericorum? Fuchsius Sesamoides maius satium vocabat: Resedam candidam Dalechampi: Resedam 2. siue albam C. Bauh. phyt. ubi reperiri narrat foliis simplicioribus, & in vnoquoque pediculo. An Tabern. in Icon. & Hist. Reseda tenuifolia, Eruca Cantabrica, Spanischer Raucken?

Mense Iulio Basileæ in horto D. Iac. Zvingeri florebat, & semine deciduo se propagabat. Ego colui Montbelgardi in horto Illustr. E. C. sed plerumque perit, semine ad maturitatem non perueniente.

CHELIDONIUM MINUS VETERIBVS, & in genere.

CAP. CVIII.

Chelidonia igitur minor, quā siluestre Triticum *μυρὸν ἄγριον*. [Ald. *μύριον*.] aliqui nuncupant, ex Dioscoridis autoritate, herbula est pediculis ab radice pendens, sine caule, foliū hederæ figurâ, sed multò rotundioribus ac minoribus, mollibus & subpinguibus circumdata. Radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum acervatim congestas, quarum tamen tres quatuorve in longitudinem protenduntur. Cæterum, iuxta aquas palustriaque loca nascitur. Vim acrem obtinet, & Anemones modo [Limonii modo, alius] summam cutem exulcerat: psoras item & scabros vngues eximit. Succus verò radicibus expressus, addito melle ad purgandum caput naribus vtiliter infunditur. Similiter & huius decoctum cum melgargarizatum, strenuè caput, cunctaque pectoris vitia purgat.

Chelidonium paruum maiore acius Aëtius tradit. Et hinc in cataplasmate impositum cutem exulcerare ait, & vngues leprosos exterere: succum eius per nares fortiter purgare: esse enim quarti ordinis calefacientium ac siccantium. Vbi porrò in frigida hepatis intemperie, calefacientibus, ac firmitatem addentibus vtendum est, Capnium, quam & Chelidonium herbam circa sepes enatam appellat, probat.

Luxatam autem esse Plinii lectionem (in Chelidonia minore) quis facile deprehendet, cum majori Chelidoniae reddatur colos albicans, flos luteus: minori folia Hedere, rotundiora, minùs candida, succus Croci, mordax, semen Papaueris: cū hæc duo postrema de maiore tradantur à Dioscoride. Namque minor acrem possidet succum, non tamen vllò pacto luteum, nec Papaueris semen, imò florem putat Ruellius sine semine proferre, radicibus potius quàm semine nasci. Sic

Descriptio:

Flores.

An Reseda Plinii No. 4 ter. Lobel.

Locus & Tempus.

Descriptio. Tritic. silv.

Locus, Vires.

Aëtius.

Plinii lectio luxata.

ergo in sedem restituetur luxata pars : Maiori colos albicans, flos luteus, succus Croci mordax, semen Papaueris, nisi quis ea quæ breuiter de minori Chelidonio scribuntur, parenthesi censeat interiecta.

Plinius no-
tatur.

Plinius [inquit Corn.] Chelidonio minori succum & semen attribuit, quæ Dioscorides maiori adscripsit. Quin & tota Chelidonii parui descriptio conuenire videtur herbæ, quam officinæ hodie Scrophulariam vocant. Nostri variâ induunt nomina. Nam & *feigwrrhenfraut*, i.e. Herbam hæmorrhoidum vocant, & *Scharlachfraut*, & *Pfaffhöllein*, *Biberhöllein*, i.e. Castoris testes vocat, à radicum similitudine. At verò quod herbulam pediculis absolutam reddidi, in græcis legitur *Περωνιον* ἴσιν ἐν μόχλῳ ἀναπτύσσεται. Significat autē ἀναπτύσσειν, absoluo, perficio, ita vt tota herba ferè ex pediculis constet, quum nullum caulem habeat, quod ipsum voce ἀναπτύσσεται significatur. Geranium Robertianum dici de Chelidonio minore, infra patebit. Sed & de Geranio Batrachoide habetur.

SCROPHULARIA MINOR, SIVE
Chelidonium minus vulgò dictum.
CAP. CIX.

Descriptio.



Chelidoniū minus, plātula est vt plurimū palmaris, aliàs paullo maior, minōve, quæ teste Trago quotannis nouā radice, foliis, & flore, sicut Satyriones & Aron, reuiuiscit, ea nobis insipida est, partim bulbulis aliquot, modò pyriformibus, modò longis, ferè teretibus, aut ventriosis, vtrinque acutis, modò

rotundis : Trago, torosæ sunt, ac instar grani Hordei olongæ, plerumquē ternæ, aut quaternæ, acervatim multis capillamentis, quibus humi hærent, fibratæ : foris pallidis, intus albis, partim fibris multis candicantibus, constantes : vnde exsurgit *coliculus*, secundum terram albicans, supernè dilutè purpurascens, circa medium ferè aut paullo inferius, geniculo donatus, ex quo oriuntur folia bina, opposita, longis pediculis, ex lato principio coloris carnei, sensim in angustum virescens desinentibus, aliquatenus hederacea, sed molliora, minora, rotundioraque, nerosa, glabra, splendentia (sicuti & bina illa, quæ statim à radice exoriuntur) indidemque ex alis foliola minora, magis angulosa, simili colore & splendore nitentia, Trago herbaceo, viridique colore conspicua, reliqui caulis folia profundius incisa, Hederae helicis repentis foliis proxima, alterno, plerumquē situ, breuioribus pedicellis virentibus appensa : summo fastigio insidet flos vnus,

Ranunculi æmulus, ex octo aut nouem foliolis aureo fulgore radiantibus, vnguibus chloris compositus, in medio habens staminula multa crocea ex tenui lateſcentia, auersâ parte sulcata : succedit capitulum Ranunculi echinatum, ex viridi luteolum, semine stipatum : Dodon. capitulum veluti Ranunculi, exiguum, ex seminibus congestum, verum minus. Floris & foliorum sapor herbaceus.

Chelidonium minus à nullis ostensum esse suo tempore vel Herbariis, vel Medicis, demiratus est Ruellius, præsertim cum nulla verno tempore frequentior occurrat, præcipuè Hirundinū aduentu. Demiratus est, quod longè dissidenti nomine, (proprio ignorato) officinæ Scrophulariæ, quod multis granorum frumenti grumis radix coaluisse videatur, vocauerint, putantes inditam fuisse appellationem, quod strumis [quas vocant græcâ imitatione, non latinâ scrofulas] medeatur : Non audiendos esse Arabicæ factionis authores testatur, qui Glaucium putant esse, quod ipsi Memithen vocant. Si quidem horum error apertior sit, quàm vt refutari desideret.

Cordus in Diosc. eadem cum Amello Virgilio Geor. 4. descripto facit, ac aurei splendoris flore, & foliis purpureis maculis, quas Dioscorides descripsit, insignito.

Fuchf. Chelidonium ideo hanc herbam vocatâ esse pronunciat, quod, vt habet Theoph. l. 7. c. 14. hirundinum aduentu florem excitet. Videtur ipsi Dioscoridis delineatio Chelidonii minoris herbæ huic, quam Scrophulariam minorem vulgò nominant, prorsus conuenire. Descriptioni subscribere ait locum, tempus, vires, & alia, quæ singula ad amussim quadrant, vt nemo hanc Chelidonium minus esse, inficias ire, sine magna impudentia, possit.

Dioscoridi autem *Χελιδόνιον* παρὰ τὸν λέοντα dici testatur quoque, licet non desint qui exiguum quoddam Scrophulariæ genus esse statuunt.

Omnes ferè rei herbariæ periti Chelidonium minus appellant. Hetruscis eam vulgò vocari *Fauoscello* putauerim (inquit Matth.) quod Fabarum modò folia subpinguia proferat. Verum an hæc sit Chelidonium minus, cuius meminere Dioscorides & Galenus, non parua videtur esse dubitatio : quod nullam prorsus nec foliis, nec radicibus præ se ferat acrimoniā, cum tamen acerrima & mordax esse deberet, longèque magis quàm Chelidonium maius : quandoquidem, Galeno teste, Chelidonium minus cutem exulcerat, & excalfacit ordine quarto. Id quod satis manifestè ostendere posset hanc non esse Chelidonium minus : nisi quis in hoc illud dixerit, quod de Aro scriptum reliquit Galenus lib. 2. de alim. facult. Nam faciliè contingere potest, quod quæ admodum Arum Cyrenis minimū medicamentosi, minimūque acrimoniæ possidet, adè vt in cibis vel Rapis vilius habeatur : In Italia verò, ac minori Asia contrà adè acre, vt medicamentis dūtaxat expetatur : ita & Chelidoniū minus, quod in Italia nascitur, minimū acrimoniæ sortiatur : quod verò in Græcia prouenit, acre admodum sentiat. Siquidem, exceptâ acrimoniâ tantum, nostrati nihil præterea deesse videtur, quin legitimū Chelidonium minus dici queat. Ex quo faciliè adductus sum, vt credam, quod quamuis in Italico desideretur acrimonia, non tamen id esse Chelidonium minus diffitendum est : tametsi inficias ire non liceat, nostrum Chelidonium

Chelidonium minus, quod omnino acrimonia sit expertus, iis morbis haudquaquam convenire posse, quibus illud conferre, quod in Græcia gignitur, tradiderunt Dioscorides & Galenus. Nam hac deficiente qualitate, necesse quidem est, ut & vires, quæ illam consequuntur, deficiant & pereant. Hinc igitur fit, ut non possim ego subscribere iudicio Fuchsi, qui in lib. de compos. med. quem auctum secundò excudit, Chelidonium minus censet alteram Malacocissi speciem. Quinimò eius opinio mihi refellenda videtur, quod planta illa nullis ferè notis aliquam mollem Hederam referat. Ea quidem foliis Hederam quodammodò æmuletur, sed quod magis attendendum erat, viticulas non pro fert, quibus humi repatid quod Hederæ cuique naturæ tributum est. Quidam nugator contendere nobiscum non erubuit hanc plantam non esse Chelidonium minus, sed Virgilij Amellum. Hucusque Matthioli. Lobelius in Aduers. nimis morosus ait, qui Chelidonium minus ob ignauam acrimoniam rejiciunt.

Dioscoridis esse *χελιδόνιον μικρόν* aut *πύρον* *ἀγρον* cōcludit etiam C. Bauh. licet vires non respondeant. Hanc enim diversitatem ratione solvobuenire, nostro iudicio, non malè suspicatur. Plinij lib. 25. c. 13. Satureiam censeri refert, quo loco Ranunculus agit. Huius folia aliquando purpurea maculâ notari, flore esse luteo simplici, aliquando & pleno reperiri.

Χελιδόνιον μικρόν græcè dicitur, latine Trago-Matthiol. Fuch. Hist. Dod. Anguill. epist. 11. Cordo in Diosc. & Hill. Gesn. hort. Turn. Lac. Lonic. Guiland. Lobel. in Adv. Obs. p. 323. Ic. Plant. p. 593. H. Lugd. p. 1048. [an eidè p. 1036. Ran. latifol.] Calt. Thal. Tabern. Ger. & Eyst. *Chelidonium minus*: Casp. Bauhin. Plin. Chelidonia 2. sine [ut etiam in phyt.] rotundifolia minor: offic. Chelidonia minor, & Hirundinaria minor: Brunfels. Ficaria & Scrophularia minor, & secunda: Malacocissus minor Fuch. Icon. Testiculus sacerdotis Syluatico, Fauagello Cæsalp. Germ. *feigwarzenkraut* / *klein Schoiskraut* / *Schorbockskraut* / *Erdgersten* / *Blaternkraut* / *Biberhöblein* / *Pfaffenhöb* / *lein* / *Schwalben wurz* / *feigblattern* & *Epypich* / *Weyenkrantz* Belg. *Speenkrunt* / *Heyn* / *Goye*: Gall. *Eclere*, ou *petit Bassinet*. & *Couillons de prestre*: It. *Fauoscello*, *Coglie di prete*: Hispan. *Celidonia menor*: Angl. *Dysewoorte*, or *figwoorte*: *Celidony menfsh*: Arab. *Memiten* & *Chilodemon*.

Locus & Tempus.

Hirundinum aduentu floret, nec longo post tempore marcescit, sic ut irrigui limites, qui largo foliorum, florumque stipatu pubescunt, confestim iis spoliati glabrescere videantur, quâ de causâ Chelidonium, i.e. Hirundinariam dicti, nullum est Ruellio dubium. Author est Tragus Martio mense proficere, sub finem Februarij erumpere ad humectos vinearum & pratorum quorundam colles: Maio marcescentem evanescere, folia florêque amittentem, radicalis interim usque ad principia Februarij anni sequentis humilantibus. Marantha vidit ineunte Februarij flores protulisse, licet Dioscorides eam aduentu hirundinum [qui Martij discessu esse solet] exoriri scribat. Omnibus Italæ locis, verno duntaxat tempore, frequens gignitur. Matthiolo, vliginoso, præsertim Solo, & in scrobium fossarumque marginibus. Fuchsius in palustribus prope aquas & limitibus humidis omnibusq; vliginosis ac hortis passim gigni scripsit, Maio mente. Nascitur [in Tom. III.

quit Dod. In pratis, secus vias ac scrobes fossaque, locis riguis ac humentibus passim vulgare: circa Martij Calendas exit, paulò post floret, Aprili deficere incipit, Maio integrè perit, post difficile fuerit, vel radiculam eius reperire, nisi locus, ubi provenit, particularis notetur. Montpelij & Lugduni floret Februario & Martio: Geneva quoque Aprili notatur.

Magnam præ se ferre acrimoniam, gustumque acerbè vellicantem narrat Ruellius. Sed non existimo eum Chelidonium minus unquam degustasse, nec observasse, quod subdit, argumento Galeni & sectatoris eius Pauli, pueros sæpius probasse, illam celeriter cutim exulcerare. Sic quoque non placet Tragus in tradendis viribus non citare Dioscoridem, sed ex ipso non degustato suo minori Chelidonio, ei tribuere acrimoniam Ranunculi linguam vellicantis, quâ nostra planta destituitur. Acrimoniâ autem deficiente caput non videtur posse purgare nec humorem trahere. Naturam habet, inquit, calidam cum acrimonia coniunctam, quare linguam, uti Ranunculus, vellicat, solerque potius externis corporis partibus adhiberi, quam intro sumi. Herba Chelidoni minoris unâ cum radice in vino decocta, melle admixto, caput purgat, & glutinosos ac lètos humores trahit, gargarisata. Idem efficit succus radicis cum melle tritus & naribus inditus. Proinde herba ipsa, radice, succoque, pulvere, & aqua distillata, in exterèdis ficub; mariscisve, magnâ utilitate & experientia Medici nostræ ætatis utantur, nam impoſitu, & insperſu, minuscè ficos & mariscas sanant, herba, aqua distillata, & puluis. Alla huius plantæ iuramenta & vires ex commemoratis animaduerti possunt. His addit Fuchsius: Chelidonium minus, Galeno teste, quarti ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando, idèq; magnam præ se fert acrimoniam, gustum erodentem. Nostrum autem usque adeò acre non est, ut commanducando sæpè nullam prorsus sentias acrimoniam potissimum in eo quod in humido loco natum sit. In eo autem quod locis siccis provenit senties & amaritudinem & acrimoniâ. sensim tamen gustu erodentem. Caterum, cum Matthiolo supra citato loco statuimus & nos Chelidonium minus Italicum, quod omnino acrimonia sit expertus, iis morbis haudquaquam convenire posse quibus quod in Græcia gignitur tradiderunt Diosc. & Galenus: calidis siquidem & siccis qualitatibus penitus destituitur. Licet autem etiam Turnerus non consulat utendum hac pro Chelidonio minori Dioscoridis, ad ea uti tamen licebit, ad quæ recentiores experti sunt. Dodonæus quidem non videtur degustasse Scrophulariam minorem. Ranunculis enim potentia proximam esse scribit, ac posteriori ætatem ad hæmorrhoides radicibus unâ cum adherentibus granulis uti, ut quæ huius succo cum vino aut laborantis urina permixto sæpius ablute contrahantur, ac dolore sopito resiccentur. Lobelius ut refutet opinionem eorum qui Scrophulariam rejiciunt ob defectum acrimonie ignaum, tribuit in Aduers. acrimoniam, quinimò in Obs. acius maiore ait. Sed hac parte sibi contrarius nobis videtur, ei modò ignauam acrimoniam concedendo, modò verò acius maiore Chelidonio tradendo.

Ego adhuc adoleſcens, inquit Solenander, vidi Tarquinium Schnellenbergium Medicum Empiricum, omne vitium hæmorrhoidum curantem Chelidonio minore. Is secretè herbam integram, siccata, in manipulos collectam, inje-

FFF

Vires & V-lus.

Acrimonia nulla.

Solenander

Hæmorrhoides.

Etamque ceruicis macerabat, eamque propinabat. Et aquam eius exstillatam, adhibebat lotioni & fori exterius per linimenta. Postea illâ herba ego multis modis ad hunc affectum feliciter usus sum. Succus frequenter illitus expeditius id facit, quâ aqua. Herba tusa apposita medetur. Noui, qui sanarunt, quos nimiam profusum ferè confecerat, ut hydropis periculum adesse videretur, exhibita huius herba aqua destillata: sed quia acris est admodum, libentius vtor herba ista, ut antè dixi, ceruicis, vel etiam vino suo loco, macerata. In pila tusa radices incoquantur oleo, eiusque est ad tumentes & dolentes hæmorrhoides usus. Flores quidam, alij herbam commiscunt oui vitello, coquant, & in placéntula manè edunt. *Huic herba ego ad hæmorrhoidum vitium mirabilem efficaciam tribuo.* Nam naturæ characterem in radice, cum exuberantibus hæmorrhoidibus habet. Sed illud diligentius examinabunt periti, quomodo verisimile sit, aquam Chelidoni minoris aciem admodum esse, quandoquidem hæc planta, teste Matthiolo omnino acrimoniæ expers sit.

CHAMÆLEVCE ET CHAMÆPEUCE ex veteribus.

CAP. CXI.

*Diuerſitas
ſynonymi le-
ho. capite.*

Malè & infelicitè cum Chamæleuces plantæ historia ex multo tēpore actum est. Vix enim è græcis Dioſcoridis codicibus duo ſaltem concordēs reperiuntur. Nam Chamæleucen alius tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucen habet: in aliis nullum eſt hoc caput: in quibusdam cum Bugloſſo miſcetur. Et præter id alij breuiſſimè rem in hunc modum abſoluunt: Chamæpeuce [*χαμαίπευκε*: alij *χαμαίλευκε*] lumborum doloribus propitia eſt, ſi trita ex aqua bibatur. Qui longiùs eius hiftoriam referunt, iſta quæ ſequuntur ad finem uſque ex Ald. codicis noſtris cum Sarraceno adiungunt. Eſt autem herba tota viridis, herbacèe coloris, foliolis, ramuliſque incuruis, floribus roſaceis.

*Plin. inter
Chamæleu-
cen & Cha-
mæpeucen di-
ſtinguit.*

Galenus & Paulus [*χαμαίλευκε*] itidem mentionem faciunt. At Plinius ſeoſim Chamæleuces & Chamæpeuces meminit: & Chamæpeucæ quidem eadem tribuit, quæ Dioſcorides Chamæleucæ. Chamæleucen verò eam eſſe tradit, quæ alio nomine Farranum ſeu Farfugium, alàs Bechion nominetur: vel reuera & inter Bechij ſynonyma in Dioſcoridis noſtris vox illa reperitur.

Porò, quid in tam conſuſo intellectu, & rei inſtantiâ reddendum eſſet, Marcellus diu dubitauit: Acceſſit tandem anxio Plinius, monuitque in ancipiti Chamæpeucen potiùs legendum eſſe, quàm Chamæleucen: quoniam quod Dioſcorides ait *ποιεῖ τὸν πόρον ἀλγῆμα*, ἐν ὕδατι λεία πινομένη, Plinius dixerit lumborum & ſpinæ doloribus propria eſt, eodem rei ſenſu & verborum ductu. Veriſimileque eſt ex his quæ Plinius eadem Dioſcoridi reddidit, hunc Chamæpeucen legiſſe, & hanc fuiſſe eius ætate capitis huius lectionem. Chamæleuces enim aliæ vires, & alia remedia ſunt, deſcripſitque Plinius Chamæpeucen Laricis folio. Suspendit animo Marcellum tamen Egineta & Aërius, qui, nullibi tractatâ Chamæpeuce, Chamæleucen deſcribunt. Vnde ſit, ne pro comperto conſtituere aliquid audeat. Multis enim, iſdemque magnis indi- ciiſ & auctori- bus pugnatur, iſque in tanta varietate id elegit,

quo Latini ſcriptoris, deficiente Græcorum, auctoritate ſe tueretur. Non videtur autem ipſi eſſe integram hoc Dioſcoridis caput. Chamæpeucen autem potiùs, quàm Chamæleucen, Valerij Cordi exemplo quoque legendum exiſtimat, ut qui ita in emendationibus quibusdam Dioſcoridis codicibus ſcriptum reperiſſe ſe aſſerit. Huc & illud accedit, quòd cum herbam hanc Dioſcorides *ὀλόχλωρον* eſſe profiteatur, ei minùs apud conuenit *χαμαίλευκε* appellatio: quippe quæ indubitanter humilem Populum deſignet: Populi verò albæ folia altrinſecus incanâ lanugine veſtiri, nedum *ὀλόχλωρον* conſpici, vnicuique conſtet.

Quæ Plinius de Chamæleuce ſcripſit, ea Hiſt. Lugd. de Chamæleuce Dioſcoridis intelligi poſſe haud cenſet, ſed potiùs ſecundum alios, quæ iſ de Chamæpeuce ſcripſit, ad Dioſcoridis Chamæleucen pertinere contendit. Sunt tamen qui breuiem apud Dioſcoridē Chamæleuces deſcriptionem in totum reſciendam ſentiant, & Galeni Chamæleucen diuerſam à Bechlo ſtatuunt. Quidam enim eſſe Bechion (inquit Plin. lib. 26. c. 6.) & alio nomine Chamæleucen putant, &c.

Amatus de Chamæleuce ſcribens, ait Latine dici Chamæpeucen: promiſcùè legi caput hoc de Chamæleuce, vel Chamæpeuce, Plinium tamè ut differentium meminiffe. Sed quæro ex Amato (inquit Turn.) Jex quo veteri ſcriptore, legatur caput hoc de Chamæleuce, promiſcùè de Chamæleuce & Chamæpeuce? Quod ſi nullus veterum id facit, quis tandem ex recentioribus ita legit, qui Plinio non debeat cedere, Chamæleucen & Chamæpeucen diſtinguenti: &c.

Nunc reliquum eſt, ut Chamæleuces & Chamæpeuces æquiuocationes inquiramus. Chamæleuce igitur Cordo eadem eſt herba cum Bechio, id eſt, Tuſſilagine. Chamæleuce etiam dicitur Petaſites, Caſalpino. Caltha paluſtris, Turnero. Hedera terreſt. Trago. Roſm. ſilueſtre, Cordo. Anthirrhinum, Caſalpino. Pinus Mugho, Dodonæo. Camphor. Monſpelienſium, Lobelio in Aduerſ. Muſcus terreſtris, ſed perperam Cordo. Chamæpitys. Roſmar. ſilu. Geſnero. Erica altera Matth. Aſparag. marinus Cluſio.

CALTHA PALVSTRIS.

CAP. CXII.



Minori Chelidoniæ ſimilis, per omnia tamen maior, minùs rubent huius coliculi: folia item profundiore circa pediculum ſinu conſtant, & purpureis maculis carent; eſt etiam alia differentia, quòd minoris Chelidoniæ coliculi ſine ramulis naſcantur: hoc verò circa ſingula in coliculo folia binos emittit ramulos, cum in m-
dore

*Dioſc. caput
reſciendum*

Synon.

*Epimed.
lomat.*

*Turn. caput
Amatum.*

Æquiuoca.

*Humilis
lana n.
q. l.*

Deſcriptio.

nore Chelidonia bina semper folia singulates coliculos vestiant. Flores in summitatibus singulorum coliculorum singulos producit luteos, paucioribus tamen, rotundioribus, multoque maioribus foliis, quam illius, constantes: in quorum medio stamina eiusdem coloris visantur: radices verò subsunt minori Chelidonie dissimiles, Hel-lebori radice cum fibris similes, foris nigrae, intus candidae, longae, graciles & insipidae: folia, floresque similem minori Chelidonio saporem habent: capitulum seminum est echinatum.

Synon.

Valerius Cordus, descriptionis author Chelidonium palustrem nominat. Sed Tragus Caltham vocari posse putat, cuius in Alexi meminit Virgilius. Lonic. ait graece vocari Chrysanthemum, sed toto caelo aberrat: Dioscoridis Chrysanthemi descriptioni minimè respondet. Gesn. hort. refert aliquos Ferrariam vocare, fortè quòd folium ferream equi soleam videatur referre.

Epimedium
lunare.

De Caltha palustri hæc Dodonæus scribit: Flores huic raro, vel nunquam apparent, quamobrem Epimedium esse aliquando visum fuit, sed temerè. Non est autem Chamæleuce aut Tussilaginis species aliqua. Inepre quoque Farfugium & Farranum habetur. Chamæleuce siquidem, quam à Plinio Farfugium ac Farranum dici perhibetur, à similitudine foliorum & Lonicæ, i.e. Populi albe, appellationem accepit. Virent autem Leuces folia superius quidem, at inferius tenui candidaq; lanugine incanescent. Calthæ verò huius neutrià in albescunt parte nec formâ eorum respondet. Hæc ille, qui Calthæ palustris, & alteram effigiem dedit, sc. absque flore in aquis provenientis.

Humili in-
cana non
est, Lob.

Caltha palustris recentiorum (inquit Lob. in Adu.) non est Chamæleuce Plinij folio Populi, siue Hamilis incana. Est Dotterbloemen Belgarum, & Farfugium Recentiorum quam Cal. Bassus ex Geoponicis Malacocysam maiorem vocat, & Matthiolus ex suo cerebro Tussilaginem alteram facit, coniecturas truales, & descriptionem ex Dodonæo, & aliis recentioribus scriptoribus emendatam, inculcando, suppressis nominibus, & mutatis classibus, quasi scopas dissolutas: hæc enim multo magis Chelidonium ipso toto vultu præfert, nisi quòd vniuersa maior: Flores neutiquam papposi, quinimò diu admodum & particula im florēt, aureis Ranunculi, aut Chelidoni minoris floribus: neq; folia ortu, vt Tussilago, anteuertunt, & Nymphaeæ luteæ colore, vel Chelidoni minoris nitore fulgent, & similes sunt adeò, vt in Angliæ vdis, vbi vberissima, sæpe pro Nymphaea minore Pharmacopœi & Clinice mulierculæ mihi attulerint, & ostentarint. Folia non subter incana, non angulosa, non caulis tomentosus, sed potius atro virore polito, vt Asa. f. Nymphaea. Radix fibrata quidem capillamentis, acris gustu est, sed moderatè. Nunc si Nymphaea inde sit dicta, quia Lymphis, Nymphæive est coniunctrix & accola, potuerunt Serapione antiquiores Caltham palustrem dictam Nymphaeæ congenerem fecisse: natales quippe, folia, & flores affinitate hand vulgari, etiamnum persuadent idem quibusdam pharmacopœis, qui nostris medicamentis non semel subdiderunt hanc, illarum [Nymphaeæ vtriusque] loco, vocabantque Nymphaeam luteam. Quin nî mihi forent notæ Nymphaeæ, certe hanc legitimam Nymphaeam agnoscerem, quoties potiores vel rationes, vel plantæ accommodatiores me desicerent. Et hæc Lobelius. Et alibi Chamæleuce siue Populus pumila quamam sit, vix nisi de nomine coniectari licet,

Tom. III.

adeò ignotis notis prodidit eam Dioscorides: &c.

Contra, plantam hanc circa riuos aquatum & vliginosis pratis nascentem, quam Clus. Caltham palustrem vulgarem, & nonnullorū Chelidonium aquaticum nominat, Anguillara Opinonū lib. 12. Chamæleucen Plin. esse existimat, iisdemq; adhuc nominibus cognitam dicit Patavino agro, quibus Plinius eam donat, nempe Frani [Plin. Farrani] & Farfugij, cuius opinioni Matthiolus assentitur, assentiuntur & alij.

Apud H. Lugd. p. 1049. Caltha palustris describitur: verum repetitur descriptio aliquibus mutatis sub altera Tussilagine Matthioli p. 1052. Sed nulla apponitur figura. Meminit eadem Calthæ palustris p. 105. sub alia Nenupharum specie Serapionis.

Hist. Lugd.
notatur.

Hier. Brunsch. in edit. anni 1550. ineptam figuram ponit, Seeblumen, h.e. Nymphaeæ nomine.

Maie & semina facit Gesn. de coll. stirp. Maie Brunsch. in ramulis rubetioribus flore magis tincto: semina minorè alboribus ramulis, & flore minorè tincto, trades. Mas & fa-

Brunsch. in-
epta figura.
Mas & fa-
mina..

Tabern. & Gerard. maiore & minorem agnoscunt. Et hinc apud Tabern. nomine Populaginis maioris & minoris due sunt figurae, apud Ger. vero nomine Calthæ palustris maioris & minoris.

Maior &
minor.

C. Bauh. phyt. (vbi priuatim Chamæleucen Plin. vocat, item quorundam Caltham Poetarū, & Boutomon Constantin.) & Plin. [vbi Chamæleucen Anguill. & Turneri statuit, Epimedium Dodonæi, Thal. & Amellum Virgilij putatum eiusdem appellat, & Farfugium Cast.] dicitur Caltha 9. sua palustris flore simplici.

Boutomon
Constant.

Germ. nuncupatur Dotterblum, Flos vitellinus, & Gelwisenblum. Flos prat. luteus, Moosblum, Flos pratensis aureus, Schmalgelbblum, Flos butyri, drachblum, & Gelwisenblum, luteus german. Maij flos.

Nomina
luteus german.

Humidis palustribus locis, veluti riguis pratis gaudet: subinde ab ipsis aquis exit: cuius folia supereminetia longioribus, nituntur pediculis, quæ alias brevioribus insunt: flores huic raro, vel nunquam apparent. Illa vna cum Ranunculis Vere floret, & serius, subinde quoque: Aestate: toto autem anno Loens & ipsa viret herba. Lugduni observavi florentem Tempus Martio, Genevæ Aprili, & Maio siliquas ferentē: item prope vassera florēt em Augusto.

CALTHA PALVSTRIS FLORE multiplicato.



Multa habet folia, Descripti circinata sepe rotunditatis, succulenta, venosa, in ambitu nonnihil, vulgaris foliorum instar, serrata: prodeunt inter illa palmares caules, interdum etiā [si vdo, pingu q̄e Solo nascatur] pedales & maiores, obliqui, in aliquot alas divisi, quæ vt plurimum, vulgaris more, ex uniuerso geniculo binos pro-

Fff 2

ferunt flores, vncialibus petiolis innitentes, multiplici foliorum texturâ constantes, coloris planè aurei, quorum quina inferiora, reliqua veluti sustinentia, & amplectentia, masculula sunt: radix non minùs quàm vulgaris, multis candidis, crassiusculisque fibris prædita est, auctore Clasio, in Hist. post.

Synon.

Autori & Camer. dicitur Caltha palustris flore pleno: Gel. hort. Caltha palustris floribus densis. Eid. de coll. stirp. Chamæleuce Ruellij hortensis, florum foliis multiplicibus: Populago multiflora T. bern. Caltha palust. multiplex Ger. flore multiplici Eyst. C. Bauh. pin. Caltha 10. [9. in phyt.] siue palustris fl. pleno.

Locus.

In Anglia spontè & plenis & odoratis floribus reperitur, Camerario auctore. Ex Saltzburgenfibus pratis (in quibus copiosè nascitur) primùm Viennam Austriæ delata: Nobilibus Matronis cœpit esse in delitiis, cum istic viueret Clusius: postea etiam ex Auguita Vindelicorum accersita: verùm non adeò elegans vt prima, sed paulò humilior: eius item folia minùs vegeta, & quasi pallescentia: flos etiam diluor, & magis pallens. Augustanz ferè similes plantæ, pauca tamen, inueniuntur in pratis quibuidam viginosis, Francofurto ad Mœnum vicinis, anno 1591. flo. e quidè pleno, sed rarioribus foliis constante, quæ in hortu illatæ, sequente anno, simplici florum textura præditos t. le. ùi flores, instar vulgaris: sic quam Lugdunum Batavorum detulit, vt istic etiam obseruare liceret, simplicem florem semper præbuit. Nobis Montbelgardi in orto fleret Vere & Autumno.

GERANIVM IN GENERE EX VETERIBUS & NEOTERICIS.

CAP. CXIII.

Gerania duo Diosc.

DVas Geranij species describit Dioscorides. Geranium, inquit, folium habet Anemonæ simile, incisuris diuisum, at longius: radicem subrotundam (ὄριον, ὄριον: Orib. ὄριον, ὄριον.) dulcè & esui aptam. Hæc drachmæ pondere in vino pota, vteri inflammationes discutit. Vocatur & à nonnullis alterum Geranium, habens cauliculos tenues, lanuginosos, duorum palmorum altitudine: folia verò Maluæ similia, & in summis alis quasdam sursum spectantes eminentias, veluti gruum capita cum suis rostris, aut dentes caninos. Huius in re medica nullus est vsus.

Sunt autem qui prius Geranium Dioscoridis Pelonitini, qui Trican, qui Geranogerontem vocent. Aphri Iesce, Romani Echinastrum appellant: Posterius quidam Oxyphyllon, aliqui Meriyya, nonnulli Myrthida, plerique Cardamomon, aut Origanon vocant. Magi Hierobricas, Aphri Iec, Romani Pulmoniam, Cicutariam, & Grui-nam herbam appellant.

Genera duo Plinio.

Plinius duo quoque genera Geranij describit: Et primò vnum iuxta Latinorum quorundam traditionem. Deinde ambo iuxta Dioscoridem. Galenus in Simplicium censu Geranion omisit. Sed Paulus sequutus Dioscoridem, vtrumque Geranion commemorat, eadem quæ Dioscorides tribuendo.

Nomina linguarum.

Commune harum & similium stirpium nomen græcum est γέρανιον, latinum Geranium. Appellatum autem est Geranium, à gruini capitis imagine, quæ summo eius plantæ capitulo inest, aptissimâ similitudine. Sic recentioribus à cico-

nia rostri effigie, Rostrum ciconiæ nominatum est. Germ. Storchen schnabel, & Krannichs schnabel: Belg. Oyenares beek: Gall. Bec de Cigogne: Ital. Geranio: Hisp. Pico de cigouina: Angl. Storckes bill: Boh. Čapinusek: Hung. Varrny lab/h. e. Cornicis pes.

GERANII SPECIES VARIÆ.

CAP. CXIV.

GERANIVM MALVACEVM.



ALteri Geranio folia sunt Maluaceis magnitudine, colore & mollitie proxima, nonnihil oblonga, subhirsuta, in ambitu serrata, pediculis appenda, tres duasve vncias lōgis, interdum ferè dodrantalibus: caules ex eadem radice, solo latiore & fimetis multo hirsuti, mediocriter crassi, dodrantè aut cubitū alti:

è foliorum sinu pediculus exit duas trèse vncias longus, multifidus, cui flores insident multi cærulei, quinque foliolis constantes: quibus decidentibus rostra oriuntur vnciam aut lescunciam longa. Hæc planta aliquando vix trientalis est, foliis ouatis, crenatis & Betonicæ ferè similibus, qualè nos habemus in Herbario nostro sicco, lectam, ut fallimur, in agro Narbonensi.

Sub Geranio secundo, siue altero quibusdam dicto hoc intelligit Dioscorides, dum ei gruum rostra tribuit. Est Geranium foliis Maluæ paulò candidioribus Plinio.

Matth. in edit. comm. anno 1559. hoc intelligit, cum ait: Geranij plantam vidi in pluribus hortis, ac viridariis satam, foliis rotundis secundi [Robertiani] Geranij modo per ambitum laciniatis, Maluam magnitudine æquantibus, fructu gruini capitulis simili. Hanc Herbariorum nonnulli, Momordicam nuncupant, quemadmodum & Balsaminam alij eodem nomine vocant: eamque cæteris præferunt in potionibus ad interna vulnera glutinanda. Hæc, meâ quidem sententiâ, magis responderet alteri Dioscoridis Geranio, vt quæ foliis ad Maluam propius accedat. Quare & hanc magis eandem esse cum illo putauerim. Veruntamen haud eam inficias, quin Pes columbinus dictus, idem sit Geranium: sed eum quis rectius fortè Geranium minus dixerit. Eadem repetit in comm. cum mag. fig. lat. & Italicis. Sed non ex ultimo Matthiolo benè perspectum fuisse hoc Geranium. Siquidem modò Momordicam ab aliis quibus appellari credit, modò verò, pro Geranio tertio, Veronâ à Calzolario misso, siue sexto depingit, & vtroque describit. Quinimò mihi persuadeo, tertio eam pro Malua alterâ à Calzolario Veronâ missâ in lat. comm. cum mag. fig. sine descriptione tradi: in comm. verò Ital. pro qua: in Epit. pro hederacea siue montana.

Memoria

Amat. nota- tur. Meminit huius Amatus sub secundi generis Geranij Plinij folio Maluæ altera specie, à multis Momordica dicta. Verum non describit, nec se satis explicat. Apollo Rad. 10. p. 193. facit Geranij Dioscoridis secundi speciem primam, à quibusdam Momordicam veram nuncupatam. Lobel. in Ic. p. 662. & Obs. p. 378. Geranij Malacoides inscribit.

Geran. Malacoides Lobel. Tabern. Ic. Geranium Mompeliacum siue Maluaceum, apud Schnabeltraut. Hist. Geran. 9. 7. 1. p. 1280. sub Geranio sexto Matthioli, ex quo denuò describitur. Illud à vero alienum est, quod ibidem dicitur, Matthiolum Momordicam pro secundo Geranio pinxisse. Existimo huius novam & descriptionem & iconem Maluæ maioris tertie Matthioli inscriptione pag. 586. apud Hist. huius Geranij extare.

Tabern. opus reprobatum. Gerard. cui Geranium Malacoides, spurium Creticum, Siquid Candie Craues bill appellat. Dodonæo in fol. lat. dicitur Geranium, Matthiolo à Calceolario missum, ad Pedem columbinum referendum. Call. Geran. Matthioli. Camer. hort. Geran. althæodes, Matthioli 6. vel ultimum. Cæsalp. Pedis columbini vulgò appellati tertia l. e. folis Althææ.

H. Lugd. Botanic. Gerard. cui Geranium Malacoides, spurium Creticum, Siquid Candie Craues bill appellat. Dodonæo in fol. lat. dicitur Geranium, Matthiolo à Calceolario missum, ad Pedem columbinum referendum. Call. Geran. Matthioli. Camer. hort. Geran. althæodes, Matthioli 6. vel ultimum. Cæsalp. Pedis columbini vulgò appellati tertia l. e. folis Althææ.

Geran. reprob. C. Bauh. Geranium 2. in hyt. 9. apud Matthioli. 3. in Pin. folio Althææ, & Maluam 3. phyt. 5. siue montanum apud Matthioli. 4. in Pin. folio hederaceo, vnam non duas statu plantas. Nec separo ab his eius in Pin. Geranium Maluæ folio quartum, siue malacoides minus, quod 1. in ipsius Prodomo.

Locus & Tempus. In hortis Brabantie & German. colitur: floret mense Martio & Septembri. Montepeljabundat: item prope Flornuam & in montibus ad Arque.

GERANIUM FOLIO ROTUNDO, MULTUM SERRATO, siue Columbinum.

Descript.



Vitriculis multis, rubentibus, parvis erectis, geniculatis donatur: folia Maluæ rotunda, nunc magis, nunc minus inclinata: flores quoque magnitudine variant, purpurei, quinque foliolis aliorum more constantes: quibus acus succedant Robertiani Geranij: radix tenuis, sed longa, rubescens, sapore adstringente.

Duplex est genus Thal. & C. Bauhino, maius Tom. III.

sc. & minus: maiori sunt caules maiores, & folia paulò molliora: minori omnia minora, & folia asperiora. Sic folia modò in profundiores, modò in breviores & latas lacinias diuisa sunt: floris etiam magnitudine differunt: flore triplò maiore & cærulei elegantioris coloris ex horto Dei habuit Frater.

Quem vulgò Eur. Cord. Ruell. Hermol. Tagault. Brunf. tom. 2. p. 290. (habet descriptionem Manlij) Fuchf. Corn. Trag. Matth. Turn. Amat. Lonic. Lac. Cast. Cronemb. Apollo, Lob. in Adu. Obs. p. 376. Ic. Plant. p. 658. Cæsalp. Tabern. Ger. Thal. Camer. hort. & Clusius Pedem Columbinum vocant, iidem omnes [excepto Eur. Cordo, qui Herbam Rupertianam malè quidem, & Grunæ herbæ speciem cognominat, Brunfels. & Camerario, qui etiam Geranium Maluaceum siue Balsaminum appellat] Geranium alterum (γεράνιον ἑρπον) folio Maluæ Dioscoridis [& Plinij, addit Amat.] esse statuunt.

Geln. hort. Geranij species folio Maluæ: Cronemb. Geranij altera species Fuchfij: Dod. Tabern. & Ger. (cui & Pulmonia, & Grunæ) Geran. columbinum: C. Bauh. phyt. Geran. siue fol. Maluæ, Eid. in Pin. Geran. Maluæ folio rotundo, primum. Matthioli. Histor. german. Geran. tertium.

Sunt qui [Serapionis interprete decepti] aberrantes, maximo errore Amomum (secundum verò Tabern. Cardamomum) esse existimant, & in Amomi locum substituunt, nullam de his historiam inquirentes.

Nec melius Barbarus Herbam Roberti nuncupat. Fallitur & Brassauolus asserens nullo modo iis esse assentendū, qui Pedem columbinum vocatum, Geranium esse contendunt, quòd Geranium foliis exeat maioribus, Anemones incluris. Sed is ignorasse videtur, quòd secundum Geranij genus, non autem primo generi à Dioscoride assignatum, est illud, quod Pes columbinus censetur. Vel fortasse dum hæc scriberet, alterum genus Geranij non animaduertit in Dioscoride.

Secundam hanc Geranij speciem, Pedem columbinum vocatam, venenum esse, Apolline rad. 10. teste, non sine lapsu tradidit Cardanus in lib. de malo medendi vii. pro columbino miluinum fortè, vel corninum accipiens Ranunculi genus, exulcerans scilicet, & vesicas excitans, vel deceptus, quia in Geranij specie foliis Ranunculo similibus, in quinta specie, à Fuchfio numeratur secunda hæc minoribus foliis.

Germ. taubensf. Pes columbæ, & scharten. Nomina fraut. Belg. Duvuenvoet. Gall. Pied de pigeon. Ital. Geranio columbino: Cast. Pico de cioguenna: Portug. Pico de gruo: Angl. Doucs foote/ or Crausbill: Poll. Gofophia noza: Hung. Gofna forónia h.e. Cleoniz vnguis, h.e. Storcken clauwe.

Floret tota sætè æstatè: provenit secus vias, in agris incultis, in cæmeteriis, & hortis: quotannis se renouat semine deciduo: Hieme enim non perfert.

Pedem columbinum præscribit Rondeletius in enemate ad Hydropem. Experientià constare alt Tabernamontanum. esse herbam valde vulnerariam portionibus additam, aut etiam in puluere sumptam. Eidem vsui inferuire & aquam distillatam. Herbam vino vel aqua decoctam, purgare vulnera. Idem præstare emplastris, balsamis & vnguentis quouis modo additam. Foru quoslibet articulorum dolores sedare.

Synon.

Error quæ-
runtam.

Alius
Brassau. id.
psus.

Non est ve-
nenum con-
tra Card.

Nomina
linguar.

Locus &
Tempus.

Vires &
Vius.

GERANIVM TVBEROSVM MINIMVM.

Descript.

Est folio, flosculo, & totâ facie vulgaris Maluacei, siue Balsamini, aut Pedis columbini, attamen multò minus: radice Auellanzæ magnitudinis, rotundâ, tuberosâ, nullis fibris, sed veluti acetabulis, aut osculis ex parietibus alimentum hauriens. Ex murorum rimis, in quibus nascitur, in hortum translatum, Geranium tuberosum minimum penitus contabuit.

Synon.

C. Bauh. phyt. Geranium 13. siue tuberosum minus folio maluaceo: Eid. Pyn. Geranium Anemones folio rotundo 10. siue Ger. tuberosum minus Camerarij.

GERANIVM GRVINALE, FOLIO

tenuiter diuiso.

Descript.



Radice nititur singulari, parua, intus forisque rubente: caules admodum numerosi, plurimum supini, dodrantales, interdum bicubitales, ramosi, sanguineo rubore perfuncti, hirsuti, geniculati: folia Pedis columbini, rotunda, sed tenuiter dissecta, subhirsuta, & nonnihil subinde rubentia: flores Geranij Robertiani, paullo

maiores, purpurei; folliculo laxiore, minusque rubente obfusi: semina rostrata, quam Robertiano habitiora.

Casp. Geranium 3. & Collum gruis, frâ nichilâls Germanorum Fuch. Lonici [cui & Gruina] Lac. Dodon. [cui & Gruinalis, & Geran. gruinale] Geran. quartum: Lobelio in Adv. ni fallor, Geran. Robertianum 2. siue Robertiana secunda: Camerario horr. Geran. supinum paruum siue vulgatius, & maius, non ita passim obuium & notum: H. Lugd. pag. 1278. Gruinalis Dodonæi: Casp. Bauh. phyt. Geran. 18. siue Robert. secundum: apud Matth. Geran. Robert. 2. Matth. 5. Tabern. violaceum: Eid. Pin. Geran. Anemones fol. rotundo 7. siue batrachoides, Collum gruis dictum. Sed Matthioli quintum non est gruinale, ut eo capite demonstratum: Geranium quoque violaceum Tabernemontani esse non potest, si vel solum figuram consideres, quæ eadem cum ipsius Geranio Rupertiano.

Locus & Tempus.

Montpelij & Genevæ observavi virens Februarij principio, Montbelgardi etiam in orto Ill. E. C. sponte florens Julio & Augusto: circa fontem admirabilem in ducatu Wirtemb. sine caulibus Octobri.

GERANIVM ARGENTEVM

montis Baldi.

Descript.



Geranium argenteum palmarum altius paulo: ex radice crassiuscula rubente, mediocris longitudinis folia exeunt longis ac trium quatuorve uncularum pediculis hærentia, parva, & quæ pollicis articulo regas, in quinque laciniis præcipuas, singulas rursus divisas, profundè ad usque pediculum fissâ, pilis infra subtristibusque albis, luculentibus ut

in Heptaphyllo montano, lanuginosa, ad Geranij gruinale formam accedentia: caulis tenuis, palmaris, in ramos abit, quorum singulis insidet flos purpureus, quantum sicca demonstrat, in medio staminibus longiusculis, quem calyx excipit magnus foliaceus, e quo tandem emergit rostrum gruinum, unciam plûs minus longum: perennis herba est, ut ex reliquis plurimorum foliorum veterum, quæ radicem quasi squammatam faciunt, colligere est.

Hoc C. Bauh. in phyt. videtur intelligere per Geranium 8. siue argenteum, & cum Geranio saxatili Thalij & Camerarij, quod idem est cum meo lucido, siue eius decimo, turpi ex confundere. In Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo 14. siue argenteum alpinum.

Nascitur alpinis rupibus maioris montis Baldi (ex quo petiit, mihi Béchius misit) Orientem aspicientibus, ac ibi passim Floret initio Julij, semen Kalendis Augusti perficitur. Perennis est planta. Radix amaruluscula, ac quadam subadstrictione donata.

Locus & Tempus.

GERANIVM TVBEROSVM.

Descript.



Geranium tuberosum dictum, nomen invenit à radice tuberosa, subliuida, insipida: cuius folia, semipalmari & palmari subhirsuto pediculo donata, lata sunt, divisa octonâ, novenave ad ipsum usque pediculum, singulis segmentis minutius dissectis, colore ex viridi canescente: flores in

Locus & Tempus.

Descript.

res in petiolis teretibus subrubrisque ac hirsutis, pulchri, purpurascētes, ex quinque foliis in summa diuisis aliquantum, intensiore purpura striatis, & circa imum marginem nonnihil hirsutis, fibris purpurantibus: circumiecta autem sunt flori quina itidem folia acuminata, intrus nonnihil rubescentia, glabra, foris virefcentia, & lanuginosa. Floribus decidentibus succedunt *rostra*.

Synonyma.

Dioscoridis est *γεράνιον* foliis Anemones, diuisionibus longioribus, radice subrotunda, dulci. Plinij Geranium alterum Græcorum. Pauli Geranium folia habens Anemonæ similia.

A Dioscoride autem primo loco descriptum esse testatur inter alios Matthiolus, qui in priorib. comm. pro Geranio pingit, & in post. pro eo etiam describit. Mirum proinde eum in Hist. germ. Geranium quintum statuere.

Geran. 1. Dico.

Pro Geranio primo, scil. Dioscoridis recipitur quoque ab Anguill. Lob. in Adu. & Obs. Cam. hort. Tabern. Cast. Gerardo, & Cæsalpino: cui & Pancascolus dicitur. Pancascolus, inquit is, vulgò appellatur in montibus nomine confecto ex pane & caseo, quorum vicem in cibis explet radix: Geranium Dioscorides vocat, & Plinius similiter.

Synon.

Gesl. hort. dicitur Geranium subrotundâ radice Dioscoridis, ab Anguillara allatum. Lob. in Adu. Obs. p. 337. Ic. Plant. p. 661. Geranium bulbosum. Cam. hort. Geran. tuberosum maius, admodum viuax & copiosè se propagans. Gerardo Geran. tuberosum. C. Bauh. phyt. Geran. siue tuber. maius: Eid. Pin. Geran. Anemones folio rotundo nonum, siue tuber. maius.

H. Lugd. icon. bina.

H. Lugd. p. 1275. Geran. 1. Matthioli: Et p. 1276. Geranium tuberosum Dodonæi. Vtraque figura est Geranij bulbosi: sed prima id proponit, vt Matthiolus expressit: secunda Dodonæi, quæ melior, sufficiebat.

Tabern. icon.

Tabern. Ic. Geran. tuberosum siue Illyricum, windisch schnabelkraut/ & Geran. bulbosum Matthioli, turschisch schnabelkraut: Hi st. Geran. septimum, Pelonitis: Geranogeron. Trica, Herba grina, Echinastrum, Vchinastrum, Pulmonia, Rostrum gruinum, Rostrum ciconiæ, & Permonia: Arab. *Geramon*. It. *Geranio*, Aco. *de pastoris*, Hispan. *Bico de ciguenha*, Gall. *Becq de cicogne*. Afric. *Isfer*, Hüg. *Daryulab*, Boh. *Ezapiusck*, Angl. *Storckes bill of Illiria*, Belg. *knobelachtig Cranebeck*, Germ. *Schloponisch Schnabelkraut*, Schlauonischer *Storckenschnabel*: Item, Geranium decimum, primo Dioscoridis annumerandum, *γεράνιον βολεβοδές*, Geran. bulbosum, & rotundum à radice nūcupatum, Geran. Byzantinum, Geran. Turcicū, German. *Zwibel schnabelkraut*, Constantinopolitanischer *Storcken schnabel*, & turschischer *storckenschnabel*: quia primò Constantinopoli in Germaniam delatū. Has duas non separamus, quin potiùs easdem esse statuimus.

Locus & Tempus.

Montbelgardi Solum commodè perfert, florens in horto illust. E. C. Iunio & Iulio. Vires ex Veteribus lege antè.

GERANIVM ASPHODELI RADICE.

Descript.

Radice habet ex multis paruis & longis bulbis constantem, versus summum fibratam: caulem cubitalem geniculatum, juxta radicem & genicula parum rubentem: è singulis geniculis duo folia longiusculis pediculis nitentia, in quinque præcipuas partes dissecta, quarum singulæ

Tom. III.

in ambitu inæqualiter incisæ sunt: è singulis juncturis, juxta foliorum exortum quinque folia mucronata exortuntur: flores in summis ramulis conjugatim paruis pediculis insistentes rosei, ex quinque foliolis constantes, colore ex purpureo rubelcentes, Geranij cæruleis floribus similes, sed paulò minores.

Clusius descriptionis author facit in Pannon. p. 419. Geranium 3, in Hist. post 4. cognominat quæ Geran. bulbosum Pennæi. Dicit autem foliorum similitudine secundum Geran. Batrachoides aliud folio Aconiti nitente [referre. C. Bauh. in phyt. est Geran. 12. siue radice ex multis bulbis constante: Eidem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 11. siue radice grumosa].

Synon.

In Dania prouenit agro Hafnensî, vnde Turnerus Clusio attulit & dono dedit.

Locus.

GERANIVM BATRACHOIDES.

Radix pellicari est crassitudine, fortis rubra, intus buxea, multis fibris donata, sapore vehementer adstringente: caules cubitum aut sequicubitum æquant, tenuis, fongosi, subhirsuti:

Descriptio.



flores speciosi, magni, cærulei, quinque foliis purpura striatis constant, in quorum medio apices atro-purpurei: folia Aconiti, magna, rugosa, profundè incisa, & quasi in orbem nonnūquam acta.

Camer. hort. & C. Bauh. duplex est: grandius floribus cæruleis, aut albis, & quidem eodem loco: minus rubris.

Trag. vocat Geran. 4. ordine postremum, Sanguinariæ radice speciem: Corn. & Matthioli in post. comm. & Hist. germ. Geran. quartum: quintum Fuchs. Lac. & Lonic. qui malè quoque Chelidonium minus appellat: sextum Turin. Dod. gall. ac etiam cum lat. in fol. Geranium Batrachoides à Ranunculi similitudine, vnde & vulgò Ranunculum cæruleum appellant. Lat. præterea & alterum Geran. batrachoides pingit, aliam Geranij Batrachoidis speciem nuncupans & describens.

Synon.

H. Lugd. p. 1280. & Cast. Geranium 4. Matthioli: Gerardo Geranium batrachoides: Clus. in Pan. sine icon. pag. 419. Geran. batrach. primum, Geran. batrach. cæruleo flore Belgicum, Hist. post. Geran. 3. *batrachoides* maius. Thal. Geran. *batrachoides* Dodonæi fl. purpureo magno. Camerar. hort. Geran. batrachoides maius & minus. Lobel. Adu. Geran. batrachoides. siue magnum, cæruleum odoratum, Obs. pag. 376. Geran. batr. siue gratia Dei, Ic. Pl. p. 659. gratia Dei Germanorum. Cronemb. gratia Dei, Geranij species Fuchsij, Tabern. Ic. Geranium siue Batrachii cæruleum, *bsauw storckenschnabel*. Hist. Geranium sextū, Ranunculus cæruleus, gratia Dei cærulea. Hoc

Plura Syn.

quamvis neque à Dioscoride, neque ab alijs Græcis describatur, tamen ad primum Dioscoridis referri posse putat.

C. Bauh. phyt. Geran. 3. siue (ceu etiam apud Matth. ubi figuram Geranij sanguinei Tabern. assumpsit) Geran. batrachoides. Eidem in Pin. Geranium Anemones fol. rotundo 5. siue batrachoides, Ger. sanguinarium Tabern. maius Eyflett.

An Geran. alterum, Geran. maiori Aconiti folio simile Gesn.?

An Balsamina vulgè Cæsalp.?

Genevæ quidem mihi florebat in horto mensæ Maio ex proximis montibus allatum. In Belgicis hortis quosdam aluisse etiam observavit Clusius: ac spontè provenire variis in Germaniæ, Bohemiæ, & Austriæ pratis.

GERANIVM BATRACHOIDES ALBUM
& ex albo cum cæruleo colore varium.

Descript.



Folius est similibus Batrachoidis vulgaris, aut certe vix notabili differentiā variantibus, quorum pediculi cubitum longitudine excedunt. Tota planta lanugine quadam albicante obreeta. Caules sunt bicubitales. Flores albi lineis cæruleis striati, quidam etiam medio-cærulei, sex foliolis constantes. Calyx hic

sutus, quinque constat foliis, è quo, flore decedente, rostrum emergit notabili hirsutie donatum, vnciam plus minus longum, desinens in apicem tenuem, qui in extremitate per siccitatem in tenuissima quædam filamenta capreolorum instar contorquetur. Tandem dissiliens rostrum semina ostendit quina, imis rostri costis hærentia, & in folliculo membraneo contenta, oblonga, sinuata, colore pullo, exterius viridi, sapore dulci, grato. In foliis autem nullus sapor effatu dignus.

Cerardus pro Geranio 2. Batrachoides albo assumpsit iconem à Tabern. propositam pro Geranio 13. siue sanguineo, quod non displicet: figura enim Tabern. non convenit cum sanguinei descriptione. C. Bauh. Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo 6. siue Batrachoides flore variegato, Anglicum variegatum Eyflett.

Ex semine Argentiniæ collecto in horto Frid. Meieri provenit nobis Montbelgardi: secundo anno floret & semine deciduo se propagat.

GERANIVM BATRACHOIDES ALIVD
folio Aconiti nirente Clusij.

Descriptio.

Prodeuntibus è radice frequentibus longoque pediculo nitentibus foliis præditum est,



Ranunculi platyphylli, aut Aconiti lycoctoni pallido flore, folio respondētibus ferè, rugosis, subhirsutis, in aliquot profundas lacinijs diuisis, deinde in ambitu serratis, quæ gustata initio adstringere, & linguam exsiccare, deinde nonnihil calfacere deprehenduntur: caule cubitali ut plurimum,

firmiter, rotundo, geniculato, in multas alas diuiso, quibus supernascuntur folia superioribus minora, paucioribusque lacinijs diuisa, perinde tamen in ambitu serrata: summi rami in oblongis pediculis flores gestant quinque foliis constantes, Geranij batrachoidis quod in Belgicis hortis alitur, floribus formâ pares, paullo tamen minores, nec, ut illi, cæruleos, verum ex purpura rubentes, decem staminibus cum stilo ex umbilico floris prodeuntibus: deinde oblonga, erectaque rostra, non inflexa, aut inclinata, quinque utriculis ad eorum basim turgentibus, & semen continentibus, quod maturitate exilit, aliorum Geraniorum more: radix superiori [Geranio phæo siue pullo flore] ferè responder, & summâ tellure in plura crassa, interneque rubentia capita, extuberat, quæ fibras etiam agentia, singulis annis augentur.

Author Clus. in Pannon. pag. 417. & Histor. post. describit, Geranij batrachoidis alterius titulo: inscribit verò ibi pag. 418. Geranium secundum: hinc autem Geran. 2. batrachoides minus.

C. Bauh. phyt. Geran. 6. siue batrachoides maximum, Batrachij speciem tertiam Gesn. hort. & Geranium batrachoides alterum, vel montanum primum Clusij videtur appellare. Cur autem maximum cognominat, cum Clusius minus esse scribat? Ei est in Pin. Geranium Anemones folio rotundo 1. siue batrachoides folio Aconiti, Geranij species tertia Gesn. hort. Geranij maioris species prima. Eid. app. Geran. batrachoides Gerardi. Variat, inquit, flore cæruleo, albo, lineis cæruleis variegato: est & flore cæruleo duplici, sed duplè majore, & dicitur Geranium batrachoides cæruleum, & Geran. batrachoides flore albo, Eyflett.

Crescit in Pannoniis, Stiriacisque Alpibus, nusquam tamen abundantius, quam supra Gamlugam, in illo ascensu ex Herrenalben jugo ad sublimes scopulos Durrenstein, in quibus floret Iulio & Augusto: in hortis autem Maio.

GERANIVM

Locus & Tempus.

Locus & Tempus.

GERANIVM BATRACHOIDES.
maximè minus laciniatum,
folio Aconiti.

Descriptio.

Est ex eadè Batrachoidis Geranii familia aliud, eo majus, foliis ad Aconiti lutei folia accedentibus, ea verò quinque laciniis incisa, iisq; latioribus, quàm in primo Batrachoidè, & per extrema serrata, hirsuta: caules magni, hirsuti, geniculati, in ramos divaricati, in longos desinentes pediculos bifidos, qui sustinent magnos flores duos, ex purpureo rubentes, quos excipiunt rostra brevia.

Synonyma.

De hoc ait Gesner. hort. Geranii tertia species ferè similis montanæ (i.e. Ischemo) maioribus & latioribus foliis, quibus Aconitum luteum representat, flore rubente. Item, Append. Geranii maioris species foliis magnis, figurâ ferè & magnitudine Aconiti lutei, hirsutis, asperis.

Locus & Tempus.

An Clus. Pannon. pag. 422. & Hist. post. Geranium *ajuztoides* alterum? Nascitur in humidioribus pratis in quibus ferè Bistorta. In hortum Ill. E. C. Montb. ex monte Balon translatus diu durat.

GERANIVM BATRACHOIDES LONGIUS
radicatum, odoratum.

Descriptio.



Spectabili florum amœnitate nulli Geranio cedit, qui ex calyce globoso, striato, rubente hirsutoque, odorati emicant purpureo-violacei, è quinque foliis compositi, surrecto staminum purpurascens alio cincto, in caulibus geniculatis, dodrantalibus, cubito altioribus interdum, & hirsutis: folia diuisurâ quodam-

modò Saniculæ, ex virore incana, pilosa, odorem spirant non ingratum. Radix obliquè acta serpit, longa, minimi digiti crassitudine, fibris & geniculatis tuberibus donata, foris rubens, intus alba cum adstrictione valida, nescio quid aromatici gustui offerens.

Synonyma.

Lobel. in Obs. p. 376. Ic. Plant. p. 661. vocat Geranium Batrachoides alterum longius radicatum. Camer. hort. Geranium macrorhizon, Gallorum Banaticam, grauissimi odoris; Staticè quarundam, septem floribus roseis, ventrem sistentem à Plinio descriptam. H. Lugd. p. 1280. Geran. Batrach. alterum long. radicatum Lobelii. Casp. Bauh. phyt. Geran. 6. siue Batrachoides odoratum: Idem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 3. siue Batr. odoratum, Geran. montanum Gesn. coll. Geran. Batr. alterum Dod. Ger. macrorhiz. Eystett. Pedem columb. in siluis nascentem alterum Cæsalpini.

Locus & Tempus.

Frater mihi retulit nomine Momordicæ ex horto Patavino. Obseruavi ego Sturgardiæ in Tom. III.

GERANIVM PHÆVM FLORE
reflexo.



Descriptio.

Sapientissimum est Geranii genus, foliis amplioribus, quàm Batrachoidis, in octo plus minus segmenta, angustata, sed lata, diuisa, subhirsuta, nigricantibus maculis aspersa, per ambitum latiusculis crenis conspicua, nullo odore prædita. Flos summitatibus insidet purpureus & penè fuscus, satis magnus, accedens ad florem Geranii folio odorato, qui inuersè contorquetur atque reflectitur, in medio apices, floribus decidentibus rostra oriuntur vnciam longa.

Synonyma.

Lobel. in Obs. pag. 377. Icon. Plant. p. 660. Geranium fuscum intitulat. Tabern. Ic. Geran. maculatum *fleckenschnabelfraut*. Hist. Geran. phyt. Geran. 9. siue montanum fuscum, Eidem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 8. siue montanum fuscum, Geran. mont. Dodon. Geran. fuscum Lobelii, Lugd. & Eystett.

Locus.

Colitur in Germaniæ hortis, ut Frid. Meieri Argentinas floreus Maio, & Ill. C. Wirt. Sturgardiæ floreus Iunio.

Geranium phæo siue pullo flore Clusii.



Descriptio.

Athor Clusius vocat in Pann. p. 419. Geranium montanum 1. siue Geran. *phæo*, aut pullo flore. Hist. post. Geran. 1. pullo flore, Geranium folia habens Lycoctono flore luteo non dissimilia.

C. Bauh. phyt. Geran. 5. siue Batrachoides hirsutū flore atrorubente, Geran. mont. 1. Clusii, Geranii maioris species secunda, Gesneri in Ap-

pendice.

Ego, ut verū fatear, facile crediderim, Geraniū

G g

phæum à nobis descriptum & Lobelii fuscum, ac hoc Clusii pullo flore, easdem plantas esse, aut saltem valde similes. Hoc tamen diuersitatem forsitan demonstrat, aut naturæ lusum, quod Clusius scribit florum folia laciniata esse, quod non demonstrat tamen icon. Neque nos florum foliorum lacinias vnquam obseruauimus. Si non in post. Hist. folia adhuc laciniata scripsisset, suspicaremur legendum esse folia reflexa, aut tale quid simile, & hac in parte errorem esse commissum.

Locus &
Tempus.

Inuenitur in Stiria Alpibus, ubi sylvæ desinere solent: & floret Iunio: in hortis verò, in quibus felicissimè prouenit & luxuriat, Maio.

GERANIVM MAGNVM FOLIO trifido.

Descriptio.



Elegans Geranium, cuius aliquot ramos habemus cubitales, brachiatos, glabros, quibus folia per ramos ex dodrantali plus minus distantia, & non multò breuioribus pediculis, hærent tripartita, principio tamen quo pediculo hærent, vnciali latitudine integra, nonnihil hirsuta, per ambitum serrata, plurimis fibris se mutuò

contingentibus & interfecantibus intertexta. Summa flores occupant purpurascens.

A Doldio nobis missum est pro Geranio montano, neque descripto, neque depicto. An Pes columbinus in siluis nascens &c. Cæsalp.

Icon.

Icon nostra desumpta est ex Clusii Geranio quinto nodoso I. Plateau, & ramo Geranii 6. tuberiferi eiusdem. Hæc enim duo Clusii Gerania vnum sunt, & à nostro non differunt.

C. Bauh.
notatur.

C. Bauh. in Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo 12. Geranium nodosum, quæritq; an sit Geran. cæruleum Tabern. & Batrachoides Gerardi, sed frustra, concluderat enim antè eorum Geranium esse Geran. Anemones folio rot. primum, siue Batrachoides folio Aconiti.

GERANIVM SANGVINEVM SIVE hæmatodes crassâ radice.

Descriptio.

Crassâ hæret radice, multis longis crassiusculis appendicibus auctâ, rubrâ, gustu admodum adstringente: caules emittit plures, cubitum altos, rubentes, hirsutos, geniculatos, in multas alas diuisos: ad singulas iuncturas bina nascuntur folia, circumscriptione rotunda, sed in quinque lacinias, trifidas plurimum, profundè ad pediculum ferè dissecta, hirsuta, supernè virentia, subtus canescentia, sicco & adstringente sapore prædita: flos pediculis singularibus ex superio-

rum foliorum sinu pronatis vnicus infidet, Rosulæ æqualis, coloris purpurei, quinque magnis



foliis constans pulchrè explicatis, quæ totidem nervosis, hirsutis, viridantibus foliolis subtus natis suffulciuntur, medium verò occupant stamina: rostra suboriuntur quinque thorulis seu granis firmata, quibus diffilientibus acus rostrorum reflectuntur.

Trago hoc Geranium minime ignotum fuit, sed ab eo Geranium tertium

vocatum, & Sanguinariæ radice titulo pictum. Fuchs. Lonic. Lac. & Turnero dicitur Geran. sextum: Corn. & Dod. gall. quintum: Gesn. hort. Geranii altera species maior montana, & Ischimon: Dod. gall. Camer. hort. Thal. H. Lugd. pag. 1279. & Clus. Pan. p. 411 [p. 419. quartum.] Geran. hæmatodes: Hist. post. Geran. 7. ajuarades. Lob. in Adv. pag. 296. Geranii Robertiani varietatem tertiam constituit.

Gerardo Geran. sanguinarium boudif. Eranes biff. Ceterum Geranii sanguinari titulo due habentur apud Tabern. icones & descriptiones: posterior autem figura in Ic. p. 774. in Hist. part. 2. p. 449. melius placet priore, quæ in Ic. est pag. 62. in Hist. part. 1. p. 151. quam C. Bauh. apud Matthiolum melius Geranio 7. siue Batrachoidi accommodauit. Hic vocauit in phyt. Geran. 7. siue sanguineum maximo flore: In Pin. Geran. Anemones fol. rot. 4. sanguin. max. flore sanguinar. Eystett. Compilerator porro Tabernamentani imperitiam suam stirpium summam detegit, eandem herbam bis tradendo, etiam quidem vulgò notam. Geranium tandem hæmatodes, siue sanguineum dicitur tum à radice sanguineo intus & foris colore, tum à mirifica eius in sistendo sanguine facultate.

Tossanus Carolus anno 1590. mense Iulio mihi transmisit ex Champagnole Burgundiæ nomine Geranii alpini, inibi in iugis altissimorum montium collectum. Monspelii floret Aprili: Geneuæ Maio: Basileæ iuxta Leurach Iulio & Augusto. Nascitur in omnibus Pannoniæ & Austriæ infra Onasum cædis montanis siluis, editioribusque gramineis locis. Mons præterea arci Greben imminens ultra Drauum in Pannonia Interamni, totus ferè eo Geranii genere confusus, qua parte Occidentem spectat. Siluæ etiam Francofurti ad Mænum vicinæ eo abundant. Floret Maio & plerumque totâ subsequente Æstate.

Sclauonica mulieres huius decoctum ex profluente aqua, mirificè commendat in capitis grauedine, si synciput, ubi dolor est, eo abluatur, deinde herba decocta superimponatur: postremò, (quod superstitione non caret) in profluentem, vnde aqua hausta, abijciatur. Ad sanguinem vndique manantem compescendum in primis commendatur.

GERANIVM

GERANIVM MOSCHATVM FOLIO AD
Myrrhidem accedente maius & minus.*Geran. moschatum minus.*

Descriptio.



Spinosplurimum caulibus profert, eosque plures, & satis crassos, nodulos, teretes, & pilis hirtos, per terram supinos: folia è geniculis vtrinque exeunt, palmum plus minus longa, & pluribus foliolis ad costam rubescentem hirsutamque adnexis composita, quorum singularia ad Chamædrys folia accedunt, diuisura profundiore, sapore

insuavi & subastringente: ex foliorum alis pediculi singulares oriuntur quadrantales & triantales, tenues, rigidi, villosi, rubentes, qui in pedicellos minores quatuor, quinque aut sex fissi, *flosculos* in umbella gestant, Pedis columbini dicti Geranij ex caeruleo purpurascens, quibus rostratum semen succedit: *radix* simplex crassiuscula, fibrata, alba, sapore eodem cum foliis.

Huic affinis & illa species, inuentu rarior, tota maior, odore Moschi, foliis non ita altè incis, & nonnunquam tantum serratis.

Est Geranion quod aliqui Myrrhin, alij Merthyda apud Plinium appellant. Ruell. vocat Acum pastoris Herbariorum, suspicaturque esse Geranium primum folio Anemones apud Dioscoridem & Plinium. An Cord. Hist. Geran. supinum majus?

Brunfels. tom. 2. thapf. 11. pingit sub titulo Herbae Roberti, vocatque Geran. Rostrum ciconiae, Robertianam, Gratiam Dei. Quomodo autem describat, certò mihi non constat, nisi id faciat quarto loco. De hoc Geranio pauca admodum Brunsch. in priore editione (vbi nulla figura) nomine Gratiae Dei: in edit. autem anni 1550. eam pingit. Tragus Geranium primum [sc. Dioscor. facit, & pro minore pingit, sed pictura non multum valet, Apollinaris Geraniorum genera non distinguit: pingit tamen, sed satis ineptè, Geranium quod Rostrum ciconiae dicitur & moschatum.

Matth. non dubitandum existimat, quin Geranium Plinij, Myrrhis & Myrrhida dictum, illa sit herba quam quidam Rostrum tum gruis, tum ciconiae appellant, quidam verò cum officinis Acum moschatam. Ruellium hallucinatum credit, quòd Acum moschatam dictam, quam ipse Herbariis etiam Acum pastoris appellari ait, primi generis Geranium Dioscoridis esse opinetur. Ex quibus patet eum in prior. comm. malè Geraniū primum inscripsisse, ac propterea in post. meliùs Geranii tertii nomine pinxisse. Quin & Amatus, licet huius figuram Geranii primi titulo exhibeat, falsò Ruellium primum Geranii genus apud Dioscoridem putasse refert.

Geranium primum vocant Cornar. Dodon. Tom. 111.

gall. Turn. Lonic. Cast. Fuchf. & Lacuna. Anguill. verò ep. 13. describit pro Herba moscata, Gruaria, Herba Ruberti & Acu muscata.

Cronemb. supra empl. Gratia Dei, deprehenditur contraria scribere. Nunc enim Ruellium idèd reprehendendum ait, quòd Rostrum gruis primam Dioscoridis speciem putarit: Nunc verò Geranium Dioscoridis primum, Roberti cognomine assignet. Per Ruberti autem herbam hoc ciconiae Rostrum intelligit, & passim Acum moschatam vocari ait, quòd ipsum haud placet.

Lob. indictam ait Diosc. vocatq; Myrrhidam Plinii in Adu. Obs. p. 376. Icon. Plant. p. 658 vbi & Geranium moschatum. Item pag. 659. Myrrhida Plinii, & Rostrum ciconiae inodorum, vulgatum. Cæsalp. Acum moscatam folio Pimpinellæ, & Pectinem Veneris Plinii. H. Lugd. p. 1277. Geranium tertium Plinii. Camer. hort. Geran. moschatum.

Tabern. Ic. p. 57. vocat Geran. minus, Geran. aruense [sc. in flore] alterum flore albo. Item, p. 58. Geran. myrrhinum. Hist. Geran. 3. inodorum, in Schnabeltraut. Auser Schnabeltraut: Geran. 4. aruense album: Geran. quintum, Geranii primi speciem Dioscoridis, Geran. cicutarium, Rostrum gruinum, Gruinam, Gruariam, Herbam gruinam siue gruariam, & Acum pastoris similem præcedenti, maiorem, odoris grati. Frustra Tabern. ponit duas icones Geranii minoris quandoquidem solo colore differunt.

Geran. Geran. moscatum, Myrrhidam Plinii: Item Geran. moschatum inodorum, Plinii Myrrhidam inodorum, Vnsauoric musc. Craues bill. Et, Geran. inodorum album, white flowered Vnck necesse. Cur. Ger. separauit album à priore caeruleo purpurascens: cur quoque prius & posterius non reliquit vno & eodem capite?

C. Bauh. phyt. Geran. 14. siue Cicutæ folio moschatum & primum Plinii: Item, Geran. 15. siue Cicutæ folio inodorum, Geran. supinum maius Cordi: Et, Geran. 16. siue Cicutæ folio supinum. Idem in Pin. Geran. Cicutæ fol. 1. moschatum & inodorum, Acum moschatam Columnæ, Ger. σκανδακός φυλλόν Thal. & moscatum Eystett. Item, Geran. Cicutæ folio 4. siue minus & supinum, Geran. 7. siue gruinum Dod. moschatum inodorum Eystett. Flos communiter Bresilici coloris: aliquando albus est: hinc duæ figuræ apud Tabern.

Geran. moschatum minus Monspelii obseruauit: Basileæ floret Octobri in itinere Moutensi: Geneuæ passim *au plain palais* virens mensis Februarii principio & Martio: Patavij florens medio Febuario. Maius hortense est. Maius, inquit Tabern. solet prouenire in agris cultis, arenosis minus autem locis macris & arenosis, & rudibus.

GERANIVM SPECIOSVM ANNVVM,
longissimis rostris, Creticum.

Latè terram obumbrat ramulorum hirsutorum, nodosorum cogerie, foliis prædiorum longis, hirsutis, nonnihil rubentibus, sinuosis & serratis, sapore acido & adstringente: flores caerulei amœni, quinquefolii, quos circumstant calycis dehiscens folia quina, è striatis filis media membrana pellucida alba commissis composita: acis plusquam palmari longitudine ad basin crassiusculæ.

An Lobel. Obs. p. 377. Geranium Creticum an-

Ggg 2

Cronemb.
ianatusIndicta
Diosc.

Gerard. mot.

Locus &
Tempus.

Descriptio.

Vires &
Vius.



num; Ic. Plant. Geran. Cret. annum hæmato-des. Camer. hort. Geran. Creticum longissimis rostris à Lobelio descriptum. Clus. Gerar. & Taber. Ic. Geraniū Creticum: Tabern. Hist. Geran. 8. Cadiacum, Veteribus indictum. Cas. Bauh. phyt. Geran. 19. siue maximum latifolium longissima acu. Eidem in Pin. Geran. folio Cicutæ 7. siue latifol. longiss.

acu. Nobis aliunde missum est titulo Herba Roberti Hispanensis.

Locus & Tempus

Montbelgardi in horto Ill.E.C. floret Iulio & Augusto, Septembri verò maturat semen: se ipsum seminat & Hiemem perfert. Mompeliano agro, Clusio teste, sponte prouenit.

GERANI VM ROBERTIANVM murale.

Descriptio.



Obiue in rudibus Geranium Robertianum, radice tenui, colore buxæ: quæ caules surrigit dorantes & cubitales, hirsutos, geniculatos, rubentes, maximè circa articulos & propter terram, ramosos: folia partim à radice, partim ex geniculis, hirsuta, pediculo rubente hirsuto, Matricariæ ferè diuisurâ, segmentis primariis duntaxat tribus, odore ubi teruntur Pastinacæ, sapore adstringente, per oras aliquantum rubentia, interdum tota: flores purpurei, dilutiore purpura striati, foliis quinque constantes è calyce hyliuto, atrorubente, quinquepartito emicant, apicibus in medio croceis: succedunt rostra mucronata semen appensum habentia.

Geranium Robertianum candidissimo flore in monte Wasserfall non rarò occurrit. Ruell. ni fallor, vocat Sideritidem tertiam: Dioscoridis, & vulgò ait vocari Acum pastoris, dicit esse Myrrhin Cicutæ foliis, & inde à nonnullis Cicutariam dici. Tragus pro altero Chelidonii genere describit, ac Gratiæ Dei titulo pingit: Eorum autem opinionem planè improbat

Flore candido
Sideritis 3.
Ruell.

qui Pedem columbinum vocatam hanc plantam velint: Chelidonium minus esse statuens: Eius autem opinionem reprehendit Cronemburgius, cuius verba paulò post adscribemus.

Apud Matth. Figura in priorib. comm. sub Geranii alterius inscriptione designans Geranium, Robertianū, melior est, deterior in post. comm. tituli etiam diuersi: descriptio nulla bona: Camerarius pro ea ponit Geranii Robertiani nouam imaginem: C. Bauh. pro tertio pingit Geran. Robertianū ex Tabernamontano, ac præterea inepitam addit Matth. picturam, quam præter nostram sententiam, ac etiam, vt suspicamur, Matth. facit Geranium 4. Fuchsi, siue gruinalæ. Porro, Matthiolus in prior. comm. Sideritidem postremam Diosc. eam planè referre plantam scripsit, quam vulgus Herbariorum Rubertā appellat. Sed præsentia verba silentio præterit in comm. cū mag. figuris. Quemadmodum tandem non descripsit Geraniū, ita solâ picturâ passim in comm. suis & Hist. germ. exhibet Sideritim tertiam. Quum autem figura Matth. nonnihil repræsentet Geraniū, & ipse olim dixerit Sideritim Rupertam referre: existimo figuram esse partim ad descriptionem, partim ex Geranio effictam. Hinc fortè in comm. post. omisit verba, de Ruperta in prior. tradita, vt suum tueretur figmentū. Et hæc fortassis quoque occasio fuit, vt Camer. in Hist. Matt. germ. & Epit. eius iconem quoque neglexerit: C. Bauh. meam ante multos annos annotatam sententiam amplexus est. Sideritis quartæ figura inquit, videtur voluisse Geranium aliquod exprimere Matt. quoad folia maximè cum Geranium Rupertianū Sideritidis nomine donetur: flores verò nō Geranio, sed Alchimillæ conueniunt. Inscibitur hæc à Lugd. Sideritis quarta à Cast. & Tabern. tertia, à C. Bauh. quinta.

An Cronemburgius hoc Geranium à Moschatoritè distinguat, ex his eius verbis percipies. Tragus Chelidonium minus appellare voluit, herbam vulgò dictam (Efts gnad. h. e. Gratiæ Dei, improbens eos qui Geranion, qui Roberti herbam, qui Acum moschatam, qui Pedem columbinum esse contendunt: in quorum tamen catalogo habentur quotquot simplicis Medicinæ artem tradunt doctissimi. Notandus Ruellius quod Myrrhin Dioscoridis statuit herbam Roberti, sicut & Io. Tagault. de pot. vulnerariis.

Lonic suo more omnia confundens pingit Lonic pro Geranio tertio, ac secundo pro Chelidonio minore, pluribus plantis eadem nomina tribuens priori loco.

Si Valeriola de peste, Herba Roberti est eadem cum aliorum, non placet adiunctum Rostriconiæ nomen: id etiam perpendendum fuerit, an in carbunculis pestiferis vltus eius conueniat.

Scio Lobel. aliò referre Panacem Heracleum Sideritidem Anguillaræ, quem epist. 5. eundem cū Sideritide Crateuæ & tertia Dioscoridis facit. Verum melius placet Tabernamontani opinio.

Tabern. Ic. & Hist. vocat Geran. Rupertianum, & Geran. primum, ac ait Tragus non sine errore Chelidonium minorem vocare: esse Dioscoridi Sideritim Heracleam Crateuæ: Anguillaram existimare esse Panacem Heracleon Diosc. sed longè aberrare: Doctos vocare geranium Rupertianum, muschatum, & vulnerarium, item Gratiæ Dei, Herbam rubeam, Rubeam muschatam, Robertianam, Rupertianā, Herbam Roberti aut Ruperti, aut diui Ruperti, & Rubertā: & has nomenclaturas ferè omnes à rubro caule & foliis rubris

ei impositas esse: appellari alijs etiā Acū muscha-
tā. It. Aco muschata & Ruberta: Gall. l'herbe Robert:
& Bec de cigogne sentant le musc: Angl. hierb Ro-
bert. Belg. Kobrechts fruyt / Roberts fruyt / &
Dynacrs beek die nader de Muscus rieck: Ger-
man. Ruprechtstraute / S. Ruiprechts frau t /
Siechtstraute / Gottes gnad / Kottlauffstraute / q
erysipelatibus medeatur, flein Schöllwurz / &
flein Schwalbenstraute / quod cum Chelido-
nio, aut aduentu hirundinum floreat, & hinc Tur-
nerum Geranium Chelidonium, & Geran. hiru-
dinarium nominasse. Item, Geran. violaceum, Ger-
duodecimum, Geran. batrachoides minus, & gra-
tiam Dei minorem.

Hist. Lugd.
item eadem
reposita.

H. Lugd. pag. 1276. Geran. 2. Dioscoridis, 3. Mat-
thioli, Pes columbinus: p. 1276. Herbae Roberti,
Geranii quarti genus Matthioli. Cur eandem fi-
guram ponit duobus locis, sub diuersis titulis,
quorum prior non conuenit?

Hist. Bräsch.

Apud Hier. Brunsch. in edit. anni 1505. bene
pingitur figura Herbae Ruperti, & melius qui-
dem quam in poster. anni 1550. ubi alterius gene-
tis icon exhibetur.

Doff. not.

Dofft. habet iconem Geranii Robertiani siue
muralis pag. 147. quod à cæteris minus diligenter
distinguit.

Fuchs. Dodon. gall. Brunfels. Lac. Turn. &
Thalio dicitur Geranium tertium: Lob. in Adu.
(vbi & Sideritis Achilleadon, aut congener) Ob-
seru. p. 375. Ic. Plant. p. 67. & Camer. hort. Geran.
Robertianum: Robertiana vulgò Cæsalpino.

C. Bauh. phyt. Geran. 17. siue Robertianum pri-
mum: Apud Matth. Geran. Robert. primum: item,
Geran. 5. Matthioli. Cur autem Geranium Mat-
thioli diuersum facit à Robertiano? Eidem Pin.
Geran. folio Cicuta 5. siue Robert. 1. Duplex est:
alia omnino viridis, quam sceminam faciunt: alia
rubens, quæ præfertur, teste Camerario.

Locus &
Tempus.

Solet provenire in veteribus muris, in cæsis
arboribus, locis frigidis, humidis & umbrosis: A-
prili floret & tota penè Æstate, teste Tabern.

Fuchs. vlm adstringendi & siccandi tribuit. Tra-
gus videtur ei Chelidonijs minoris vires adscribere.
Rard, inquit, intrò sumitur propter nimiam
quam obtinet frigiditatem: efficacissimè erysipe-
latis imponitur herba tusa: succus & aqua distilla-
ta quibusvis exulcerationibus oris, mammilla-
rum & pudendorum, tam muliebrum, quam vi-
rilium medetur. Succus mariscas mundificat, sa-
næque: tumores deprimat, duritias mammilla-
rum, aliorumque membrorum, si fortè conqussa-
ta fuerint, discatit. Ioannis de monte experimen-
tum parui facimus, qui multos oculorum mor-
bos, appensâ nudo collo radice, certo anni tem-
porè collectâ, Nicolau quædam Magistrû curasse
scribit. Geranium Robertianum, alijs Sangui-
nariam dictam, rubens præferunt pastores, aquæ
incoquentes & potui dantes pecori, armentive
cruenta mingentibus.

GERANIVM LUCIDVM.

Descriptio.

Geranium nostrum lucidum folia habet Mo-
mordicæ siue Geranii batrachoidis longitis
radicati formâ, sed minora quam illa, Geranii co-
lumbini, in quatuor profundas lacinas ferè sem-
per tripartitas diuisa, ex virore obscuro pulchrè
lucentia, nonnihil hirsuta, pediculis herentia,
palmaribus aut vnciâ duntaxat longioribus: cau-
les multi sunt, lucidi, rubentes, in varios ramos
diuisi, interdum ferè cubitales: flores Geranii
Tom. III.

Robertiani floribus similes & pares: rostra bre-
uia.

Cur C. Bauh. in phyt. Geranium suum 8. siue
argenteum, Geran. saxatile Camer. hort. Geran.
sax. ὄζροσκόπιον Thal. à Geranio suo decimo, si-
ue lucido nostro separauit. Si diuersa sunt, cur in

Synonyma.

in Pinace v-
num fecit? Vo-
cat Geran. A-
nemonas folio
rotundo 15. si-
ue lucidum sa-
xat. rotundifo-
lium Colum-
næ.

Geneuæ co-
piosè abundat
ad lacum extra
portâ de Rive
in muris. Item
inter Lugdunū
& Geneuam à
Chastillon flo-
rens Maio. Ex
semine proue-
nit Montbel-
gardi in horto
meo, postea
perit.

Locus &
Tempus

CHELIDONIVM MAIVS VETERVM.

CAP. CXVI.

Qvam apud Theophrastum Gaza Hirundi-
nariam interpretatus est, eam Dioscorides
sic delineauit. Chelidonium magnum [χελιδόνιον
μέγα] caulem producit cubitalem, aut etiā maio-
rem, gracilem, qui propagines habet foliis ple-
nas. Folia similia sunt Ranunculi, teneriora ta-
men, & colore subglauca. Iuxta singula verò fo-
lia flos est, velut Viola alba. Succus autem cro-
ceus, acris, mordax, aliquo modo subamarus, &
græuolens. Radix supernè quidem vna est, in-
fernè verò plures. Fructus est velut Papaueris cor-
nuti, tenuis, longus velut Pineæ nucis conus, in
quo sunt semina Papauere maiora. Huius suc-
cus melli admixtus, & in æreo vase ad prunas co-
ctus, ad acuendum visum commodus est. Expri-
mitur autem succus è foliis, & radice, & fructu,
sub initiū Æstatis, siccaturque & in pastillos ef-
formatur. At radix pota cum Aniso ex vino albo,
morbum regium curat. Herpetas item cum vino
imposita. Et dentium dolores sedat comman-
ducata. Videtur autem Chelidonium nomen
repperisse, quod simul atque hirundines,
quæ Chelidones vocantur, apparent, è ter-
ra prodeat, earumque discessu emarcescat, vel
quod si quis pullus hirundinum excæcet, ma-
tres ipsorum herbam illis exhibere narrentur, &
cæcitati ipsorum mederi.

Hirundina-
ria Theophr.Hirundo
anis

Chelidonium inter spuria quidam Præoniam
[πραιονίαν] vocant, alij Cræam [κραιάν] quasie-
gregiis pollentem viribus, alij Aubion [αυβιον:] a-
lij Glaucion [γλαυκίον:] alij Pandionis radicem
[πανδίωνος ρίζαν:] alij Philomedion [φιλωμείδιον:] alij
Othonion [ὀθόνιον:] Romani Fabium [φάβιον:]
Galli Thona [θῶναν:] Ægyptij Mothoth [μοθῶθ:]
Daci Crustanen, h.e. κρουσανίαν

Appellat
Nothæ
Plin.

Chelidonium (inquit Plin. lib. 8. cap. 28.) visui
saluberrimam hirundines monstrauere, vexatis
pullorum oculis illâ medentes. Et rursus lib. 25.

Ggg 3

cap. 8. Animalia quoque inuenire herbas, in primisque Chelidonium. Hac enim hirundines oculis pullorum in nido restitunt visum, ut quidam volunt (hoc rider Cels. lib. 6. Aristoteles verò cap. 6. lib. 4. de ortu animalium causam reddit: nempe eos renasci si pungantur ac euellantur, cum adhuc fiunt, non autem ubi perfecti fuerint) etiam erutis oculis. Genera eius duo: Maior fruticosa caule, folio Pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudie duum cubitorum. Color albicans, flos latens. Minori folia Hederæ rotundiora, minus candida. Succus Croci mordax, semen Papaueris. Florent aduentu hirundinum, discessu marcescunt. Florentibus succus exprimitur, & in æreo vase cum melle Attico leniter cinere feruēti decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Vtuntur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia appellantur ab ea. Et hæc de duplici Chelidoniæ genere Plinius, quæ cum inuicem commisceat, atque confundat, alibi de iis agere non placuit, licet figurâ multum differant.

Plin. not.

Galen.

Galeno 8. simpl. med. Chelidonium extergentis admodum & calidæ facultatis est, sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupillis colligitur digestionem atque discussionem indigens. Vbi sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione jecoris proficiscentem, in vino eam albo potui exhibentes. Similiter manfa confert dentium doloribus. Porro, Chelidonium minus, cum acius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, vnguesque scabros exterit. Succus eius per nares purgat, utpote admodum acer. Itaque hæc herba quarti ordinis fuerit (calfacientium incipientis. Majus autem Chelidonium tertii est ordinis) absoluti iam, idque tum in calfaciendo, tum in siccando. Aëtius, qui eundem vsum Chelidonio magno adscribit, exersoriam & calidam vim abunde possidere ait.

Fuchf. refut. in hnt.

Chelidonii nominis appellationem quod attingit, duplicem eius rationem cum Diosc. tradit Marcellus: reliquas verò dicit non satis certum habere intellectum. Fuchsius Chelidonio autem hirundinem nomen indidisse perhibet, vel quod primum hanc inuenerit, vel quod eius aduentu floreat, discessuue commarcescat, id quod de minore verè dici putat. Sed Chelidonium minus longè ante discessum hirundinum marcescit. Dicitum verò scribit Dodonæus Chelidonium maius non quod aduentu χελιδόνων, i.e. hirundinum proueniat, aut abeuntibus illis pereat, cum toto anno reperiatur, sed quia excæcatis pullis hac herba matres restituere visum in opinione sit. Hanc tamen opinionem ceu vanam & à veritate alienam, auctore Celso, tanquam fabulam, ad græcas ablegat calendas.

Æquiuoca.

Chelidonii nomine sequentes plantæ passim ab authoribus donantur: Chelid. maius. Chel. fol. laciniato. Cucurma, de qualib. 19. Fumaria Split. Fumaria bulbosa. Aquilegia. Clymenum.

Chelidonium verò minus, Scrophulariæ minori, vnanimis ferè authorum consensus, competere ait. Chelidonium minus dicitur etiam de Geranio batrachoide, quàm bene autem facile indicabunt lectores. Nec melius Chelidonii speciem minorem Geranium Robertianum esse contendunt. Gesn. in ascr. Diosc. Chelidonium micron Fumariam appellari refert. Scrophulariam flore pleno Camer. hort. cognominat Che-

lidonium minus flore pleno. Chelidonium minus palustre Cordi, est nobis Caltha aquatica. Lonic. in Diosc. lib. 2. cap. 167. Ranunculum & Chelidonium turpi errore confundit. Chelidonium dici de Anagallide ostendunt ex Dioscoride Tragus, Lonic. & Gesnerus. Idem Gesnerus in ascript. Diosc. refert dici Chelidonium de Vite alba, siue Bryonia de qua libro 15. Sunt Chelidonia Ficus ἰσχάδης χελιδόνιος, Atticæ scilicet quæ & Chelidones vocantur: Pollux. Commendantur eadem ab Athenæo lib. 14. De purpureis Chelidoniis Columella inter Ficus. Nouissima sub Hieme maturatur Chelidonia Ficus, inquit Plinius. Eas Grammatici quidam à Chelidoniis populis in Britannia dictas coniiciunt, nescio quàm rectè.

CHELIDONIA.

CAP. CXVI.



Passim in Description. parietinis & maceris occurrit Chelidonium maius, cuius radix minimo digito crassior, fibrosa rubra, rubrum croceumve succum, ut & folia caulesque fundit: aliquid caules producit, teretes, hirsutos, propter radicem & genicula tuberosos, ut in ea planta quæ

Noli me tangere vocant, rufum mordacemque in ingratum illum succum fractos remittentes: folia cum Aquilegiæ foliis similitudinem aliquam habent, utcumque tamen maiora, longiora [Lobel. ait tota facie ad Plinianum Capnum, vel Aquilegiam, comparatam, foliis cæsiis] numeroque plura, ad costam ex interuallis adnexa, ut plurimum sena, septimo alam claudente: singularia folia Quercinorum æmulam diuisuram habent, Trago tenera, colore herbaceo, altera verò parte ex cæsis viridi. Flores crocei quatuor foliis constant, multisque staminibus concoloribus: filique oblongæ semen continent: Trago filiquæ oblongæ ceu corniculati Papaueris semen pallidum recludunt: folia, caules, & flores croceum stillant lac, in primis radix, quæ & ipsa aureo planè prædita est colore, succo simili, lento, gustu amaro, grauissimique odoris: Lobel. succo croceo fuluiore, virosiore quàm Papaueris cornuti.

Χελιδόνιον μέγα Græcies: Latinis, ut Ruell. Synonyma. Trago, Fuchf. Cordo in Dioscorid. & Histor. cum nom. Matth. Lac. Cast. Dod. Lob. Adu. Obs. & Ic. nibus, liguarum. Plant. Gesn. hort. Cæsalp. Thal. Tabern. & Gerardo, Chelidonium maius: Brunfels. Chelidonia. Anguill. Chelidonia maior: Turn. Hirsudinaria: Lob. Adv. Hirsudinaria maior: C. Bauh. phyt. Chelid. i. sine mai, vulg. in Pia. & Clus. in hist. Apuleio

Apuleio Hirundinina, aliis etiam Herba lucis, Herba impetiginaria, Herba hirundinis: offic. Celidonium, & Celidonia, etiam vulgò in Herutria. At ab imperitis, præsertim Chymistis, qui multorum stultitiâ Poëtas facillè imitantur, quod græci nominis vim ignorent, quod latine nil aliud quàm Hirundinariam significat, *Celi donum* corruptè nominatur. Serap. de simpl. cap. 296. *Kauroch*, *Curcuma*, & *Chelimonthoma*: Bellunenfi *Chalidunum* & *Memiran*: Glossographo Auicennæ *Algurduene*, *Hauroch*, *Hauroc*, *Chilidomon*, & *Memirefsi*: Apud Auic. cap. 199. *Cauchum*, *Aluadachale*, *Aluadachule*, & *Alzardahune*. Germ. *Schellwurz* / *Schellkraut* / *Schwalbenkraut* / *Boldwurz* & *Gilbkraut*: Bel. *Schelerunt* / *Goudwortel* / *grootc Bouwe* / *incende Bouwe*: Gall. *Eselere* ou *Eslaire* (quod caligantibus oculis aciem videndi restituat.) *Chelidoine*, & *Felougne*: Ital. *Chelidonia* maggiore, *Herba donna*, & *Cedrognà*: Hisp. *Chelidonia*, *Terna de las golondrinhas* aut *golondrinhas*, *Celiduenà*, & *Celiduenha*: Angl. *Celandine*: Boh. *Celidony* & *Celdonia wietzy*: Hung. *Enyadonia* & *Feckfe fur*.

An Virga
indur. A-
niuna.
Lobel. indagandum proponit, num sit Virga tinctorum Auicennæ: Est Alberto Magno Herba quarta, à Chaldaeis Aquilaris dicta quod tempore quo Aquilæ suos nidos faciunt, nascatur, à Græcis Valis, à Lat. *Chelidonia*.

Locus.
Locus gignitur incultis, in vepribus, propter sepes, inter cætera herbarum vitia, inter rudera, in scrobium ripis, in vetustis citius, quàm in apicis. Toto anno viret: ab Aprili mense in multam ætatem floret, siliquæ interea perficiuntur, seminâque maturantur.

Vires & viâ.
Vires quas tribuunt *Chelidonio* suo Diosc. Plin. Galen. & Aërius, itémq; fabulâ per Celsum reiectam, videre licet antè. Radix *Chelidoni* maioris, quantum eius manus capere possit, purgata, in sextario [quem Germani *Ein halb mass* exponunt] rosacei aceti decocta, ita vt deinceps percoletur, decoctioque adjiciatur theariacæ Vnciæ cum dimidia. cyathique vulgaris mensura exhibitâ, à peste correptos (attestante id certâ experientiâ, inquit Trag.) liberabit, si postquam biberunt in lectum se composuerint, & sudauerint. Aqua eius distillata oculis indita: claritatem iis adfert, maculas eorum rubras emendat, sicut & faciei si inde colluantur: eodem modo anthracæ pestilentes sanant: serofi humoris ad articulos vulneratos decurrentis fluxum sistit, quem Germani *das gsidt wasser* vocât. Aqua distillata per aliquot dies pota, obstructos meatus hepatis adaperit morboque regio medetur. Herba cum radice tusa ac umbilico [cum oleo chamæmelino feruēfacta] imposita torminibus & vteri doloribus opitulatur. Eius pulvis vlcera & vulnera purgat, sanatque inspersus. *Chelidonium* tritam cum axungia verrucas absumere refert Rondeletius. Lobel. rariùs intrò sumendam censet, sed commodiùs foris vtendam ad impetigines & psoras puerorum, necnon metallorum chymicas medicationes. Succus *Chelidoniæ* [inquit Paracels.] colore suo imponit oculis, ac si dotatum esset auro: verùm Chymistæ, qui animam vel quintam essentiam, vnde coagulantem ac permutantem tincturam efficerent, venati sunt, nihil præter fatuum errorem assecuti sunt. Chymistæ [addit Matth.] *Celi donum* appellant, quâ nominis præstantiâ frætri, ex hac herba quandam quintam essentiam fieri prædicant, non modò suis vanis alchymicis imaginationibus ac-

Tom. III.

commodatissimam, sed ad tuendam etiam sanitatem hominum, morbosque quàm plurimos profligandos vtilem. Herba in calceis delata si nudis pedibus teratur, ictericos sanare creditur: eadem mensium abundantiam sistit, mammis mulierum admota. Succus cauis dentibus inditus eos frangit & eiicit. Hanc herbam, si Alberto credimus, si quis cum corde talpæ habuerit deuincet omnes hostes, omnes causas, & omnes lites amouebit. Et si prædicta ponantur super caput infirmi, si debet mori statim cantabit altâ voce, si nò, lachrymabit. Sed mittamus aniles fabulas, vndeque digressi sumus, redeamus. Succus ad oculorum maculas, argemas, nubeculas, & cicatrices plurimùm commendatur. Verùm cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi iis additis, quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi dicitur esse lac muliebre.

CHELIDONIUM FOLIO LACINIATO.



Q Vivulga. Descriptio.
tius illud
Chelidonium maius nouit, facillè oblatam hanc eius varietatē discet: cætera similia, folia minora, cocciniùs crebriùsque incisâ: florum itidē folia aliquib⁹ incisuris secta, & veluti simbrata, accedētia ad flores plantæ, quæ quibusdam dicitur Cuminū siliquosum & *Hipæcoum*

Clusij.

Dicitur Spreng. hort. *Chelidonia* maior foliis *Synon.* & floribus incisâ: Clus. Hist. post. *Chelidonium* maius laciniato flore, siue maius multifido folio. C. Bauh. apud Matth. *Chelid. maius alterum*: Eisdem in phyt. & Pin. *Chelidonium* 2. siue maius foliis quernis.

Vidi primò Heidelbergæ in horro Sprengeri *Locus.* spontè natam. Ex seminibus ab illo oblatis à pluribus annis Montbelgardi coluimus in horto. Ill. E. C. vbi ex deciduo semine quotannis repullulat.

AQVILEGIA IN GENERE.

C A P. CXVII.

A Quilegiâ subjicimus, cum quibusdâ *Chelidonia* siluestris dicatur, & foliis aliquomodo conueniat, nisi quod sint paulò rotundiora & molliora. Videtur autem dicta quasi Aquilina, ob florum mucrones aduncos, vt sunt aquilini vngues. Veterib⁹ ne fuerit nota, ambigitur. Costæus quidem & Aldroandus Pothon [Desiderium Gazæ,] veterum, Theophrasti scil. esse contendunt: Cæsalpinus verò eiusdem Theophrasionem credit: Dalechampio contrà apud A-

Descriptio.

Iovis flos.

Leo herba.

thenæum Theophrasti *δῖος ἄνθος* est, Iovis flos: Gesnero tamen Leontostomon Theoph. dicitur, & Leo Columellæ; Leo herba Dodonæo. Alii *Ægilopa* Græcorum credunt, omnesque facultates eidem tribuunt, sed non parum aberrant. *Tragus Centaureum Germanicum* siue maius esse autumat, eiusque illi vires, sed temerè & citra omnem rationem tribuit. Sunt etiam, referente Matthiolo (qui flori inter alios colores aureum adscribit, qualem nos nunquam observauimus) qui *Chelidonium maius* nuncupent. Gesner. in cat. pl. Cantabricam opinatur; Ruell. cæruleas *Violas*, aut quæ sint se nescire fatetur. Sed eis minus conuenireprehenditur. Dodon. in gall. hist. antiquis incognitam ait. Fabius Columna eam *Aquilinam* quæ simplici flore est, *ἰσότροπον* Dioscoridis esse cæset, cuius iudicium Clusio valde probatur. Lobelius tamen Columnæ opinionem *Aquilegiam* pro *Isopyro* Dioscoridis ponentis in suis plantarum illustrationibus rejicit atque damnat.

*Angelica.
Amor perfectus.*

Gesnerus de *Aquila* annotat, aliquos herbam hanc, quam plerique *Aquilegiam*, aut cum Matthiolo *Aquilinam* nominant, *Angelicam*, & *Amorem perfectum* vocare: Germ. *Obierfelen* / *viagelen* / & *viaglen*: Belg. *viselenen*: Galli *Ancholies*: Itali *Aquileia*, & *Celidonia saluatica*: Angli *Columbine*.

*Locus &
Tempus.*

Aquilegia flore simplici in montium pratis luxuriat, ea scilicet quæ cæruleo est flore: feritur etiam in hortis: caulescit mense Iunio. In hortis quidem diuersorum colorum conspicitur: itemque multiplex.

AQUILEGIA FLORE SIMPLICI.

Figura tres Fuchf.

Descriptio.



Plusquam pollicari crassitudine est radix, candida, sapore subdulci: folia ex longis, rigidis, hirsutis pediculis terterna, *Chelidonia* maioris, infra glauca, supra viridatia, cum obscurâ acrimoniâ exsiccantia, relicta tandem dulcedine effatu digna: caules tenues, sed rigidi, hirsuti, geniculati, ramosi, amœnos flores sustinent,

corniculis rostratis compositos, ut passis alis columbam (si cum lateribus alternatim interjectis foliis vnum ex corniculis exemeris) egregio naturæ artificio deformant: atque hi quidem vel siluestres, vix alterius coloris, quam punicei, vel hortenses, colore cæruleo, rubro, candido, carneo, herbaceo, versicolore, infinitam pariunt varietatem: omnibus tamen semen *Consolidæ* regalis, nigrum, lubricum, in corniculis surrectis *Aconitorum* continetur.



Aquilegia siluestris dicitur, *Aquilegia* simpliciter Trago, Fuchf. H. Lugd. p. 820. Lonic. Cæsalpin. & Gerardo: *Aquileia* Fuchf. Gesner. hort. & Dod. syluestris Thallio: *Aquileia simplex* Cammer. *Aquilina* Matth. Lobel. Adv. Obs. p. 440. Ic. Plât. 761. Cast. & Tabern. *Aquilegia* 1. siue simpliciter Trago, Fuchf. H. Lugdun. pag. 820. Lonic. Cæsalp. & Gerardo: *Aquileia* Fuchfio, Gesner. hort. & Dod. syluestris Thallio: *Aquileia simplex* Cammer. *Aquilina* Matth. Lobel. Adv. Observ. p. 440. Ic. Plât. 761. Cast. & Tabern. *Aquilegia* 1. siue simplex siluestris.

Aquilegia hortensis, simplex secunda C. Bauh. *Aquilina* rubra Lob. Icon. p. 761. *Aquilina* Cast. alba Tabern. Ic. & Hist. quoad iconem, quoad ordinem 1. 2. 3. & 7. siue niuea, purpurea & rubra.

Aquilegia montana magno flore C. Bauh.

Aquilegia montana magno flore, 3. in Pin. in *Aquilegiæ* vulgaris altitudinē excrefcit quidem, sed foliis primū differt, cum in lacinias tenuiores, easque non obtusas, ut in aliis, sed acutatas diuidantur, & folia penē subrotunda sint: sic & floribus est cæruleis, vulgari similibus, sed multo maioribus. In monte prope *Thermas Fabarias* copiosè prouenit.

Aquilegia montana paruo flore, *Thaliætri* folio.

Ex radice parua, folia *Thaliætri* formâ, sed exigua, pallidè virentia, prodeunt: inter quæ cauliculus tenuis, palmo minor, duobus, tribusve foliolis breuibus, oblongis, minimè diuisis, exsurgit, florem vnicum cæruleum sustinens, formâ quidem vulgari similem, sed quintuplò minorem.

In *Helvetiorum* Alpibus reperitur: in *Moravia* propè urbem *Trebis*, sub arce *Smilo*, in pratis vernali tēpore copiosissimè reperiri relatum est C.

est C. Bauhino, qui in Prod. secundam facit, & in Pin. quartam.

AQVILEGIA FLORE PLENO, sive multiplici.

Descript. **O**bflores elegantia in hortis culta hæc stirps modò pluribus, densioribus, & nitidioribus corniculis oblectatur: floribus etiam vberiore fertur multiplicibus, qui vel cærulei proflus sunt, vel violacei, vel cineracei, vel blandè rubentes, vel fauve rubri, vel albi, vel ex albo & cæruleo, violaceo ve multifariam commixti, vel alterius coloris, quis enim omnes enumeret? cætera similia.

Synon. Aquilegia multiplex Hort. Lus. flore pleno cæruleo, albo, incarnato, purpureo, rubro, sine 1. 2. 3. 4. & 5. Eyst. multiflora variegata Lob. Ic. p. 762. (ibidem & Aquilegia multiplici vario colore flore.) Aquileia multiplex Gerard. multiplici flore Dod. Aquilina multiplex Tabern. Ic. & Hist. quoad iconem; quoad ordinem 4. 5. 6. & 8. sive cærulea, alba, purpurea & variegata. Aquilina pleno flore Clusij hist.

C. Bauh. phyt. Aquilegia 3. sive hortensis multiplex: Pin. Aquilegia pleno flore 1. sive hortensis multiplex flore magno, Aquilegia flore rubro 5. Eyst. fl. variegato duplici Syver. Aquileia 6. sive variegata Bry. Aquilina fl. rubro Bry. Syver. Item, Aquilegia pleno flore 2. sive hort. multiplex fl. paruo.

AQVILEGIA FLORE PLENO INVERSO.

Descript. **N**on tantum fertur vberiore hi multiplices flores & colore diuersitatem pariunt multiplicem, sed & figurâ discrepare iidem quotidieprehenduntur, & diuersas interdum sortiri facies. sive naturæ lusa, sive artificio quodam, ut inuersi flores propemodum videantur.

Synon. Clus. hist. Aquilina pleno inuerso flore. Lobel. Ic. p. 763. (ibidem & Aquilina inuersa multiplici albo colore) Aquilina plenis multiplicibus floribus: Obs. p. 440. Aquilina plenis & multiplicibus aspectu suauissimis floribus inuersis cum hortensi multiplici eadem: Tabern. Hist. Aquilina 9. prorsus nitea flore magno & lato sursum reflexo: H. Lugd. pag. 821. Aquilina plenis & multiplicibus floribus Lobelij: Aquilina carnei coloris Bry. Aquilegia inuersa Camer. C. Bauh. phyt. Aquilegia 4. sive hortensis multiplex inuersis floribus. Pin. Aquileg. pl. flore 3. sive hort. multiplici flor. inuerso, Aquileg. cærulea inuerso flore, Eyst.

AQVILEGIA FLORE SIMPLICI ET pleno, non corniculato.

Aquilegiam floribus non corniculatis, sed Nigellæ citinæ instar foliosis, vocamus, quâ Clusius pro Aquilina roseo flore pleno pingit, & describit.

C. Bauh. pin. Aquilegia pleno flore 3. sive flore roseo multiplici, colore communiter cæruleo, rarius albo, rarissime carneo, sive blandè rubente: vel albo nigris punctis asperso: hinc Aquilegia stellata flore purpureo, rubescente, violaceo, & albo minutissimis nigris punctis ornato, sine 1. 2. 3. & 4. Eyst. Aquilegia stellata cæruleo-violacea Syverij.

Tom. III.

AQVILEGIA DEGENER.

CAP. CXVIII.

Ita nonnunquam degenerat Aquilegia, ut sapiusculè flores proferat strigosiores, & tum quidem aut colore languidiore, & quasi dilutione apparent, aut prorsus vitorem induunt, Camer.

Descriptio:



Aquilinam degenerem conspicere meminit Clusius exiguæ Rosæ formam æmulantes flores ferentem, coloris vel omnino viridis, vel ex viridi purpureascentis, mutatâ videlicet pristina formâ, sive potius vitio contracto, ex stirpium intempestiua ex vno loco in alium translatione.

Lobel Icon. Synon:

pag. 674. & Hort. Lusar. Aquilegia degener. C. Bauh. phyt. Aquileg. 5. [in Pin. fl. pleno] sive degener virescens: Aquilina 10. herbacea rubro variegata Tabern. Hist. Aquilina degener Bry: Aquilegia stellata rosea Syver.

Aquilegiæ semen tusum ac pondere drachmæ cum croco nummi pondere è vino bibitum, præstantissimum est medicamentum aduersus morbum regium [experientiâ certâ id attestante Trag.] si postquam sumptis, in lectum te composueris, probè contestum, ac sudorem eliceris: eodem modo vsurpatum meatus iecinoris obstrictos, vnde multæ ægritudines oriuntur, aperit. Aqua florum Aquilegiæ distillata, pora eadem efficit, præstatque leuamentum aduersus syncopen. Abscessus proinde internos discutit, venenum quoduis expellit, ac tormina mitigat.

Cæterum, quæ de Aquilinæ facultatibus Clusius accipiebat à Rapardo, libet hîc subscribere: nimirum Aquilinæ vulgaris semen tenuissimè contusum, & ex vino propinatum, mulieribus in partûs difficultate cum optimo successu exhiberi: si prior tamen hauustus minùs fuerit efficax, alium similem propinandum esse.

Vires & Vfus.

THALICTRUM VETERIBVS.

CAP. CXIX.

Fecit in hac herba vnus literæ ambiguae similitudo, ut authorum exemplaria partim Thalictum, *Θαλίτρον*, partim *Θαλίτρον* Thalictum legerent, prout et pro e apud Græcos, apud Latinos verò postea pro e litera fuit agnita.

Thalictum.

Thalictum.

Sunt autem Plinio & Dioscoridi, paucis exceptis, de Thalictro eadem omnia. Thalictum, ait hic libro quarto, folia Coriandri habet, at pingiora, cauliculum Rutæ crassitudine, in quo folia, quæ trita imposita, vlcera diuturna

Dios.

H h h

ad cicatricem perducunt, nascitur præcipuè in campestribus. Ille lib. 27. cap. vlt. Thaliætrum folia Coriandri habet, pinguiora paullo, caulem Papaueris. (Sed Coriandri legit quoque Gale- nus sequutus Dioscoridem. Et fieri potest, ut Plinius græcâ lectione deceptus *μικρὸν* pro *μυρσιν* legerit) nascitur ubique in campestribus: meden- tur vlcibus folia cum melle. Aegineta cum Ga- leno siccandi vim sine erosione habere ait.

Annotat Goupylus in veteribus Dioscoridis exemplaribus hoc loco caput esse de Typha. Sed de Typha priori libro tertio egit.

Æquiuoca.

Thaliætri nomen sequentes adepræ sunt plan- tæ. Thaliætrum nigrius caule & semine striato. Thaliætrum folio saturatiùs virente, cauliculo nõ striato. Thaliætrum speciosissimum glaucum, se- mine & caule striato. Thaliætrum montanum album Clusij. Thaliætrum maius folliculis an- gustifolium C. Bauhini Clusij. Thaliætrũ praten- se angustissimo folio C. Bauhini. Thaliætrum mi- nus, siue Rutæ pratenfis genus minus, semine striato. Thaliætrum minimum fœtidissimum. Aquilegia ab Heroldo, sed malè. Pimp. saxifr. minor Rondeletii, à Lobelio & H. Lugd. Seri- phium germ. Chamæmel. fœrid. à Gesnèro. Po- tentilla à Ruellio, sed falsò. Consol. regalis Tra- go, sed etiam falsò. Phelandr. Plinij à nonnullis, sed magno errore.

THALICTRVM NIGRIVS CAULE ET semine striato.

Descript.



PVlchrè vi-
centibus fo-
lis, licèt satu-
ratiùs cinctis,
splendentibus
tamen, longis,
angulosis do-
natur: caules ri-
gidi, striati, ina-
ves, virescunt,
& ad viri alti-
tudinem & ma-
iorem aliquan-
do excrescunt:
flosculi per-
quàm exigui,
muscosi, herbi-
di, obtusum fe-
rè in orbem
glomeratis sta-
minulis herbi-
dis, aut ex her-
baceo flares-

centibus constant: radix fibrosa buxi coloris, in-
grati amaricantis saporis.

Cordus in Diosc. verum Thaliætrum facit, ac
germ. *heylblat*/ hoc est, Folium sanum appellat,
quod rustici Saxones hâc maxima curent vulne-
ra, sine aliquo adiutore medico: ait tamen ali-
quos *widerthorn* vocare, sed hoc vocabulum latè
patere. In Hist. verò Thaliætri nigri nomine de-
scribit.

Gesn. hort. Saxifragam luteam appellat à co-
lore florum vel radicis luteo, ac Rutæ pratenfi
cognatam ait: alibi Barbam caprinam minorem
vocat.

Dod. gall. ad Barbam capri refert, ac pro secun-

da siue minore specie describit, & pro Pigano
pingit. Ignaros pharmacopœos pro sylvestri Ru-
ta, non sine magno errore uti scribit, & muller-
culas Belgicas Rhabbarum spurium vocare.
Doctorem quorundam opinionem, Thaliætrum
existimantium, veritati haud consentaneam vi-
deri. Icon quidem à Dodonæo proposita respon-
det huic nostro Thaliætro nigriori. Sed parui fol-
liculi, quorum in descriptione meminit, siliqua-
rum instar, conueniunt Thaliætro, nobis à folli-
culis denominato. Quas verò radices nigras tri-
buit, Tragus Barbæ caprinæ vulgari adscripsit,
qualem ipse pro prima specie pingit: nobis igi-
tur videtur Dodonæus diuersas plantas confun-
dere.

Lobel. in Adu. author est industrios quosdam
Thaliætrum Dioscoridis opinati, Saxifragiam pra-
tensem, quam Rutam fœtidam siue luteam, &
pòst Rutam pratensem Herbariorum, commo-
diore vocabulo appellat, ac etiam in Icon. Plant.
tom. 2. pag. 56. & Obs. pag. 508. eodem titulo do-
nat.

Icon Tabernæmontani Rutæ pratenfis maio-
ris quidem conuenit cum nostro Thaliætro ni-
griore. Verùm in descriptione non conueniunt
quæ scribit de triangularibus folliculis. Rutam
pratensem maiorem primam, contra doctos ne-
gat esse Thaliætrum Dioscoridis, concludens esse
Phelandrium Plinij, cognominans Rutam vul-
nerariam, & Rhabbarum adulterinum, germ.
wunderkraut, & *groß wesen Rauthen*.

Schwenckfeldius plura Thaliætra inuicem
confundit: videtur autem eius Thaliætrum pra-
tense, Thalij Thaliætrum maius folliculis angu-
losis: Eius verò Luteum, nostrum nigrius: ad quod
etiam referendum censemus Alpinum.

Clus. in Pann. p. 380. & Hist. post. vocat Thalie-
trum s. siue pratense i. elatius, longioribus & Syno-
magis aris foliis, & quodammodò splendenti-
bus. C. Bauh. Pin. Thaliætrum i. siue maius si-
liqua angulosâ aut striata, Thaliætrum nigrum
Thalij, secundum siue lausol. germanicum Ca-
merarij, Rutam sylvestrem Cæsalpini: Ei autem
adscribit florum muscosa stamina è pallido can-
dicantia, rariùs purpurascantia. Quæ occasio ut
huc etiam referat Thaliætrum flore incarnato, &
albo, Eylett.

Abundat in collum pratis itinere Monbel-
gardenfi quâ itur *l'isle* & Vefontium, in multis
etiam Germaniæ locis, ut inter Electorales vires
Oppenheim & Weyns in campis.

Dodonæo Thaliætra maiora temperatè calida
ac vnâ resiccantia apparent: Folia eorum oleri-
bus admixta, aluum nonnihil commouent: Ra-
dicis decoctum idem potius præstat. In Hist.
gall. plures vires tribuebat quas in lat. omisit.
Lutetiani nonnulli ad calculum laudabant Lo-
belio. Thaliætris quibusdam in locis in Italia, te-
ste Camerario, vtuntur contra pestem: in Saxonia
contra icteritiam. Non autem placet Dodonæum
& alios, ceu Tabern. easdem vires omnibus Tha-
liætrorum generibus adscribere, quum ipsis non
fuerint bene nota.

THALICTRVM SPECIOSISSIMVM glaucum, semine & caule striato.

Hominis interdum proceri staturam adæ-
quat, vel etiam superat, radice flaua, multas
fibras

Locus &
Tempus

Descript.



fibras à latere obliquas circumquaque spargente, sapore amaro: caulium autem rectus, singularis, nullis alis, ramisve brachiatus, purpurascens, inanis, crassitudine digitali, perquam longis internodiis interceptus: *Folia* ex articulis nascuntur, quos vaginam amplectuntur, Thalictri maioris nigrioris latiora,

si singularia spectes, colore utrinque subcaeruleo, vel glauco, sapore amaro, & acro, odore gravi: summum caulis fastigium in furculos aliquot abit, quibus flores insident muscosi, ex meris fibrillis luteis compositi: *semen* tegitur tunica tenui, non anguloso folliculo.

Dodon. in purg. append. & Hist. in fol. lat. Thalictrum maius tertium facit, Camer. hort. Thalictrum 1. italicum vulgò. Casp. Bauh. Pin. Thalictrum 3. siue maius flauum, staminibus luteis, vel glaucifolio, Thalictrum maius Ger. Thalictrum in Hetruria vulgò *Verdemacum* Casalp. Clusius Pann. pag. 380. & Hist. post. Thalictrum 1. siue Hispanicum. Lobel. Obs. p. 509. Ruta pratensis siue Thalictrum longè maius & multò spectiosissimū. Tabern. Ruta pratensis maior quarta, Phelandrium Hispanicum, *Großwiesen Rauke* Spanisch heyl blat: An Pes milui Angullaræ?

Locus & Tempus.

Ex Hispaniis in Belgium venit, & deinde operâ Clusij Pannonicis Austriacisque prouinciis vulgare factum est. Nobis ex S. Lupo Burgundie missa planta fuit nomine Rutæ caprarie. Excreuit in hort. o. Ill. E. C. ad altitudinem hominis florens Iunio & Iulio.

THALICTRUM MAIUS FOLLICVLIS angulosis caule læui.

Descript.



Tom. III.

QUOD D. Gesnerus Thalictrum maius appellare solitus est, in cubitalem, vel sesquicubitalem altitudinem excreuit, ramosis, rigidis, politis, lauib'que & concauis caulibus donatū: *folia* Aguillegæ, læuia eiusdem penè coloris, & ferè inodora, amaricantia cū acrimonia: *flores* cœu mulcæria, cōferta, ex-

radiatis staminibus in orbem actis, dilutam Violæ nigra purpuram referentibus, apicibus tamen obsoleto colore luteo præditis, compacti. *Radices* fibrosæ, multiplices, tenues, externæ nigricantes, internæ albæ, sapore non ingræ, quatuor veluti costis constant: *semen* in folliculis angulosis tenue, longum, fuscum.

Lobel. Adu. Ruta triangulo pericarpio: Tabern. Synon. Hist. sine iconē, Ruta pratensis maior tertia. Dodon. Thalictrum magnum quartum: Clus. Pann. pag. 380. Thalictrum 4. siue montanum 3. à priore [montano albo 1. & 2.] solo floris colore differens. Thalictrum 5. flore purpureo Camer. hort.

In monte Salenæ Genenæ obseruauī flores Locus & Tempus
Iunio & Iulio semine maturo; in Sabaudia florens Autumno: Montbelgardi ad Dubim itinere versus Eysle inter dumeta Iunio. Ex semine in horto prouenit.

Thalictrum pratense angustifolium.

Clusio est in Pann. p. 380. & Hist. post. Thalictrum sextum, siue pratense secundum, humilius, Synon. flore candicante: Thalictrum 3. angustifolium Camer. Thalictrum 4. siue pratense angustifolium C. Bauh. Pin. Ruta pratensis maior 5. Tabern. in Hist. sine iconē.

THALICTRUM MINUS, SIVE RUTÆ pratensis genus minus, semine striato.



THALICTRO maiori cum Descripti
folliculis similis, non ea tamen ut plurimum huic proceritas: caules tenuiores, non minus tamen rigidi: *folia* consimilia, crassiuscula, sed minora, siue sit spontanea siue culta, situ & dispositione eadē: *radix* tenuis, fibrosa, lutea, repens: *flores* ex radiatis staminibus componuntur, capitulis minoribus, colore ex fusco ad luteum

vergente: *semen* eidem responder.

Dodon. gall. Barba capræ tertia species, fortè Hypecoum Dioscoridis, quod etiam *ὕπεκουμα*: Eidem in Purg. app. & Hist. Thalictrum paruum, Thalictri quintum genus minimum, Thalictrum minus, ut etiam Gerardo: Thalictrum 4. paruum Camer. hort. Thalictrum tenuifol. Cordo hist. Thalictrum Cordi tenuifolium Lobel. in Adu. & Ic. Plant. p. 56. tom. 2. & Obs. p. 508. Clusio Thalictrum 7. siue omnium minimum, foliis minoribus, cineracei coloris, pallido floris colore: radice omnium maximè flaua & serpente, subindeque noua germina producente: Thalictrum 8. siue minus C. Bauh. Pin.

Hyoscyamus H. Lugd. pag. 1081. *Cæsalp.* Ruta pratenfis alia minor, *Cicuta* Atheniensium quorundam. Ruta pratenfis minor *Tabernaemont.*

Locus.

In campestribus maritimis locis apud Belgas reperitur, alibi etiam in montosis, ut in Baldo Italiae monte provenire fertur.

Thalictrum minimum fetidissimum C. Bauhini.

Descript.

Caule est pedali, rotundo, in ramulos diuiso: foliis pluribus in tres lacinas diuisis, anterioribus duabus incisuris denticulatis, superne attrourentibus, inferne pallescentibus: in ramulorum fastigiis flosculi parui, muscoli, ex plurimis staminibus compositi, quibus succedunt exiguae valvulae, oblongae, senae, septenae, striatae, apice incuruo donatae, ubique inuicem iunctae, capillaceo oblongo pediculo insidentes, semen exiguum includentes. Tota planta odorem foetidissimum spirat: in Valesia reperitur.

BARBA CAPRI.

CAP. CXX.

Descript.



Radicem sortita est medocriter crassam, fibrosam, cortice interam crassiusculo, ad rufescentem declinante, cui subest lignosa substantia cum copiosa medulla alba, fatua: caules, duos, tres cubitos alti, & maiores, multis alis concaui, laeves, teretes, medullosi, arcto tubulo (qui in alio nullus est) perforati: folia Castaneae oblonga, acuminata,

ferrata, plura ad costam alligata, nullis intercedentibus minoribus foliis ut in Vlmaria, à qua & flores huius plurimum differunt, in ligulis videlicet racematim collocati, perpusilli, candidi.

Acetarium olim.

Hermolaum in Dioscorico hanc per Acetarium oculus, quam quidam *Tragopogon* falso esse volunt, & vulgò *Barbam petrae*, & in Gallia *Cispadana* *Barbulam hircinam* vocant, intelligere puro.

Tragus *Barbulam caprae* inscribit, proque *Barba caprina* 2. siue sylvestri delineat, ac cum *Vlmaria* ad *Pycnocomon* *Dioscoridis* refert. Sed hinc opinionem improbat *Fuchsius*. *Parauij* alibi que in Italia *Christophoriana* (*Crostofanaria* *Anguill.* epistol. 14.) æquius vocari ait *Gesnerus*, qui quondam *Asparagum silvestrem* vocabat.

C. Bauh. Pin. *Barba caprae* 1. siue floribus oblongis, *Melandryon* *Plinij*, *Barba capri* *Fuchsi*. *Dodon.* gall. caprae H. Lugd. Eyf. caprina altera *Lonic.* *Potentilla* 2. *Anguill.* *Drymopogon* 1. *Tab.* Nobis quidem iudicibus H. Lugd. p. 1081. pingit *Barbam caprae*, verum in descriptione cum ea confundit *Vlmariam*.

Locus.

Generis copiose provenit in monticulo la Bastie, à Basileæ ad Rhenum prope domum ru-

ram. Alunt Vngariæ, Austriæ, Stiria, vicinarumque prouinciarum montanae siluae *Barbam caprinam* *Fuchsi* & *Tragi*, ab *Vlmaria* diuersam, referente *Clusio*.

VLMARIA.

CAP. CXXI.



Caule recto, Synon. anguloso, rubente, concauo, firmo, ad duos aut tres cubitos adolefcit, folia lato virore nitentia, quina aut septena, ad costam connexa, in ercedentibus complusculis minoribus: singularia folia, segmentum folij *Imperatoria* referunt, serrata & nonnihil sinuata: interdum verò crispo contextu plicatum

ad *Vlmi* folia accedunt; sapore citra morsum strenuè siccante: flores suauolentes positi & formâ *Filipendulae* vulgaris, albidii, quinque foliis constant, apicibus crebris similiter albis, aut in luteum vergentibus: succedunt capitula parua acuminata ex contortis oblongis seminulis composita: radix digitalis, infinitis fibris rubentibus capillata. *Trago*, longa, fibrisque multis capillata, foris nigra, intus subfusca, grauissimi odoris, amari simul & adstringentis, non aliter quam glandes.

Cordo *Histor.* *Medefussium*, *Argentilla* maior quorundam, *Trampsiwurzel*. *Tragus* describit pro *Barba caprae* prima, refertque cum secunda ad *Pycnocomon* *Plinij* & *Dioscoridis*. Nobis autem opinio *Tragi* planè displicet, nec vlla nota nobis cõuenite videtur cum *Pycnocomo*. *Quin* *Cortulus*, cum *Parauij* essemus, *Chrylocomen* faciebat. *Gesner.* verò nobis *Apum* herbam, *Imbenfrant*, denominabat, quia ea apes summopere delectentur, si aluearia illinantur. *Rupellæ* in Gallia vocant *Vignette*. *Anguill.* epistol. 17. dicitur *Potentilla* libro de dynamis *Galenii* laudata. *Barba caprina* 1. *Lon.* itemque *Dod.* gall. quoad descriptionem: figura enim non responder, ideoque eam in foliis mutauit, depinxitque sub titulo *Reginae prati*, vocauitque germ. *Wicissbart* Belg. *Wenette*, Gall. *Barbe de cheure*. Cum *Rhoda* *Plinij* similitudinis aliquid obtinere ait. Sed tamen eandem esse, affirmandum, contra C. Bauhinum, haud censet.

Gesn. hort. *Christophoriana*, *Barba capri* maior, *Regina prati* (sic dicitur etiam *Gerardo*) & *Vlmaria* quorundam. *Barbicapra* & *Vlmaria* vulgi *Lob.* in *Adv.* & *Obs.* p. 209. H. Belg. p. 869. *Icon. Plant.* pag. 711. *Vlmaria* *Car.* *Steph.* *Horti* p. 66. H. Lugd. p. 1081. *Gesn.* cat. *Camer.* hort. & *Tabern.*

C. Bauh. Pin. *Barba caprae* altera, siue florib. com.

paſtis, Potentilla i. Anguill. Argentilla maior Thalij.

Alunt Vngariæ, Aſtriæ, Stiriz, vicinarumque provinciarum prata humidiora, & torrentium ripæ, Vlmariam ab ulmaceis foliis dictam, temperamento, atque etiam odore Pimpinellæ maiori Italicæ quodammodo respondentem, referente Cluſio. Non raro in vliginosis pratis, sæpè etiam inter spinas, & in collibus quibusdam, quotannis novos caules emittit, floræque Iunio mense, auctore Trago. Montbelgardi paſſim circa aquarum riuos abundat; Baſilæ in itinere, quo itur Leura, & Genevæ in pratis ultra Aruæ flouens Maio & Iunio, copioſè Iulio inter Durlacum & Eſſingen.

Calidam & ſiccā iudicat Tragus. Mulierculantem verno tempore tenera folia legunt, oleibꝫ ſuis adiungunt. Si in vino rubro & quaſi nigro decoquatur radix & bibatur, diſentericæ utilis eſt. Eadem verò vino & melle decocta & pota aluum ſoluit, bilem extrahit. Semen in cibo commanducatum, capiti noxam adfert. Herba cum farina ruſa & impoſita, tumores diſcutit, ſurculos præterea extrahit, cuſpides & tela, ruſa & impoſita. Folia aduſſiora puſtulas excitant, quemadmodum Ranunculus. Ego contra Tragum, iudico hanc plantam potiꝫ frigidam, quàm calidam, & poſteriores vires, quas ponit Tragus (quæ potiꝫ Pyconocomi Dioſcoridis) non conuenire ſed planè contrarias eſſe iis, quas ex eo primo loco recenſemus. Præterea Dioſcorides ait Pyconocomon conſtare Erucæ foliis acrioribus, non tamen puſtulas Ranunculi modo excitare ſcribit. Tragus in ſua deſcriptione nullius acrimoniz meminit, ſed tantum amari & aſtringentis ſaporis. Rupellenſis Renatus dicit hydromelini ex eius flore conciliari gratum odorem, & ita parari ut æmuletur vinum Creticum quod Maluaticum vocant: ſe etiam viſiſſe qui Lutetiz aduerſus peſtem commendarent.

LEONTOPETALON IN GENERE EX antiquis & recentioribus.

CAP. CXXII.

Leontopetalum caulem proſert dodrantalem [*διατριχάμιον* ver.] aut etiam altiore, plurimis aliſ concavum, in quarum cacuminibus ſiliquæ ſunt elcerum modo [quidam carent hiſ vocibus, *ὁμοιοί* [*sc. λοβοί*] *ἰπερίθοι*.] ac in hiſ duo triaue minuta ſemina, flores punicei, Anemonæ ſimiles, folia Braſſicæ, Papaueris foliorum diuiſura: radix nigra, Rapo ſimilis [*ῥίζα μέλαινα ὡς περ γορδύνη*: hæc ver. parentheſi includit.] quæ eminentias ceu nodos quosdam habet. Naſcitur in aruiſ, ac inter ſegetes. Radix ex vino pota commorſis à ſerpente auxiliatur, dolorem omnem celeriter eximens. Miſcetur & iſchiadicorum clyſteribus, Dioſc.

Sunt qui inter ſpurla Leontopodion, qui Leuctetion, qui Leontion, qui Dorida, qui Dorictenda, qui Lychnidem agreſtem, qui Pardalium, qui Therybetium, qui Rapeium, qui Papauer cornutum, qui Anemonem vocant. Romani Papauer culum, aut Semen leoninum dicunt. Ex quibus conſtat nomen à ferociſſimo & generoſiſſimo omniū animali quondam inueniſſe. Quid autem illi cū leone conueniat, non ſatis certum eſt. Si nominis origo expendatur, nihil Leontopetalon erit, annotante Marcello, quàm leonis folium. Sed quæ leonis partem, verbi cauſa, pedem, aurem, linguam, a-

Tom. III.

lāmye huiuſcemodi, folium referat, non ſatis pro comperto eſt, præſertim variantibus appellatio-nibus, Leontio, Leontopodio, & Leonino ſemine, quæ quidem omnes à leone cauſam nominis, ſed non eodem modo habent: Siquidem Leontion leunculus eſt, Leontopodion autem leonis pedē ſignificat, & Leoninum ſemen cauſam nominis in ſemine non in folio eſſe oſtendit. Cur autem agreſtis Lychnis diceretur, floris figura in cauſa eſt, quæ Anemonem & ſilueſtre Papauer dici etiā Leontopetalon fecit. Omnes enim hi flores magnitudinis, colore, totaque figurā ſimiles, aut ſaltem non multum diſſimiles inter ſe ſunt.

Deſcripſit Leontopetalon lib. 27. c. 11. Plinius iſdem verbis: Rhapeion aliis vocari dicens, folio Braſſicæ, caule ſemip-dali, aliſ multis, ſemine in cacumine in ſiliquis Ciceris modo, radice Rapo ſimili, grandi & nigra: naſci eam in aruiſ: & omnium generum ſerpentibus in vino potam radicem aduerſari, nec quicquam celerius perficere: dari & iſchiadicis.

Maximè autem, auctore Galeno, radice vrimur, quæ diſcutiendi vim habet, ſiccaturque & calefacit in tercio ordine.

Leontopetalon quidam eam herbam eſſe vo- Equiuoca- lunt, quam ſequenti capite deſcribemus. Alij Fumariam bulbosam Leontopetali genus eſſe exiſtimant. Alij, teſte Geſnero, Helleborum nigrum. Garyophyllitam aquaticam Tragus, Alchimillā Cornarius, ſed non ſine magno errore.

LEONTOPETALON QVORVNDAM.

Radix pugnum implet, rotunda, tuberibus multis inæqualis, cortice cinereo, pulpa vi- Descriptione- rente in luteo, ſapore amaro: hinc exeunt pediculi pedales, trifariam diuiſi, quorum ſingulæ diuiſio-

nes bina aut terna gerunt folia circinata: ferè rotunditatis, alia integra, alia lacinata, & veluti criſpa, colore ex glauco flauoſcente, venoſa: flores in vncialibus pediculis, foliis oblongis interiectis, in cauliſ bus ſpicatim congeſti, lutei Ranunculi florum magnitudine, quinque ſtriatis oblongis foliis conſtant, apicibus



luteolis umbilicum circumſtantibus, quibus marceſcentibus prolongantur pediculi in palmarem longitudinem, in extremo vtricum venoſum Halicacabi ſuſtinentes: ſemen nigrum Cannæ Indicæ ſemini perſimile.

Leontopetalum Mat. h. Geſn. hort. & Camer. ſynon: Leontopetalon Lobel. in Adu. Obſ. pag. 391. lc. Plant. p. 685. Caſt. Lonc. Rauvvolff. Lac. Cæſalp. & H. Lug. p. 1608.

H h h 3

Leontopetalum hoc quod ex Græcia adfertur descriptioni Dioscoridis nec foliis, nec flore respondere ait Anguillara epist. 12. ac propterea an verum sit, aliis diiudicandum proponit.

Ex semine quidem Camerario prodit foliis binis oblongis, crispatis oris, sed ad frugem non peruenit, & quidem quoad radicem & fructum convenit descriptioni Dioscoridis, sed folia & flores planè discrepant. Incolæ Orientalium regionum circa Alepum, ubi Rauvolf. reperit, suâ linguâ *Astak* vocant, atque radicem maiorem pulvere vestes fricant, & hac ratione maculas delent.

Hanc plantam, eiusq; nigram extuberantemque radicem Rapi instar vidisse se ait Matthiolus non modò Venetijs, & Patavij in quibusdam hortis, verum etiam in Hetruriz arvis, aliisque Italiz locis, nascique frequenter in Apulia.

PAONIA VETERIBVS ET Neotericis.

CAP. CXXIII.

Theoph.

Theophrasto cognita fuit. Sic enim libr. 9. Hist. pl. cap. 9. de ea disseruit. At illud veluti adiectitium, & è longinquo petiti videtur, quod sc. Pæoniam [Castam reddit Gaza] quam alij Glycyfidam [*γλυκύσις ἰαυ*, Gaza Dulcisidam.] vocant, noctu effodiendam præcipiunt: sibi imaginantes, si interdū quispiam eruat, & à pico martio conspiciatur, eum fructum qui sem legere, sed oculis periclitari radicem autem secanti, sedē procidere.

Pæonia siue Glycyfide [*παωνία ἢ γλυκύσις*] quibusdam Pentorobon. Sic Apuleius à numero granorum Ervo similium vocat, quin & Sarracum Galeno sic legere maugit, græcè tamen legitur *πεντοροβον* habet] dicitur.

In nothis vocatur Pæonia mas Orobælium [*ὀροβέλιον*, à granis Ervo similibus:] alijs Orobax [*ὀροβᾶξ*]: alijs, quod menstruum sanguinem educat, Hæmagogum (*αἱμαγωγόν*): alijs Pæfede, [*παῖσαιδον*]: alijs Aglaophotida (*ἀγλαοφωτίδα*): quibusdam quasi Diuinum donum, Theodonium (*θεοδώνιον*): alijs, quasi Lunaris, Selenion (*σελῳνιον*) Prophetis, quasi Lunæ genitura, Selinogonum (*σελῳγόγονον*): alijs Phthipsis (*φθίσις*): Romanis Casta. Sunt qui Idæos dactylos (*ἰδαίους δακτύλους*) radicem Pæoniæ vocent.

Descript.

Caulis ferè in duorum dodrantum altitudinem adolefcit, inquit Dioscorides, adnascente numerosa sobole comitatus: ac mati quidem folia sunt, qualia Iuglandis (*βασιλικὴ κάρφα*: Plinio qualia Ifatis, pinguliora, rotundioraque & minora. Sed Sarracen. pro Ifatis, Iuglandis reponendum esse suspicatur.) Fæminæ verò incisuris Smyrni modò diuisa (*φύλλα ἀσπιδίου*). Plinio fæminæ folia Myrrham redolent, & densiora sunt: ex quo patet, *ἀπὸ τῆς σμυρνίνης σμύρνα* legisse, manifesto errore: quamvis & Smyrnum à Myrrhæ odore saporeve, quem refert, ita dictum est. Sarrac.) Summo caule fert vtrique siliquas quasdam, veluti Græcas nuces (*ἀμυγδαλοειδεις*) quibus dehiscenibus grana multa rubentia, parva, acinis Punicorū (*πῦραι*) similia inveniuntur, & inter hæc media quinque aut sex, nigra, purpurea. Radix maris digitali ferè est crassitudine & palmi longitudine, gustu adstringens, candida (*λευκή* ver. caret) Fæminæ verò radicibus ceuglandes septem octove adhærent, quales Hæmular regiz [*ἁσπιδίου ἀπὸ δένδρος*] radicibus

adnascentur. Idem in aliquibus exemplaribus posteaquam de fæminæ radicibus egit: Mas, inquit, plures habet, quoniam non vnâ radice nixus est, palmi altitudine, candidaque. Sed Sarac. ita potius legendum censet: Mas plures non habet, sed vnâ radice nixus est.

Antiqua autem pariter & honesta siue Pæonia, siue Glycyfide eam voces, plantæ huius appellatio est. Habet enim altera auctorem antiquæ medicinæ peritissimum Pæonem, cuius in vera & fabulosa historia egregium nomen & æterna laus adhuc est: Altera à dulcedine, quam solo nomine indicat, non parvam illi dignitatem & gratiam illi acquirit. Accedit his quod nihil non sanari Pæoniâ superstitiosè credidit antiquitas, nec corporis tantum morbis, sed animi affectionibus pariter mederi: adhuc imperate tempestatibus, arcere grandines, disficere saorum rubiginem, & ne in huiusmodi longiores finus, Lemuribus etiam aduersari. Quod non aliunde in plebs animos itrepsit, quam ex his quæ Theophrastus, & Theophrastum sequutus Plinius, pluresque alij de legenda Pæonia ridicula magis, quam superstitiosa, tradiderunt, & ex his quæ à Dioscoride de ephialtis naturæ vitio, non deorum irâ, præcepta sunt, adicientibus continuè imperitis ex superstitione sua, deorumq; metu, quæ nullam haberent naturæ rationem, religionemq; medicinæ turpissimè miscen-
tibus. Ex quibus factum est, ut tam multis nominibus vna censeretur Pæonia, quorum aliqua nullam, nisi ex humana superstitione causam & originem habent, qualia sunt Menion, Selenionq; Lunarem herbam significantia: qualia iidem Idæi dactyli, qui in Creia nutriti Iouem dicti fuerunt in veteri superstitione quotidianis precibus exorati, quibus potestate Pæonia comparabatur. Nisi forte, quod magis verisimile est, prima huius nominis origo à radicibus eius facta fuerit, quas Dioscorides ait in fæmina glandium quantitate, & Asphodeli figura esse, & à digitali longitudine, quam habent, dactyli primum vocata ex eo herba fuerit, mox accedente superstitione ad Idæos dactylos transtulerint homines, & quæ simpliciter Dactyli herba nominabatur, religiosè Idæi dactyli vocari inciperit, mox Theodonion, quod diuinam opem & auxilium pollicetur. Tum Aglaophotis quod lucis splendorem ostendit, postremoque Casta herba, modò antiqua Romanorum ea appellatio sit. Ex eodem genere reliqua sunt præterea, quæ ad numerum folliculorum, & seminum figuram in ea pertinent, qualia sunt Pentarobon quasi quinquervum, Orobælion, & Orobax, omnia ab Ervo notissima fruge facta, cui Pæoniæ semen quantitate in cunctis, colore autem in quinque aut sex tantum par est. Sola Hæmagogos vox à ducendo sanguine facta fuit, pertinetq; ad vires eius, quibus puerperis à partu se non purgantibus prodest.

Cæterum Pæoniam marem Tragus maximo cum errore existimat esse Fraxinellam, siue officinis falsò Dictamnium dictum. Æquiuoca

Insulam perhibet Tragus Scolorum distinctionem, qui Pæoniâ vulgarem illam, Germanis *Benedicten Rosen* vocatam, Lapathum esse statuunt. Eodem authore apud Dioscoridem Pæoniæ nomenclatura Chelidonio quoque tribuitur.

Laudata multum antiquis & neotericis ob vires & varias & multas vtilitates Pæonia est. Radix (in-
quit

quit Diosc.) feminis à partu non purgatis exhibetur: ciet quoque menses aucis græcæ magnitudine pota: ventris etiam doloribus in vino bibita auxiliatur. Prodest arquatis, & iis qui renum aut vesicæ cruciatibus infestantur. Eadem decocta in vino potaque aluum sistit. Seminis autem granula decem, duodecimve rubentia in vino nigro & austero pota, sanguinolentum fluorem muliebrem [ῥοῦν ἐρυθρὸν dixit, ad differentiam τῆς λευκοῦ]. Enimvero ῥοῦς γυναικείος etiam ipsi Dioscoridi pro colotis varietate duplex fuit, alius λευκός, hoc est, albus, alius ἐρυθρός, i.e. rubens. Hunc porro Sarac. cum Scribonio Largo fluorem sanguinolentum vertit: Plinius rubentes menses reddidit] sistunt: stomachicisq; qui erosiones ventriculi sentiunt, comesta opitulatur. Quin & à puerulis pota est: ita ve initia calculi eximant. Quæ verò nigra sunt grana, suppressionib⁹ nocturnis, quas ephialtas [Incuborum suffocationibus, Faunorum in quiete ludibriis, Plin.] vocant, vuluæque strangulationibus, ac vteri doloribus, numero quindécim, in aqua malsa aut vino pota auxiliantur. Cæterum [hæc Goupylus in antiquo utroque codice finis capituli adscripta reperit, quæ Ald. codex ad notha reiecit] nascitur Pæonia in altissimis montibus, eorumque verticibus.

Ad eadem commendat libri 25. cap. 15. & libri 27. c. 10. Plinius: & ad melancholiam, & contra serpentes.

Ex autoritate Galeni, Radix Pæoniæ menses cit, ex malsa Amygdalæ quantitate pota. Expurgat etiam iecur obitructum & renes. Sed hæc efficere nata est, quæ acris & subamara est, quæ verò quiddam etiam adstrictorium obtinet, fluxiones ventris sistit. Oportet autem tunc in austerorum vinorum quopiam eam decoctam bibere. Est omnino reficcatoria vehementer, vti non desperauerim eam ex collo pueris suspensam, merito comitiali morbum sanare. Equidem vidi, inquit, puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitiali liberum, ex eo quo gestabat radicem tempore. Vbi autem forte fortunâ quod à collo suspensum erat, decidisset, protinus morbo correptus est: rursusque suspensio in illius locum alio, inculpatè postea se habuit. Visum verò est mihi satius esse depud id certioris experientie gratia detrahere: id quum fecissem, ac puer iterum esset conuulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius suspendimus: ac deinceps profusum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus. Sic succus Cyrenæicus Columellam phlegmone affectam iuuat: Sic Nigella fricta ac odorata destillationes & grauedines desiccat. *Addit Levin. Lemnius lib. 8. cap. 3. de occult. nat. miraculis: Pæonia Galeno nō minùs decantata, quàm Brasica Catoni, non solum à qualitate elementari, sed totius substantiæ vi ac proprietate specifica hunc morbum [epilepsiam] expugnat. Pueros autem in quibus vis morbi minùs valida, etiam à collo gestata hoc morbo collapsos erigit. Discutit enim, consumitque humorem pituitosum, qui huius morbi est seminarium. Intus verò exhibitæ eius bacca etiam in adultis efficacius id præstant. Siquidem stultosum, imbutumque veneno humorem absorbent, ac corpus ad temperamentum calidius, sicciusque perducunt. Hoc autem semen præstantissimum nonnulli asserunt, quod à Pæoniæ, quam masculi nomine designant, prima fortura emergit: Dia enim stolones, h.e. inutiles frutices, culmoliq; effectos ac semine destitutos profert. Vbi verò perfectè adoleuit, siliquis dehi-*

Tom. III.

scens, hinc baccas atro colore politas, hinc acinos, coccineos, fragrantique rubore nitidos, ostendunt, nigricans semen in vltum referuandum, non tamen eâ vanitate, ac superstitione, vti sequentis anni semen credatur inefficax, cum à decimo partu etiam qui emerfit fœtus, præsentaneam vim habeat, modò ne cariosus sit & euanidus. In confesso est (inquit Montuus lib. 1. cap. 8. Haloseos febrium) Pæoniæ radicem de collo pendentem, epilepsiam arcere, quod manifestavit Galenus minime omnium mendax. Egoque subinde expertus sum ad fonticos & lonaticos plurimum valere. Pæoniam masculam infantium collo subnexam, comitalem morbum sanare, verissimum esse comperit Fernellius. Quin & Apollonius Menæbenus libello de Alce cap. 7. Pæoniæ maris radicem decrescente Lunâ collectam, & recentem collo appensam, puerum epilepticum, illico sanitati restituisse, nonnullis experimentis in Suecia vidit: Fœminam autem hoc præstare non solere, multorum experimento compertum esse testatur. Nonnulli Sole Leonem occupante, die item & horâ solaribus, decrescente etiam Lunâ colligendam præcipiunt. Bisariam eiusmodi sanatio contingere potest, vel desiccatione, vel è totius substantiæ proprietate. Cæterum, quacunque tandem ratione ista contingant, successus huius spe frustramur (verba sunt Iulij Alexandrini à Neustain in suis Galeni de simplicium medic. facult. librum notis) hodie. Vel igitur tam efficax non est nostra hæc Pæonia, quàm aliarum fortasse regionum aliquarum: vel leuiora erant illius temporis mala hæc, quàm nostri huius sint, ob immutatam in deterius, fortè victus rationem. Quam ego asserre hoc loco causam non dubito, quum videam eiusdem rationis allatam à Galeno alibi super aliis morbis quibusdam, Hippocratici temporis victus rationem multò magis commendante quàm sui.

Mirari subit Tragum, illam ex Plinio fabulam de Lemnibus & Faunis, quasi planta hæc malignis spiritibus aduersetur, approbare, & non potius ex Dioscoride ad ephialtas, qui morbus naturalis est, facere, scribere.

Fuchsius Pæoniæ radicem tribuit leuiter adstringentē, cum quadam dulcedine. Si verò pluscūlū dentibus mandatur, acrimoniam quampiam subamaram percipi ait, in radice præsertim nostratis Pæoniæ, quam fœminam esse dicit. Pæoniæ verò in vniuersum temperamentum tenulum esse partium, exicatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulò calidius.

Aquam stillatitiam sic parat Wirt. Empiricus: Pæoniam floribus abundantem eruit, in tenues particulas conscindit, in cantharo benè obturato & lutato in cellam frigidam supra fundum reponit, ibique per quatuordecim dies relinquit, ac post distillat. Hanc autem aquam caput valdè imbecille corroborare affirmat, si æger, quum in stupis fuerit, aut caput lauerit, stillatitium liquorem tepesactum capiti affuderit, manūque à parte anteriore ad posteriorem deductâ, affricat. Idem quum ab Epilepsia timeret, arreptas Pæoniæ radices abluat, in tenues rotulas conscindit, quarum drachmas duas in vino albo macerat, de eo per biduum bibit, & epoto aliud affundit. Altero quoque die nouas immitit radices, per quatuordecim dies crescente Lunâ in continuando. Si demum sibi valdè metuatur, mane per biduum aut triduum ipsius radicis duas aut tres rotulas co-

Montuus.

Tragus notat.

Temperamentum.

Caput imbecille.

medit, per duas horas à cibo abstinens: similiteriturus cubitum.

**PÆONIA MAS, VNA PRÆCOCIOR,
& altera tardior.**

Descriptio.



Pæonia mas præcocior ut rarior, ita notabili foliorum & radicis differentiâ à fœmina difpescitur. Ea siquidem, quàm fœmina, videtur altius adfurgere, ad sesquicubitalem, aut bicubitalem altitudinem, pluribus caulibus, nonnihil rubentibus, in aliquot ramos diuisis, foliis vestitis Nucis Juglandis ferè

positu & figura, sed latioribus, crassioribus, lanugine quâdam aeternâ parte pubescentibus, ternis, quaternis, quinis, rarius septenis, saturè virentibus, glaucoque obductis, caulium extremis ad commissuras parte interna rutilis, ex longis rubescentibus pediculis pendentibus. Flores supremis insident fastigiis singulares, paruli, quos carinata quedam folia sustinent, similes ferè floribus Pæoniæ fœminæ, sed dilutiores, non sine purpureâ tinctura, necuis reliqua floris parte saturationibus, in quorum medio stamina purpurantia apices croceos sustinent. Succedunt cornicula alba, villosa in principio, atque lucente lanugine pubescentia, rarius terna, sæpius quatuor aut circiter, crista sanguinea incurua supernè donata, iuxta cornicula stamina tu illa, apicibus luteis farinaceis constituta. Cornicula verò quæ terna, quaterna, quina, rarius plura hirsuta, incana iam grandiora reddita, atque per maturitatem dehiscencia, recurvantur, elegantissimamque granorum ostentant seriem vtrinque ordine positam, primum acinis Granati colore similibus, mox atro-cæruleorum, tandemque nigrorum, rotundorum, crassiorum, quàm in fœmina, colore & substantia alioqui similibus, quemadmodum & sapore. Huius flores Maij initio explicantur, moxque decidunt. Radix ceu palus altè depangitur, recta, nonnunquam in adnata pauca dinaricata.

Eadem huic quæ priori proceritas: idem foliorum situs, sed numerosiora sunt, quippe quina aut septena impari aliquando bifido: dilutius quoque virent & auersâ parte cum prædicta foliis collata pallent, quâ & alba quadam lanugine donata sunt. Non caulium modò extrema, sed ipsæ quoque foliorum costæ ex puniceo interna seu aduersa parte rutilant. Floris corniculorumque eadem forma & ratio quæ præcedentis. Sed tardiùs erumpunt, nec citiùs quàm prioris decidunt. Radix tum huius tum præcedentis pollicari crassitudine aliquot diuisuris constant rectis, aliisque depactis, foris ruffis, intus candidis,

gustu à granorum sapore haud notabili diuersitate prædito. Floret hæc sub finem communiter Maij.

Lob. Obs. p. 390. Ic. Plant. 684., Pæonia mas: Item, p. 685. Pæonia mas cum semine. H. Lugd. p. 856. Pæonia mas Matthioli, & Pæonia mas Dalechampi. Duae figuras vnius plantæ habent.

Pæonia mas Cordo in Diosc. Matth. Anguill. Synon. Lob. in Adu. Dod. Cæsalp. Tabern. & Gerardo Pæonia pulchrior, siue nobilior, vel. 2. Trago: Pæonia mas foliis Nucis Gesc. hort. Pæonia 1. siue folio nigricante splendido, mas C.B. phyt. & pin. vbi ait: Variat floris colore purpureo, incarnato: & huius herbæ folia latiora segmenta habent, quæ subtus exalbida, hinc Eyst. Pæonia mas fl. purpureo: item Pæon. mas fl. incarnato: Et, Pæon. mas maior: itemque Pæon. mas maior fl. incarnato. Floris amplitudine reliquas superat: & herbæ folia in latiores & pauciores virentes particulas diuiduntur.

Gesnerus in Generoso dicto Heluetiæ monte reperiri audierat. Nos non nisi in hortis cultam obseruauimus. Si seminetur Vere, ut plurimum per annum latitat, & post singulis annis foliorum diuisurâ augetur. Non se multiplicat ut alba, vel fœmina, vel ea quæ pleno flore est: radix enim tubest crassa, profundè descendens. Pæoniæ autem effodiendæ commodissimum tempus est Lobelio, sub Caniculæ sydere.

PÆONIA FŒMINA VVLGATIOR.



Vlgaris notitiz est hæc Pæoniæ fœminæ species, omnibusque hortis familiarissima, quæ Radices glandulosas, fibris quibusdam interceptas habet, ut Asphodelus, à quibus denudè & aliæ nonnunquam propagantur simili modo glandulosæ: caulis viridis, vix, nisi ad pediculi foliorum exortum, rub-

redinem vllam ostentat: folia variè & inconditè dissecta, modò trifida, modò bifida, (de singularibus foliis intellige) aliàs etiam integra, supernè virentia, internè albicantia aliquantum, & nonnihil hirsuta: stros qualis in mascula cum staminibus & apicibus consimilibus: perinde ut & siliquæ: at semen oblongum, per maturitatem nigrum.

Hanc Latini, inquit Tragus, Pæoniam, & Hæstam regiam nuncupant. Ego verò Pæoniam fœminam Dioscotidis esse existimo: quam ille nomenclaturis inter notha relatis, & de quibus antè, describit.

Pæonia fœmina Dod. gall. Altera in fol. lar. vbi Pæoniam marem Plinij & Dioscotidis suspicatur. Huius inquit, Plinius folia Myrrham redolere

Paon. mas
Pam.

Synonyma

Herba paralyfis alba, Brunfels. tom. i. chap. 15. Secunda & sylvestris, Trago: Verbasculum non odoratū sine alterum, wild Schlußfeldsumen, wenz himelsschlüssel, Fuchfio. Verbasculum album, Dod. gall. Primula Veris maior, floribus pallidis ac diluviis coloratis, quasi albidis Dod. lat. Antè diximus Dodonæum minus distinctè scribere de hac Primula Veris cuius iconem exhibet, qualem Lobel. habet, vti etiam iconem eius quæ pleno flore est. Arthritica, Primula Veris, Herba ad paralyfim, Herba Petri Nic. Myrepsi, in fine Hlemlis erumpens, pallidior & minus odorata, Gesn. hort. Primula Veris, Herba Paralyfis elatior pallido flore, Clus. Pan. & Hist. Primula Veris floribus pallétibus & foliis grandiorib. odoris nullius Lob. in Adu. Primula pratensis luteo pallida inodora in Obs. p. 305. Ic. Pl. p. 568. Primula silu. 3. vel [in ordine] 5. Tabern. Primula Veris, Paralyfis tilu. Thal. Alismatis sine Damafonij genus alterum Plinij: secunda species Fab. Col. Verbasculum flore simplici 2. siue pratense inodorum C. Bauh. phyt. & Pinace.

Primulae Veris flos multiplex, Dod. Primula veris elatior polyphyllus ex Anglia in Belgium allata, Clus. Primula Veris pallida, in hortis Anglicis & Northmannicis culta, florum maiorum prouentu & fœ u multiplici, triplo aut quadruplo omnium Primularum magnitudine & elegantia prima, Lobel. in Adu. Primula hortensis Anglica omnium maxima & serotina florib. plenis, Obs. p. 305. Ic. Plant. pag. 567. Primula Veris multiflora silvestris, Primula 3. vel silu. 1. Tabern. Arthritica pleno flore, Camer. Primula hortensis Anglica Lobelij, H. Lugd. p. 384. Prim. Veris Anglicana fl. pleno Eyf. C. Bauhin. in Pin. Monimus antè nos dissidere à Casp. Bauhino in eo quod putet Primulam Anglicanam Lobelij eandem esse cum odorata flor. pleno: Belgæ & Angli dijudicent.

Locus & Tempus.

Idem fœ è locis quibus lutea odora prouenit pallens inodorata. In pratis circa Tigurum abundat. In Austria, Sittia, Pannoniaque pratis reperit Clusius. Montberlgardi in dumetis & siluosis flor. Aprili.

PRIMVLA VERIS FLORIBVS EX SINGVLARIBVS pallidis maioribus simplicibus & plenis. Item alia flore albo.

Descriptio.

Radix longa, fibrosa, gustu adstringente, Anisum redolente, promit multos pedunculos, hirsutos, teretes, exalbidos, radicem versus leniter purpurantes, semipalmares & palmares, quorum fastigio insident è calyculo oblongo pentagono, angulis hirsutis prædito, colore herbaceo, quinquepartito diuiso, flores ex languesciente luteo palliduli, vnguibus croceis, quinque foliis cordatis constantes, odore fœ è euano, in quorum medio reconduntur alie staminula lutea, pistillo herbaceo capitellum viride proferente: in singulis pediculis singuli flores, similes Primulae Veris inodoratae, cui etiam similia folia rugosa, nervis hirsutis pronam partem percutrentibus, oblonga, obrusa, supinâ parte glabra, sapore non adeo adstringente atque radix.

Varietas.

Ludere in horto Ill. E. C. Montbelg. obseruauit florem duodecim foliis cordatis stipatum. Ex eodem etiam calyce prodiit flos geminus, suo quisque corniculo nixus: vni quidem folia septena, alteri quina: ipseque adeo calyx totidem consta-

Tom. III.

bat pinnatis cæsuris, quot simul vterque flos foliis. Flore etiam pleno accepi Argentina.

Synonyma

Trago dicitur Herba paralyfis sylvestris. Gesn. hort. Primula Veris, siue Herba ad paralyfim, circa Curiam Rhætorum nascens, peculiaris, flore singulari, non in corymbis: Eidem in ep. ad Fab. Cur. Arthritica species rara, floribus singularis, non in corymbis: Item, Arthritica species, singulos flores singulis petiolis sustinens: In epist. ad Zyving. Arthritica hybernæ. Dod. gall. Verbasculum minus, officinarum Primula Veris minor: lat. Primula veris minor, floribus pallide luteis, pediculis tenuibus.

Primulam Veris, Herbam paralyfis humilem flore pallido, siue *ἀπαύδος*, Vngaris *Kacha verag*, hoc est, pultis ex Panico & Milio cōfectæ [quam illi Kacha vocant] florem dictum, Clusius in Anglia flore omnino nūuo conspexit.

Syluarum primula [Lobel. in Obs. pag. 305. & Ic. Plant. pag. 368. inscribitur.] Tabern. vocat Primulam silu. 2. Columna, Alismatis siue Damafonij genus alterum Plinij.

C. Bauh. phyt. & Pin. Verbasculum 3. siue siluarum maius singulari flore, Primulam Veris siluestrem flore pallido. Eyf. Herbam paralyfis Cæsalp. Arthriticam caule exiguo, vel nullo, Camerarij. Eidem in Pin. Verbasculum flore multiplici 2. [6. in phyt.] siue siluestre magno plenoque flore, Primula Veris sylvarum fl. pleno specioso Eyf. flore multiplici H. Lugd. Primula Veris multiflora silu. Tabern. Prim. Veris fl. pleno Ger.

Circa Curiam Rhætorum tota Hyeme flor. Loc. & tempus. si nix sinat. Maxima copia in Vngaria cædis siluis, & in Anglia flore albo etiam in cædis siluis abundè lactei candoris obseruabat Clusius & in Belgium mittebat. Lubentiùs hæc nemorosa, ymbrosasque conualles sectatur: vt in Anglia, Delphinatu & Sabaudia. Flandris & Gallis hortensis. Bononiæ, Veronæ, Ferratiæ, & Patruij passim flor. in hortis mense Februario, Martio, & Aprili.

PRIMVLA VERIS FLORIBVS PLENIS ex singularibus pediculis.

DE hac antè mentionem fecimus sub hoc titulo: Primula Veris floribus ex singularibus pediculis, &c. Hanc pingit Lobel. in Icon. Pl. pa. 265. tom. 2. pro siluarum Primula Veris flore pleno specioso.

Descriptio.



In horto Ill. E. C. dono D. Frider. Meieri habui, qui Argentine aliam ostendit flore, albo pleno, vnguibus luteis, quæ defloruerat Mensis Maij 14. die.

Locus.

PRIMVLA VERIS FLORIBVS OBSCVRÈ
virentibus fimbriatis.

Descriptio



Siluarum Pil-
mula fim-
briatis floribus,
rugosisq; plicis,
& coloris obscu-
rè viridis, Lodi-
ni hortis fre-
quēs, alioqui as-
similis ceteris
aut hore Lobelia
Adv. qui in Obs.
p. 306. Ic. Plant.
p. 569. titulo pie
posito donavit.
Tabern. dicitur
In Ic. & Hist. Pri-
mula filu. flore
viridi, Primula
sexta: Gesn. hort.
Arthritica gen^o
odoratum flore
virenti: Dod.
lat. Primula Ver-

ris minoris species floribus herbaceis, obscure-
que virentibus, & quandoque foliis multiplica-
tis. Icon quæ proponitur à Lob. & Tabern. pro
Primula Veris floribus obscurè virentibus flores
habet plenos. Quare mirari subit Lobelium non
annotasse plenos esse. Ea icon optimè repræ-
sentat Primulam Veris cum floribus plenis ex
singulis pediculis: vereor ne Lobelius vi-
derit siccos flores, in quibus color facillè deper-
ditur, alio successu temporis apparente, si in sic-
candis non summa diligentia adhibeatur. Sum-
ma fuit opera Clusij in annotandis Primulæ Ver-
is differentiis, verum viridium colore non me-
minit. C. Bauh. phyt. Verbasculum 4. siue sil-
uarum minus flore singulari, quandoque multi-
plici: Pin. Verbasculum flore multiplici 3.

Lobel. not.

PRIMVLA VERIS MINOR
purpurascens.

Descriptio



Fibrosis Pri-
mulæ vulga-
ris radicibus hæ-
ret, è quarum
capite folia pul-
lulant numero-
sa terræ incum-
bentia, sextanti
longitudine, lati-
tudine vnciali
circū circa ferra-
ta, subtus inca-
na & nervorum
viridatium dis-
cursu, virgata,
superius viren-
tia: inter hæc
caules surgunt
plures dodran-
tales & brevio-
res, nudi, eno-
des, in quorum

Icon alia.



cacumine um-
bella sedet flo-
rum numero-
sorum semun-
cialibus pedi-
culis herentiū,
floribus Auri-
culæ vrsi re-
spōdentiū, co-
loris purpura-
scentis.

Huic per om-
nia similis mi-
nor species,
caule trium,
quatuorve vn-
ciarum, foliis
penè Alines
vulgaris & etiā
dimidio mino-
ribus, vix ap-
parētib; cren-
is: floribus
paucis, vno sc.
duobus, vel tri-
bus.

Varietas

Cum autem in figura nostra Fuchiana flores
minùs benè exprimantur: parvam plantam ex
nostris curauimus pingendam, simulque maio-
rem ex Clusio assumpsimus.

Coronarii puniceæque flores, foliis ad peren-
nem radicem oblongis, inferius candicantibus,
Cordo in Obs. silua. Arthritica, Primula Ver-
is minor cæruleis flosculis, Gesn. hort. Para-
lytica alpina, Sanicula angustifolia maior, flori-
bus rubore & candore confusis: primula Veris
foliis Gnaphalii montani longioribus: floribus
purpurantibus, aut ex roseo & albo confusis
micantibus, Viennâ Austriæ à Clusio missa: I-
tem, Sanicula alpina minor, siue media, folio
minore tantillum crenato, floribus non dispari-
bus, Lobel. Obs. pag. 307. Icon. Plant. pag.
570.

Compiler Tabern. Primulam Alpinam me-
diam, siue secundam: itemque Primulam Alpi-
nam angustifoliam, siue tertiam, confusè ponit
cum Auricula vrsi.

C. Bauh. phyt. Verbasculum 8. siue cæruleum
umbellatum: Item, Verbasculum 9. siue Alpi-
num angustifolium maius: Et, Verbasculum 10.
siue Alpinum angustifol. minus. Eidem in Pin.
Verbasculum Alp. 1. siue umbellatum Alp. minus
Maie, Cordi Obs. Serchenblümse Gesneri,
monente Camerario: Verbasculus Alp. siue cæ-
ruleus H. Lugd. pag. 126. Sanicula Alp. minor
siue media Lobelij H. Lugd. Primula Veris flo-
re rubro, Gerardi: Arthritica flore purpureo,
Camerarij: Primula Veris angustifolia rubra &
alba, Eyst. Item: Verbasculum alp. 2. siue um-
bellatum maius: Kenserlin Simleri: Paralytica Al-
pina, Sanicula angustifolia maior Lobelij H.
Lugd. Primula Veris albo flore Gerardi, va-
rians floris colore, albo, rubro, & rubore & can-
dore confuso.

Clusio videtur Gesneri Kenserlin: & Cesar,
inter herbas aut Regulus: Austriacarum rhizo-
tomarū freugblumen, & klein rot schüsselblu-
men: Rusticorum Anglorum Birdcein, hoc est,
Aulium oculi, teste Pennzo.

Spontè magna copia prouenit in vliginosis &
humidis

rare, sed ab omnibus tribus diuersam esse testantur Cornarius, & Tragus.

Struth. filu. Pinxit Botan. Hær. Egenolphi p. 101. Fraxinellam sub inscriptione Struthij siluestris, *wild Senffentkraut / & Speneckkraut.*

Desf. notat. Dorsthenium nesciuisse quid scriberet, id demonstrare videtur, quod iuxta nomen Dictamni, *Lipwurz / Eichtwurz / & wildsilic* posuerit Fraxinellam, & ab altera parte Polygonatum: ex descriptione, quam habet, apparet eum nomina prædicta confundere. Si præterea caruimus, ut ipte ait, germana Dictamno, quis docuit ipsum tempus colligendi ad distillationem? In Germania, Gallia, & Italia, non prouenit vera seu germana Dictamnus, quæ distillari possit.

Bruch. 10. lat. Apud Hieron. Brunschveig in edit. anni 1505. malè Polygonatum pingitur sub his nominibus, *wij wurzel / græcè Baris aut Diptamus, germ. Diptum / aut wjwurzel* nomine falso *Schwartz Diptam / Lipwurz / Edelstein* vel potius *lumbart*, ut habet impressio anni 1550. in qua melius Fraxinella exprimitur. Quin & Apollinaris in una editione Polygonatum, & in altera Fraxinellam prædam proposuit.

An natrix Plinij Anguillare?

Synonyma. Dictamnus p. rarus est Brunfelsio. Dictamnus vulgaris dicitur Trago, Gesner. hort. (cui & Fraxinella Italorum, & Rurpedij Chamæmelia, h. e. Fraxinus pumila, & Tragium Coldenbergij.) Camer. Lonic. [cui & Pæonia mascula] & Officinis. Dictamnus nostra Cordo in Diosc. Dictamnus albus Matth. Lac. Cæf. & Castori Diptamnium album Bello. Tragium Dodon. gall. Tragium Creticum, Guil. theone. Polemonium Tabern. Fraxinella Cordo hist. Dod. lat. H. st. Lugd. p. 872. Clus. Pan. p. 54. & Hist. Ger. & Eyst.

Locus. In Italia ac Germaniæ montibus ac collibus lutofo ac saxoso reperitur folio. Illius passim in Pannoniis siluis, saltibusque Viennensibus inueniuntur duo genera. Apud Belgas hortensis est. Floret Iunio: post semen prouenit.

Tempus. *Vires & vus.* Illidem cum vulgari Pæonia pollere viribus, Tragi autoritate concludimus. Venenis omnibus aduersatur. Radix, inquit Matthiolus, cuius usus est, amata est: valet aduersus venena, & venenosorum animalium ictus. Necat interaneorum vermes drachmæ pondere hausta: datur contra frigidos vteri morbos, nam & menses & vtiuas mouet, partus adiuuat, secundas & emortuum foetum educit, tum supposita, tum cum Pulegio suffusa, tum ex vino meraco duarum drachmarum pondere pota. Valet quoque ad alui torsiones, & ad eiciendos renum calculos. Additur quoque vtiliter in portionibus internorum vulnerum. Datur comitialibus, & in aliis cerebri affectibus. Præstat contra pestilentie contagia, quoquo modo sumatur. In summa ad multa radix vtilis est: Siliquæ & flores contactu pruritus faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant. Dodonæo radix excalfacit & siccatur ordine secundo, digerentis, attenuantis & aperientis est facultatis: conferre & stomachis & anhelosis fertur, & aduersus lethalia medicamenta antidotis vtiliter permisceri.

PRIMULA VERIS ODORATA FLORE
luteo simplici.

CAP. CXXV.

Descriptio. PRIMULA VERIS hæc odorata è radice modicè crassa, inæquali, rubente, sapore sub-
Tbm. III

astringente, odore suauis, aromatico; fibris albis longis donata: folia profert per terram sparsa, oblonga, subrotunda, rugosa instar Betonicæ, sed maiora; In quorum medio caulibus surrigitur palmaris aut dodrantalis, vnus pluresve, leuiter hirsutus, teres foliis nudus, in cuius fastigio flores quini, septeni, aut etiam duodeni ex oblongis calycibus in viridi flauis, lutei, odorati, simplices, in quinque lacinias diuisi, vel multiplices aliquando, in quorum medio apices crocei, ac stylus viridis: quibus marcescentibus succedunt semina, quæ Tabernamontano parua & nigra dicuntur.

Ruellio est Arthritica prior, à floribus primo Vere statim emicantibus, officinis Primula Veris dicta. Ruri Cuculi brachula aut Primueris. Luteæ Violæ genus quoddam esse credidit, suspicatusque est esse Violam Tusculanam, quod ea cum cælum silet, & tempus serenat, exitu Hiemis necdum exactis frigoribus, erumpat, & ut prima vernas texat corollas, ita confestim fugax euanesceat, ut in medium Veris vix decorem suum proroget: Vita ei complurimum mensura, nec temerè ad summum sesquimensum excedit. Nec desunt qui Phlomidis coronarias esse contendunt, sed notæ iam memoratæ non consentiunt.

Brunfelsius multa subinde apud autores de Paralyti herba [sic enim vocat rom. i. Rha. f. 15.] se vestigasse iactat, & plurima cum Herbariis consulisse, verum nec quicquam comperisse, quod ad stomachum fecerit suum. Nomen ignotum Veteribus ait, & Barbarosam inscitè, tam ineptè, confusæque omnia miscuisse, ut maius etiam negotium fecerint, &c.

Quod in Dioscoride & Plinio, Herba paralyti nomen habeat, Trago non constat. An verò Britannica sit Plinij, aut Britannich Auicennæ doctoribus discutiendum relinquit, ab illis enim erudiri de veritate cupit. Apud Phrisium Chelidion, Taxifilon: Opiperam, Chelidion, & Germanicæ voce *fastenblumen*, h. e. Quadragesimalem florem nominari refert.

Et quamvis sint qui putent, ut Ruellio, Fuchsio, & recentiorum aliis placet, hanc vulgaris notitiæ plantam, quæ in quibusdam Brachaculi, officinis Primula veris, Germanis Clauis sancti Petri appellatur, esse Dioscoridis Phlomidem, eorum tamen sententiæ haudquaquam ad stipulandum censet Matthiolus: Siquidem huic folia non insunt hirsuta, nec etiam rotunda, sed rugosa & oblonga. Addendum putat quod florem, quos hæc proferat, nusquam meminerit Dioscorides, neque è Veteribus alius. Id quod, eius quidem iudicio, silentio inuoluendum non fuerat. Matthiolus eadem hæc de Primula Veris caulifera, pallido flore inodoro intelligit, quam infra describemus.

Sed cum in eos inuehitur, qui inter Verbasci, species numerant duas illas plantas (Primulam Veris odoratam & inodoram) colore florum differentes, quæ primæ omnium Vere florent: quæque Herba paralyti vulgò vocantur: non reatâ reprehensione [ut Maranthæ videtur] vitur, dum inquit, si Verbasci essent species, eius flores essent omnino à Dioscoride descripti, quamuis [ut Maranthæ in hac re sententiam proferamus] in aliis notis eorum placitum non ex omni parte acceptandum existimet.

Neoterici prima Phlomidum genera Dioscoridis, censent eam herbam (inquit Spieg. Hag.

lib. 1. cap. 25.) quæ Paralytica & Artherica vulgò dicitur, cuius multæ sunt species. Verùm non vident Dioscoridem his folia tribuisse hirsuta, quæ in nostra Paralyti desiderantur. Sunt enim aut læuia, aut crispa Lactucæ modo, hinc Laïuca silv. in regione Patauina vocatur.

Dorfl. error. Dorsthenius grani errore, deceptus ut puro lectione Brunfelsij, Margaritæ nomen adscribit Herbari paralyti, licet postea dicat Margaritam esse Bellidem.

Dod. taxat. Dodonæus, ut nobis videtur, minùs distinctè scribit de Primulis Veris: oportebat eum inter alia indicare eam quæ flore eleganter est luteo, jucundè odorato cuius iconem omisit Primulas, cum Matthiolo & Spiegelio, non hirsu at aut, contrarium tamen asserit Lobel. & quasdam hirsutas esse pronunciat. Nominantur, inquit, artherica, & Herbari paralyti, quod ad artuum & nervorum dolores conferre existimantur. Quæ maior est, à nonnullis Herba S. Petri dicitur. Altera Primula Veris minor appellari consuevit. Ad φλόιδες, Latinis Verbascula dicta, à plerisque referuntur, sed cum folia eius nec hirsuta, nec rotunda, ægè eò pertrahuntur, &c.

Synon. Cæterùm, dicitur Herba paralyti Brunfels. Cast. descr. Herba paralyti vulgaris Trago, altera Casalp. Primula Veris Matth. H. Lugd. p. 834. Tabern. hortensis Thal. Primula Veris maior fl. luteis odoratis Dod. Primula Veris flavo flore elatior Clus. Pann. & Hist. port. Primula Veris flore luteo Eyst. Primula pratensis Lob. in Obs. p. 305. Ic. Plant. p. 567. odora lutea in Aduers. Gerardo. Verbasculum odoratum Fuchs. Dod. gall. Verbasculum flore simplici i. siue pratense odoratum. Artherica Gesn. hort. simplex luteo flore Camer. hort. Alisma pratorum Columellæ. Dodecantheon Anguill.

Locus & Tempus. Vbiq; in pratis vlginosis & riguis, præsertim regionum minùs calidarum, ut Sabaudia, Flandria, Gallia, Northmannia & Anglia primo Veris tempore florent, referente Lobelio. In Austriæ Stiria, Pannoniaque pratis & herbosis montibusque locis atque silvis Primulæ Veris Herbariorum genera nascuntur, elatior utraq; atque humilior, auctore Clusio. Basileæ, Genevæ, & Lugduni floret Martio & Aprili.

Vires & vñs. Recentiores duobus Verbasculis hos effectus assignant. Triteri imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto vesicæ renumque obstructions solvuntur. Ius herbari propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata, & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaveris, amara & modicè acrisunt: ut hoc nomine desiccandi & detergendi facultatem, quam illis Galenus adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis Herbarij calida & sicca esse statuunt. Et mulieres formæ studentes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, quod maculas, rugasque, & alia eiusdem vitia mirificè detergeant. Folia gustu non ingrato, in olere, placentulis & acetariis, admodum vtilia capiti, nervis, & humorum ex decubitu putredini, aut inflammationi, eoque vulneraria habetur. Esse Primulas Veris facultate quidem resiccantes, sed calidas exiguum, aut nihil, prodidit Dodonæus.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA PROLIFERA odorata.

Locus Argentinae in horto Frid. Meieri Primula Veris flores in caule geminos aut trigemi,

nos proferebat, altero alteri innato: folia inferiora parte erant valdè hirsuta.



Synon. Tabern. Tabern. Primula Veris, plifera. Schusselblum mit nebenblümen. quasi stirpium ignarus separat à Primulis Veris & alio capite reponit.

Lobel. in Ic. p. 264. flore gemino altero alteri innato.

C. Bauh. Pin. Verbasculum 4. (7. phyt.) flore multiplici, siue proferum, Primula Veris flore geminato Ger. Eyst. H.

Lugd. pag. 835. figuram Lobelij habet priori loco sub Siluarum Primula Veris flore multiplici inscriptione.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA, FLORE luteo pleno, odorato.

De hac Gesnerus hort. scribit: Primula Veris species magis colorata & odoratior, quæ vere floret: cuius genus dasypodium seu densifolium habeo, inquit, quod semen non profert.

Synonymi Tabern. in Icon. & Hist. pingit eam sub titulo Primulæ Veris multifloræ, gesnelt Schusselblum.

C. Bauh. Pin. Verbasculum, flore multiplici i. [5. phyt.] siue hortense multiplex, Primula hortensis Anglica Lobelij. Hanc nos aliam statumus.

Frequens in vasis Germaniæ hortis occurrat: Locus & floret maio. Flore maiore observant Argentinae Tempus, magis luteo & odorato apud D. Frid. Meierum.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA PALLIDO flore, inodoro, aut vix odoro: Et alia maxima flore pleno.



Descriptio. Primula flore pallido radice conuenit cum ea quam in initio descripsi-mus, ut & caule: at folia aliquando majores laciniati, pallidi, nullo odore commendabiles, similes floribus Primulæ Veris odoratæ cum singulis pediculis, colore, & magnitudine: semen

Herba

Synonyma

Herba paralyfis alba, Brunfels. tom. 1. raph. 15. Secunda & sylvestris, Trago: Verbasculum non odoratum siue alterum, wild Schlusselflumen / wens himelfchlusself / Fuchfio. Verbasculum album, Dod. gall. Primula Veris maior, floribus pallidis ac dilutius coloratis, quasi albidis Dod. lat. Antè diximus Dodonæum minus distinctè scribere de hac Primula Veris cuius iconem exhibet, qualem Lobel. habet, ut etiam iconem eius quæ pleno flore est. Arthritica, Primula Veris, Herba ad paralyfim, Herba Petri Nic. Myrephi, in fine Hiemis erumpens, pallidior & minus odorata, Gesn. hort. Primula Veris, Herba Paralyfis elatior pallido flore, Clus. Pan. & Hist. Primula Veris floribus pallidibus & foliis grandioribus. odoris nullius Lob. in Adu. Primula pratensis luteo pallida inodora in Obs. p. 305. Ic. Pl. p. 568. Primula filu. 3. vel [in ordine] 5. Tabern. Primula Veris, Paralyfis filu. Thal. Al smatis siue Damafonij genus alterum Plinij: secunda species Fab. Col. Verbasculum flore simplici 2. siue pratense inodorum C. Bauh. phyt. & Pinice.

Primulae Veris flos multiplex, Dod. Primula veris elatior polyphyllus ex Anglia in Belgium allata, Clus. Primula Veris pallida, in hortis Anglicis & Northmannicis culta, florum maiorum prouentu & fœ u multiplici, triplo aut quadruplo omnium Primularum magnitudine & elegantia prima, Lobel. in Adu. Primula hortensis Anglica omnium maxima & ferotina floribus plenis, Obs. p. 305. Ic. Plant. pag. 567. Primula Veris multiflora sylvestris, Primula 3. vel filu. 1. Tabern. Arthritica pleno flore, Camer. Primula hortensis Anglica Lobelij, H. Lugd. p. 384. Prim. Veris Anglicana fl. pleno Eyst. C. Bauhin. in Pin. Monimus antè nos diffidere à Cesp. Bauhino in eo quod putet Primulam Anglicanam Lobelij eandem esse cum odorata fl. pleno: Belgæ & Angli dijudicent.

Locus & Tempus.

Idem ferè locis quibus lutea odora prouenit pallens inodorata. In pratis circa Tigurum abundat. In Austria, Sicilia, Pannonia & in pratis reperit Clusius. Montberlgardi in dumeris & siluosis fieret. Apuli.

PRIMVLA VERIS FLORIBVS EX SINGVLARIBVS PALLIDIS MAIORIBVS SIMPLICIBVS & plenīs. Item alia flore albo.

Descriptio.

Radix longa, fibrosa gustu adstringente, Anisum redolente, promit multos pedunculos, hirsutos, teretes, exalbidos, radicem versus leuiter purpurantes, semipalmates & palmates, quorum fastigio insident calyculi oblongo pentagono, angulis hirsutis præditi, colore herbaceo, quinquepartito diuiso, flores ex languescente luteo palliduli, vnguibus croceis, quinque foliis cordatis constantes, odore ferè euanido, in quorum medio reconduntur alie staminula lutea, pistillo herbaceo capitellum viride proferente: in singulis pediculis singuli flores, similes Primulae Veris inodoratæ, cui etiam similia folia rugosa, nervis hirsutis pronam partem percurrentibus, oblonga, obtusa, supinâ parte glabra, sapore non adeo adstringente atque radix.

Varietas.

Ludere in horto Ill. E. C. Montbelg. obseruauit florem duodecim foliis cordatis stipatum. Ex eodem etiam calyce prodiit flos geminus, suo quisque corniculo nixus: vni quidem folia septena, alteri quina: ipseque adeo calyx totidem constat.

Tom. III.

bat pinnatis cæsuris, quot simul uterque flos foliis. Flore etiam pleno accepi Argentina.

Synonyma

Trago dicitur Herba paralyfis sylvestris. Gesn. hort. Primula Veris, siue Herba ad paralyfim, circa Curiam Rhætorum nascens, peculiaris, flore singulari, non in corymbis: Eidem in ep. ad Fab. Cur. Arthritica species rara, floribus singularis, non in corymbis: Item, Arthritica species, singulos flores singulis periolis sustinens: In epist. ad Zyving. Arthritica hybernæ. Dod. gall. Verbasculum minus, officinarum Primula Veris minor: lat. Primula veris minor, floribus pallide luteis, pediculis tenuibus.

Herba paralyfis humilis.

Primulam Veris, Herbam paralyfis humilem flore pallido, siue *αμαλόν*, Vngaris Kacha vrag hoc est, pultis ex Panico & Milio cōfecta [quam illi Kacha vocant] florem dictum, Clusius in Anglia flore omnino nullo conspexit.

Syluarum primula [Lobel. in Obs. pag. 305. & Ic. Plant. pag. 368. inscribitur.] Tabern. vocat Primulam filu. 2. Columna, Alismatis siue Damafonij genus alterum Plinij.

C. Bauh. phyt. & Pin. Verbasculum 3. siue siluarum maius singulari flore, Primulam Veris sylvestrem flore pallido Eyst. Herbam paralyfis Cæsalp. Arthriticam caule exiguo, vel nullo, Camerarij. Eidem in Pin. Verbasculum flore multiplici 2. [6. in phyt.] siue sylvestre magno plenoque flore, Primula Veris sylvarum fl. pleno specioso Eyst. flore multiplici H. Lugd. Primula Veris multiflora filu. Tabern. Prim. Veris fl. pleno Ger.

Locus & tempus.

Circa Curiam Rhætorum tota Hyeme floret, si nix sinat. Maxima copia in Vngaria cædis siluis & in Anglia flore albo etiam in cædis siluis abundè lactei candoris obseruabat Clusius & in Belgium mittebat. Lubentius hæc nemorosa, vmbrosasque conualles sectatur: ut in Anglia, Delphinatu & Sabaudia. Flandris & Gallis hortensis. Bononiæ, Veronæ, Ferrariæ, & Patenij passim floret in hortis mense Februario, Martio, & Aprili.

PRIMVLA VERIS FLORIBVS PLENIS ex singularibus pediculis.

Descriptio.

DE hac antè mentionem fecimus sub hoc titulo: Primula Veris floribus ex singularibus pediculis, &c. Hanc pingit Lobel. in Icon. Pl. pa. 165. tom. 2. pro siluarum Primula Veris flore pleno specioso.

Locus.

In horto Illustr. E. C. dono D. Frider. Meieri habui, qui Argentine aliam ostendit flore, albo pleno, vnguibus luteis, quæ defloruerat Mensis Maij 14. die.



Iij

PRIMVLA VERIS FLORIBVS OBSCVRE
virentibus fimbriatis.

Descriptio



Silvarum *Primula* fimbriatis floribus, rugosisq; plicis, & coloris obscure viridis, Lōdini hortis frequēs, alioqui a similibus cæteris auctore Lobelio Adv. qui in Obs. p. 306. Ic. Plant. p. 569. titulo p̄posito donavit. Tabern. dicitur in Ic. & Hist. *Primula* silu. flore viridi, *Primula* sexta: Gesn. hort. Arthritica gen^o odoratum flore virenti: Dod. lat. *Primula* Ve-

ris minoris species floribus herbaceis, obscureque virentibus, & quandoque foliis multiplicatis. Icon quæ proponitur à Lob. & Tabern. pro *Primula* Veris floribus obscure virentibus flores habet plenos. Quare mirari subit Lobelium non annotasse plenos esse. Ea icon optime repræsentat *Primulam* Veris cum floribus plenis ex singularibus pediculis: vereor ne Lobelius viderit siccos flores, in quibus color facile deperditur, alio successu temporis apparente, si in siccandis non summa diligentia adhibeatur. Summa fuit opera Clusij in annotandis *Primula* Veris differentiis, verum viridium colore non meminit. C. Bauh. phyt. Verbasculum 4. siue silvarum minus flore singulari, quandoque multiplici: Pin. Verbasculum flore multiplici 3.

Label. not.

PRIMVLA VERIS MINOR
purpurascens.

Descriptio.



Flbris *Primula* vulgaris radicibus hæret, & quarum capite folia pululant numero: sa terræ incumbens, sextatili lōgitudine, latitudine vnciali circū circa terrata, subtus incana & neruorum viridatū discursu, virgata, superius virentia: inter hæc caules surgunt plures dodrantales & breuiores, nudi, enodes, in quorum

Icon alia.



cacumine umbellata sedet florum numero: sorum semuncialibus pediculis herentiu, floribus Auriculæ vñi respōdentiū, coloris purpurascens.

Huic per omnia similis minor species, caule trium, quatuorve vnciarum, foliis penè A fines vulgaris & etiā dimidio minoribus, vix apparentibus crenis: floribus paucis, vno sc. daobus, vel tribus.

Cum autem in figura nostra Fuchsiæ flores minus bene exprimantur: parvam plantam ex nostris curauimus pingendam, simulque maiorem ex Clusio assumpsimus.

Coronarii puniceæ q̄te flores, foliis ad perennem radicem oblongis, inferius candicantibus, Cordo in Obs. silua. Arthritica, *Primula* Veris minor cæruleis flosculis, Gesn. hort. Paralytica alpina, *Sanicula* angustifolia maior, floribus rubore & candore confusis: *primula* Veris foliis Gnaphalii montani longioribus: floribus purpurantibus, aut ex roseo & albo confusis micantibus, Viennâ Austriæ à Clusio missa: Item, *Sanicula* alpina minor, siue media, folio minore tantillum crenato, floribus non disparibus, Lobel. Obs. pag 307. Icon. Plant. pag. 570.

Compiler Tabern. *Primulam* Alpinam mediam, siue secundam: itemque *Primulam* Alpinam angustifoliam, siue tertiam, confusè ponit cum Auriculæ vñi.

C. Bauh. phyt. Verbasculum 8. siue cæruleum umbellatum: Item, Verbasculum 9. siue Alpinum angustifolium maius: Et, Verbasculum 10. siue Alpinum angustifol. minus. Eidem in Pin. Verbasculum Alp 1. siue umbellatum Alp. minus Maiele, Cordi Obs. Serehsenb. in se Gesneri, monente Camerario: Verbasculus Alp. siue cæruleus H. Lugd. pag. 126. *Sanicula* Alp. minor siue media Lobelij H. Lugd. *Primula* Veris flore rubro, Gerardi: Arthritica flore purpureo, Camerarij: *Primula* Veris angustifolia rubra & alba, Eyst. Item: Verbasculum alp. 2. siue umbellatum maius: Fenserslin Simleri: Paralytica Alpina, *Sanicula* angustifolia maior Lobelij H. Lugd. *Primula* Veris albo flore Gerardi, varians floris colore, albo, rubro, & rubore & candore confuso.

Clusio videtur Gesneri Fenserslin: & Cesar, inter herbas aut Regulus: Austracatum thizotomari Freusblumen, & Klein rot sel. usselblumen: Rusticorum Anglorum Wirdein, hoc est, Auium oculi, teste Pennzo.

Sponit magna copia prouenit in viginosis & humidis

tate, sed ab omnibus tribus diuersam esse testantur Cornarius, & Tragus.

Pinxit Botan. Hær. Egenolphi p. 101. Fraxinellam sub inscriptione Struthij siluestris, wild Scyffentraut / & Spenscheltraut.

Descriptio. Dorsithenium nesciuisse quid scriberet, id demonstrare videtur, quod iuxta nomen Dictamni, Lipwurz / Bichtwurz / & wildsilie posuerit Fraxinellam, & ab altera parte Polygonatum: ex descriptione, quam habet, apparet eum nomina prædicta confundere. Si præterea caruimus, ut ipse ait, germana Dictamno, quis docuit ipsum tempus colligendi ad distillationem? In Germania, Gallia, & Italia, non prouenit vera seu germana Dictamnus, quæ distillari possit.

Bruch. 10. 101. Apud Hieron. Brunschweig in edit. anni 1505. malè Polygonatum pingitur sub his nominibus, weiswurz / græcè Batis aut Diptamus, germ. Diptum / aut weiswurz nomine falso Schwartz Diptam / Lipwurz / Edelsteinadi, vel potius lumbart, ut habet impressio anni 1550. in qua melius Fraxinella exprimitur. Quin & Apollinaris in vna edulone Polygonatum, & in altera Fraxinellam pictam proposuit.

An natrix Phnij Anguillare?

Synonyma. Dictamnus putatus est Brunfelsio. Dictamnus vulgaris dicitur Trago, Gesner. hort. (cui & Fraxinella Italorum, & Rurpodij Chamamelia, h. e. Fraxinus pumila, & Tragium Coldenbergij.) Camer. Lonic. [cui & Pæonia mascula] & Officinis. Dictamnus nostra Cordo in Diosc. Dictamnus albus Matth. Lac. Cæs. & Castori Diptamnum album Bello. Tragium Dodon. gail. Tragium Creticum, Guil. theone. Polemonium Tabern. Fraxinella Cordo hist. Dod. lat. Hist. Lugd. p. 372. Clus. Pan. p. 54. & Hist. Ger. & Eyst.

Locus. In Italiæ ac Germaniæ montibus ac collibus lutofo ac saxoso reperitur folio. Illius passim in Pannoniis siluis, saltibusque Vlnensibus inueniuntur duo genera. Apud Belgas hortensis est. Floret Iunio: post semen prouenit.

Tempus. Iisdem cum vulgari Pæonia pollere viribus, Tragi autoritate concludimus. Venenis omnibus aduersatur. Radix, inquit Matthiolus, cuius usus est, amara est: valet aduersus venena, & venenosorum animalium ictus. Necat interaneorum vermes drachmæ pondere hausta: datur contra frigidos vteri morbos, nam & menses & vrinas mouet, partus adiuuat, secundas & emortuum særum educit, tum supposita, tum cum Pulegio suffusa, tum ex vino meraco duarum drachmarum pondere pota. Valet quoque ad alui torsiones, & ad eijciendos renum calculos. Additur quoque vtiliter in portionibus internorum vulnerum. Datur comitialibus, & in aliis cerebri affectibus. Præstat contra pestilentie contagia, quoquo modo sumatur. In summa ad multa radix vtilis est: Siliquæ & flores contractu pruritus faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant. Dodonæo radix excalfacit & siccatur ordine secundo, digerentis, attenuantis & aperientis est facultatis: conferre & stomachis & anhelosis fertur, & aduersus lethalia medicamenta antidotis vtiliter permisceri.

PRIMULA VERIS ODORATA FLORE luteo simplici.

CAP. CXXV.

Descriptio. Primula Veris hæc odorata è radice modicè crassa, inæquali, rubente, sapore sub-Tbm. III

astringente, odore suauis, aromatico, fibris albis longis donata: folia profert per terram sparsa, oblonga, subrotunda, rugosa instar Betonice, sed maiora: In quorum medio caulis surgitur palmaris aut dodrantalis, vnus pluresve, leuiter hirsutus, teres foliis nudus, in cuius fastigio flores quini, septeni, aut etiam duodeni ex oblongis calycibus in viridi flauis, lutei, odorati, simplices, in quinque lacinias diuisi, vel multiplices aliquando, in quorum medio apices crocei, ac stylus viridis: quibus marcescentibus succedunt semina, quæ Tabernæmontano parua & nigra dicuntur.

Ruellio est Arthritica prior, à floribus primo Vere statim emicantibus, officinis Primula Veris dicta. Ruri Cuculi brachula aut Primueria. Luteræ Violæ genus quoddam esse credidit, suspicatusque est esse Violam Tusculanæ, quod ea cum cælum silet, & tempus serenat, exitu Hiemis necdum exactis frigoribus, erumpat, & ut prima vernas texat corollas. ita confestim fugax euanescent, ut in medium Ver vix decorem suum proroget: Vita ei complutimum menstrua, nec temerè ad summum sesquimenssem excedit. Nec de iure qui Phlomidis coronarias esse contendunt, sed notæ iam memoratæ non consentiunt.

Brunfelsius multa subinde apud auctores de Paralyti herba [sic enim vocat tom. 1. Rhap. 15.] se vestigasse iactat, & plurima cum Herbariis conuulisse, verum nec quicquam comperisse, quod ad stomachum fecerit suum. Nomen ignotum Veteribus ait, & Barbaros tam inficere, tam ineptè, confusæque omnia miscuisse, ut maius etiam negotium fecerint, &c.

Quod in Dioscoride & Plinio, Herba paralytis nomen habeat, Trago non constat. An verò Britannica sit Plinij, aut Britannicæ Aucennæ doctoribus discutiendum relinquit, ab illis enim eruditi de veritate cupit. Apud Phrisium Chelidion, Taxifilon: Opiperam, Chelidion, & Germanicæ voce fastenblumen, h. e. Quadragesimalem florem nominari refert.

Et quamuis sint qui putent, ut Ruellio, Fuchsio, & recentiorum aliis placet, hanc vulgaris notitiæ plantam, quæ in quibusdam Brachæ cuculi, officinis Primula veris, Germanis Clauis sancti Petri appellatur, esse Dioscoridis Phlomidem, eorum tamen sententiæ hanc quaquam ad stipulandum censet Matthiolus: Siquidem huic folia non insunt hirsuta, nec etiam rotunda, sed rugosa & oblonga. Addendum putat quod florem, quos hæc proferat, nusquam meminerit Dioscorides, neque è Veteribus alius. Id quod, eius quidem iudicio, silentio inuoluendum non fuerat. Matthiolus eadem hæc de Primula Veris caulifera, pallido flore inodoro intelligit, quam infra describemus.

Sed cum in eos inuehitur, qui inter Verbasci, species numerant duas illas plantas (Primulam Veris odoratam & inodoram) colore florum differentes, quæ primæ omnium Vere florent: quæque Hebræ paralytis vulgò vocantur: non re & à reprehensione [ut Maranthæ videtur] vitur, dum inquit, si Verbasci essent species, eius flores essent omnino à Dioscoride descripti, quamuis [ut Maranthæ in hac re sententiam proferamus] in aliis notis eorum placitum non ex omni parte acceptandum existimet.

Neoterici prima Phlomidum genera Dioscoridis, censent eam herbam (inquit Spieg. Hag.

Arthritica prior Ruell. Cuculi brachula Primueria Viola Tusculana

Herba Paralytis Brunfelsii

Matth. 103 darguine

lib. 1. cap. 25.) quæ Paralytica & Arthetica vulgò dicitur, cuius multæ sunt species. Verùm non vident Dioscoridem his folia tribuisse hirsuta, quæ in nostra Paralyti desiderantur. Sunt enim aut læuia, aut crispa Lactucæ modo, hinc Lactuca silv. in regione Pataulina vocatur.

Dorsth. error. Dorsthenius graui errore, deceptus ut puto lectione Brunfelsij, Margaritæ nomen adscribit Herbe paralytis, licet postea dicat Margaritam esse Bellidem.

Dod. taxat.

Dodonaus, ut nobis videtur, minùs distinctè scribit de Primulis Veris: oportebat eum inter alia indicare eam quæ flore eleganter est luteo, jucundè odorato cuius iconem omisit. Primulas, cum Matthiolo & Spiegelio, non hirsutas ait, contrarium tamen asserit Lobel. & quasdam hirsutas esse pronunciat. Nominantur, inquit, arthetice, & Herbe paralytis, quod ad artuum & nervorum dolores conferre existimantur. Quæ maior est, à nonnullis Herba S. Perri dicitur. Altera Primula Veris minor appellari consuevit. Ad *φλόιδες*, Latinis Verbascula dicta, à plerisque referuntur, sed cum folia eius nec hirsuta, nec rotunda, ægè eò pertrahuntur, &c.

Synon.

Cæterum, dicitur Herba paralytis Brunfels. Cast. descr. Herba paralytis vulgaris Trago, altera Casalp. Primula Veris Matth. H. Lugd. p. 834. Tabern. hortensis Thal. Primula Veris maior fl. luteis odoratis Dod. Primula Veris flauo flore elatior Clus. Pann. & Hist. post. Primula Veris flore luteo Eyst. Primula pratensis Lob. in Obs. p. 305. Ic. Plant. p. 567. odoratulea in Aduers. Gerardo. Verbasculum odoratum Fuch. Dod. gall. Verbasculum flore simplici 1. siue pratense odoratum. Arthetica Gesn. hort. simplex luteo flore Camer. hort. Alisma pratorum Columellæ. Dodecantheon Anguill.

Locus & Tempus.

Vbiq; in pratis vlginosis & riguis, præsertim regionum minùs calidarum, ut Sabaudia, Flandria, Gallia, Northmannia & Anglia primo Veris tempore florent, referente Lobelio. In Austria, Stiria, Pannoniaque pratis & herbosis montanisque locis atque siluis Primulæ Veris Herbariorum genera nascuntur, elatior viraque atque humilior, authore Clusio. Basileæ, Genevæ, & Lugduni floret Martio & Aprili.

Vires & vsus.

Recentiores duobus Verbasculis hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulo- rum doloribus. Radicis decocto vesicæ renum- que obstructions solvuntur. Ius herbe propi- natur & illinitur aduersus rupta, luxata, & liuen- tia. Quod verò hæc eadem possint, temperamen- tum eorundem palam docet: parum enim ad- stringunt: si gustaueris, amara & modicè acris sunt: ut hoc nomine desiccandi & detergendi fa- cultatem, quam illis Galenus adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis Herbarij calida & secca esse statunt. Et mulieres formæ stuentes, succo è floribus illorum ex- presso faciem illinunt, quod maculas, rugasque, & alia eiusdem vitia mirificè detergeant. Folia gustu non ingrato, in oleris, placentalis & acetariis, ad- modum vtilia capiti, nervis, & humorum ex- cubitu putredini, aut inflammationi, eoque vul- neraria habetur. Esse Primulas Veris facultate quidem resiccantes, sed calidas exiguum, aut ni- hil, prodidit Dodonaus.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA PROLI- fera odorata.

Locus

Argentina in horto Frid. Meieri Primula Veris flores in caule geminos aut trigemi-

nos proferebat, altero alteri innato: folia inferio- re parte erant valdè hirsuta.



Lugd. pag. 835. figuram Lobelij habet priori loco sub Siluarum Primulæ Veris flore multiplici in- scriptione.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA, FLORE luteo pleno, odorato.

DE hac Gesnerus hort. scribit: Primulæ Ve- ris species magis colorata & odoratior, quæ Vere floret: cuius genus dasypodium seu den- sifolium habeo, inquit, quod semen non pro- fert.

Tabern. in Icon. & Hist. pingit eam sub titulo Primulæ Veris multifloræ, gesn. Schüsselblü- men.

C. Bauh. Pin. Verbasculum, flore multiplici 1. [5. phyt.] siue hortense multiplex, Primula hor- tensis Anglica Lobelij. Hanc nos aliam statui- mus.

Frequens in variis Germaniæ hortis occurrit: Locus & floret maio. Flore maiore observari Argentina Tempus magis luteo & odorato apud D. Frid. Meierum.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA PALLIDO flore, inodoro, aut vix odorato: Et alia maxima flore pleno.



Primula flore palli- do radice con- uenit cum ea quam in ini- tio descripsi- mus, ut & cau- le: at folia ali- quando ma- jora: flo- res laciniati, pallidi, nullo odore com- mendabiles, similes flori- bus Primulæ Veris odoratæ cum singulis pediculis, co- lore, & magni- tudine: semen

& loculamenta, ut in illa.

Herba



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXXI.

NERVIFOLIA, VT PLANTAGINES, GENTIANÆ,
POLYGONATA, HISQVE NONNIHIL SIMILES.

Peracla sanè magna ex parte Coronariarum natura est, quarum ineffabiles varietates non minùs ostendendo nos placuisse speramus, quàm naturam eas præbendo, cùm hunc genium nobis largitus sit D. O. Max. ut à se largitas indagaremus curiosius ipsi, ut ostenderemus aliis. Nunc aliò gressus dirigendus. Est ubi ex fructu, est ubi ex flore, est etiam ubi ex radice stirpium classes melius æstimes: nunc ad folia maximè respicere lubet. Ergo, hercle, has nunc perlustremus, quarum folia cœu parallelis costis atque nervis nobiliter instructa sunt, & his affinitate proximas. Quanquam si & aliò respicere lubeat, est ut spicati aut caudati culmini similitudinem in plerisque contempleris.

PLANTAGO VETERIBVS.

CAPVT I.



HEOPHRASTVS simpliciter Arnoglossum vocat, aliquando Stelephuron, vtrumque verbum à Theodoro Plantago vertitur. De Arnoglossò inquit: Ab radice tantùm foliata est: pro-rogat suos prouentus ex singulis floribus: alibi Stelephuros, inquit, spicosa, quæ Agnina lingua à quibusdam vocata est, & ab aliis Coturnix (Conturnix Cæs.) similis caudæ vulpinæ, nisi quòd florem non particulatim edit, sed per totam spicam, Tritici modo: flos lanugineus, ut Frumenti: Genere autem conuenit cum Oculo canis, & Bibinella, & Cauda vulpina, quæ spicam gerunt, non acutam, neque aristatam totà formâ cum Tritico similia, sed latiore folio.

Plinius seorsum de Plantagine & Stelephuro agitenam Stelephuros, inquit, proxima est Caudæ vulpinæ, nisi quòd illa particulatim florer. Alibi duo genera Plantaginis tradit, minorem & maiorem. Verba eius lib. 25. cap. 8. sunt hæc: Celebrauit & Thomison Medicus vulgarem herbam Plantaginem, tanquam inuentor, volumine de ea edito. Duo eius genera, minor angustioribus foliis & nigrioribus, linguæ pecorum simillimis, caule anguloso, in terram inclinato, in pratis nascens. Altera maior, foliis laterum modo inclusa: quæ quia septena sunt, quidam eam Heptapleuron [ἑπταπλευρον, h.e. Seprineruiam] vocauere. Huius & caulis cubitalis est & angulosus. Nas- citur in humidis multò efficacior, Vis mira siccan-

Tom. III.

do densandoque corpore, cauterij vicem obti- nens. Nulla res æquè sistit fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Ita habet vetus Plinij codex, qui Dioscoridem, miras huius herbæ fa- cultates tradentem variis aliis in locis sequitur & declarat.

Ceterùm, caput Dioscoridis [quod nonnulli codices ἀπὸ ἀρνολώσου ἐπὶ πλεῦρος inscribunt, alius verò codex πολυπλέυρη] sic habet. Plantago (ἀρνολώσου. Orib. οἱ ἢ ἐπὶ πλεῦρος, οἱ ἢ πλεῦρος) duùm est generum: minor enim vna est, maior altera. Ac minor quidem foliis prædita est angustiori- bus, minoribus, mollioribus: cauliculis verò an- gulosis, ad terram inclinatis: floribus autem pallidis, ac semine summis caulibus emicante. Ac maior (πὸ ἢ μέγας. Sunt antigrapha, in qui- bus periodus ἀ τὸ ἢ μέγας, vsque ad γένεται, h.e. nascitur, deest: sed teste Sarraceno, retinenda sunt omnia:) & amplior latiorque est, & latifo- lia, in oleris vsu apta [λαχανώδης: Ald. λαχανώδης:] Caulis huic angulosus, subruher, cubiti al- titudine, à medio ad verticem tenui semine cir- cumdatus. Radices subiacent teneræ, hirsutæ, candidæ, digitali crassitudine. Nasceitur in palu- dibus, sepibus, ac locis vliginosis. Maior (μέγας vet.) porrò efficacior est. Vim habent folia ex- siccatoriam & adstringentem. Quare omnibus malignis, elephantiasin comitantibus, fluxioni opportunis, sordidisque vlceribus illita conue- niunt. Cohibent & sanguinis eruptiones, no- mas: carbunculos, herpetas, & epiniētidas, vetera quoque & inæqualia vlcera cicatrice obducunt.

K k k



Chironia sanant & sinus agglutinant. Morfibus canis ambustis igni, inflammationibus, parotidibus, panis ac strumis quoque & ægilopiis cum sale imposita profunt. Coctum verò olus cum sale & aceto sumptum, dysentericis, cæliacisque subuenit. Datur & in locum Betæ (διδόται & c. Hæc vsque ad ἡ ἀδματικὴ διδόται, h.e. & suspiriosis data, in veteri margine reperiuntur, Sarrac.) cum Lenticula [ῥ. φακὺς] decoctum. Exhibetur & herba decocta ad aquam intercutem, cui Leucophlegmatiz nomen est, post ficiorum alimentorum esum, ita tamen vt media cibus interueniat. Comitibus quoque & suspiriosis data proficit. Foliorum succus oris vlcera repurgat, si subinde colluatur. Cum cimolia aut cerussa erysipelatis medetur: fistulis infusus auxilio est: prodest & ad auriū dolores atque ophthalmias, seu instillatus, seu in collyria additus. Sanguinantibus [sanguine putrescentibus, Plin.] quoque gingiuis, & sanguinem supernè rejicientibus potu confert: clystere verò dysentericis (vet. addit phthificis & dys.) infunditur. Contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ subditur in velle: re: quemadmodum & si vulua rheumatismo laboret. Semen ex vino potum alvi profluuiā & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix seu colluta, seu commanducata, dentium dolores sedat. Eadem cum foliis ad vesicæ renūque vlcera in passo datur. Cæterum, ferunt ternas radices cum vini ternis cyathis & aquæ pari modo tertianis febribus, itémque quaternas quaternis auxiliari. Sunt & qui radice vinculo è collo suspensa amuleti instar vtantur ad strumas discutendas. Syri huius (leguntur hæc ad capitis calcem inter notha) & Calaminthæ iussulum cum melle prodūt mederi paralyticis [febribus, Corn.] si secundā & quartā parasceues, i.e. Veneris die exhibeatur. Hoc autem velut arcanum accipito: est enim vetissimum & experientiā comprobātū.

Galen.

At vt eas vires habeat plantago, quas Dioscorides & Plinius ipsi attribuunt, temperamentum eius mixtum facit: habet enim (vt Gal. 6. simpl. pharm. ait) aquosum quiddam frigidum, habet & quid austeri, quod terreum est, & siccum ac frigidum, vt refrigeret simulque siccet: & secundum ambo secundi est à mediis abscessus.

Temperam.

De Plantaginis virtutibus elegantissima est Macri Poësis, quæ sic habet:

Macri Poësis.

Herbam, qua nostra lingua Plantago vocatur, Hanc ἀργυρώσαντα Græci vocat, est quia lingue agnina similis foliis. Plantaginis huius

Etymon.

Sunt gemina species, & maior prima vocatur: Altera verò minor, quam vulgò lanceolatam dicunt, quod foliis, vt lancea, surgat acutis.

Temperam.

His inflammandi, desiccandique videtur

Vulnera.

Tertius esse gradus: maiorem vim tamen esse Maiori dicunt: nimis humida vulnera siccant, &c.

Nomina linguarum.

Cæterum, ἀργυρώσαντα Græcis dicitur & Latinis, quod folia eius agninae linguae simillima sint: Nonnulli tamen Arnion (ἀρνειον, quasi agninam,) alii Probaton (προβατειον, quasi ouillam) alii Cynoglosson (κυνόγλωσσον, quasi canis linguam,) alii Heptapleuron (ἑπτάπλευρον, quod septem fibris seu costis in dorso distincta sit:) alij Polyneuron (πολύνευρον, quasi multineruiam) appellant. Magi Caudam ichneumonis, Aegyptij Aschat, Romani Plantaginem, ducto à planta vocabulo.

Plantago.

Germani ab agni lingua (Echaffungen/ sed vulgò wegerich: Belgæ wechbre/wegeheblat: Galli Plantain, & vt inter notha legitur, Turbidolpion: Itali Plantagine, & Plantagine: Hisp. Lhantem Tamehagem: & voce spuria Thesaricam: Pœni A-

Viarum herba.

tiircon. Angli Plantayne, Bohemi Gytrocel: Hungari, Vti fitu, h.e. Viarum herbam. Neque aliæ maioris Plantaginis extant appellationes, nisi quod quandoque Rubra cognominatur.

Minor Plantago *αργυρώσα*, siue Quinqueneruia, & Lanceola, siue Lanceolata: Germanis *Episiger wegerich*: Gall. *Lanceole*: Belgis *houtribbe*: i.e. Costa canina: Anglis, *Ribwortte*: Hung. *Hozzu* vt fitu, appellatur.

Paucis, vnaquæque Plantago suum hodie retinet nomen.

Est enim Plantago maior folio glabro.

Plantago Rosea.

Plantago maior panicula sparsa.

Plantago marina magna.

Plantago rosea exotica.

Plantago maior hirsuta & media.

Plantago quinqueneruia cum globulis albis pilosis.

Plantago incana & lanuginosa minor.

Plantago lanceolata foliis lanuginosis, & longis pilis hirsutis.

Plantaginis lanceolatae species minima.

Plantago latifolia minor.

Plantago angustifolia maior, caulium summitate foliosa, & alia spicata.

Plantago angustifolia minor, spicâ hirsutâ albâ, foliis ex atro virentibus valde villosis.

Plantago angustifolia alpina.

Plantago umbilicata.

Plantago Indica, Payco acris.

Plantago maritima à Dodonæo exhibita, quæ depingitur à nobis Coronopi marini nomine.

Plantago aquatica, cuius varias species trademus lib. 38.

Qualis sit Fistula pastoris, Plantago Italica, Damasonium, Alisma, *welsch wegerich*, Eucharlij Roslin pronunciare nondum queo. Barba siluana à recentioribus Medicis inter Plantagines aquaticas reponitur. Nos Sagittam vocamus. Sunt qui Bifolium maius Plantaginem palustrē appellant lib. 38. Alii verò qui Plantaginem alpinam quorundam vocent Alisma.

PLANTAGO MAIOR FOLIO GLABRO, non laciniato, vt plurimum.



Digitali crassitudine radix est, lateratim, vt Descrip Lobel. ait, fibrosa, candida, & in medio præcisa, siue mutilata, Morsus Diaboli ferè modo: folia rotundiora, sui medio latiora, glabra, septem nervis distincta, humi accumbentia, sapore, vt mihi videtur, aspero, cum aliqua acrimonia & amaritudine: caules pedales, lenti, thyrsus & veluti spicam florum stamineorum albi-

albicansium, Lobelio obscure purpureorum & pullorū, proferunt: semen sublongum, obsoleti coloris, Lob. Portulacæ pusillum fuscū aut rugineū.

flore C.B. phyt. Idem Pin. Plantaginem latifoliā, siue roseam, floribus quasi in spica dispositis. Basileæ Iunio mense florentem vidi in vase farinā à Theod. Zvyngero. In horto Ill. E. C. rosa viret Augusto.

PLANTAGO MAIOR PANNICULA sparsa.



Sola differētia Belgicis agris & hortis, in pannicula spicatum sparsa, onusta innumerā herbarum flosculorum, racematim coherentium, ferturā.

Dicitur Lob. Obseru. p. 162. Plantago rosea pannicula sparsa: Sarathrodes & Coremarophora, siue Scoparia Gemmæ: Roseæ Plantaginis

varietas. Ic. Plant. p. 305. Plantago panniculā sparsa. Dod. gall. Plantaginis primæ siue maioris species alia. Lat. in fol. Plantago maior spicā multiplici. H. Lugd. p. 1256. Plātago rosea Lob. C.B. phyt. Plātago 4. siue latifol. maior spica multiplici. Eid. Pin. Plā. lat. 6. siue spica multipl. sparsa.

Plantago marina magna.

Spithamæis pediculis nituntur folia, paricum pediculis longitudine, palmum lata, acuminata; crassa, septem nervis donata, sapore cum Plantagine septemnerua terrestri eodem, nisi admixta esset faldedo quædam: caules cubitales, nudi, thyrsis longis florum insignes, quos semina sequuntur, iam dictæ Plantaginis similia: Hanc situs loci fortè diuersam facit videri à vulgari Plantagine maiore glabra.

Apud mare florentem vidi mense Maio, semenque proferentem Augusto.

PLANTAGO ROSEA, FLORE EXPANSO.



Huius floris ad didit Camerarius apud Matthiol. in Hist. germ. & Epit. Plantagini maiori. In horto vocauit Plantaginem roseam. Sic quoque Lobel. in Icon. Plant. p. 304. appellauit, & Eyst. Plantag. roseam exoticam Gerard. Plant. latifoliā 4. siue roseam

Kkk ;

PLANTAGO ROSEA.



Plusquam pollicari radice perennat: folia per terram spargens Plantaginis latifoliæ, pilosa & nervosa: inter quæ caules surrigit satis crassos, hirsutos, in quorum fastigio folia crebra, inferioribus dimidio minora, interiore orbita, Alines, admodum parua, virescentia, Rosam deformat.

Cæsalp. vocauit Plantaginem foliato caule, frequentem in Germania. Dod. Plantaginē cum spica Rosæ instar. Plantaginē roseam spicatum Ger. & Eyst. Plantaginē multiplicem Tabern. Ic. & Hist. Plantaginē roseam Lob. in Adu. Plātaginē roseam vulgarem. siue icone & descrip. Clus. Hist. post. Plant. roseam Penæ H. Lugd. p. 1256. Plantaginē 2. siue latifoliā maximā roseo Tom. III.

synonyma

Locus

Tempus

Vires & Vitis.

Descriptio

Descriptio

C. Bauh.
nos.

flore expanso C. Bauhin. in Pinace. Apparet C. Bauhinum loco citato non parum titubare, dum Plantaginem roseam Aduersariorum ad hanc refert: dumque rursus eandem [Plantaginem roseam Penæ, H. Lugd. p. 1256.] ab hac nobiscum separat. Ipsum eadem Icon, eademque verba satis redarguunt.

Eandem cum prædicta, aut certè valdè similem Clusius describit vocatq; Plantaginem 2. siue latifoliam exoticam, Plantaginem peregrinam latifoliam Gareti.

PLANTAGO MAIOR HIRSVTA, MEDIA
à nonnullis cognominata.

Icon. Guarini.

Descriptio



Icon. Lobel.

Synonima



Matt. nos.

Plantago
minor.

Minimi digiti crassitudo est radicis fibrata, recta, adstringenti: folia lata, nervosa, utrinque lanugine tenui canescunt: caules recti, cubito altiores, teretes, hirsuti, inanes, spicam gestant, muris maioris caudæ quadantenus similem, calyculorum agmine denso compactilem, qui in quaterna foliola subpurpurea explicati stamina concoloria, apicibus autem albis, ostendant.

Brunfels. tom. 1. rhaps. 1. Lonic. & Camer. Plantago maior. Hist. Lugd. p. 1254. Plant. maior Matth. Fuchs. Gesner. hort. Dod. Schvv. & Matthiol. h. germ. (vbi figura transposita, & posita sub titulo maioris.) Plantago media. Thal. Pl. media Dodonæi. Trago Plantag. media vel 2. & latifolia: Eid. Hist. germ. Plant. media vel alba, Dioscorid. & Plinio fortè non nota. Cordo in Dioscorid. Plantago 3. latifolia similia habens folia multò tamen minora & leuiter hirsuta. Tab. Ic. & Hist. Plantago minor Dioscoridis: Plant. 4. Lingua ouina. Lobel. in Adu. & Ger. Plantago

incana. Lobel. in Obs. p. 162. Icon. Plant. p. 504. & Clus. hist. Plantago maior incana. Turn. Plant. minor. C. Bauh. phyt. Plantago 3. siue latifolia 3. siue incana: Eid. pin. Plant. latifolia 3. siue incana: Cynoglossa quorundam, Lugd.

Αριόγλωσσον μέσον, Plantago quinqueneruia, mittel wegerich / wegebreit / wegetrit (inquit Schvvencckf.) in hortis & secus vias, ut maior glabra, nascitur, eiusdem facultatis. In Germania abundè frequens. Æstatis tempore, ut ceteræ, conspicua, atque vnà cum spica reperitur: Hyeme quoque, ut aliarum, sola restat radix, haud facillè periens, teste Dodonæo.

Quum Plantagines refrigerent, repellant, adstringant, & glutinent, haud consulerim applicandam commorosis à cane rabido, aut à serpentibus, licet multi Neotericorum ad eos morsus commendent. Morsibus capis [inquit Schvvencckf.] ambustis, inflammationibus, calidis podagris, folia conueniunt. Tusa addito salis modico luxatis dolores & tumores tollunt.

PLANTAGO QVINVENERVIA CVM
globulis albis pilosis.

Descriptio



Numerosa per terram spargit folia, quinqueneruia hirsuta, cœuntibus pediculis in caput radices, ita ut propter tomentum coitus vix appareat: latitudo iis semuncialis, longitudo sextantal: caules multi, alij erecti, alij supini, palmares & spithamæi, capitula gestant, tomento albo villosa, iulos

Salicis imitata.

C. Bauhin. phyt. vocauit Plantaginem 8. siue Plantagini similem alteram. Pin. Plant. angustifoliam 8. siue panniculis Lagopi.

Floret mense Aprili ad ripam lacus Aluenfis, montem Seti, & Balneum Baleructi, vbi obseruauit cum essem Monspeffuli.

Plantago incana & lanuginosa minor.

Vulgari minor foliis incanis, multaque lanugine obductis, humi stratis, maxima anni parte caule vidua, & floris expers: inter multas tamen plantas, nonnullas animaduertebat Clusius Maio mense ferentes exiguum spicam Plantaginis instar, minorem, plenam florum pallefcientium. eius radix tenuis, longa & nigra erat.

C. Bauhin. phyt. Plantago 6. siue Salmaticensis: Eid. pin. Plantago latifolia 10. siue villosa, seu incana lanuginosa.

In collibus Salmanticæ vicinis, aliis item Castellæ locis aridis obseruabatur à Clusio.

PLANTAGO

PLANTAGO LANCEOLATA.

pula vinum discutere, mentemque restituere author est Scrib. Largus.

PLANTAGINIS LANCEOLATÆ species minima.

Radice prædita est parua, ad foliorum exortum valde villosa: folia gramineæ angustic, Description.

duum aut triu vnciarum longitudine: caulium palmo longiorum cacumini capitulum breve & veluti glomeratum insidet.

Hanc esse æstimamus, quæ Tabern. in Ic. & Hist. itemque Gerard. Plantaginem angustifoliam minorem inscribit: Cæsalp. Lanceolam minorem: C. B. phyt. Plantaginem 12. siue angustifoliam

minore: Idem pin. Plantaginem angustifoliam 6. Facile crediderim à Lanceolata magnitudine tantum differre, idque ratione loci. Monspefuli Septembri mente floret.

PLANTAGO LATIFOLIA MINOR.

Plantagini maiori in omnibus similem fecit Description: Tabernamontanus, qui cum Gerardo Planta-

ginem latifoliam minorem inscribit. C. B. phyt. Plantaginem 5. siue latifol. minorem, & mediæ genus minimū Thalii: Idem pin. Plantag. latifoliam 12. siue glabram minorem.

Dubium mihi est an Thalius & Tabern. de eadem Plantagine scribant. Tabern. suam refert ad rubrā, quam nos latifoliam glabram maiorem vocamus: Thalius verò suam videtur ad eam referre quam mediam Dodonzi vocat, & nos latifoliam hirsutam inscribimus.

PLANTAGO ANGUSTIFOLIA MAIOR,

caulium summitate foliosa: & alia spicata.

Anno 1612. Augusto mente Io. Lamandus Delphinus perquirens plantas horti Ill. B. Kkk 3

Description

ocus:

res & r

Description



Officinæ quoniam folium arctius definit in acumem, & veluti in lanceæ mucronem fastigiatur, Lanceolatam; vulgus autem Lanceolam appellat. Germani *flam oder Spitzger wegerich* vocant, quia sc. acuminatior & longior est: & ad equinæ costæ similitudinem *Rosripp*: Galli *Petit Plantain*.

Brunfelsij figura Plantaginis minoris tom. 1. rhaps. 1. non placet. Fuchsius pro minore mediam pingit.

Synon.

Dod. gall. & lat. Gefn. hort. Schvv. Lon. & Lac. Plantago minor. Cast. Plantago media. H. Lugd. p. 1255. Plantago minor, longa Matthioli: Item, Plantago minor Dod. Corn. Lob. Adv. p. 163. Ic. Pl. p. 305. & Gerardo Plantago quinqueneruia. Cordero in Diosc. Plantago angustis oblongis foliis. Trago, Plantago lanceolata, Plant. 2. vel minor, & Lanceola, Quinqueneruia Manlij, Herlatum, Megeborra & Herba Martis Phrysijs. Matth. germ. Plantago longa, vulgò lanceolata. Anguill. Plantago altera dicta Lanciuola. Tab. Ic. Plant. Lanceolata: Eid. Hist. Lanceola & Lanceolata, Costa canina. C. Bauh. phyt. Plantago 9. siue angustifolia maior: Eid. pin. Plantago angustifolia 1. siue maior, Lanceola Maior Cæsalp.

Plantaginem æt. *Cardop*, minorem, seu lanceolam, Thalius duplicem facit. Maior, inquit, folia profert bipalmaria, sæpe duarum vnciarum latitudine ferè, quæ quandoque in ambitu vel pinnulis quibusdam paruis exornantur, vel omnino sine illis existunt. Altera minor folia breviora habet & strictiora. C. Bauhinus variare ait, spicis aliquando bifidis: aliquando loco spicarum, capitulis mirè variantibus.

Passim provenit locis & viis incultis. Floret initio Æstatis, semen Augusto legitur.

Siccior est & commendatiore dote ad vulnerarias potiones, vnguenta & hernias, etiam vulgi experimento. Ebrio datam copiosam in cra-

Synonyma

Tempus

Diosc.

Tempus

ocus:

C. Mont. reperit Plantaginem maiorem angustifoliam luxuriantem in dicti horti prato.

Icon Gerardi.

Descriptio



Icon Clusij.



Radix autem lignosa erat & insipida, fibriferaque valde tenuibus nixa: folia multa cubitali longitudine, duos pollices quædam lata: costæ vel nervi elatiores quinque, ad pediculos apparent rari quidam pili, alioqui ipsa folia tota virore prædita sunt, quæ quum gustantur, sapor nullus notabilis aut insignis sentitur, subsequente tamen post acrimonia: caules plures, non ramosi, angulosi, sesquicubitales, & quæ parte radici adhærebant, purpurascens in summitate veluti spicæ, vnciam circiter longæ, in quibus flosculi cum apicibus longiusculi: in capitulis albis semina longiuscula, ruffa, tunicis parvis involuta.

Gerard. [cuius Iconem proponimus] Plantago quinqueneruia rosea differt à nostra

quæquam descripsimus, in eo quod nostra tot foliola in supremo caule non habeat, & in eo quod ex foliolis prodeant duo cauliculi spicari. Quam ob rem Clusij Plantago exotica nostre similior.

Quam C. Bauhinus in Phyt. Plantaginem 10. siue angustifoliam maiorem in caulem excrescentem vocat, eam in prod. & in Pin. Plantaginem 2. siue quinqueneruiam caulium summitate foliosam cognominat, ac sic describit: à vulgari in eo differt, quod cauliculi spicam florum sustinentes, in caulem palmarem excrescunt, in cuius summitate, folia plura, eo modo quo ad radicem disposita: spicis non oblongis, sed rotundis, brevissimis pediculis lanuginosis insidentibus. In Pinace etiam vocat Plantag. angustifoliam tertiam siue proliferam.

Plantago angustifolia minor spica hirsuta alba, foliis ex atro virentibus valde villosis.

Radice est tenui, fibrosa, albicante: foliis aliquan-

do vncias quinque longis, strictissimis, atrovirentibus, tribus nervis distinctis, per marginem potissimum pediculis, pilosis: inter quæ cauliculi exurgunt, alij cubitales, alij pedales, alij palmares, aliquando triunciales, ad exortum aliquando villosi, glabri nonnunquam, quibus spicæ breves, oblongæ & subrotundæ insident.

Hanc descriptionis author, C. Bauhinus, facit in phyt. Plantaginem 11. siue angustifoliam alteram, vel minorem angustissimo folio. In prod. Plantaginem 3. siue trineruiam angustiss. folio. Pin. Plantaginem angustifoliam 9. siue trineruiam fol. angustissimo. Synon.

Sæpius hanc Plantaginem ad vias, maximè ad rudera author notauit. Locus

PLANTAGO ANGVSTIFOLIA ALPINA



Radice crassa, fuscula, longa, parum fibrata, circa caput crassescens, folia oriuntur ad lanceolata Plantaginis folia accedentia, sed multò angustiora, & circiter trientem vncie lata, sesquipalmaria, quinqueneruia, parum hirsuta, nigricantia, solidiuscula: caules ad radicem hirsuti, foliis longitudine æ-

quales, capita gerunt semuncialia, plantagineis nigriora.

An Gesn. hert. Lanceola montana. H. Lugd. Holosteum quorundam. C. Bauh. phyt. Holosteum 4. (3. Pin.) siue hirsutum nigricans. Synon.
Genevæ in monte Thuri.

Plantago Indica, Payco acris.

Herbæ Payco nuncupatæ, Monardi ex Peru missæ, tribuuntur (ex versione Clusij) folia Plantaginis foliis cum formâ, tum colore simillima, siccata quidem admodum tenuia, & gustata valde acria, calidâque. Descriptio

H. Lugd. pag. 1919. meminit in Peru Payconis. C. Bauh. phyt. vocavit Plantaginem 7. siue Plantagini similem Peruvianam. In pin. Plantaginem latifoliam 7. siue Indicam. Synon.

Eius pulvis ex vino sumptus, nephriticum dolorem è flatibus, aut frigida causa provenientem tollit: ipsa verò planta cocta, & emplastri in modum dolenti loco imposita, eundem effectum præbet: quod certissimum esse ipsâ experientiâ didicisse Monardes testatur.

PLANTAGO VMBILICATA.

Radix ei Plantaginis vulgaris simillima, spithamum longa, creberrimè fibrata: è cuius nodulo

Descriptio

nodulo siue basi, digitalis crassitudinis, plantagineum, latum, vnicum, admirabili naturæ opificio, expansum folium, paulatim propagando in latum gyrum umbilicatum excrecens, & Coclidis instar per circuitum ascendens, in spiras duas tantum, aut semiternas conuolutum, ac veluti ex pluribus coniunctis in vnum contiguisque Plantaginis maioris foliis conflatum, spithameæ, altitudinis aut pedalis ferè, cuius summum folium Platanis latifoliae seruat figuram, sinuosam tamen & rugosiorē, sapor illi prorsus plantagineus. E medio conuoluti siue umbilicati, imo centro, foliorum quædam rudimenta conspiciuntur, e quibus caulem erumpere verisimile: De cæteris Lobelio qualiscumque descriptionis auctori



nondum constabat: In Aduers. autem umbilicum montanum Herbariorum vocat. C. Bauh. dicitur in Pin. Plantago latifolia 8. siue peregrina sinuosa.

Monspelio Londinum semine misso Lobelio à D. Casparo Pelliterio, in horto I. Nafmyth. Chirurgi & Archibotani miræ & raræ elegantiae hæc orta planta.

PLANTAGINI ANGVSTIFOLIAE similis Habbures.

Descriptio

Planta, quam Frater pro Habbures Camerarij misit, magnā habet cum Holostio Monspeliensium similitudinem: folia sunt uncias tres circiter longa, angusta, in acumen desinentia, nervosa, hirsuta, sapore nullo insigni: caules aliquot eiusdem longitudinis cum foliis, rotundi, capitula plantaginea, longitudinis vnguis, latiuscula.

C. Bauhin. in phyt. vocat Holosteum 3. siue hirsutum albicans alterum, addens D. Camerarium ab Alpino nomine Gotne albi cathartici accepisse. In Pin. Holosteum 5. siue Creticum alterum, Leontopodium Creticum aliud Clusij hist. Dubitat an sit Plantagini similis planta H. Lugdunensis. Ex Oriente secum detulit D. Bern. Paludanus.

PLANTAGINI AFFINIS BIBINELLA Siciliæ herbula.

Thryallis Theophrasti & Plinij, Bibinella Theodori, auctore Cæsalpino, herbula est ex Sicilia habita, minor Lanceolā ac viridior: folium medio quodam modo se habet, inter Lanceolam & Plantaginem: paruis circumquaque apicibus, vt Coronopo, frequentioribus: coliculos fert palmares, plenos semine, vt Plantago:

Herba assumitur inter olera.

Casp. Bauhin. pin. Coronopus 3. siue maritima maior, Plantago marina Dodon. gall. Lobel. in Adu. Obl. p. 163. Ic. Plant. p. 306. Tabern. & Gerardi. Plantago maritima Geln. hort. & H. Lugdun. p. 1359. Plantago angustifolia Dod. & Coronopus marinus Camerarij.

Synonima

PLANTAGINI SIMILE ANTIPHARMACUM, siue Contrayerua.

Monardes de Ind. Occid. parte 2. in epist. Petri Osmæ. meminit perniciosi cuiusdam toxici, quo in bello & venationibus incolæ vtantur, cui aduersari dicitur planta foliis latis, Plantagini Hispanicæ haud ab similibus, si teratur & vulneribus imponatur. Sic enim venenum extinguere, & à Symptomatibus illis, quæ toxicum generare solet, liberare aiunt. Pro magno thesauro existimant Hispani, eam plantam se inuenisse: nascitur eadem regione, vbi Toxicum.

Locus

Eandem esse cum iam dicta credimus, quam idem Monardes libro simpl. medicamentorum ex nouo Orbe delatorum, cap. 17. sequentibus delineauit.

Ex Charcis prouincia Peruana radices quædam venenis aduersantes aduehuntur, Iridis radicibus valde similes, sed minores, & ficulacii folij odore. Hispani Indias inhabitantes Contrayerua appellant, quasi dicas Alexipharmacum, quoniam earum puluis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum, cuiuscunque tandem sit generis, præsentissimum est remedium (vno sublimato excepto, quod solâ lactis potione extinguitur,) vomitione illud reiciere faciens, aut sudores evacuans. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix, aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu.

Huc quoque referenda herba quædam (vt Gomara hist. gen. cap. 71. perhibet) indis nota, cuius radicis succus alexipharmacum est pestilenti & pernicioso toxico, quo ipsi sagittas illinunt.

C. Bauh. pin. dicitur Plantago latifolia 11. siue Plantagini Hispanicæ similis.

HOLOSTIVM VETERVM. CAP. II.

Holostium (ὁλόστιον ita editio Parisiensis, alij tamen ὁλόστιον, quasi totum esui aptum, teste Cæsalp.) Dioscoridi parua est herba, tribus aut quatuor digitis eminens supra terram, foliis & viticulis Coronopo aut Gramini proximis, gustu adstringentibus: radice prætenui, vsque in capillamenti speciem (pili instar alius. Cæterum, error hic notatur in Dioscoride, capillamenti similitudinem tribuenti radici, cum potius herbe conueniat, Cæsalp.) alba (vulgares codices habent λευκὴν τῇ εἰδει, i. e. albam, fibrosam. H. Lugd.) Nascitur in editioris terre locis. Potest & ipsa si simul coquatur, carnes cogere & conglutinare. Bibitur & ad rupta cum vino.

Plinius non Holestium, sed Holosteon vocat, quasi totum osseum, ex aduerso tamen appellatam à Græcis herbam, quia sine duritia, sicut fel dulce [fortè Holostium ob duritiem fruticis dictum est, non vt Plinius statuit:] tenuis vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor di-

gitorum seu Gramen, foliis angustis, adstringens gustu, nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad conuulsa [vulsa Corn.]rupta, in vino pota. Vulnera quoque conglutinat. Nam & carnes coguntur (quum coquantur, Corn.) addita.

Galenus siccantem cum adstringente vim Holosteo attribuit: vnde adrupta commodè bibatur.

Cæterum Holosteon Cornarius Graminis speciem esse arbitratur mollioris sc. illius, quale in editoribus locis nasci tradit. Ac Holostij nomine sequentes apud Authores donantur plantæ: Dens canis primus, seu Plinij Phalaris. Gramen Luzulæ. Holostium lunci foliis Matthiol. Myosuros quorundam. Filix saxatilis. Holostium Plantagini simile. Plant. angustifol. alp. Serpentina. Gramen Fuchsj dictum, eique affine gramen. Tunica minima. Pilosella maior Fuchsj. Pilosella minor eiusdem. Herniaria. Tragos Diosc.

HOLOSTIVM PLANTAGINI SIMILE.

Descriptio



Holostium Monspessulanum.



maius Clusij: itémque in Icon. Plant. pag. 307. Ab Hist. Lugd. pag. 1189. & Camer. hort. Holost. Salm. Clusij. A Gerar. Holost. Salmanticense

Holostij Monspessulani radix longa, crassa, nigricans, lignosa, plurium capitum: folia per terram sparsa, tota albida, hirsuta, & tomentosa, palmaria quædam, quædam multò minora, non tota semunciam lata, quinque nervis per longum distincta, gustu adstringente:

exsiccata conuoluuntur & in acumen definunt: caules spithamei, aut breuiores: repertiuntur etiam cubitales, similiter hirsuti, thyrsus gerunt longum, aliquot vnciarum, interdum vnius, Plantagini & Cornu ceruino floribus & seminibus similes.

Idem est cum Holostio Salmanticensi Clusij, quod ei duplex. Vocatur autem à Lobel. in Obs. p. 166. Holost. Salm.

Clusij: Tabern. Holost. maius: Camer. apud Matthiol. in Hist. ger. & Epir. Holostium & Holosteum quorundam: C. Bauhin. phyt. & pin. Holosteum 1. siue hirsutum albicans maius, & Plantago angustifolia albida Dodonæi. Holosteum Salmanticense alterum Clusij, vocat Holosteum paruum Monspeliense. Ego diuersimode sunt species, Holostium maius & minus Clusij, asserere non ausim.

Monspellii obseruatur florens Aprili & Maio: itémque Autumno in aridis Oliuetis & non procul ab arvis, viâque Boutoneti proximâ frequens. In hortis floret primo anno, sed raro semen maturat. Frigoris impatiens est.

CORONOPVS VETERIBVS.

CAP. III.

Dioscoridis Coronopus (κορωνόπος) oblonga herbula est, humi strata, folia habens incisuris diuisa (hirsuta, cap. de Pysilio. Plura vide cap. de Holostio.) atque hæc quidem oleris quoque modo cocta estur. Radicem potè habet tenuem, adstringentem, quæ cæliacis in cibo præclare facit. Cæterum, prouenit locis incultis, in aggeribus, & secus vias.

Meminit huius Plinius lib. 21. cap. 16. Aculeatarum [hanc vocem Plinius referre ait Cæsalpinus ad præcedentes plantas, de quibus Plinius iam dicto capite prius locutus sit:] caules aliquarum, inquit, per terram serpunt, ut eius quam Coronopum vocant. Et rursus lib. 22. cap. 19. Coronopus oblonga herba est cum fissuris. Seritur interim, quoniam radix cæliacis præclare facit in cinere tosta.

Et hunc usum eius medicum etiam Galenus & Aëtius habet. Sed in Paulo κορωνόπος ὁ φελὲν legitur, pro κορωνόπος. Nec librarij est hic error, ex vocatione affinitate decepti, sed ipsius authoris Pauli: qui quum alaudam colicis opitulari antea scripsisset, mox subiunxit, κορωνόπος ἢ ῥίζα αὐτῇ πεπύσιται, κορωνόπος ὁ φελὲν ἰδιόμορφη.

Theophrastus lib. 7. cap. 9. inter ὀπθηνοδύλλα, quæ folia à radice ad terram habent, κορωνόπον recenset. Alibi inter aculeatas & spontè nascentes herbas. Itémque lib. 2. caus. cap. 7. inter amaras. Apud Theophrastum Gaza Silaginem & Selaginem vertit.

Inter reiectanea siue notha aliis dicitur Ammonos (ἀμμόνος) aliis Astrion (ἀστρίον) Aphris Atirsipite (ἀτρίσιπιτῆ) Romanis Caciatrice (κακιάτρικη) aliis Stilagine (στιλάγω) aliis Sanguinaria, ἀγλινάρια.

Coronopus autem cornicis pedem significat, & refert quoque, folijs ita fissis & dispositis, ut cornicis pedem repræsentent. Nec ignota herba est, inquit Cornarius, & nostri nomine græcam vocem exprimente appellant.

Porro Manardus his adstipulandum esse iudicauit, qui volunt Coronopum Dioscoridis eam esse herbam, quæ vulgò dicitur Herba stella. Nos Coronopum siue Cornu ceruinum vulgò, Spicâ Plantaginis vocamus. Refert Cæsalpinus & alteram Herbam stellam, quam nos Coronopum serpentinam, alij verò filulestem, cognominant. Est præterea Coronopus Massiliensis Lobelij, serpentinae fortè varietas. Coronopus serpentina omnium minima. Coronopus maritima Rainaudeti. Coronopus maritima nostras. Coronopus Ruellij, siue repens: Eodem nomine etiam

etiam insigniuntur: *Plantago marina*, *Catanan-*
ce quorundam. *Ranunculus*. *Caltha aquatica*.
Gramen dictum Dens canis; *Capriola*, *San-*
guinaria. *Galiopsis maior*. *Atractylis*. *Carduus*
stellatus. *Cedrus lycia*.

CORONOPVS SIVE CORNV
ceruinum vulgò, spicâ Plantaginis.
CAP. IV.

Descriptio **V**T plurimum tenuis est radix, adultior ta-
men digitali crassitudine reperitur, alba:



vix villo ex-
cellenti sapo-
re, exceptâ ad-
strictione: fo-
lia statim à ra-
dice, crebra,
longa, angu-
sta, hirsuta,
nervosa, in la-
cinias aliquot
laterales, ceu
ceruini cornu
ramos, vnde
nomen, diui-
sa, sapore non
nihil adstrin-
gente: inter
hec caules sur-
riguntur Plā-
taginis, rigi-
duli, tenues,
teretes, hir-
suti, dodianta-

les & cubitales, thyrsulum plantagineum susti-
nentes, flores & semen Plantaginis proferen-
tem.

Qui spontè provenit, folia per terram spar-
git numerosa, in orbem, Coronopi vulgaris mo-
do diuisuris, & lacinijs crebrioribus, longiori-
bus, rigidis pilis hirta, eoque nomine ferè inca-
narin umbilico ad foliorum veluti radiorum in
centro concursum multa lanugo mollis candi-
da: caules complures palmates & dodrantes,
rigidi, asperi, hirti, spicam gerunt Coronopi vul-
garis spicâ similem: radix singularis, fibrata,
crassitula, mediocriter longa, lignosâ matrice
facta.

Tabern. Icon. Coronopus, Pes cornicis &
Stella maris. Gesn. hort. Coron. verus, Herba
stella Italarum. Anguill. Coronop. in multis I-
taliz locis vocatus Herba Stella. Lob. in Adu.
Coronopus [sic etiam in Obs. p. 139. in Ic. Plant.
p. 437.] Cornu ceruinum. Cordo in Diosc. Coro-
nop. vera: Ejd. in Hist. Coronop. sativa.

Fuchsius Coronopum vocat, ac inter alia hæc
addit: Κορνόπους, ἡ ἀσέλιον Græcis, Pes cornicis &
Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis inco-
gnita herba: Germanis commodè *Kraen*: aut
Rappensues: Gallis *Capriole*, ou *Sanguinai-*
re, ou *Dent au chien* appellari potest. Coronopus
autem non alia ratione dici cœpit, quàm quòd
cornicis pedem effigie repræsentet. Sanguina-
ria verò, Sanguinalisue vocata est, quòd sangui-
ni sistendo apta sit herba. Sunt qui Herbam stel-
læ nominant, alludentes haud dubiè ad græcam
appellationem Astrion. Nonnulli quòd fo-
lium eius multipartitè confectum, in ceruini
cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu
Tom. III.

vocarunt. Ex Dioscoridis descriptione, etsi con-
cisa admodum, satis liquet, herbam hanc esse
Coronopum &c. In editione autem eius gallica
Lugdunensi annotatum legimus nomina *Ca-*
priole, *Sanguinaire*, ou *Dent au chien* ad hanc her-
bam non pertinere.

Dodonæus [qui in hist. gall. ob dissimilitudi-
nem veterum Coronopi, Pseudocoronopon vo-
cat, gall. *corne de cerf*, & quibusdam in locis, *her-
be de la comtesse*] Fuchsio cōtrariatur his verbis:
Herba stella, siue Cornu ceruinum ad Plantagi-
nes accedit, nasciturque locis incultis, aridis, a-
renosis, secus vias: In Italia, Germania vtraque,
Gallia, tum & alibi frequens reperitur quando-
que in hortis, vbi ampliter luxuriat. Spicæ eius
eodem, quo Plantaginis, tempore conspicuæ.
Herbam stellam non pauci nominant: sunt &
qui Stellariam nuncupent; stellaria tamen &
Alchymilla à recentioribus dicitur: est & Aster
Atticus stellaria. Dicitur verò à Bel. *Hertzho-*
ren, & alicubi *Grauthe* & *Graunne cruyt*, i. e.
Comitissæ herba: Hisp. *Guabelha*: Germ. *Cra-*
yenfus, quod illi nomen à Leonhardo Fuchsio
putatur inditum, quòd Coronopum Dioscori-
dis esse indicauerit, veluti & nonnulli post eum
alii. Κορνόπους siquidem Cornicis pedem, i. e.
Crayenfus sonat: non tamen hæc Dioscoridis *κο-*
ρνόπους est. Neque enim oblonga herbula est, nec
villo modo repit, viticulosus cauliculis destituta,
quibus serpat: folia tantummodò per terram
steruntur. Coronopus autem herba exigua, o-
blonga & serpens, vti Dioscorides & Plinius te-
stantur. Atque hanc ob causam Herba stella ne-
quaquâ pro Coronopo haberi poterit. Sunt ta-
men inter reiectaneas Coronopi appellationes,
quæ non perperam Herbæ stellæ conueniunt, vt
sunt *ἀμύρος*, siue Arenaria, quòd arenosa amet
loca: *ἀστὴρ*, quòd stellæ siue astri modo per ter-
ram spargatur: & Sanguinaria, quòd arenosa ad-
uersus sanguinis qualdam profusiones perutilis
habeatur. Sed nomina hæc pluribus stirpibus
communia, qualia, præsertim inter nothas voces
Dioscoridi ascriptas, haud rarum est reperiri,
magni minime sunt facienda.

Marardus tamen ijs ad stipulandum iudicauit,
qui volunt Coronopum Dioscoridis esse hanc
herbam, quæ vulgò Herba stella dicitur. Quin
& Matthioli huius opinionis sectatores non
solum, nihil falli existimauit, sed eò adductus
fuit, vt crediderit Coronopum tam Theophra-
sto, quàm Dioscoridi idem esse; vocarique Ita-
licè *Coronopo*, quod tamen in comm. Ital. non
ait. Existimat præterea Coronopum speciem ef-
se Plantaginis. Non placet autem nomen galli-
cum *Capriole*, quod in Epitome cum Camera-
rij additionibus adeptum, & repositum, *Corne*
de serf ou *Sanguinaire*, quod ipsum postremum
non probò.

Camer. hort. vocat Coronopum sativum, in
acerarijs vtilem, *hirschenhorn Salat*. Turn. Co-
ronopum aut Coronopodium, Angl. *Crowd*
foote Plantayne, & Silaginem Gazæ.

C. Bauh. phyt. & pin. Coronopum i. siue horten-
sem, Coronopum Tragi, Anguill. Lac. Lon.
Tabern. & Eystettensis, sativum Cæsalpini, Cor-
nu ceruinum Gerardi. Item phyt. Coronopum
2. siue syluestrem, hirsutiorum, Coronopum sylu.
Coronopum sylu. Cæsalpini, Coronopum Pro-
chytæ, Columnæ.

Castor huius Coronopi duas habet figuras
quarum vna malè posita est pro Coronopo syl-

Locus &
Tempus

uestri, vt ipsemet Castor in fine libri annotauit.

Coronopum spontaneum Montpelij tantum obseruari, vbi passim prouenit. Lugdunū in hortis seritur, florētq; Maio. Gener Cherlerus circa Gramontium maritimi tractūs collegit. Copiose nascitur circa Shene iuxta semitas & in aggeribus maritimis. Meus Dioscor. Græcus (inquit Turn.) habet *ῥαῖον*. Ruellius videtur legisse *ῥαῖον*, quod magis placet: nunquam enim circa domos, sed in aggeribus, quos Græci vocant *ῥαῖον*, frequentissimè vidi. Seritur in hortis, & spontè nascitur in incultis & secus vias, teste Cæsalpino. Quæ autem seritur, angustiore folio constat, mollior, & rarioribus appendicibus gratior: syluestris hirsutior, folijs profundius lacinia, Erucæ similitudine.

Vires &
vires

Quia folia sapore dulci & adstringente, idè cruda in cibis recipiuntur. Modus autem apparandi, & post leuem coctionem in aceraria indendi, durat etiamnum in Gallia & quibusdam Angliæ locis. Prodest nephriticis in olerè, aut cibo sumpta: non tamen calculum atterens aut expellens, sed renes debiliores roborans, caloremque eorum contemperans: sanguinis verò ex his eruptiones cohibet etiam ac sistit. Cæterum, herba manifestè adstringens, frigida & sicca, Plantagini facultate accedit.

CORONOPVS SERPENTINA.

Descriptio



Insignis crassitudinis & longitudinis est radix, in capitula aliquot sub inde diuisa: ex qua foliorum seges magna pululat, longitudine Coronopi esculenti, sed latitudine trientem aut quadratam non adæquatum: caules inter ea plures palmares & altiores, nudi, enodes, thyrsi Coronopi insignes.

Icones

Quæ à nobis pingitur desumpta est ex planta Cherleriana. Variè autem videtur herba ludere, eiusque lusus exhibitos nostrâ ac Lobelij tabellâ, itèmq; Matthiolinâ.

Synonyma

Lobelio in Adu. pag. 17. Serpentina vernaculè vocata, Matthiolo Holostium putata, p. 186. Serpentina Matthioli, Holostij species. p. 187. Serpentina, nō Coronopus, sed potiùs Holostium. Est enim folijs gramineis aut Vetonice syluestris humi procumbentibus: radix lignosa Vetonice Garyophylleæ, semine & spica Holostij Montpelici, aut Coronopi vulgaris: prouenit in montibus Galloprovinciæ, Aruerniæ & passim in Italia. Huic altera, tora similis, nisi habitioribus folijs, flosculis, cauliculis incanis & hirsutis foret: Apenninis montibus & in Delphinatu repertu facilis. Hac ille qui mihi videtur obscurior. Cur ad Holostium refert plantam p.

Lobel. re-
preh.

187. quam pag. 17. cum Holostio non conuenire dixit. Cur etiam Serpentinam, ei plantæ, quam Coronopum vocat, demptis lacinijs, simillimam facit, posteaque longè disparem ait?

Matthiol. in prioribus comm. Serpentinam *Serpentina Matth.* depingit, sed nō describit, in Epit. verò cum addit. Camerarij Coronopum syluestris, & *Herba stella saluatica*, Italicè nominauit. Dodonæus in fol. lat. figuram habet nomine Serpentine Matthioli, describitque pro Herba stella altera.

Gerardo Coronop. syluestris: Gesn. hort. Lob. Synon. in Obs. p. 240. Coronop. silu. Serpentina Tab. Coronop. silu. siue Serpentina H. Lugd. pag. 669. Coronop. silu. siue Serpentina Matthioli Lob. in Ic. p. 439. Coronop. in montibus nascens inter saxa: & altera in ædificijs, simplicior, Cæsalpino. C. Bauhin. phyt. & pin. Holostium 6. siue strictissimo folio maius.

Figuram satius Coronopi Castor malè posuit *Castor* pro Coronopo syluestri, Herba stella syluatica, & Serpentina, quod ipsemet in fine Herbarij annotauit.

Matthiolo teste Serpentina prouenit in Goritienfi agro diluto extenuatòque solo, non longè à Sontij fluminis ripis, & alijs etiam in agris. Geneuæ habui in horto delatam ex propinquis montibus, florentem Maio & Iunio. Frequens in Etruriæ *Montacuto*.

Matthiolus Coronopo suo eximiam tribuit vim contra ictus & morsus venenatos serpentum: dantur autem eius puluerati drachmæ 2. ex vino albo: hoc remedij genere multi euaserunt subito, ab eiusmodi virulentis animalibus vulnerati, quemadmodum ego ipse certò obseruauit. Eiusdem radix in vino albo decocta, hydropicis vtiliter propinatur, diebus aliquot continuis manè, & sudoribus postea vacandum: Semen ex vino austero aut aqua Portulacæ haustum, omnem alui fluxum sistit ac hæmoptysin: consuevit etiam herba in vino rubro aut aceto coqui, & ius calidum in ore teneri, contra immensos dentium cruciatus.

CORONOPVS MASSILIENSIS LOBELII
Serpentinæ fortè varietas.

Densissimo sparsòq; foliorum stipatu luxuriat, Sedi minimi faxei montani, vel Pinastris ritu, positu, & rigiditate, innumera etiam sobole cauliculorum, dodrantalium, semè pusillum, Plantaginis aut Serpentine vulgaris, spicis includentium: Radix longiuscula, lignosa, crassior, gustu nonnihil calida, aromatica.

Coronopi & Sedi montani mediam plantam Massiliensem [vt vocat Lob. in Adu. p. 187. Obs. Belg. p. 525. Ic. Plant. p. 438.] nouam antiquis & neotericis

neotericis indictam, visum fuit subdere, cum propter nonnullam inter se similitudinem, tum propter eisdem natales maritimos. *Mibi sanè* videtur iconem ex Lobelio hinc appositam esse luscum Coronopi Serpentinae, & non respondere descriptioni Lobelij, quæ videtur convenire nostro Coronopo maritimo.

Tabern. Coronopus Massilioticus, *Marsilischer krahenfuss*. C. Bauh. phyt. & pin. Holostium 8. siue Massiliense. Coronopus Massiliensium Hist. Lugd. Coronopus siue Serpentina minor Gerardo.

Collibus & cautibus Massiliæ vicinis ad maris allusiones, inter Tragacanthum passim luxuriat.

CORONOPVS SERPENTARIA omnium minima.

Descriptio.



Coronop⁹, cuius figuram hic damus, factam ad plantam siccam, à nobis Iunio mense Burmij Rhætorum collectam, radice est crassa: caulibus verò & floribus Coronopi serpentinae: sed foliis latoribus. Representatur sanè figura Lobelij, in qua tamen non placent foliola cauliculis appicta quæ in nulla harum plantarum vidimus.

Serpentinam omnium minimam [ut vocat Lobel. in Obs. p. 240. in Ic. Plant. p. 439. nullatenus à superioribus distare ait, præterquam exilitate; coliculis enim vix vnciam æquare & sesquinciā.

Tabern. dicitur Coronopus minor, Serpentina minor, *kleiner krahenfuss*, *klein schlangen-Grass*.

C. Bauh. phyt. & pin. Holostium 7. siue strictissimo folio, Serpentina omnium minima Lobelij, Dodonæi & Lugd. Coronopus siue Serpentina minima Gerardi. Coronopus altera in ædificijs Cæsalpini. Quod verò Lugdunensis cen'eat, inquit, nullatenus à Coronopo Serpentina distare præterquam exilitate, dubito: quod verò opinetur eam esse, quam Pena pingendam curavit, & quam Monspelienfes Holostium sint suspicati, omnino fallitur, cum tres distinctas plantas habeam, *Hæc frater* in phyt. Dubitamus nos an tres plantæ, quas figuris exhibet Lobelius, ab invicem sint distinguendæ, vel non potius varietates. Quæ de exilitate dicit Lugd. desumpta sunt ex Lobelio, nec idèò culpandus. An Cæsalpinus eandem tradat cum Lobeliana, dubito: dicit enim lanuginosam, Lobelius verò hirsutam,

In cellis montium iugis sterilibus Seuenæ in Gallia Narbonensi copiosè provenit.

Tom. III.

CORONOPVS MARITIMVS Rainaudeti.



Coronopi ^{Descriptio} maritimi nomine misit ex Prouinciæ Aix ad nos Rainaudetus Pharmacopæus plantam, cui radix sesquipalmaris, crassa, fusca, sicca, insipida: è qua innumera oriuntur radiorum foliorum stellæ, tali verò fere dispositione, quam in Phyllo Dalechampi videmus,

vel Erica Matthioli, confertiorum, repandorum, semenciâ breuiorum, angustiorum, quàm Serpentinae Matthioli: radiorum umbilicus totus villosus, Lupini latitudine, è quo coliculus exit vncialis, nudus, hirsutus, thyr'sulo fere totus obses.

Coronopus à nobis nunc descriptus optimè conuenit cum descriptione plantæ, quam Lobelius in Adu. pro Coronopi & Sedi montani media planta Massiliensium proposuit.

CORONOPVS MARITIMA NOSTRAS.



Radix breuis, nigricans, crassa, fibris aliquot donata: folia quàm in Coronopode vulgari strictiora sunt, longeque crassiora & succulentiora, interdum penè iunceæ, quadrantaliam, ac etiam palmariam, sapore salso: flos purpureus, spicatus, vulgaris, ut semen.

Cam. hort. Coronopus marinus: Lob.

in Adu. Plantago marina: Dod. gall. Tabern. & Ger. Plantago maritima. Gesn. hort. & app. itemque H. Lugd. Plantago maritima. C. Bauh. phyt. Plantago 13. siue angustifolia maritima. Eid. pin. Coronopus 3. siue maritima maior: Babinella Cæsalp.

Monspelij iuxta mare mense Augusto fleret, inde verò delata Montbelgardum, floruit Iunio & Iulio: semen maturuit Augusto. Terrâ gaudet salis, aggeribus & littoribus salis Zelandiæ & Bergis ad Zoom copiosa.

LII 2

MYOSVROS.

CAP. V.

Descriptio

Fibras numerosas pro radicibus habet, unde folia germinant multa graminea, trium quatuorve vnciarum, angusta admodum: coliculi vix altitudine folia excedant, enodes, teretes, nudi, flosculos in cacumine gestantes, muscosos, herbacei coloris, paulatim sese explicantes, succedente clauâ diarum triumve vnciarum, tereti, mucronata, granulis multis compactili, caudam murinam affabre mentiente.

Synonima.



dam murinam affabre mentiente.

C. Bauhin. in phyt. & pin. Holostium 9. siue Holosteo affinis, Cauda muris: Coronopus siluestris Tragi: Myosuros Dod. gall. [qui holostium negat, & Denticulam canis Ruellij:] Myosuros, cauda muris. Lobel. Adu. & Ic. Pl. p. 440. Myosuros cauda murina Tab.

Myosuros quorundam Thalia. Cauda muris Dod. lat. Lob. Obs. pag. 241. Camer. & Gerardo. Holostium Botan. Francofurt. Holostium Dioscoridis, Denticula canis Ruellij, & Gramen molle Lonicero. Holostium Loniceri H. Lugd. p. 189. Eid. p. 128 Cauda muris.

Nomina, linguar.

Perappositè autem à recentioribus *μυὸς οὐρα*, ἢ *μυὸς οὐρ* vocatur herba, Latine Cauda muris, vel murina: germ. *Mantzschuvantzlin*, *raufentkorn*, & *Messgrass* Belg. *Mursensteerkens*. Gall. *Quene de souris* Anglis *Blod strange*.

Locus.

Pinguibus agris & pratis gaudet. Aprili mense floret: Maio semen maturum est.

Vires.

Refrigerat, nec multum à Plantagine viribus differt. Gustu Plantaginis esse scribit Pena, Lobelius legit gustu Hydropiperis.

CYNOPS, CONOPS, CVLIX HERBA Veteribus.

CAP. VI.

Thoph.

Oculus canis.
Canaria.
Conops.
Culex.

Cynops apud Theophrastum lib. 7. hist. c. 8. numeratur cum spicatis: germinat post æquinoctium primis imbribus. Theodorus modò Oculum canis venit, modò Canariam. Hermolaus legendum esse suspicatur Conopa, & non Cynopa, ut intelligatur herba Culex appellata: nam Græcè Conops culicem significat, de qua herba reperitur apud rei rusticæ scriptores [Plinium lib. 19. cap. 5. Cassianum lib. 12. cap. 19. Hermolaum lib. 2. Coroll. 366. Othonem Brunsell. in O-nomast. med. Constantinum Lex. græco. Gesu. in cat. pl. Idem lib. 1. Quadr. de cane agens per integrum fere folium tractat de Conopo Theophr. eumque Psyllion esse probat, plurimis adductis rationibus, contra secus sentientes:] Cucumeros

nasci sine semine, si farinâ eius herbæ macerentur semina.

Apud Plinium quoque lib. 21. c. 15. & 17. inter Cynops eadem spicatas Cynopsis mentio reperitur, Culinis verò herbæ lib. 19. cap. 5.

Cæsalpinus Culicem herbam censet Conizam, Coniza, deriuato nomine à Conope, quoniam culices abigat, ut Dioscorides testatus sit.

PSYLLIVM VETERIBVS.

CAP. VII.

Descriptio

Psyllium [*ψύλλιον* vet. add. ἡ κυνοκεφάλιον] Dioscoridi folio est Coronopidis, hirsuto, at longiore [*μακροτέρη*: addendum hoc annotauit Goupylus ex utroque antiquo, quod in vulgato exempl. desiderabatur:] ramulis dodrantalibus, totaque herbula fœni modo tenuis ac minutula. Coma verò ipsius à medio caule ducit initium, capitulis duobus tribusve [aut pluribus, addit vet.] conglobatis: in quibus semen pulicibus simile, nigrum atque durum. Nascitur in aruis & incultis. Vis ei refrigerans: articularum morbis, paroidibus, tuberculis, œdematis, luxatisque, & capitis dolo i cum rosaceo, aut aceto aquaue impositum auxiliatur. Infantium quoque enterocolis ac eminenti umbilico illitum ex aceto medetur. Acetabuli verò mensuram tritam in duabus aquæ heminis macerari oportet, ac ubi sese aqua densauerit, lentoremve contraxerit, illini. Siquidem vehementer refrigerat: sed & in feruentem aquam immissa calorem reprimat: denique & contra erysipelata est efficax. Fama est, si virens herba domum importetur, pulices arceri. Tusa porro cum adipe, sordida malignaque vlcerâ repurgat. Succus fluxione infestatis ac vermiculosis auribus ex melle prodest: Idem de lethaliibus autor est potum totius corporis frigiditatem inducere, & torporem cum exolutione & mœrore: contra hoc auxiliari omnia, quæ contra potum Coriandrum.

Psyllij semen maximè in vſu est, inquit Galenus, ex secundo ordine existens frigidorum. Verum in siccando & humectando medium quoddammodò est & moderatum.

Phyllion [referente Plinio lib. 25. cap. 11.] alij Cynoides, alij Crystallium, alij Sicelion, alij Cynomion appellant, radice tenui, superuacua, samentosum, Fabæ granis in cacuminibus, folijs canino capiti non dissimilibus, semine autem pulici, unde & nomen: hoc in bacis: ipsa herba in vineis inuenitur. Ei vis ad refrigerandum & discutiendum [ita ἀποκερυσσίνην δύναμιν reddidisse videtur, id est vim repellendi: alioqui enim διαφωρητική, est vis discutiendi: & hæc per calida fit, i la per frigida [ingens: semen in vſu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura, sextario aquæ densat ac contrahit. Tunc terere ac crassitudinem illinire oportet cuiusque dolori, & collectioni, inflammationique, tenesmo in aqua cum radicibus medetur. Omnibus articularum morbis salutare est huius semen madefactum in aqua, admistis in heminam seminis duobus resinæ colophoniz cochlearibus, thuris vno.

Psyllium inter nothas Dioscoridis appellationes ab aliquibus Cataphysis [*κατάφυσις*] ab alijs Cynoccephaliō [*κυνοκεφάλιον*, quasi caninū caput:] alijs Crystalliū [*κρυστάλλιον*]: alijs Cynomuya [*κυνόμυια*, quasi Canina musca:] alijs Psylleris [*ψύλλης*]: alijs Sicelioticon [*σικελιωτικόν*, quasi Sicula

la herba] nuncupatur. A Siculis Conidiis] *κονιδίαι*:] Romanis Silbacium [*σιλβάκιον*] seu Herba pulicaria, Aphris Vargugum appellatur. Crystallij porro nomenclatura à viribus notisque eius facta est: quā indicarunt, qui eā vñ sunt, crassescendi densandique vim, quam ea habet: Crystallum enim glaciem Græci vocant, quæ in lapidis duritiem concreta densatâque frigore aqua est. Illi simile aliquid Pulicaris huius herbæ liquor habet, vt ex Dioscoride & Plinio patet.

PSYLLIVM MAIVS ERECTVM.

Descriptio.

Multis fruticat ramis, hirsutis, teretibus, variè diuaticatis, per quos folia incondita, graminea, tomentosa, summus caulis ramorumque extrema crebros producant pediculos, umbellam quodammodò mentientes, quorum singulis capitulum insidet imbricatum, Plantaginis, crassius, breuius, squamis maioribus, floribus similibus: semen lubricum, lucidum, nigrum, pulicis effigie, mansu aut maceratione mucilaginem abundè red lens: radix exigua, fibrosa. Est exilius & habitius.

Synon.

Ψύλλιον Græcis, *Psyllium* Latinis, vt Trago, Matth. Fuch. Turn. Cordo in Diosc. & Hist. [vbi annuam hanc speciem describit. Ei autem vt existimo, incuriâ typographi addita figura Conizæ: quamobrem quicquid scribat Lobelius, particulare *Psyllium* non habet hoc loco Cordus.] Dodon. Gesn. hort. Lob. in Adu. Obs. p. 239. Cast. & Gerardo. *Psyllium minus* Cæsalp. secundum Anguill. primum Tab. *Psyllium alterum* C. Bauh. phyt. Eid. pin. *Psyllium* 3. siue maius erectum. *Pulicaris herba* Lob. Ic. Plant. pag. 436. *Psyllium* Matthioli H. Lugd. p. 117 2.

Nem. lingu.

Germanis *Psyller kraut*, *flobe samen oder kraut*: item *flobsamenkraut*. Belgis *Vleycrwt*. Gallis *Herbe aux puces*, i. e. Herba pulicum siue Pulicaris herba. Italis *Psillo*. Hisp. *Zargatoni*. Angl. *fleeuorte and fleeseede*. Boh. *Chmeleyck*. Arab. Serap. Bazarâ chatona, Auerrh. Bescartoron seu Bezercorhume. Ægypt. *Chetum*.

Locus

Spontè Narbonensis & Gallo prouinciæ vruata proscissaque arua operit & infernit: Ac etiam inter oliueta, sabulosa que serobes Monspeliani agri prouenit, exilioribus ramis: Littora verò sabulosa maritima lubenter sedatur maritimum, habitiore sed non dissimili aspectu, referente Lobelio. In campis aut incultis locis subinde exire scribit, feri & quandoque semel satum facillè aliquot deinde annis recurrere: Pro loci natura non rarè lætius, præsertim circa maritima, gigni, alibi minus. In Germania & Anglia obseruauit Turnerus, verum semper hortense. Monspelij florentem vidi in Autumno & Vere: in Italia inter Bononiam & Florentiam, itémque inter Vincentiam & Villanouam, Aprili. Geneuæ abundat vigens Iunio, & virens adhuc Ianuario, & perferens Hiemem cum floribus. Lugduni cum semine Septembri & Octobri à Ainay & ad Rhodanum prope ædes. *Psyllium* copiosissimè prouenire in Ægypto auctor est Alpinus.

Vites & Vitis.

Psyllij semen vsui in medicamentis arteriacis, & bilem siue præparantibus, siue educantibus. Seminis & herbæ mucaginosis & lactei cremoris similis succus ad purgandam choleram etiamnum à Lobelio commendatus. Expertus sum ego mucaginem seminis in penem iniectâ, ardorem eius sedare. Aqua, inquit Dodonæus,

Tom. III.

in qua semen *Psyllij* quassatum, siue agitatam, maceratū nque fuerit, donec lentorem contraxerit, omnes inflammationes sedat: ardentium febrium calores mitigat: sitim restinguit: & in ore detenta asperitates linguæ lenit: Interaneorum ex acrimonia humorum dolores tollit: dysentericis, & quibus intestina, aut vesica, exulcerantur, utilis, vtilior verò etiam ex semine antea tosto. Alium & hæc mollit, clementerque subducit, præsertim Saccharo aut Iulepo ex violis addito, vel potius ex infusione frequenti dilutè rubentium Rosarum, quo modo in ardentissimis febribus vtiliter exhibetur. Verum non nimis crebrè hac mucagine vtendum admonet Serapio, & post eum Fallopius, stomachum siquidem offendit, frequentique ac nimio vsu subinde syncope aut animi deliquium etiam succedit, vñ cum mortis periculò: quia nimium eius venenosum, vt ait, est: quod non modò Græci, sed & Auicenna testatur. Seminum apud Ægyptios vsus est, præsertimque mucilaginis ab ipsis paratæ cum aqua rosacea in omnibus febribus biliosis, ardentibus, inflammationibusque pectoris, vt in pleuritide, & peripneumonia, sed extrahunt cum aqua Hordei, & cum Saccharo candido exhibent: in aqua rosacea extracta *Psyllij* mucilage ij vtuntur in biliosis diarrhæis & dysentericis, atque omnes externas inflammationes, emplastri aut fomenti modo, tum ex viridis plantæ foliis, tum ex seminibus *Psyllij*: tota planta vtuntur.

Noxæ.

Gatin. not.

Corn. not.

Psyllij mucilaginem commendat Gatinaria in dolore capitis calido, malè existimans exteriorem partem admodum frigidam, interiorem calidissimam & vesicatoriam. Cornarius itidem *Psyllij* substantiam medullæ interioris calidam & siccam in quarto gradu pronunciauit: itémque venenum esse. Sed quā ratione sit venenum non docet. Arabes quidem ponunt in *Psyllio* duas substantias diuersas, vnam in cortice, alteram in medulla, sed de ea diuersa substantia nihil dicunt Græci, quamvis ipsi frequenter vsi sint & cortice & medulla.

PSYLLIVM MAIVS SVPINVM.



Isdem in Locus Descrip. tractibus, sed maginibus & squalidis Oliueta- rum incultis collibus, samentosus lignosusque proluxa foliorum & surculorum caudata, comosaque sceturâ densissima implexa fruticat, & rep- tando cæpi- tem ornat læ- tiore aspectu, sed hirsutie ex viridi albi-

cante. Semine haud dissimili: sed maiore fuscò- que, siue Castaneæ corticis colore: radice ligno-

LII 3

Synon.

sâ durâ, fibrarum proceru prolixâ.

C. Bauh. phyt. Psyllium 1. siue maius: Eid. pin. Psyllium 2. siue maius saporum: Psyllium alterum Matthiol. Cast. H. Lugd. p. 1173. & Tabern. Psyllium perenne Gesn. hist. Obs. p. 239. Ic. Plant. p. 437. Psyllium 3. Anguillare, maius Cæsalp. Psyllium semper virens Gerardi.

Psyllium Indicum foliis crenatis.

Descriptio

Radice est oblonga, tenui, fibris capillaris: caule circa radicem lignoso & rufescente, rotundo, subaspero, pedali, in frequentes ac foliosos ramulos diuiso, qui capitula plura, duodena, squamata sustinent, è quibus flosculi pusilli, pallide lutei, lanuginosi relucens: semen nigricans, paruum, splendens, succedit: folia habet oblonga, angusta, acuta, crenata, instar foliorum Coronopi, nonnihil laciniata: hirsuta: ex semine Psyllij Indici nomine lato in horto aliquoties flores, enatum auctori C. Bauh. qui in prod. Psyllij primi nomine describit. In pin. vocat Psyllium 1. Psyllium Dioscoridis, Psyll. Indicum crenatis foliis, & Psyllium primum Anguillare: *κνύστα* Theophrasti: Oculum canis & Canariam Gazæ.

PSYLLIO ACCEDENS GOTNE,
Rubrum quibusdam dictum.

CAP. VIII.

Descrip.



Vbi adoleuit, patula magis quam alta est plantula, gracilis, lignosa radice firmata: coliculis palmares, quoru pleriq; nonnihil reclinati, foliis vestiti paucis, vncialibus, Psyllij angustioribus. Idem verò rursus in aduersos diuiditur ramos, quorum diuinationi subiecta sunt fo-

lia prædictis similia: capitula Psyllij, multò breuiora, imbricata, non tantum fastigio ramulorum insident, sed etiam in cœtu ramulorum sessilia, vt in Gnaphalio vulgari: flosculis ex apicibus luteis succedit semen paruum relucens. Annua est planta meo quidem iudicio: nam quo anno sata est, florer, vt ipse vidi, licet alij aliter sentiant.

Psyllium minus.
C. Bauh. not.
Gotne rubrum
& album.

Fratri C. Bauhino phyt. [vbi tertium facit] propter totius plantæ cum Psyllio similitudinem, Psyllium minus appellari placuit. Ei Zvingerus Gotne rubri & albi nomine misit. Is tamen differentiam statuere videtur inter Gotne album & rubrum. Siquidem Alpinus hoc Gotne rubri nomine ad Camerarium misit: at nomine Gotne albi eam quam sub Holosteio tertio [Plantagini angustifoliae simili] proposui. Idem in prod. sensit & sub Psyllio secundo siue minore descripsit.

In pin. vocat Psyllium 4. siue minus, Gotne

rubri & Botrij rubri nomine acceptum, quæriturque an sit Kally tertium Alpini, minus rectè pictum? Cæterum, quam C. Bauhinus in prod. pro C. B. not. Psyllio minore pingit, descriptioni non respôdet.

KALLI TERTIVM ALPINO.
CAP. IX.



Folia constat paucis Aiuget foliis proximis, longioribus multò, caule singulari, non recto, ex quo tres quatuorue canaliculi qui rectâ sursum feruntur, in singulorum cacumine caput ex quinque aut pluribus foliis Chamæpity similib. deorsum inclinantib., & in arcum recuruatib.: in

Descrip.

quorum medio flosculi multi, Rosarum flosculis similes. Herba salsa, atque acri sapore linguam vellicante.

Descriptionis auctor vocat Kalli tertiam speciem, censetque reponendum sub Anthyllide secunda Dioscoridis.

Kalli tertium in Ægypto proueniens, vt aiunt multi, in puluerem redactum, ac per os sumptum, phlegma atque bilem exustam purgat: idem ex foliis succus expressus facit. Ex hac primò & secundò exsiccata & combusta cineres parantur, qui ad vitra atque alia conficienda, conferunt, testibus iis, qui ex Ægypto Venetias conuehuntur.

Locus

Vires

LEONTOPODION VETERIBVS
arque Cemos.
CAP. X.

Dioscoride auctore Leontopodion [*λεοντοπόδιον*] duorum digitorum herbula est, foliola *Disco. vari* habens arcta [*seva*: Ver. non legit] robusta, quaterpium ferè, aut etiam tertium digitorum longitudine, hirsuta, quæq; radici sunt proxima lanatiora [*sewa*: Ald. odoratiora: capitula in summis caulib. quasi perforata [*secta* ver. & Marcell.] in quib. flores nigri [*lutei* ver.] Semè verò vsq; adeò spissa lanugine obuolutum [*côuer*u difficile] est, vt ægrè deprehendi possit. Radix subiacet parua: quam etiam tradunt amuleti ratione alligatam ad amatoria prodesse, tuberculaque discutere.

Leontopodium Plinius ait lib. 26. cap. 8. alios Leucoron, alios Dorypetron, alios Thorybetron vocare: radicem eius aluum sistere, bilèmq; purgare, in aqua mulla, addito pondere denariorum duum. Nasci in campestribus & gracili solo. Semen eius potum, lymphatica somnia facere dici. Cap. 12. Semen in aqua tritum cum polenta, omnia infixæ corpori extrahere. Cap. 14. Semen in aqua tritum & cum polenta illitum, spicula sagittarum extrahere. Libro verò 27. capite 8. silendam

filendam censet Cemon [Eccemon CH.] propter vanitates magicas. Hoc autem apud Plinium valde alienum Leontopodium bilem purgare & aluum sistere. Mirum & illud, quod historiam hujus plantæ à Dioscoride prolixè tractam ne Plinius quidem attigerit. Cum Cornario & Sarraceno Leontopodium Plinij multum discrepare à Leontopodio Dioscoridis existimauit Dalechapius, idque vtriusque vires collatas ostendere. Placet & hæc opinio C. Bauh.

Galenus neque posteriores Medici Leontopodij meminerunt. Sed & quod Aetius & Apulejus Leontopodium nominant, non aliud quam Leontopetalon esse palam est.

Sarracenus Cornarium secutus λεοντοπόδιον Dioscoridis, Cemon Plinij esse suspicatur, tum quia vox ea in Dioscoridis nothis etiam inter Leontopodij synonyma reperitur, tum quia & Cemon ad amatoria prodesse innuit Plinius: quæ opinio etiam Marcello placet: non refragante Dalechampio.

Leontopodium verum hætenus non solum sibi, sed alijs quoque ignotum esse arbitratur Matthiolus. Sed ab omnibus in Italia ignorari falsò desinit. auctore Guilandino.

Equiuoca Cæterum Leontopodij nomine sequentes donantur apud varios auctores Plantæ. Pentaphyllum montanum. Pes leonis. Leontop. Candia. Gnaphal. Alpin. Gnaphal. aliud. Gnaphalio affinis. Gnaph. Fuchsi. Gnaph. virgatum. Pilosella phlomod. Scorpioides aquat. Caltha. Leontopetalon. Cyclaminus. Aquilegia.

LEONTOPODIUM CANDIÆ quorundam Psyllio affine.

CAP. XI.

Descriptio **R**adix nigra est, duriuscula, fibrata: ex qua folia emergunt pluscula, pedalia ferè, Plantaginis Alpine angustifoliæ, vel potius Sesamoidis minoris, sine tamen lacinijs tota villosa. Ad

radicem verò recuruis pediculis lignosis flores hærent villosi, quos capitula itidem sequuntur villosa, Psyllij similia, semen rotundum, oblongum, cinereum, Psyllio aliquantò majus continentia. Leontopodij 2. [vt vocat C. B.] phyt. & 3. inter icones, Creticum cognominatum, Holsteum 4. in

pin. accepit nomine Leontopodij ex Candia rari.

Leontopodium, quod tradimus, est Imperato planta Candiæ propria, quæ in omnibus respondet descriptioni Dioscoridis, inde Leontopodium legitimum inscripsit. Quidam Catanancem existimant.



Bellus tamen in Epist. ad Clusium contrarium tener. Cum arefcit, inquit, capitula in se contrahuntur ad speciem vnguium milui exanimati, vt in Catanance prima Dioscoridis: sed Catanance non est: nam folia Coronopi non sunt, neque semen Onobo simile habet. Si autem hæc duo haberet, legitima esset Catanance.

Dubitat Clusius an ad Plantaginis angustifoliæ, similitumque classem, hæc planta sit referenda, quam ex Italia Francofurti diuersâ appellatione insignitam accipiebat. Cortusius enim ipsi mittebat eam adhuc tenellam, vestigia tamen capitum adhuc retinentem, vnâ cum iconè, ipsam stirpem satis scitè referente, addito Catanances nomine. Iosephus verò à Casa bona ipsam plantam maturam & aridam, ac recens è Creta delatam, Leontopodij appellatione. Clusius autem diligenter conferens vtramque cum Leontopodij & Catanances descriptione, animaduertit notas aliquot habere satis inter se conuenientes vt fusè enarrat.

Iconem ex viuentè plantâ in horto D. Iacobi Zvingeri cum suis capitulis Septembri visa pingi curauimus.

Vtuntur hac vulgariter ad soluendos quos putant ex maleficio Venere vt non posse: nam herbâ super prunas posita, ter patientem nudum per fumum transire faciunt, & totidem viabus indusium eius fumigant: & sine dubio liberum à maleficio fore prædicant: Bello referente.

Vfus.

ELLEBORINE, EPIPACTIS, ET Damasonium in genere CAP. XII.

Epipactis, quam alij Elleborinem [ἐλλεβορίνην] & Borien vocant, scutex est pusillus [θαμνίσκος μικρός], pro quo vet. quidam πῶμα μικρὸν perquam exigua foliola [φυλλάκια. Ald. φύλλα] habens. Contra venena & iocinoris vitia pota prodest, auctore Dioscoride.

Peregrina Italiæ auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam lib. 10. cap. 20. numerauit.

Non satis autem descripta est, vt nostra ætate cognosci possit: nec cur Elleborinen vocauerit eam antiquitas, constat. Si nomen ipsum tamen expendatur, non abs re fuerit Elleboro similem aut congenerem credere.

Si contra, Theophrastum aliquis audiat lib. 9. hist. pro candido Veratro de ea sic tradentem: Miscetur autem in Ellebori poculo, vt vomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis, inquam, hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tam quia Elleboro congener sit, Elleborinen dici: sed quod Ellebori vim augeat, conjunctaque illi faciliores vomitiones faciat. Vtramque enim ex Theophrasto colligi causam arbitratur Marcellus.

Cæterum, vbi Theophrastus Elleboro albo, Elleborines herbula semen admisceri scribit, aliquam Saraceno suspensionem mouet, Theophrastum hoc loco per Elleborinem, Sesamoides intelligere.

Elleborinen suam Matthiolus non describit, sed tantum pingit, nec etiam Epipactidem aut Elleborinen astruit.

Gesnerus de Lunar. ait alios etiâ errare, qui aliam Ellebori nigri speciem [cui folia plerum-

que bifida aut trifida] Elleborinem appellant. Quibus quid intelligat, videant lectores. Elleborines nomine intelligi Elleborum nigrum siluestrem vulgarem putat idem de hortis. Idem rursus de Lunar. illos errare scribit, qui Consiliginem Elleborinen appellant.

Elleborinen quandam pingunt recentiores & Belgæ, quam Elleborinen Dodonæi inscribimus.

Inter Elleborines præterea consideranda veniunt: Damasonium alpinum siue Elleborines species floribus albis. Damasonium purpureum dilutum est Elleborine sexta Clusij. Damasonium alpinum floribus luteis. Elleborine ex albo sublutea. Elleborine siue Damasonium montanum quorundam angustifolium, flore violaceo. Elleborine ferruginea Dalechampi, quæ nobis est Damasonij species quorundam, siue Calceolus D. Mariz.

Ac pro Elleborine à nonnullis traduntur sequentes plantæ: Bifolium. Gentianula. Buphtal. Dodon. Lunaria botrytes. Herniaria. Centaur. minus.

ELLEBORINES SPECIES VARIE. CAP. XIII.

ELLEBORINE DODONÆI.

Descriptio



Numerosis fibris radicatur, albidis, quàm Hellebori habitioribus, & ad Rusci radices, accedentibus, sapore amaricante: caulis modò vnicus, modò plures pedales, aut etiam cubito altiores, nullis ramis donati, teretes, & farina quadam aspersi: quibus sine pediculo adnascuntur folia, Hellebori

albi instar nervosa, sed multis numeris minora, & vix ad foliorum Polygonati magnitudinem pertingentia, sapore itidem amaro: caulis à medio ferè ad summum vsque fastigium per intervalla alternatim floribus ornatur, Orchidum floribus non multum dissimilibus, quos constituunt folia bina albida, terna, herbacea, vtraque expansa, quorum medio ceu exenteratum muscæ cadauerulum ex albo purpurascens conspicitur: flori subest canaliculatum capitulum pediculo inherens breui, quo aucto semen clauditur minutissimum & pulvisculi instar.

An Damasonium calliphylon Cord. in hist?

Camér. apud Matth. germ. ponit figuram cum inscriptione Elleborines, dicens flores variare, & quosdam virentes esse, alios albicantes, alios rubellos, siue incarnatos, & rubentes, præsertim in Austria & Vngaria. In Epit. pingit sub titulo Epipactidis siue Elleborines. Quenam autem sit Helleborine Dioscoridis, difficile conjectu arbitrat.

Hæc herba appellata est à Dodon: gall. græcè *ἐπὶ ἀσκήν* quoddam Helleboro albo figurâ similis sit: latinè Helleborine & Epipactis. Quidam existimant quoddam Helleborine sit herba quæ Helleboro viribus duntaxat assimiletur, & nō figurâ. Sed horum opinio falsa cognoscitur, quoddam huic nec vnicam vim Hellebori Dioscorides attribuit. Idem in fol. lat. Helleborinen inscribit, ac ait: Helleborinen non improprie dici ac nominari posse, ipsa cum Veratto albo similitudo testatur: &c.

C. Bauhin. phyt. & in pin. Helleborine i. siue latifolia montana: Helleborine Dodonæi H. Lugd. pag. 1312. Helleborine recentiorum secunda, Clusij. Helleborine Gerardi. Epipactis latifolia, Eyst. Sigillum Salomonis, Cæsalpini: Foliorum amplitudine [& quod altera folijs oblongis acutis, altera verò subrotundis est] & floribus colore euarians.

In montibus passim occurrit Augusto, Septembri, & Octobri mense florens. Clusio provenit in opacis Galliz, Germaniz, Austriæ, & Vngariæ locis, etiam in Pannonia interamni inter Drauum & Sauum flumina. Præcocior est reliquis & Maio plerumque florere solet.

DAMASONIVM ALPINVM SIVE Elleborine, floribus albis.



Adsimilis est Helleborinæ: radices fibrosæ, tenues: caulis modò dodratalis, modò maior, modò minor, gracilis, foliis alternatim amictus, Plantaginis lanceolata, angustis, aliàs etiam vnciâ latioribus, sed Hellebori albi more striatis, nitidis: flores per caulis summam spicatum & velut Orchidum modo dispositi:

è sinu foliorum exiguorum singulares, maiusculi, lactei, longi calyces capitulo impositi, tribus in ambitu foliis prædicti, intra quæ duo alia minorahis verò oppositum tertium hians, & labellum luteum velut alis quibusdam munitum. Ex huius hiatus pistillus albus, nitidus, brevis, capitulum sustinet nitidissimum, tenerimum, oblongum, summa parte per longitud. hyli impressione notatum.

C. Bauh. phyt. & pin. Helleborine s. siue flore albo, vel Damasonium montanum latifolium: Tabern. & Ger. Helleborine albo flore: Eyst. Epipactis angustis foliis: Cordo hist. Alisma cymbalanthemon.

Reperta mihi in montibus ad S. Vrsinû flores Maio. Eademque etiam olim observata Tiguri. Genero Cherlero in syluaticis & vmbrosis littoribus maris Adriatici frequentissima & speciosissima observata.

Damasonium purpureum dilutum, siue Elleborine iv. Clusij

Cvitali caule, rotundo, geniculato, quem in singulis geniculis alternatim ambiunt angusta-

Descriptio



parte adnexam habens, æqualis ferè cum foliis longitudinis, candicans, intus striatum: sustinebantur flores anguloso, tortili, hirsutoque nonnihil capitulo: radix illi fibrata, sparsa, subinfescentis coloris.

C. Bauh. phyt. & Pin. Helleborine 7. siue montana angustifolia purpurascens: Helleborine 5. Clusij pann. 6. eiusdem hist. Damasonium tenuifolium Cordi hist. Damasonium alpinum H. Lugd. p. 1058. Alisma tenuifolium Thalij. Sigillum S. Matix 5. Cæsalp. Helleborine angustifolia Tabern. & Gerardi. Nos Damasonium H. Lugd. huc non referimus, flores siquidem inter alia conueniunt.

In Pannoniæ quadam silua, magno miliari ab arce munitissima Nemethviviur, aliisque Zolnok vicinis locis abundantissime nascitur. Floret hoc genus Iunio, nonnunquam etiam Iulio.

DAMASONIVM ALPINVM floribus luteis.

Descriptio

Radice est nigra, modicè fibrata, altius descendentem: foliis oblongis, angustis, nervosis, lanceolatae siue Plantagini minori similibus, aliquantò longioribus, acuminatis: caulibus pedaliibus: flore luteo: seminibus oblongis, angulosis, quaternis simul sic conjunctis, ut hiantem mediospatio fenestrata quædam meta appareat, apice nigro supereminente, elegantissimi figurâ, laternæ, quæ nondum cornu chartæ obducta est, clausæque simili, & huic plantæ peculiari.

Damasonium



Tom. III.

alpinum montanum Herbarij vocant: quidam Clymenum, folio Plantaginis minoris, folliculis Tridi similibus, fructu oblongo, citris polyorum non dissimili. Sed cum Damasonij nomen huic plantæ indiderint, haud constat. Quare liberum cuique aut id retinere, aut aliud verius sufficere: H. Lugd.

In Alpium vmbrosis conuallibus gignitur.

Elleborine ex albo sublutea.

Caulis surgit recto, sesquicubitali, plüsimus. Foliis vestitur pluribus, alterno situ positis, perfoliatis, latioribus quàm Helleborine flore albo, venosis & striatis, ut Hellebori albi, sed multis numeris minoribus, satüre virentibus. Caulis summa thyrsus occupat florum ex albo luteorum galea alba labello luteo & suberocæo præditorum: e quorum sinu pistillus firmus, crassus cum apiculis farinaceis: Ad quorum pediculos semina longos singula extrorsum conspiciuntur foliola parua, angusta, acuminata: Radix fibrata, ad Elleborum accedens, valde profundè radicata. Sapor amarus admodum in foliis & floribus.

An Damasonium alpinum H. Lugd. p. 1057. & 1058.

Observavi florentem mense Maio in limitibus Montbelgardensis ditionis versus Mathai arcem in vepribus, & in monte dicto Montbar.

Elleborine siue Damasonium montanum quorundam flore violaceo angustifolium

Damasonium hoc montanum, quod Dalechampi olim Clymenum denominabat, floribus est violaceis, ceteroqui Elleborine Dodonæi affinis planta, sed foliis angustioribus. Prope Genavam in colle la Bastie observauimus: item in monte Roisberg prope Malsmunster mense Octobri Helleborines flore violaceo meminisse Lobel. in Obs.

Elleborine Botpoudic seu Alisma racemosum.

Sesquidodrantalis est planta, caule geniculis discreto, ex quibus continuo ordine folia sua exerit, Plantaginem maiorem ferè imitantia, fescuciam lata: flores verò racematim quasi in longo recuruoque scapo dependent plurimi rubicundi.

Thalio descriptionis auctori dicitur Alisma Botpoudic seu racemosum: C. Bauh. phyt. & pin. Helleborine 2. siue atro-rubente flore: variat foliorum amplitudine: florum colore atrorubente, rariùs candido.

Frequens est multis in locis, opacis tamen & montium jugis.

Damasonium flore herbaceo, intus non nihil candicante

Pari est cum Helleborine Dodonæi magnitudine, paulò latioribus foliis, minoribus floribus, qui etiam quinque, foliis constant, & galeolam cum prominente labro amplectuntur, colorisque sunt herbacei, interius nonnihil candicantis, nullius odoris, quibus torosa contortaque capita subfunt: radix nominatæ similis.

Clus. pann. Elleborine 2. Eid. hist. Helleborine recentiorum 3. C. B. phyt. & pin. Hellebori-

Minn

Locus. ne 3. angustifolia palustris siue pratensis.
Inuenitur in quibusdam Austria & Pannonia
ficcioribus pratis, & in Norimbergensi silua vrbi
vicina ad Latomias.

Elleborine flore carneo.

Synon. Huic minor est altitudo, similia interdum fo-
lia, nonnunquam multò latiora: flores aut om-
nino purpurascens, aut omnino, aut propè car-
nei, Elleborines Dodonzi floribus prorsus simi-
les: nec radix differt.

Locus. Elleborine 3. Clus. pann. 4. Eid. hist. Hellebo-
rine 4. siue flore carneo C. Bauh. phyt. & pin. Sig-
illum S. Mariæ alterum Cæsalpino.

Crescit in montanis pratis & cædis siluis
Austriæ.

Elleborine montana angustifolia spicata.

Locus. Elleborine 4. Clus. p. nn. 5. Eid. hist. Hellebo-
rine 6. siue montana angustifolia spicata cubita-
lem altitudinem superat, & amplissima omnium
sunt illi folia, atque oblonga purpurascens
florum spica.

Nascitur in multis Pannonia & Austria siluis,
& ad montanorum pratorum margines: sed nus-
quam frequentius, quàm in eâ silua, in qua Da-
masonij species, Calceolus D. Mariæ abundat.

Elleborine tenella, tribus in caule foliis prædita.

Descriptio. Non inelegans est Elleborines recentiorum hoc
tenellum genus, quod Gulielmus de Meta, Medi-
cus ex Italia rediens, observabat, & Clusio Fran-
cofurti donabat. Erat verò pedalis ferè altitudi-
nis, gracili caule, tribus foliis prædita, Ellebori-
nes vulgaris foliis formâ similibus, & quinque
nervis per longitudinem eorum excurrentibus,
sed longè minoribus, ut quæ circiter vnciam lō-
ga sint duntaxat, semunciam lata: summus cau-
lis in spicam florum desinit Elleborines vulga-
ris flores imitantium, sed minorum: radix sum-
mâ quasi tellure sparfa, crassiusculas succulentâ-
que fibras egerat.

Elleborine 7. Clus. h. 8. C. Bauh. phyt. & pin.

DAMASONII SPECIES QVIBUSDAM siue Calceolus D. Mariæ. CAP. XII.



DAmasonij
speciem
faciunt quidam
Helleborines
affinem herbâ,
foliis alterna-
tim per caulem
pedalem, illa-
rum similibus,
venosis, subhir-
sutis: flos sum-
mo cauli insi-
det plerumque
singularis qua-
tuor foliis atro-
purpureis de-
cussatis acumi-
natis, utrem
magnum ex lu-
teo pallentem,
lignipedum Fran-
ciscanorum ca-

lopodia imitatum, supernè aliquousque patulū
sustinentibus: siliqua pulvisculo, ut in Helle-
borinis & Orchidibus plena succedit: radix obli-
liqua sub terra agitur, numerosis fibris capilla-
ta, subinde caulium emarcescentium vestigia im-
pressa gerens.

Calceolum D. Mariæ spuris Orchidibus co-
gnatam plantam determinavit Ciusius, Ellebori-
nes recentiorum primæ titulo, eam describens &
depingens. Germani Marienschuch Pfaffen-
schuch appellant: Hungari Ezereth gymsiu, i.e.
Milleb onam herbam, quasi χιλιόδυναμις dicas, Milleb.

Gesnerus in epist. lib. 3. frequentem apud Hel-
uetios inueniri subscribit, luteūque florem illi
tribuit, Cosmofandalonque Pausanij suspicatur,
quod & Sādaliij formam referat flos, & punctis
ceū literis quibusdā notetur, et si Pausanias Hy-
acinthum esse conjicit, sed huic cum Sandalio
nihil. Quidam vir doctus Lonchitum primam
esse putat. Gesnerus verò de veteri nomine du-
bitat, & tamen ad Alismatis species refert. Fru-
ctus, inquit, semen, odor, sapor cum succo gluti-
noso & subacri, τὸ ὄρεον λεγομένης cognata esse
arguunt, et si radix testiculata non sit. De coll-
stirp. vocat Calceolam luteam: item postea, Cal-
ceolum D. Mariæ foliis Ellebori. De hort. A-
lismatis speciem quorundam, & Calceolum D.
Virginis vulgò dictum. Simlerus & Aretius,
Ancken balten /) Damasonij aliquam speciem.
Dod. hist. Flor. Damasonium nonnullis existima-
tum, Damasonium nothum: Lat. in fol. Calceo-
lum maritimum, cuius inscriptione duas exhibet
figuras, & vulgò Calceolum sacerdotis, germ.
Pfaffenschuch & Papen schoen appellari refert:
Existimari verò & à nonnullis Alisma siue Da-
masonū esse: sed minùs quàm Saponariam cum
eo conuenire. Folium quidem Plantaginis satis
respondere: sed desiderari capitula thylsi: florem
tenuem, inalbicantem, & radices Veratri ni-
gri similes.

De recentiorum Calceolo Mariæ (ut vocat in
Adu. & Obs. pag. 126.) siue Calceolo Mariæ &
Sacerdotis crepida, Damasonio notho (ut in Ic.
Plant. pag. 312. inscribit) hæc prodit Lobel. Pri-
scis etiam præterita videtur illa floris larua per-
quàm spectabilis, etiam plantagineis foliis, aut
Bifolij, quam nonnulli Alisma opinati sunt, vul-
gus Septentrionalium vnzer vrome i schoen/
vel Papen schoen, i.e. Virginis calceum, vel
Sacerdotis crepidam vocitat à floris effigie, quæ
quatuor costat foliolis dilurè purpurascens, &
rubetibus, sui è medio prominentibus utriculū
quendam purpureum, latus vacuum, rotundum,
fuci, aut atylonis cadauer, vel vnedonis caliculos
florum nonnihil referens, sed supernè, aut late-
re vno patulum, instar ctepidae oræ patulæ, quæ
inferitur pes: foliis Plantaginis, aut Alismatis in
longitudinem venosis: radice transuersa, nec al-
tè depacta, nec multum fibrosa.

Apud Amatum lib. 3. c. 158. ponitur ex figuris
Dalechampi pro Lonchitide prima, quamvis A-
matius scribat Lonchitidem vtramque sibi inco-
gnitam.

Camer. hort. Damasonium nothum Dodonzi:
Thal. Alisma ὀνδερμον aut κοκκινδερμον H. Lugd.
p. 1146. Elleborine ferrugine Dalechampi.

C. Bauhin. phyt. & pin. Helleborine 9. siue flo-
re rotundo, siue Calceolus: Alismatis species
flore ferrugineo Gesn. hort. Lonchitis prior Da-
lechamp. in Dioscor. Damasonium nothum
Dod. gall. Pseudo Damasonium Clus. pann.
Ca ceolus Mariæ Eyst. Flore est luteo, sed fo-
lia ad

lia adiuncta ferruginea: reperitur & albo, & vtriculo purpureo: apud Heluetios flore est duplò maiore, quàm apud Noricos.

Tempus. Intellexi, inquit Clusius, in Hercinia silva, præterea circa Fuldam, alijsque Germaniæ siluosis locis copiosè nasci. Ego Tiguri florentem observavi Maio: in montibus Genævæ propinquis Iunio.

De Calceoli autem Mariani facultatibus licet nihil occurrerit Dodonæo ad scribendum: vix pote non modò veteribus, sed nec recentioribus satis cogniti: Vulnerariam tamen herbam esse, plagasque recenter illatas sanare aiunt non pauci.

ALISMA TOSSANI CAROLI. CAP. XIII.



Caule singulari, cubitali, anguloso, glabro, fusco: cuius scapus in alas aduersas atque hæc rursum in alias surrectas omnes & in thyrsum fastigiatas diuiduntur: flores singuli in fident stellati, quinque radiatis folijs [rarissimè quatuor] constantes, ijsque acuminatis, internè ex dilutiore

cæruleo in albidum pallescentibus, strijs saturationibus longitudinem percurrentibus, quæ externa parte paululùm admodum apparent, in herbaceum declinante: in medio flore surrigitur vèrricosus nonnihil stilus, & quina stamina, Viola leuiter tincta, quæ nonnunquam repanda in foliorum interstitiis sese insinuant: porrò autem singulis florum folijs ad basim binæ seu pusillæ verrucæ violacæ adnascuntur: toti denique flori foliola viridantia radiata subijciuntur: folia per terram sparguntur, plantaginea, media inter Plantaginis maioris & Quinqueneruæ folia, alia cauli sine pediculo adnascuntur, angustiora, ex opposito sita, magisque acuminata, singulifque adeò thyrsi diuisionibus folia, sed minora, subijciuntur, ex aduerso posita: sunt ea verò pinguiscula, arrouirentia, glabra, per quorum longitudinem neruus decurrit rectus, alis vtrinque sinuatis: sapor gustanti amarus.

C. Bauh. in phyt. eius meminit, vt apud nos visò, nomine Alismatis primi, siue folio glabro. An autem eadem sit cum Gentiana Pennæi, flore punctato subcæruleo, vt idem voluit in Pinace, ambigimus.

Pulchram hanc plantam nobis jam descriptam ante annos plures ab insigni pharmacopœo Tossano Carolo accepimus, in Burgundiæ Champagnole locis aquosis collectam, quæ in hortum translata pluribus annis durauit, & quotannis floruit, & semen maturauit mense Augusto & Septembri.

Tom. III.

GENTIANA VETERIBVS. CAP. XIV.

Perisset tota Gentidis antiquissimi Illyriorum regis jam pridem cum nomine fama, nec esset regiæ eius fortunæ monumentum aliquod, nisi renascens quotannis Gentiana, gratâ inter homines memoriâ, honorem illi identidem augetet, amareque hominem & laudare, posteros cogeret, qui vt generi humano prodesset, in frigidissimis regionis suæ, ventosisque montibus, neglecto regiæ potestatis honore, herbas quærere, & inuentas nobis indicare, veritus non fuerit. Tam innocenter sibi, vtiliter verò alijs, tunc reges imperia tractabant, gaudente, vt patet, matre omnium terra, augentibusque vires suas herbis, quæ regum manibus foderentur. Gaudente etiam Medicina, quæ reges haberet auctores, eorumque dignitate suum & ipsa honorem & gloriam augetet. Quantò Illyriorum regi honestius hoc in laudibus suis audire, quàm Cæsari centum & nonaginta duo millia hominum occisa prælijs, qui maximus fortunæ & gloriæ eius cumulus est, in honorem suum fecisse? Et quos bello alij perdidit, inuentæ à se Gentianæ remedijs ad sanitatem instruxisse.

Nora igitur omnibus semper Gentiana fuit. Et Dioscorides ab inuentore Gentio Illyriorum regi Gentianam appellatam scribit: folijs proximè radicem (ab radice, Cæsalp.) Inglandi Plantaginæ similibus, subrubentibus, à medio autem caule, & maximè circa cacumen paulùm dissectis: caule inani [concauo] læui, digiti crassitudine, ac binum cubitorum altitudine, geniculis distincto, & maioribus ex intervallis folijs circumdato: semine in calycibus lato, leui [sine pondere] aceroso (paleaceo) ad Spondylii semen accedente: radice longâ, Aristolochiæ longæ simili, crassâ & amara. Nascitur in celissimis montium jugis, locis vmbrosis, aquosisque. Vis radici excafactoria & detergens. Cõtra venenatarum bestiarum morsus duabus drachmis cum Pipere & Ruta ex vino pota auxiliatur. Extracti succi drachma ad laterum dolores, & casus è sublimi, ac rupta & conuulsa prodest. Hepaticis quoque & stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita partus ejicit: impositaque vt lycium vulneraria est, & cuniculatim depascentibus vlceribus medetur, præcipuè verò succo, qui quidè oculis etiam inflammatione laborantibus illinitur. Miscetur & succus acrioribus collyrijs pro meconio [hoc loco meconium] (cum) pro [pro] legendum esse ipsa res monstrat. Non enim medicamenti frigidissimi loco substituitur, quod calidum & siccum est, H. Lugd.] Sed & radix vitiligines, alphas dictas, absterget. Porrò extrahendi ratio hæc est: Contusa radix ad dies quinque aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent, emineantque radices: ac vbi refrigit aqua, linteo excolatur, moxque discoquitur ad mellis crassitudinem, fietilique vase reconditur. Hactenus Dioscorides, in cuius nothis aliqui Ceutauream radicem, alij, Aloem gallicam, alij Narcen, alij Chironium, Dardani Aloerin, Romani Gentianam seu Cicendiam, alij Cyminalem vocant.

Plinius lib. 25. cap. 7. scribit Gentianam vbique nasci, in Illyrico tamen præstantissimam, folio Fraxini, sed magnitudine Lactucæ: caule tenero, pollicis crassitudine, cano & inani, exinter-

Mmm 2

vallis foliato, trium aliquando cubitorum, radice lentâ, subnigra, sine odore, aquosa, montibus subalpinis plurima. Vsum esse in radice & succo. Radicis naturam esse exsiccatoriam, sed pregnantibus non bibendam. Hæc hoc loco. Sed & reliqua à Dioscoride tradita, sparsim idem Plinius habet.

Galen.

Galenus omnem vim Gentianæ radici ex amaritudine attribuit. Gentianæ (inquit 6. simpl.) radix multum est efficax, cum opus extenuatione, abstersione, purgatione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, cum impensè amara sit. Hæc Galenus.

Auicenna.

Auicenna Gentianam calidam esse scribit ordine tertio, siccam verò secundo. Componitur ex hac apud Mesuem, & alios plerumque Medicos, theriaca diatessaron. i.e. ex quatuor rebus, sc. addita Aristolochia rotunda, Myrrha, & baccis Lauri, æquali portione, quæ vicem explet Theriacæ magnæ. Diosc. alio modo diatessaron facit, exhibens percussis à serpente radicis Gentianæ drachmas duas cum Pipere & Ruta & vino.

Cæterum, Gentianam Centaurio similem, Centauriam radicem aliqui nominauerunt, & ex eo Narceem, quoniam Narce Centaurium etiam dicatur. Fuerunt qui Aloëem gallicam nulla foliorum, sed radicis & rectitudinis & amaritudinis similitudine aliqua, quæ utrumque genus amaram rectè sub terram agit. Chironia à centauro Chirone dicta idem est, quoniam & Centaurium ab eodem Chironia pariter nominetur. Credidit præterea Marcellus, quoniam Aloë diceretur Gentiana, à Dardanis Aloëtim pariter nominatam fuisse.

Porro licet Veteres vnius duntaxat Gentianæ meminerint, recentiores tamen cognouerunt plures, & scriptis publicarunt. Et C. Bauhinus inter Neotericos doctè inter Gentianas sic distinxit. Aliæ sunt radice perenni, aliæ fugacissimæ, flore & semine prolato, interire non solent, sed singulis annis ex eadem radice, noua germina producunt: hæc verò, flore emarcido, & semine disperso Hyeme intereunt, & ex semine renascuntur.

GENTIANA VULGARIS MAIOR Ellebori albi folio.

Descriptio.



sequeñtes, singulares, læues: ex foliorum superi-

Folia Hellebori albi foliis paria, circa radicem multa, per caules ex aduerso sita, eisdem pediculis connatis amplectentia, nerulis tribus aut quinque plantagineis distincta, glabra, polita, lucida, hisque notis ab Hellebori albi foliis distincta: caules cubitales, bicubitales, ac etiam interdum hominis altitudinem as-

orem minorum sinu flores verticulorum modo dispositi erumpunt, calycibus inclusi primùm, postea intumescences explicantur, qui singuli longiusculi & lutei: sequuntur vascula oblonga, in duas se partes aperientia, in quibus semen numerosum, leuiter rubens, ad Leucoij semen accedens, leuius: radix crassa, longa, multifida, inuis flauescens, sapore insigniter amaro. Quæ cum sit fungosa, siccata insigniter corrugatur, ac externe rufescit.

Fuch. cum Cordo reprehensione dignus, quod folia per ambitum leuiter incisa Gentianæ attribuant, non obseruantes Dioscoridem esse corrigendum. Helleboro enim albo foliis adeò proxima est ut minùs exercitatum eminus eludat.

Theod. Dorst. ineptam, nescimus cuius plantæ iconem exhibet, jam antè pro Galanga quoque positam.

Gentiana dicitur Brunfels. tom. 3. rhaps. 77. Cordo in Diosc. & Hist. Fuch. Anguill. Gesn. hort. & de coll. stirp. Matthiol. Euch. Rœss. Corn. Harch. Io. Agric. Lon. Rob. Const. Cæsalp. H. Lugd. pag. 1258. Lac. Dod. Turn. & Castori, qui germ. *Reichswurz* vocat, quod nomen non conuenit. Gentiana magna floribus luteis Gesn. in deser. mont. fr. Gentiana maior floribus subcæruleis, Gesn. in app. hort. Gentiana maior vulgata, Aret. in deser. mont. Stæck. Gentiana maior fl. luteo Camer. hort. Gentiana maior. Lob. in Adu. Obs. p. 165. Ic. Plant. p. 308. Gentiana floribus luteis Simlero de Alp. Gentiana magna fl. luteo veteribus descripta. Gentiana veterum Clus. pann. & Hist. Gentiana alpina maior C. Bauhin. pin. & [ut etiam phyt.] Gentiana 1. siue maior lutea.

Physiologia Græcis, Latinis & officinis omnibus Gentiana. Mauritanis Gentiana, Centiana linguarum basilicæ, seu Balateca: Sclationibus & Turcis Serfenicha. Germ. *Gentian* / *Bitterwurz* / & in Alpibus Helvetiæ *Bersach*: Belg. & Angl. *felwort* & *Gentiane*, ut & Gallis. Itali latinum nomen retinent, uti & Hispani.

In montium pratis ac pascuis varlis in locis obseruauit, florentem Iunio ac semen maturantem Augusto. Copiosam ait Turnerus in Alpibus inter Germaniam & Italiam: Matthiolus frequentissimam in excellis Tridentinis montibus, præsertimque in Ananienfibus, in quorum cacuminibus effodi refert radices brachiali longitudine. Augusto & Septembri colligitur radix, & siccatur in umbra. Singulis annis regerminat: cum verò semine se propagat, tardè altero & vix tertio anno caulem producit, nata in Sueviæ & Briscolæ montibus, Cordo. In hortis difficulter ultra triennium durat: in iis quidem floret, sed faciliè postea perit, nec ex semine faciliè prouenit.

Commendatur radicis puluis ad canis rabidi morsum. Hepaticis & stomachicis, qui cibum sumptum retinere non valent, Gentianæ radicis puluis è vino potandus exhiberi debet, quod qui fecerit, authore Trago, auxilium præfens sentiet. Euporiston medicamentum in febribus, quod etiam testatur Horatius Augerius in suis epistolis. Simlerus in descriptione Alpium, refert pastores uti Gentianis ad vbera vaccarum si à muribus araneis aut aliis bestiis venenatis lædantur. Putredinis Gentiana hostis infestissima, & veneni mors, inquit Lobelius. Pesti adeò remedium præfens, ut non modò homini, sed etiam brutis incolumitatem tueatur: & amissam restau-

Fuch. & Cord. an.

Theod. Dorst.

Synon.

Nomina

Locus & Tempus.

Vires & vus.

restaurer, eoque solita Heluetia istam cum flammula porcis, & olim Monachis propinare, ne anima in vino cadere puteretur. Gentianæ aqua, perferim quæ vase duplici balnei vapore, vitreis organis elicitur, febres (vt Matth. se sæpius expertum ait) ab infarctu tum viscerum, tum vaporum excitatas mirificè pellit. Alui tineas necat maculasque in facie qualescunque detergit, si eâ frequentius maculæ abluantur. Succum Gētiæ magnitudine Castanæ aut Nucis Juglandis dimidium eius vno die, alterum post die, commendat deglutendum, contra febres, non solum tertianas longas & nothas, sed & quartanas.

GENTIANA MAGNA FLORE purpureo & albo.

Descriptio



A Vulgari maiore, luteo flore nihil formâ differt: etenim ampla habet folia, Ellebori albi folijs haud multum absimilia, sed teneriora, & saturatiore viriditate splendentia: caules digitali aut pollicati interdum crassitudine præditos, rotundos, cubitales, nonnquam bicubitales, genicu-

latos, quos ambiunt similia folia, aliquantulum tamen angustiora, ex aduerso sibi opposita: extremos caules ambiunt binæ aut ternæ confertorum florum coronæ, qui non sunt lutei, aut stellati, vt in vulgari maiore, sed purpurei, maiores, concavi, in senas aut plures lacinias obtusas extremis oris secti, & purpureis quibusdam punctis, inferiore & interiore, quæ candidiores & dilutiores sunt, distincti, odoris expertes, totidem, quot sunt lacinie, staminibus longum & bifidum vasculum internè ambientibus, in quo continetur copiosum semen, planum, paleaceum, minus quàm in illa flaua maiore stellato flore, subrotundum: radix crassa, longa, foris plerumque flaua, intus alba, impenitè amara, digitalibus fibris subinde prædita est, singulis annis noua germina (quemadmodum maior flaua) proferens, & multos caules ex eodem capite producens, præsertim cum adoleuit, sed qui alternis duntaxat annis, vt plurimum floriferi esse soleant, interquiescente nimirum vno anno à partu matris. Aliud genus inuenitur nihil quidem à dicta aut formâ, aut magnitudine differens, sed cuius flores, qui in illo sunt purpurei, in hoc omnino lactei coloris conspiciuntur, auctore Clusio.

Trago Gentianæ alterum genus, multò magis exiguum, vulgate per omnia referens, excepto flore subcaeruleo, & gustu amarior. Geiner. in monte fracto, Gentiana punicea, radice lutea, amarior: Eid. coll. stirp. Gentiana punicea, radice lutea, amarior: Eid. coll. stirp. Gentiana minor, alpina, floribus magnis puniceis, caule cubitali, radice pollicis, vel duorum. Simlero Gentiana altera minor floribus puniceis. Harch. Gentianæ

Tom. 111.

species paulò maior, subcaeruleo flore. Dod. gall. Gentiana 2. siue flore caeruleo Tragi, maiori efficacità. Camer. apud Matth. in hist. germ. Gentiana caerulea maior, in Heluetia frequens à Gesn. descripta. Eid. in Epit. Gentiana maior alia: Item hort. Gentiana maior flore purpureo. Et sicetiam Clus. pann. 277. & 278. itemque hist. cui & Gentiana Pannonicarum & Noricarum Alpium maxima, Gentiana maior albo flore. C. Bauh. phyt. & pin. Gentiana 2. siue maior purpurea Lobel. Obs. p. 165. Gentianam purpureis floribus à Clusio sibi transmissam memorat, iconem tamen non exhibet.

Purpuream Gentianam collegi Burmij Rhætorum florentem Iunio. Gentiana maior purpureo flore exisponit in Pannonicarum Noricarumque Alpium jugis abundè: Floret Augusto: semen Septembri maturescit, nouâ niue in ea iuga cadere incipiente. Varietas flore albo in Stiriz superioris alpinis: Verum neque hoc genus, neque illud purpureo flore cicurare vnquâ potuit Clus. aut vllâ diligentia & culturâ efficere vt in hortis permanere vellet, nedum flores proferre. Quin culturæ beneficio deterior euadit.

Quoniam autem gustu amarior quàm vulgaris, idè in Medicina efficacior habetur, vehementiusque & soluere, & purgare creditur. Frequens huius vsus ad morsus animalium venenatorum. Hec magnitudine & formâ dictæ planè similis, eius tamè flores paullo (vt ex sicca à Cromero missa planta, Clusio deprehendere licuit) minores, colorem habent pallidum, siue, vt Cromerus scribebat, obsoletè luteum, quàm plurimis nigris maculis, intus & foris aspersum. Idem addebat, ab eo, qui ipsum in montana illa loca deduxisset, sibi relatum, in alio quodam præalto monte, aliam formâ non dispari reperiri quæ caeruleo flore esset.

Synonyma

Gentiana maior pallida punctis distincta & caerulea Clus. pann. p. 280. Eid. hist. Gentiana maior pallido flore punctis distincto: Et, Gentiana maior caeruleo flore. C. Bauh. phyt. Gentiana 3. siue maior pallida: Eid. pin. Gentiana 3. siue maior flore punctato.

In Silesiæ montibus eruit Achilles Cromerus Nissenis.

GENTIANA FOLIO CONVOLVTO.

Planta est elegans radicibus fuscis, crassis, longis, lentis, repentibus, fibellis paucissimis ad-



hærentibus. vnde caules exurgunt cubitales, rotundi, striati, glabri & albi, geniculis distincti, in terram reclinati, & concavi: circa quos folia viridia, glabra, subrotunda, nervosa, vncias duas lata, paulò longiora, rarius ex singulis geniculis bina, sed ex quolibet geniculo vnũ tantum, nullo

Descriptio

Mmm 3

certo ordine vel numero enascitur, quod antequam expendatur, fistulæ instar caulem completur: flores in summo cauliculi, ex superiorum foliorum sinu, tenerimis pedicellis subnixi, ex cauliculis oblongis, nonnihil hispidis prodeunt, Saponariæ vulgaris formâ ex quinque folijs per oras crenatis commissi, qui colore albi sunt, leui carneo colore asperso, in quorum medio staminula quædam exigua,

Gerardo Gentiana concava, Angl. hollow flower or Englisch Gentian. Sed improprie à Gerardo Gentianam folio cœvoluto vocari concavam scribit in epist. ex Anglia ad nos Lobelius. C. Bauhin. phyt. in prod. (cuius descriptioem assumpsimus, ex missa ei iconc concionatam) dicitur Saponaria concava Anglicana: item pin. vbi & Saponaria 2.

Locus & tempus.

Hæc Aetate media floret in Anglia, in Comitatus Northampton nemore quodam Sipanie dicto, auctore Gerardo.

GENTIANA MINOR, SEV VULGI Cruciata.



Descriptio

Reptant cum radice rami sesquipalmes, & dodrantes subrubentes: quos crebra ambiunt folia, bina semper aduersa, vel potius vnum continuum ad genicula, tanquam vagina caulem inuoluens, cuius utrinque exit segmentum Gentianæ, sextuplò ferè minus, leue, pingue, amarum; flores in ramulis

extremis ex foliorum alis conferti, cærulei, quinquepartiti: semen copiosum, minutum, oblongum, fuluum, insipidum, vasculis continetur oblongis bipotentibus, folliculo membraneo obuolutis.

Brunf. l. Herba foliozum. Corn. Gentianæ Herbatiolum altera species. Anguillatæ Cruciatæ in Apenning copiosa, nomine Gentianellæ. Gesnero horto: Gentiana cruciata. Camer. horto Gentiana media, siue Cruciatæ, libentius horto affluens: Eid. apud Matthiol. Gentiana minor. Et sic etiam ipsi Matthiol. Tabern. Gerardo, Lobel. Obs. pag. 166. Icon. Plant. pag. 309. & Adu. quibus & Cruciatæ recentiorum. H. Lugd. p. 1259. Cruciatæ siue Gentiana minor Matthioli. Cast. p. 203. *ἡ ἁγία ἡ ἡ*, non Pettimborsa, sed Metimborsa vocanda. Et sic etiam pag. 154. Sed cur Durantes eandem plantam duobus locis tradit? Nonne hoc factum ignorantia stirpium? postremo enim loco sub titulo *ἡ ἁγία ἡ ἡ*, Cruciatæ & Pettimborsæ malè pingit Cruciatam stellatam.

Synonyma

Cruciata Fuchf. (cui & Gentianæ species) Matthiol. Lacun. Lon. & Eyst. Cruciatæ Gentianæ species Harch. Cruciatæ gentianella Thallio. Vincetoxicum alterum Cæsalp.

Hæc planta germanis vulgari vocabulo *Mor*

delgheer & Creutzburg, quasi Radix cruciata Nomina (γυπαρίμος) appellatur. Et hanc à radice ita dictam putant, sed folijs potius cruciatim cauli incumbentibus nominis etymon debetur. A radice amara Bitterwurp. Radicem amaram, appellatis. Alij Saponariam & Itatin agriam, germ. Seiffenraut/ & wildweidfraut/ sed peiperâ vocant. Qui Rhenum habitant Germani, S. Detersfraut/ h. e. Heibam S. Petri: nonnulli propter vulnera quæ sanare dicitur, Sperensich nominant: Alij heissallen schaden/ quasi Chiliodynamin: Belgæ Modelgheer: Angli Grosse woort Gentian. Intelleximus à sagis gallicè nominati l'herbe du cry. Ital. Gentiana minore: Boh. Prosfresene foreny. Hieron. Braunsch. putat eam esse herbam, quæ Hebraeis dicitur Borich.

Cruciatam d. etiam plantam, testimonio Matthioli, non paruum cum Gentiana cognationem habere confirmatur. Ananienſa rura Cruciatam vulgò vocant Pettimborsa, sed corrupta Italica voce, pro Metti in borsa, quod ingentibus viribus commendatur, ut patet de ac gemma, crumenis afferuari mereatur: aut quod tantum viribus excellat, ut Medici eâ viuentes ingentem argenti & auri copiam crumenis sint reposituri. Matthiolus in comm. lat. cum mag. fig. videtur nomen Pettimborsæ alteri Gentianæ tribuere. Ab Ungaris vocatur gent lazlo/ Kiraly füe/ h. e. S. Ladislai Regis herba.

Potè Gentianæ tertiæ vulgò Cruciatæ vocatæ (ut vocat) Clusius duas differentias obseruauit: vnam ramis humi procumbentibus & minorem: alteram firmis & erectis caulibus, eamque maiorem: flores item alterius magis cærulei spectantur, atque illarum altera radicem in foramina sectam minimè habet.

C. Bauhin. qui in phyt. Gentianam quartam facit, & in pin. Gentianam pratenſem i. & Gentianam cruciatam vocat, triplicem differentiam constituit, Vnam procumbentem & minorem: alteram erectam & maiorem: Et tertiã radicem non pertusã.

Nascuntur verò eæ per vniuersam Pannoniam cum in collibus, montibusq; aperti & gramineis, tum siccioribus pratis, & herbosis, secundum publicas vias, locis. Sed obseruatur etiam Viennæ Austriæ in pratis Dornacilibus, siluæ adiacentibus. Item prope Wernigerodam. Locis nō ita arduis, hæc Gentiana, multa & passim oritur, vi prope Basileam, & Maconium Burgundia Gallicæ, depressis collibus, Lobelio. In collibus & montibus, inquit Dodonæus, nec non in alijs incultis agris & asperis locis [& secus itinera, Trag.] reperitur, & in Germania quidem frequenter. Septembri quidè in Germaniæ agris, Iulio mense in Belgij hortis floret. Ego vid. florentem Basileæ extra portam S. Albani in colle Iunio & Iulio: mense Augusto prope Leura, & in montibus wasserfal. Geneuæ mensis Februarij principio inueni in proximis montibus, ut Saleuæ, cum reliquis foliorum & caulium præcedentis æstatis.

Huius Radices recentioribus magnis laudibus Vires & effertur contra pestilentiam & venenosorum virus animalium ictus. Matthiolus quidem illud se experientiã compertum habere scribit, quod radice tusâ, & ventri emplastrum modo imposita, vermes, qui in intestinis fuerint, procul dubio necentur: & vlcera strumæ sanentur, si ijs eodem modo conusa, quæ nuper effossa sit, vel sicca & in puluerem contrita adhibeatur. In summa non

non desunt, qui asserant, hanc ea omnia præstare posse, quæ Gentiana. Cæterum amara & foliis est & radice; temperiem calidam & siccam obtinet: præstat quæcunque amara possunt. Pastores pecorum apud Mediomatricos miris superstitionibus hanc plantam fœdant (inquit Tragus, qui hanc plantam *pitrua* esse existimat) nam ubi pestis porcorum ingruerit, illius herbam ac radicem minutim concisas cum aliis quibusdam pulueribus, in cibo ac potu exhibet, adiunctis quibusdam preculis, planè sibi persuadentes quotquot huiusmodi escas degustauerint porci, eos à pestilentia tutos fore.

GENTIANA FOLIO ASCLEPIADIS
vulgò creditæ.



Caulis plures ex radice ad cubitum altos tollit, graciles, articulatos, quorum singulis iuncturis bina ex aduerso posita folia adnascuntur, Asclepiadis foliis formâ & magnitudine, respondentia, quinque secundum longitudinem nervis: è quorum singulorum sinu flos nascitur vnus, magnus,

oblongus, calathi formâ, quinque laciniis per extremum diuisus, cæruleus, totidem in medio staminibus: *Siliqua*, inquit Clusius subsequitur bicornis, quæ per maturitatem dehiscens, semen ostendit planum, paleaceum, colore cinereo, radix digitali crassitudine, lutea, multas oblongas eiusdem coloris in latum spargit, singulis annis augescens, & noua germina proferens, gustu impensè amaro. In nostra icone male picta radix.

Gesn. fr. Gentianæ species foliis ferè Asclepiadis [Hirundinariæ Simler, de Alpib.] florib. cæruleis. Item, hort. Gentiana foliis Hirundinariæ seu Asclepiadis quorundam *Giffwurn*/Schelmenfrant: quæ copiosa ubique apud Tigureses locis montanis circa semitas alibique apparet.

Arer. in deser. mont. Stockhornij & Nelli, *Giffwurn* prior, cæruleos habens flores, Campanulæ figura: foliis Asclepiadem referens: caule rubescens: radice bifidâ, luteâ, longâ, amarâ: semine compresso: Gentianæ species.

Dodon. lat. in fol. Cruciatæ siue Gentianæ minoris species Gesneri & Tragi, foliis Hirundinariæ, floribus confatis in Germania secus semitas. Velim Dodonæum iudicasse, ubi Tragus Gentianæ folio Hirundinariæ meminisset. Gentianam porro eam in Germania secus semitas obseruare non memini, sed neque confatis flores obseruavi. Vereor ne Dodonæus diuerfas plantas confundat.

Tom. III.

C. Bauh. pin. Gentiana alpina maior 4. siue Asclepiadis folio (sic etiam cognominatur in synon. C.B. not. phyt. ubi sexto loco ponitur) Gentiana 3. Tragi, & Dodon. gall. Gentiana 2. Clusij Tabern. Gentiana minor altera Dodon. lat. Vincetoxicum primum Cæsalpini. Quicquid dicat C. Bauhinus, ex sententia etiam Clusij & Dodonæi, hanc apud Tragum non comperio. Est ea mihi alia.

Copiosè in Pannonia, Sciria, Austriaque inferior Locu. re prouenit ad montium radices, vmbrosis collibus, nusquam verò in summis & apertis iugis in Rhæticis montibus Schlickius Medicus eruit. Florer Augusto: semen maturascit Septembri. Tempus Fertilis hæc est, nec interquiescit, sed singulis annis, verustior videlicet, multos caules floribus onustos producit. Pertinax autem est, & fœdè mitiora loca respuit, interdum tamen curâ & diligentia efficit Clusius, ut in hortis comprehenderet, & singulis annis repullularet & flores ferret: attamen quasi nativo aëre & pabulo priuata, atque tanquam compedibus vincta, lugere videbatur, ac pristini vigoris & elegantia plurimum amittere.

De Vincetoxico Matthæus Syll. scribit valere contravenenum: ingredi in Theriacam Diatessaron, quasi hæc pro Gentiana accipiat. Nam ut Cæsalpinus monet, apud Messem & reliquos authores non Vincetoxicum legitur, sed Gentiana. Celebrantur radices huius in febribus pestilentibus, & ad vermes enecandos singulari remedio. Sclauonici rustici, huius radices decoctum foelicer calculosis propinari, experimento se compertum habere affirmant. Acrius & Iosias Siml. tradunt eâ pastores uti ad vbera vacarum, si à muribus, araneis, aut aliis venenatis bestis lædantur, curanda. Amara & hæc foliis & radice est; temperie calida & sicca.

GENTIANA ALPINA MAGNO FLORE.



Graciles habet radices, longiusculas, plures coherentes, flauescens, Description! propagines ex lateribus producentes. Folia humi fusa in orbem, crebra, duplò triplove Hippia maiora, vncis duabus interdum longiora, semunciam aut vnciam ferè lata, in acumen desinentia, crassiuscula,

vnico nonnunquam, aliàs tribus per lōgum nervis donata, amara: pediculi vnciales, binis ex aduerso positis foliis ornati, ex calyce dimidio brevior, quàm Hippio, strem emicantem sustinent magnum, Violæ Marianæ patem, calathoeide, duarum, triumve vnciarum longitu-

ne, unifolium per oras supremas in quinque lacinas diuisum, quarum spatia intercedit appendix, auriculæ instar, continua: color foris ex albo subcæruleus, laciniarum tamen spatia cærulea sunt: qui color vegetior & cyaneus hilaris lacinias intrinsecus tingit, penitus autem si intruere, stiliis picturæ ad fundum usque ex cæruleo purpureis, asperis, hinc inde eiusdem coloris punctulis: è fundo emergit turbinatus stylus, angulosus, paluisculo luteo circiter circumspersus, in summo tandem cacumine bifidus florem, teste Clusio, consequitur oblongum acuminatum capitulum, quod sese in duas æquales partes aperiens, semen ostendit exiguum, striatum, terrei coloris.

Synonyma

Trago Gentiana postrema, siue quarta. Gesn. horto Gentianula, siue Gentianella alpina: Et cat. Gentianella pumila. Aret. Gentiana 4. minima. Clus. Panh. p. 284. & 285. itemque in Histor. post. Gentianella 5. siue Gentianella maior verina. Lob. in Ad. pag. 130. Gentianella.

Amato addita est figura Dalechampi, in fine posita pro Elleborine. An autem Amatus hanc intellexerit, ignoro, quia à se visam in horto Magnifici Azaioli Fertariensis, Epipactim non describit. Hist. Lugd. p. 828. inscribit Gentianellam minimam latifoliam, atque quorundam esse Helleborinem, siue Epipactim, posse verò & Thylacitum maiorem dici: Allobroges Repeires nominare.

C. Bauh. not.

C. Bauhin. Gentiana 15. siue Gentianella alpina angustifolia magno flore: Item Gentiana 16. siue Gentianella Alpina latifolia magno flore. Has diuersas esse plantas perperam statuit Frater.

Locus & Tempus.

Crescit in Schneeberg & Erscher abundantissimè, aliisq; alpibus continuâ serie productis, perpetuâque quasi niue obstitis: ubi Iunio & Iulio h. e. primo istic Vere, floret: sub Iulij verò finem & Augusto semen maturitatem adipiscitur: ac mitioribus locis, in quibus authore Clusio, rariùs inuenitur, atque in hortos translata, Aprili & Maio. Inueni ego in monte Rhætorum Septimo dicto florentem Iunio. In altissimis Diocesis Curiensis alpibus in tractu prope Cœnobium Ossefers appellatum, quo loco thermæ sunt decantatissimæ, primum Trago sese obtulit. Lobelius in Parauinis collibus & decliuis, ubi viperæ capi solitæ sunt, obseruauit. Hist. Lugd. crescit in aridis, niuosis, perflatis, montosis: floret mensè Aprili.

Amarissimus est totius plantæ sapor, ideoque locinoris vitis nempe regio morbo, & obstructionibus auxiliatur, pari cum Gentiana facultate, cui amaritudine non cedit.

GENTIANÆ SPECIES, CALATHIANA quibuldam radice perpetua siue palustris.

Descriptio.

VDos amat pratorum margines, singulari, aliàs multiplici supra cubitalem altitudine, recto caule affurgens, per quem æqualibus spaciis aduersa concidunt folia, palmari nonnunquam altitudine, culmum lata, superius atrouirentia, infernè dilutiora, è quorum sinu à medio ferè caule, summo tenus, flores iâ singulares, iam duo, aut plures, cærulei, quinquepartiti, calathiformæ, Gentianellæ Helueticæ pares, vel etiam minores: radices plures longæ, luteæ, amaræ, quæ non bene exprimuntur in nostra Fuchsiana figura, quæ causa cur aliam pingi iusserimus.



An in figura folia non sint penè maiora, quàm in ipsa herba, licet graphicè descriptam dicant Aduersaria. Figura Gesneri melius mihi placet. In com. lat. cum mag. fig. circa nomen Pettimborsa sibi contradicere videtur: id enim nomen olim Cruciatæ tribuebat.

Figuram habet Cast. Dur. p. 203. pro Gentiana minima, Italicè Gentianella & Pettimborsa vocata, flore ex cæruleo purpureo, quæ repræsentat aliquatenus Violam Calathianam.

Dod. gall. lib. 2. cap. 21. Calathiana Viola, Calathiana Plinij, & Viola autumnalis, *Violette d'Aut.* *Viola aut.* *tone*, Belgis *blaw liliekens*, & *Suisent schoon*. Eid. lib. 3. ca. 12. Gentiana tertia, sine iconè. Idem de Flor. ait vulgò apud Belgas nomen non habere, esse tamen qui cæruleum Liliun nuncupant.

Gesn. hort. Calathiana Viola autumnalis, amara, humidioribus pratis proueniens, profundioribus radiculis, cærulei coloris saturati flore: Gentianæ genus. Item, Gentianæ species pulchra, Pictis dicta Kreichio, fortè Plinij Calathianæ species, Dodonæo propter floris figuram, Calathiana vocata. Sed nec Gesnero, nec Dodonæo assentiri possum, Gentianæ enim minori, quàm picturâ exhibet Dodon. & Gesnerus pro Pneumomanthe

Trago Gentianæ tertia species radice longâ & admodum amara, cauliculis tenuibus, teretibusque, foliis acutis, angustis, Campanulæ, oblongis, cæruleis.

Matthiolus in prior. commemorat dærum Gentianarum minorum, quibus in comm. It. cum mag. fig. tribuit radices albas, figuram vnam tantum exhibens, titulo Gentianæ minimæ. In Lat. adscribit caules humi plerumque acubantes, vocatque Ananienfium rutrum genus vltimum Pettimborsa vulgò dictum. Considerent autem lectores an fuerit ritè nota hæc Gentianula Matthiolo, describens radices albis, & caulibus humi acubantibus.

monanthe, radices non sunt annuæ, quales dicit Cordus esse Pneumonanthes. An Gesn. coll. Calathiana, autumnales Violæ cæruleæ, ex quarum genere Petilium florem Plinii dixerit, radicibus amarissimis? An rursus, Gentiana palustris, florens Augusti medio & fine?

Pneumonanthe [sic in Icon. Plant. Lobelius p. 309.] Cordi, Gentianæ minoris species [Calathiana Viola Plinii Dodon. additur in Obs. pag. 166.] Germ. *lingen blum*, Cruciatæ similis, aut eadem, quæ in pratis etiam montosis oritur, foliis angustioribus, minoribus, flore cæruleo, Calathi modo, radice fibrosâ, nequiquam incisâ: à Matthiolo graphicè descripta. Vnam duntaxat, & huic similem sed floribus albis alit hortus professoris in Academia Louanienfi Petri Brughelii. *Item antè diximus*, Pneumonanthen Cordi differre à Matthioli Gentiana minore & à Calathiana Dodonæi. Præterea, tantam similitudinem hand animaduertimus cum Cruciatâ, quantum perhibet Lobelius.

Gentianæ quartæ siue angustifoliæ procul dubio genus est illa, quæ à Dodonæo Campanula autumnalis nominatur, & quod Augusto floreat atque Autumno, à Ruellio Calathiana Viola appellata est, à Cordo Pneumonanthe: *Miror* Clusium cum aliis eandem facere istam Calathianâ cum Pneumonanthe Cordi multum differente.

H. Lugd. huius plantæ tres figuras habet: p. 824. Calathiana Viola. Item, Campanula pratensis: pag. 1259. Cruciatæ siue Gentiana minima Matthioli.

Gentianella palustris, de qua hoc loco agimus, proponitur à Gerardo & Tabern. pro Pneumonanthe. Thallio dicitur Viola Calathiana tertia.

C. Bauh. phyt. Gentiana 7. siue palustris: Apud Matth. Gentiana minima Matth. & Castoris, quoad descriptionem, non iconem, Viola Calathiana 2. Thallii, Pneumonanthe humentium ericetorum Lobelii. Non mihi verò videtur Violam Calathianam Thallii secundam cum hac conuenire. Pneumonanthen ericetorum Lobelii suspicor esse Gentianellam quadrifolio flore. Eid. pin. Gentianella palustris 1. siue angustifolia, flore cæruleo, violaceo, & purpureo.

In Ducatûs Vvitembergici loco humido circa Aichelberg obseruavi florentem Septembri: Lob. in Pedemontanis pratis prope Susam & Rioli multam testatur. Reperit Dodonæus in pratis, frequenter in aliis incultis, & iisdem quibus Erica humidioribus locis. Clusio authore crescit in Austria pratis ad montium radices sitis. Floret Augusto. Aliquoties à Gesnero fuit plantata, paulò pòst tamen periit. Quamvis autem radix ei non simplex sit, locum tamen desiderat palustrem.

Viribus iisdem quibus Cruciatam præditam ait Matthioli. Dodonæus qualitate calidam statuit, Gentianæ facultate quodammodò similē, multò tamen imbecilliorē. Efficax à recentioribus aduersus pestilētes morbos habetur, & ad virulentorum animalium morsus & ictus. Alii præclaras ei vires in sanandis pulmonum affectionibus ac hepatis adscribunt.

**GENTIANVLA LANVGINE AD SINGV-
lorum foliorum floris lacinias donata,
flore quadripartito.**

Descriptio **R**adix tenuis quasi repens, albida, amara: canes sæpè singulares, aliquando plures, Tom. III.

dodrantes & minores, quadranguli, in ramos aliquot diuisi: *folia* ex aduerso posita ad nodos oriuntur, inferiora quidem vnciâ breuiora, superiora verò longiora, culmum lata, neruo vnico



secundum longitudinem decurrente: *flos* in vniuscuiusque ramuli extremo singularis, calathi formâ, longus, colore cæruleo, in quatuor partes duntaxat profundas diuisus, non mucronatus sed rotundas modicè & crenatas, quarum latera vtriusque barbitio donata cæruleo, nec vllam

habent ad imum lacinia intrinsecus lanuginem; medium occupant apices quatuor obsoleto minio tincti, staminibus albidis insidentes, nec non calycis vasculum longum quadrangulum in duos apices albicantes desinens, in quo *semen* continetur minutissimum, puluerulentum, ad instar Orobanches, aut Helleborines: ex radice Autumno evulsa, præter floriferos caules, oculi in sequentis anni germinationem apparebant. In tota planta gustu nullum saporem percipio præter paucam amaritudinem in foliis.

An Dodon. in fol. lat. Campanula autumnalis, in ericastris tenuior ac minor? Thallius vocat Violam Calathianam seu autumnalem primam. Gesn. hort. Calathiana Viola autumnalis alia minor, flore dilutiori, radice inutili. An eid. coll. stirp. Gentiana pumila flosculo cæruleo, radiculis albis? An Camer. hort. Gentianella pratensis Bauarica minutissima, Autumno florens? An Lob. Obs. p. 166. Gentianella siue Pneumonâthes varietas, strigosior tota, humentium Brabantia ericetorum? An Clusio in Pann. p. 284. & Hist. post. Gentianæ quartæ, siue angustifoliæ varietas?

C. Bauh. phyt. Gentiana 8. siue angustifolia autumnalis, Pneumonanthe Cordi & Lob. Calathiana Viola autumnalis minor Gesn. flore cæruleo, dilutiore, nigro, rariùs albo. Apud Matthioli. Gentiana minor Matthioli, quoad descriptionem: Calathiana Viola Lugd. Dodon. in 8. Campanula autumnalis in fol. Viola Calathiana siue autumnalis Thal. Gentiana angustifol. 2. Clusio. *Ego separo* Gesner. Calathianam minorem à Pneumonâthe, nec ei tribuo colorem nigrum, ac miror neminem annotasse, flore esse quadrifolio tantum.

C. Bauh. pin. Gentiana pratensis 6. siue angustifolia autumnalis maior, Pneumonanthe Lob. Calathiana Viola autumnalis minor Gesn. hort. Calathiana autumnalis Gesner. cat. Campanula autumnalis Dodon. Eyft. Gentiana 4. siue angustifolia 2. Clus. Pannon. & Hist. flore cæruleo dilutiore: est nigro: rariùs albo. Item, Gentiana pratensis 7. siue angustifolia autumnalis minor floribus ad latera pilosis, Pneumonanthe Cordi Hist. def. Ad. Viola Calathiana Nan

Viola Calathiana Thal.

C. Bauhin.
notat.
Locus &
Tempus.

autumnalis prima, Thal. Gentianella autumnalis foliis Cætauræ minoris flore cæruleo, Eyst. C. Bauhin. hic separat, quæ in phyt. coniunxerat. Gentianulam quadrifolio flore vidi eundo Montbelgardo à l'isle, vbi ultra Montenoy iuxta dumeta floret Octobri. Inter Vaniaucourt & Dampierre supra fontem in colle Septembri. Itē prope Blaumontium, S. Hippolytū & Basileā, in monte Mouters in pratis descendendo ad sinistra versus Augustam. In Hausbergo Ienæ creberimè legit Thalius.

GENTIANA ANNUA CLVSII I. FLORE
ex cæruleo purpureo exiguo.

Descriptio.

Cvbitalem habet caulem, firmum, geniculatum: per quem ad singulos nodos sparsa sunt bina semper folia, sibi ex aduerso opposita, trineruia, latâ sede & sine pediculo cauli inhaerentia: sensimque in longum mucronem desinentia: ab imo ferè caule ex foliorum alis nascuntur dodrantales & palmares ramuli, tenues, minoribus foliis septi, quinos, septenos aut plures flores foliis cinctos, proferentes, in quinque mucronatas lacinias diuisos, exiguos pro plantæ magnitudine, purpurascens ex cæruleo coloris: iis succedunt longa & angusta vascula, tenui semine plena: radix lingularis est, exigua, paucissimis fibris prædita.

Synonima.

Clus. pann. & Hist. Gentiana fugax siue annua 1. vel Gentiana septima, & Tab.

C. Bauh. phyt. Gentiana 10 siue pratensis folio quasi triangulo: Eid. pin. Gentiana pratensis 2. siue autumnalis ramosa, Viola Calathiana altera siue polyanthemus Thalii, Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo purpurascens, Eyst. flore rariùs candido. Nos referimus Thalii Violā, ad Gentianam fugacem 2. Clusij.

Vires &
vltus.

Nascitur in pratis herbidiisque locis ad montium radices sitis, montiumque cliuis, Iulio & Augusto flores proferens.

GENTIANELLÆ SPECIES QVIBVSDAM,
An Cordo Pneumonanthe, aut Gentiana
fugax altera Clusij?

Descriptio



Est vbi vnicò, est rursus vbi pluribus donatur caulibus, vix vnciā altioribus, vel dodrantalibus, ac etiam interdum cubitalibus, angulosis, ex viridi saturatè rubentibus, fractu contumacibus & multum ramosis: folia, infima quidem ex angusto principio sensim dilatantur, superiora verò latiore principio caulibus adnascuntur

ra verò latiore principio caulibus adnascuntur



que semunciales mucronatas lacinias abeunt, quarum singulis internâ parte (non ad latera) pili, barbulae purpurascens adnatæ, quarum coitus tubulo inclusa quinque stamina cum stylo viridante occultat: sunt autem sapore luculentius amaro quàm folia, non sine acrimonia, calyx longus semen continet rotundum, Papaueris semine minus: radix subest lignosa, dura, modò vnica fibrata, modò plures. Annua est herba.

Fuschius, cum Tubingæ degerem, vocabat Gentianam cæruleam quartam. An Cordo hist. Pneumonanthe, i.e. Lungenblumen? An Arret. Rastberghis? An Clus. pann. pag. 289. & 290. itēque hist. Gentiana 8. siue fugax, aut annua altera?

Gesn. hort. Calathiana Viola autumnalis tertia, Gentianæ genus, radice inutili, calathis florum puniceis, multis, confarctisque: subacris.

Thal. Viola calathiana altera, seu πολυάνθιμος, floribus coloris ex pallidiore cæruleo subrubentis veluti leniter, odoris nauseosi seu virosi. Rariùs flore prorsus candido.

C. Bauhin. phyt. Gentiana nona. Eid. pin. Gentiana pratensis 3. siue flore lanuginoso: Gentiana 8. siue fugax altera Clusij. Fortè Frater non intelligit eandem, quam nos: quia Violam calathianam πολυάνθιμον, ad aliam Clusij refert, nempe fugacem primam.

In Alpibus Rhæticis, & montibus Geneuz propinquis, itēque Basileæ in pratis, floret Augusto & Septembri. Montbelgardi abundat supra la Crote, & circa Blaumontium, passim locis cliuosis sub Autumno.

Gentianella fugax tertia Clusij, flore virescente & subcæruleo, breuiore & maiore.

Pari fermè excrescit altitudine, nec minùs frequentibus ramis est prædita: caulis etiam quadrangulus, terni aut plures in singulis ramis flores superiori similes, sed breuiiores, amplioremque virescentis initio coloris, deinde subcærulei: quibus longa cornicula seu mucronata membranacea vascula semine plena, vt in superiore succedunt: folia in singulis nodis multò latiora, mucronata, trineruia, ex aduerso inter se sita, viridis saturi & quodammodò nigricantis coloris: radix superiori similis, inquit descriptionis author Clusius, qui Gentianam 9. siue fugacem aut annuam tertiam, impensè amaram cognominat.

C. Bauh. phyt. Gentianam 11. vocat. Idem pin. Gentianam

paullatimque in mucronem acutum facel- sunt obscure virentia, & in atrum nonnūquam vergentia, nervis aliquot secundum longitudinem donata, sapore subamaro, ortu opposito: flores ex foliorum alis, itēque in ramulorum extremis copiosi, purpurascens, calathi formā, sescunciam circiter longi, in quin-

Locus & Tempus

Descriptio

Gent. fu. 4. Clusij.

Hydon.

Locus & Tempus.

Descriptio.