



B-78/1-26


⊕ ⊕ ⊕ III O


Faint handwritten text, possibly "Guia" and "B-78/1-26"

7



ASUA MAGESTADE
FIDELISSIMA
D. MARIA I.
N. SENHORA
RAINHA DE PORTUGAL
EDOS ALGARVES
PROTECTORA
DAS SCIENCIAS EDAS ARTES
& & &
D. O. C.
Domingos Vandalle





FLORAE LUSITANICAE

ET

BRASILIENSIS

SPECIMEN

* *Plantae exoticae*
B. Brasilienses.

ET

EPISTOLAE

AB ERUDITIS VIRIS

CAROLO A LINNÉ

ANTONIO DE HAEN

AD

DOMINICUM VANDELLI

Scriptae.



CONIMBRICÆ:

Ex Typographia Academico-Regia ;
M.DCCCLXXXVIII.

*Cum facultate Regie Curie Commissionis Generalis pro Examine, &
Censura Librorum.*


Apud Bibliopolam Antonium Barneoud;

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

- C** Anna *Angustifolia*. B. *STAM*: filamenta 2. sterilia minima, tertium fertile, filiforme, brevifimum. *Anthera* maxima, oblonga, didyma, acuminata, ciliata, villis longis insidens corollæ longitudine.
- *glauca*. * *PIST*: . . . *Stylus* fere longitudine staminis, parte superiore incrassatus. *stigma* emarginatum.
- Amomum* scapo bracteato: spica obtusa, longa. B. *PER*. *Capsula* triangularis, 3 — valvis.
- Vellozo*. *SEM*: solitaria. B. *Vellozo*.
- Obs.* stamina 2. sterila. *Obs.* convenit cum *Vochy*. *Flor. Guian. Tab. 6.*
- Curcuma longa*. B. — foliis oblongo-lanceolatis, lineatis, coriaceis. B.
- Vif*: resolvens, pellens, emmenagoga. *Salicornia herbacea*. *Salga-deira*.
- Radix* tingit colore luteo, sed fugaci. *Vif*: stimulans, diuretica, emmenagoga.
- Thalia geniculata* B. — *fruticosa*.
- VOCHYA**. Fig. 1. *Callitriche verna*.
- CAL**. Perianthium monophyllum, 4. partitum, laciniis subrotundis, duabus majoribus. *Blitum virgatum*.
- COR**: tripetala, petalis inæqualibus, externum majus, duo minora vaginans.
- Nectarium* pone cornutum, revolutum, labio superiore magno, petala, omnesque fructificationis partes, vaginante.



CLASSIS II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

- J** Asminum *officinale*. * Vis. purgans, vomito-
Jasmin. ria, emmenagoga, an-
 Vis: uterina. thelmintica.
- ┌ *grandiflorum*. * Pinguicula *Lusitanica*.
 ┌ *azoricum*. * Verbena *indica*. B.
 ┌ *fruticans*. ┌ *officinalis*. *Urjebaõ*
 Ligustrum *vulgare*. * Vis: adstringens, vul-
 Baccae purpuream pictu- neraria.
 ram pro chartis lufori- ┌ *supina*.
 is præbent. Lycopus *europæus*.
 Philyrea *media*. Succus nigricante colore
 ┌ *angustifolia*. quævis inficit, ut elui
 ┌ *latifolia*. nequeat.
- Olea *europæa*. *Oliveira*. Cunila *thymoides*.
 Vis: Olei obtundens, Ziziphora *hispanica*.
 emolliens: *fruct. condit.* Rosmarinus *officinalis*.
 tonica, stomachica. *Alecrim*.
- Veronica *officinalis*. Vis: excitans, nervi-
 Vis adstringens, vulne- na, tonica, stomachica,
 raria. resolvens.
- ┌ *alpina*. Salvia *officinalis*. *Salva*.
 ┌ *Beccabunga*. Vis: adstringens, toni-
 ┌ *Anagallis*. ca, nervina, stomachica,
 ┌ *agrestis*. uterina.
 ┌ *arvensis*. ┌ *pratensis*.
- Gratiola *officinalis*

- *verbenaca.*
- *hispanica.*
- *Sclarea.*

Vif: stimulanſ, exhilarans, ſternutatoria, reſolvens.

- Dianthera americana.* B.
- *varietas.* Spicis ſolitariis, alternis: foliis ovatis; nervis infra villoſis: caule volubili piloſo. B.
 - ſpica communi terminali, ſolitaria, propriis ternis, comofis: foliis ternis, lanceolatis, utrinque villoſis, reflexis. B.
 - ſpicis ſolitariis, oppoſitis: foliis ovato-lanceolatis, infra villoſis: caule volubili. B.
 - ſpicis ſolitariis, terminalibus: foliis ovato-oblongis, utrinque pi-

loſis: caule erecto, ſubramoſo, piloſo. B.

DIGYNIA.

Anthoxanthum indicum. B.
varietas ſpica lineari, articulis bifloris; altero floſculo ſeſſili, altero pedunculato: floſculis arifla brevioribus, denſo pilo inclufis. B.

TRIGYNIA.

Piper foliis ſubcordatis; acutis, ſubdecem-nerviis, reticulatis. B.

Jaborandi bravo.

- *amalago* B.
- *reticulatum.* B.
- *pellucidum.* B.
- *acuminatum.* B.
- *rotundifolium.* B.



CLASSIS III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

X *Iris indica*. B.
 — scapo multi-floro;
 squama flores distin-
 guente, cornea, su-
 brotunda, integerrima;
 calyptra hyalina.

Nectarii barba remota.

B. *Vellozo*.

— scapo multifloro: squa-
 ma flores distinguente,
 margine hyalina; mul-
 tifida: Calyptra colora-
 ta: *Nectarii* barba ra-
 mosa. B.

Obs: *Nectaria* filifor-
 mia, barba proluxa ter-
 minata. Capsula 1 —
 locularis, 3 valvis.

BIASLIA Fig. 2.

CAL: Perianthium: foliis
 lineari-lanceolatis, pa-
 tentibus, persistentibus.

COR: Petala tria ovata,
 calycis longitudine.

STAM. filamenta tria, ca-
 pillaria, corolla bre-
 viora.

Antheræ ovatae, vesi-
 culares, insidentes, api-
 ce interius perforatae.

PIST: Germen superum;
 oblongum. *Stylus* capil-
 laris, filamentis brevi-
 or, persistens.

Stigma simplex.

PER: Capsula ovata, ac-
 cuta, 1-locularis.

SEM: plurima, rugosa.

Obs. differt a *Callisia*
 antheris apice perfora-
 tis, & capsula 1 — lo-
 culari. *Vellozo*.

Valeriana rubra.

— *calcitrapa*.

— *cornucopiae*.

— *dioica*.

— *Phu*. *

Vis: narcotica, antif-
 pasmodica, sudorifera,
 diure-

- diuretica, purgans. — Scirpus *palustris*.
 — *locusta*. — *coespitosus*.
 — *coronata*. — *lacustris*.
 Tamarindus *indica*. B. — *triqueter*.
 Vis: *Fruct.* eccoprotica, refrigerans. Eriophorum *polystachion*.
 Crocus *sativus*, * *Aça-fraõ* DIGYNIA.
 Vis. *Stam.* anodyna, Saccharum *officinarum*. B.
 soporifera, exhilarans, *Canna de azucar*.
 relolvens, pellens, emmenagoga. Vis. edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria.
Pistillum Fulvo tingit Phalaris *canariensis*.
 colore. *Alpista*.
 — *veraus* Vis. *Sem*: nutriens:
 Ixia *bulbocodium*. — *utriculata*.
 — *chinensis*. * Paspalum *spicis* numero-
 Gladiolus *communis*. sis 5. 9., basi pilis ver-
 — *utrinque floridus*. *Baub. pin.* 41. ticillatis: floribus ge-
 minis, secundis, alter-
 Iris *florentina* nis, basi pilo elonga-
 Vis. *Rad.* expectorans, to. B.
 errhina, becchica, ec-
 coprotica. *Obs. Paspalo virgato* af-
 — *biflora* fine.
 — *pseudo-acorus*. *Pabulum*. B. E. C. O.
 Vis. adstringens. — Spicis duabus petiola-
 — *xiphium*. *Livio cardeno* tis, terminalibus, op-
 — *sisyrrinchium*. positis, horizontalibus.
 Schoenus *mariscus*. Floribus acutis: valvu-
 — *aculeatus*. la altera calycis ciliata.
 — *mucronatus*. B.
 Cyperus *longus*. *Albafor*. — Spicis inferioribus al-
 Vis. diuretica, emme- ternis, superioribus tri-
 nagoga. bus

- bus terminalibus, ex eodem centro: Floribus solitariis, acuminatis, dentibus receptaculi elongati insidentibus. B.
- *coespitosa.*
 - *Melica ciliata.*
 - *papilionacea.* B.
 - *Poa aquatica.*
 - *trivialis*
 - *pratensis.*
 - *annua.*
 - *eragrostis.*
 - *rigida.*
 - *spicata.*
 - *Briza minor.*
 - *virens.*
 - *media.*
 - *maxima.*
 - *Cynosurus cristatus.*
 - *aureus.*
 - *Festuca myurus.*
 - *fluitans.*
 - *Bromus sterilis.*
 - *arvensis.*
 - *geniculatus.*
 - *rubens.*
 - *scoparius.*
 - *rigens.*
 - *pinnatus.*
 - *Stipa tenacissima.*
 - *Avena elatior.*
 - *Loeflingiana.*
 - *fatua.* * *Aveia.*
 - *Vis: Sem: refrigerans!*
 - *fatua.*
 - *sterilis.*
 - *fragilis*
 - *Lagurus ovatus.*
 - *Arundo Bambos.* B. *Do:*
- Dactylis spicis tribus terminalibus, umbellatis, supradecompositis; altera laterali: flosculis in spiculis lanceolatis, distiche imbricatis, compressis. B. *Pè de Gallinba Vellozo.*
- *cynosuroides.*
 - *glomerata.*
 - *Panicum glaucum.*
 - *italicum.*
 - *sanguinale.*
 - *crus galli.*
 - *dactylon.*
 - *patens.*
 - *Phleum pratense.*
 - *arenarium.*
 - *Alopecurus pratensis.*
 - *geniculatus.*
 - *monspeliensis.*
 - *paniceus.*
 - *Milium effusum.*
 - *paradoxum.*
 - *Agrostis spica venti.*
 - *miliacea.*
 - *australis.*
 - *stolonifera.*
 - *minima.*
 - *Aira minuta.*

TRIANDRIA.

7

- *Donax. Cann a.*
- *phragmites.*
- Panicula viridi tin gunt coloni.*
- *epigejos.*
- *arenaria. B.*
- Lolium temulentum.*
Jojo.
- Elymus arenarius.*
- *caput medusæ.*
- Hordeum vulgare. * Cevada.*
- *murinum.*
- Triticum aestivum. * Tri-go.*

- *hybernum. * Centeyo*
Vis: acefcens, mucilaginosaf.
- *turgidum. **
- *polonicum. **
- *repens. Grama.*
Vis: Rad. nutriens, diuretica, mundificans, anthelmintica.

TRIGYNIA.

- Eriocaulon triangulare. B.*
- Polycarpon tetraphyllum.*
- Minuartia dichotoma.*



CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

B Ragantia. B.
Fasc. Plant. pag. 6.

FOSCARENIA Fig. 3.

CAL: Perianthium 4 fidum, superum, persistens, inæquale, lacinia una majore.

COR: i petala, infundibuli-formis, longa.

STAM: Filam: 4. An-

theræ sessiles, longæ fauci corollæ incumbentes.

PIST:

PER: Drupa: Nux 1-sperma. B. *Vellozo.*

— Foliis lato-lanceolatis, integerrimis, subtus villosis: caule arboreo, tuber-

berculato, spinoso, spinis axillaribus: capitulis axillaribus, pedunculis longissimis. B.

URCEOLA. Fig. 4.

CAL: Per: hexaphyllum, foliolis ovatis, acutis, minimis, deciduis.

COR: monoperala, infundibuliformis. *tubus* cylindraceus, longus: *Limbus* quadripartitus, patens, laciniis oblongis, acutis, apice reflexis.

STAM: Filam. 4. filiformia fauci corollæ inserta. *Anthera* didymæ, erectæ, acutæ.

PIST: Germen ovatum, acuminatum. *Stylus* filiformis, staminibus brevior. *Stigma* capitatum.

PER: Capsula urceolata, 2 capsularis.

SEM: plurima. B.

Globularia vulgaris:

Dipsacus fullonum.

Cardo pentedor.

Scabiola leucantha.

Escabiosa.

— *succisa.*

Folia sicca luteo inficiunt.

— *arvensis.*

Vis: Rad. diluens, a-

lexiteria, becchica, exanthematica.

— *columbaria.*

— *atropurpurea.* * *Saudades.*

— *papposa.*

Spermaceo foliis cordato-oblongis, acutis, hispidis, sessilibus, reflexis; caule 4-angulati, hispido, angulis submembranaceis. B.

— Foliis subrotundis, acutis, glabris, subsessilibus, serratis: caule 4-angulati, glabro, angulis membranaceis, aculeatis, aculeis reflexis. B.

Obs. variat corolla 2:

3. 4-fida, floribus 2. 3.

4-andris: *caly.* 2. 3. 4-

dentatis. *Vellozo.*

Scherardia arvensis.

— *muralis.*

Asperula arvensis.

— *cynanchica.*

— *laevigata.*

Gallium palustre.

— *uliginosum.*

— *spurium.*

— *mollugo.*

— *aparine.* *Amor*

de hortelao

parisi-

— *pariense*.
 Crucianella *angustifolia*.
 — *maritima*.
 Rubia *tinctorum*. Ruiva,
 Garança.

Vis: Rad. adstringens,
 pellens, diuretica.

Radices rubro inficiunt co-
 lore, frequentissimo in
 usu apud tinctorum.

Petesia foliis lanceolatis,
 glabris, integerrimis:
 capitulis axillaribus, pe-
 dunculis longissimis: cau-
 le procumbente. B.

Obs. Cal: 4-partitus.

— Foliis cordatis, utrin-
 que pilosis, caule prof-
 trato, piloso. B. *Vellozo*.

Pavetta foliis lanceolatis,
 glabris. B.

Buddleja *americana*. B.

Plantago *major*. *Tancha-*
gem.

Vis: adstringens, vul-
 neraria.

media.

— *lanceolata*.

— *lagopus*.

— *lusitanica*.

— *albicans*.

— *maritima*.

— *coronopifolia*. *Diabe-*
lha.

— *Loeflingii*.

— *psyllium*.

Vis. *sem*. inviscans, lu-
 bricans, refrigerans,
 consolidans.

Scoparia foliis lanceolatis,
 serratis. B.

Vacoura meuda.

Obs. villi elongati in
 fauce corollae. *Vellozo*.

TAPANHUACANGA.

Fig. 3.

CAL. Per: monophyllum,
 2-dentatum, superum.

COR. monopetala, hypo-
 crateriformis, supera,
 ore quadrifido, patulo,
 laciniis patulis, æqua-
 libus: faux villis clau-
 sa.

STAM. Filam: 4. brevissi-
 ma basi tubi inserta.

Antheræ subrotundæ.

PIST. Germen inferum, o-
 vato-acuminatum. *Sty-*
lus subulatus. *Stigma*
 obtusum.

PER. Capsula 2-ocularis,
 2-valvis.

SEM. duo. B. *Vellozo*.

Sanguisorba officinalis.

Vis. adstringens, toni-
 ca.

B

Tra-

<i>Cornus sanguinea.</i>	<i>DIGYNIA.</i>
<i>Trapa natans.</i>	<i>Cuscuta europaea</i>
Vis. adstringens, ob-	<i>Herba subrufo tingit</i>
tipans. <i>exol.</i>	colore.
<i>Dorstenia contrajerva.</i> B.	<i>TETRAGYNIA.</i>
Vis. adstringens, sto-	<i>Ilex aquifolium.</i>
machica, alexiteria, fu-	<i>Potamogeton natans.</i>
dorifera.	— <i>setaceum.</i>
— <i>Drakena.</i> B.	— <i>gramineum.</i>
<i>Elaeagnus angustifolia.</i>	— <i>marinum.</i>
<i>Camphorosma monspeli-</i>	<i>Ruppia maritima.</i>
<i>sis.</i>	<i>Sagina procumbens.</i>
<i>Alchimilla alpina.</i>	— <i>erecta.</i>
	<i>Tillaea muscosa.</i>



CLASSIS V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

<i>Heliotropium europæum</i>	<i>Cynoglossum officinale.</i>
— <i>Tournefol.</i>	— <i>Macavallo.</i>
— <i>supinum.</i>	Vis. adstringens, sub-
<i>Myofotis scorpioides.</i>	narcotica.
— <i>apula.</i>	— <i>lusitanicum.</i>
<i>Lithospermum arvense.</i>	— <i>linifolium.</i>
— <i>fruticosum.</i> Erva das	— <i>omphalodes.</i>
sete sangrias.	<i>Pulmonaria angustifolia.</i>
<i>Anchusa officinalis.</i>	<i>Symphytum officinale.</i>
<i>Lingua de Vacca.</i>	Vis. Rad. inviscans ;
— <i>undulata.</i>	glutinans, vulneraria,
— <i>sempervirens.</i>	adstring.

- adstringens.
Cerithe major.
 — *minor*.
Borrago officinalis. * *Borragem*.
Asperugo procumbens.
Echium vulgare. *Lingua de Boi*.
 — *Lusitanicum*.
Primula veris. *Quejadilho*.
 — Vis. narcotica, nervina. *ex*.
 — *auricula*. *
Lysimachia vulgaris.
 Herba luteo colore inficit lanas.
 — *linum stellatum*.
 — *nummularia*.
 — Vis. saponacea, subadstringens, vulneraria.
Anagallis arvensis.
Marujem.
 — *latifolia*.
 — *linifolia*.
 — *tenella*.
Spigelia anthelmia. B.
Arapabaca.
 — Vis. narcotica, expellens, anthelmintica!
Plumbago europaea.
 — Vis. caustica.
 — *scandens*. B.
Convolvulus arvensis.
Verdeselha.
 — *mechoacan*. B.
- Vis. *Rad.* *eccoprotica*,
 roborans.
 — Foliis cordatis, hastatis, multinerviis, caule repente, piloso, tuberoso. B.
Rad. *esc.* *vulneraria*.
 — *sepium*.
 — *jalapa*. B.
 — Vis. *Rad.* *purgans*.
 — *althaeoides*.
 — *tricolor*.
 — *soldanella*.
 — *Brasilienfis*. B.
 — *Pinto*. B.
Fasc. Plant. pag. 9.
Campanula rapunculus
Raponço.
 — *dichotoma*.
 — *spicata*.
 — *saxatilis*.
 — *speculum*.
 — *hybrida*.
 — *hederacea*.
Samolus Valerandi.
Ipomoea foliis quinatis,
 foliolis lanceolatis, integerrimis: caule glabro, volubili, pedunculis trifloris. B.
Coffea occidentalis B.
Caffé.
 — *arabica*. * B.
 — Vis. *Sem*: *ustul.* *exsicans*,
 B 2

- cans, excitans, pellens
diuretica, antivenerea.
- Lonicera caprifolium*. *Ma-*
dre sylva.
- *perichlymenum.*
- Conocarpus erecta*. B.
- Genipa americana*. B.
- Mirabilis jalapa*. * *Erva*
triste.
- Verbascum Thapsus.*
Barbasco.
- Vis: anodyna, antispasmodica, emolliens, repellens.
- *lychnitis.*
- *blattaria.*
- *sinuatum.*
- Datura stramonium.*
- Hyoscyamus niger.* *Mei-*
mendo.
- Vis: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, antispasmodica, repellens.
- *Albus.*
- Nicotiana tabacum*. B.
- Tabaco.*
- Vis: anodyna, paregorica, narcotica, vomitoria, errhina, vulneraria, repellens.
- Atropa mandragora.*
- Vis: narcotica. *ex.*
- Physalis alkekengi.*
- Vis:
- Vis: subanodyna, diuretica, refrigerans, ecoprotica.
- Solanum verbascifolium*. B.
- *batatas* * *Batatas* *Inglezas, ou brancas.*
- *Lycopersicum.* * *Tomates.*
- *nigrum.* *Erva moura.*
- Vis: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.
- *melongena.* * *Bringela.*
- *paniculatum*. B.
- *dichotomum*. B.
- Fasc. plant. pag. 9.*
- *Banks.* B.
- Fasc. plant. pag. 10.*
- *strigosum*. B. *ibid.*
- *Valadares.* B. *ibid.*
- *Botelho.* B. *ibid.*
- *Belfort.* B. *ibid.*
- *virginianum*. B.
- Foli.*
- Obs*, differt laciniis acutis.
- caule inermi, frutescente, flexuoso, foliis ovatis, calycibus, caule, foliis pilis ramosis adpersis: foliis pagina superiore simul tuberculatis: floribus cymosis. B.
- pim.*

- *pimpinellifolio*. B.
 — caule inermi fruticoso, foliis lato-lanceolatis, integerrimis, pagina inferiore tomentosa, racemis terminalibus. B.
 — caule inermi, fruticoso: foliis geminis, altero minore, ovatis, acuminatis, integerrimis, utrinque villosis: floribus, axillaribus, confertis. B.
 — caule inermi herbaceo, piloso, tetragono, membranaceo, repente: foliis pinnatis decursive, integerrimis, pilosis: racemis simplicibus. B.
 — caule inermi, fruticoso: foliis cordato-acuminatis, utrinque pilis glanduliferis, integerrimis: floribus racemosis. B.
 — caule inermi, frutescente, flexuoso: foliis lanceolatis, integerrimis, supra nitidis, subtus albido-tomentosis, maximis; racemis cymosis, lateralibus. B. *Vel. lozo.*
 Capsicum annuum. B.
 L. * *Pimentaõ.*
- Vis: fruct. corrodens, rubefaciens, stimulans, tussiva.
 — *frutescens*. B. *Malegueta.*
Varronia lineata. B.
Rhamnus oleoides.
 — *alaternus*. *Aderno, ou Sanguinho, ou Samoca.*
 — *frangula*.
 Vis: Cort. purgans.
 Baccae immaturae viridi colore lanas inficiunt.
 — *Zizipbus*. * *Maçã de anafega.*
 Vis: Bac. inviscans, edulcorans, expectorans, lubricans.
Mangifera indica. B.
Hirtella americana. B.
Ribes grossularia. *
 — *uva crispa*. *
Hedera helix. *Era arborea.*
 Vis: vulneraria,
Vitis vinifera. * *Vide.*
 Vis: lubricans, subla-
 xans.
Achyranthes lappacea. B.
 — *prostrata*. B.
Illecebrum verticillatum.
 — *suffruticosum*.
 — *cymosum*.
 — *paronychia*. *Erva pra-*
ta.

- *vermiculatum*. B.
 Cerbera *Abovai*. B.
 Vinca *major*. *Congoxa*.
 Nerium *oleander*. *Loendro*,
 Sevadilba.
 Plumeria *rubra*. B.
 Portlandia *grandiflora*. B.
Obs. Capsula tetragona.
 Stigma clavatum.
 Echites racemis axillari-
 bus: foliis peltatis, o-
 vatis, mucronatis, in-
 ferne tomentosis: Caule
 volubili, tomentoso. B.
 — *torulosa*. *varietas*.
 Foliis lineari-lanceola-
 tis. B.
 — foliis cordato-ovatis,
 acuminatis, pedunculis
 racemosis, multifloris. B.
 Lissianthus foliis ovato-sub-
 lanceolatis, floribus, ter-
 minalibus, plurimis: caule
 tereti B.
 — foliis oblongis cum a-
 cumine, subsessilibus.
 floribus terminalibus,
 subgeminis: caule te-
 tragono. B. *Vellozo*.
 Messerschmidia foliis cor-
 datis, subacuminatis, in-
 teggerrimis, subtus to-
 mentosis, spicis secundis.
 B.
Obs. Bacca sicca 2 — par-
 tibilis, loculis 2-3- sper-
 mis. Variat foliis ova-
 tis, acutis, acuminatis.
 Macrocnemum foliis ob-
 longo-lanceolatis, cori-
 aceis, integerrimis. B.
 — foliis ternis, lato-lan-
 ceolatis, undatis, inte-
 gerrimis, coriaceis. B.

H O R T I A.

CAL: Per: 5-dentatum,
inferum, persistens.

COR: 5-petala, petalis re-
flexis, acuminatis, ad
basin pilosis.

STAM. fil. 5. *Stilus* o.

Stigma coloratum.

PIST.

PER: Capsula 5-locula-
ris, loculis 1- spermis,
tuberculata.

— foliis subcuneiformi-
bus, integerrimis: flo-
ribus terminalibus, cy-
mosis: caule arboreo.
B.

Cortex Quinae succedane-
us.

M A C I E L I A.

CAL. Per: tubulosum, 5-
dentatum, inferum.

COR: 1 — *petala*, tubulo-
sa, 5 — fida, laciniis re-
flexis.

STM.

STM: filamenta 5; basi pilosa.

PIST. Stigma 4-duplex.

PER. Drupa. Nux 1 — locularis, visco obtecta.

— foliis inferioribus ovato-oblongis, obliquis, acuminatis, supra scabris, subtus subtomentosis: floribus cymosis: caule arboreo. *B. Vellozo.*

Cirylla racemifera. *B.*

LAURADIA. *Fig. 6.*

CAL: *Per*: pentaphyllum, foliolis ovatis, lanceolatis, aequalibus, persistentibus.

COR: Petala quinque ovato-acuminata, aequalia, calyce majora.

STAM: filamenta 0, vel brevissima.

Nectarium conicum, truncatum supra stamina, & pistillum, cucullatum.

PIST: Germen oblongum, *Stilus* filiformis, Nectario vix longior. *Stigma* obtusum.

PER: Capsula oblonga, 1 — locularis, 3 — valvis.

SEM: plurima. *B. Vellozo.*

— foliis lanceolatis, ferratis: caule tereti, racemis terminalibus. *B.*

Obs. a Roridula differt ob filamentorum absentiam, & Nectarii figuram. *Hydrophyllum* foliis reniformibus integerrimis. *B.*

Obs: Corolla monopetala, subrotata, quinquefida.

GALVANIA. *Fig. 7.*

CAL: *Per*: monophyllum, 5 — dentatum, superum, minimum.

COR: monopetala, ventricosa, supera. Limbus quinque-partitus, laciniis acutis.

STAM: filamenta quinque tubi basi corollae inserta, & villo claudentia tubum.

Antherae oblongae, didymae.

PIST: Germen obovatum. *Stilus* filiformis, laeviter inclinatus, staminibus longior. *Stigma* bifidum, patens.

PER: Bacca 2 — locularis, loculis 1 — spermis.

SEM.

- SEM: fulcata. B. *Vellozo*. *Salfola kali*.
Lycium europaeum. — *soda*.
 — foliis lanceolatis: ca- — *sativa*.
 lycibus 5 — fidis: caule — *vermiculata*.
 arboreo. B. — *fruticosa*.
- DIGYNIA.
- Asclepias foliis cordato-*
oblongis, acutis: race-
mis axillaribus: caule
volubili. B.
 — *nigra*.
 — *fruticosa*. * *Arvore da*
seda.
Herniaria glabra. Erva
turca, ou das quebra-
duras.
 — *hirsuta*.
 — *fruticosa*.
 — *lenticulata*.
Chenopodium urbicum. Pé
de ganço.
 — *rubrum*.
 — *serotinum*.
 — *ambrosioides*.
 — *vulvaria*.
 Vis: antispasmodica.
 — *polyspermum*.
 — *scoparia*. * *Valverde*.
 — *maritimum*.
*Beta vulgaris. * Acelga.*
 Vis: humectans, dilu-
 ens, errhina.
 — *maritima*.
- Anabasis tameriscifolia*.
Gomphrena brasiliensis. B.
Ulmus campestris. Olmo.
 Vis: Cort: adstringens,
 vulneraria.
Gentiana lutea. Genziana.
 Vis: Rad: balsamica,
 tonica, stomachica, an-
 thelmintica.
 — *centaurium. Fel da ter-*
ra.
 Vis: balsamica, stoma-
 chica, tonica.
 — *spicata*.
Eryngium pusillum.
 — *tricuspidatum*.
 — *maritimum*.
 — *campestre*.
 Vis: diuretica, emme-
 nagoga, aphrodisiaca.
 — *amethystinum*.
Hydrocotyle umbellata. B.
Sanicula europaea.
 Vis: resolvens, adstrin-
 gens.
Atrantia major.
Bupleurum rotundifolium
 Vis: subadstringens,
 vulneraria.
- semi-

- *semicompositum*.
 - *tenuissimum*.
 - *fruticosum*.
Tordylium officinale.
 Vif: diuretica.
 - *nodosum*.
Caucalis grandiflora.
 - *leptophylla*.
Daucus carota. * *Cinoira*.
 Vif: Sem: diluens, humectans, carminativa, diuretica, emmenagoga.
 - *muricatus*.
 - *visnaga*.
 - *gingidium*.
Ammi majus.
 - *glaucifolium*.
Conium maculatum. *Cicutata*.
Athamanta oreoselinum.
 - *cretensis*.
 Vif: Sem: carminativa, diuretica, emmenagoga.
Crithmum maritimum.
Ferula communis.
 - *tingitana*.
Laserpitium latifolium.
 Vif: Rad: resolvens, diuretica, emmenagoga, stomachica.
 - *chironium*.
Heracleum sphondylium.
Ligusticum peregrinum.
Angelica sylvestris.
- Vif; Rad: resolvens, sudorifera, carminativa, emmenagoga.
Sium latifolium.
 - *nodiflorum*.
 - *sciculum*.
Sison ammi.
 Vif: Sem: carminativa, diuretica, emmenagoga.
Bubon macedonicum. * *Salça grande*.
Cuminum cyminum. * *Cominhos*.
 Vif: Sem: carminativa, diuretica, emmenagoga.
Oenanthe fistulosa.
 - *crocata*.
 - *prolifera*.
 - *globulosa*.
Phelandrium aquaticum.
Scandix odorata.
 - *pecten*.
 - *australis*.
 - *cerefolium*. * *Cerfolio*.
 Vif: antiphlogistica; diuretica, lactifera.
Chaerophyllum sylvestre.
Coriandrum sativum. * *Coentro*.
 Vif: hypnotica, carminativa, lactifuga.
Seseli turbitb.
- C Tha:

- Thapsia villosa.*
 Umbella luteo tingit colore lanas.
 — *foetida.*
Pastinaca sativa. *
 Vis: Rad: Sem: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodisiaca.
Smyrnum perfoliatum.
 — *olusatrum.*
Anethum graveolens.
Endro.
 Vis: hypnotica, lactifuga, carminativa.
 — *segetum.*
 — *foeniculum.* * *Erva doce.*
 Vis: resolvens, pellens, carminativa, lactifera.
Carum carvi * *Alcarovia.*
 Vis: Sem: resolvens, carminativa.
Apium petroselinum. * *Salsa.*
 Vis. resolvens, emmenagoga.
 — *graveolens.* * *Selino.*
 Vis. carminativa, pellens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, repellens, antifebrilis.
 — *TRIGYNIA.*
Rhus coriaria. *Sumagre.*
- Vis. Fl: Sem. adstringens, coriaria, refrigerans. *fol.* coriaria.
 Cortex caulis flavo pannos colore inficit.
 Cortex radice rufo eleganti colore tingit.
 — *copallinum.* B.
 Ejus resina in vernicibus.
Viburnum tinus. *Folbado.*
Cassine paragua. B.
Erva do Paraguai.
 Vis. vomitoria, purgans, sudorifera. *exol.*
Sambucus ebulus. *Engos.*
 Vis. narcotica, anodyna, pellens, sudorifera, diuretica, drastica.
 — *nigra.* *Sabugueiro.*
Tamarix gallica.
Tamargueira.
 Vis. Cort. Rad. Lign. *Fol.* adstringens, coriaria, obstipans.
Turnera sidoides. B.
Corrigiola littoralis.
Pharnaceum cerviana.
Alfine media. *Marugem.*
 — *PENTAGYNIA.*
Statice armeria.
 — *limonium.*
 Vis. adstringens. . . *ex.*
 — *cordata.* *feru-*

- *ferulacea.*
- *acuta.*
- Linum *usitatissimum* * *Libano.*
- Vis. Sem. Olei relaxans, obtundens, emolliens.*
- *strictum.*
- Drosera *rotundifolia.*
- Vis. corrosdens. ex.*
- *Lusitana.*
- *cistiflora.*
- Mahernia *foliis bipinnatis, petiolo communi alato, foliolis basi interne auritis, crenatis, obtusis.*
- B.



CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

- Bromelia *ananas.* B.
- *Karatas.* B.
- *lingulata.* B.
- *nudicaulis.* B.
- *acanga.* B.
- Tillandsia *utriculata.* B.
- *lingulata.* B.
- *usneoides.* B.
- Tradescantia *geniculata.* B.
- *Repens,* foliis vaginantibus, ovatis, altero latere oblitterato, subtus pilosis, spathis monophyllis. B.
- Leucojum *autumnale.*
- Narcissus *pseudo-narcissus.*
- *minor.*
- *tazetta.*
- *bulbocodium.*
- *Fonquilla* * *Fonquilho.*
- Pancreatium *maritimum.*
- Crinum *americanum.* B.
- Amaryllis *lutea.*
- *formosissima.* B.
- *Bella donna.* *
- *Scapis ex umbella foliacea multifloris, corollis campanulatis, inæqualibus, foliis oblongo-acuminatis, petiolis spiritaliter flexis: caule volubili.* B.
- Obs. Petala 3. interiora*

- ra unguibus medio coarctata: apicibus multifido-crenatis. *malobis*
- Bulbocodium *vernum*.
- Allium porrum. *
- Albo porro.
- Vis. Sem. calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.
- *jubbirsutum*.
- *sativum*. * *Albo*.
- Vis. Rad: excitans; pellens, maturans, anthelmintica, diuretica, diaphoretica.
- *vineale*.
- *triquetrum*.
- *cepa*. * *Cebolla*.
- Vis. Rad: maturans, diuretica, diaphoretica, flatulenta, aphrodisiaca, anthelmintica.
- *chamaemoly*.
- Lilium candidum. *
- Lirio de S. Antonio.
- Vis. Rad. Flor. maturans, anodyna, emmenagoga.
- Fritillaria pyrenaica.
- *meleagris*.
- Uvularia perfoliata. B.
- Tulipa gesneriana. *
- Ornithogalum pyrenaicum.
- *narbonense*.
- *pyramidale*. Leite de
- gallinba*.
- Scilla *maritima*. *Cebolla alvarra*.
- Vis. Rad. incidens, stimulan, pellens, diaphoretica, diuretica, hydragoga.
- *peruviana*.
- *lusitanica*.
- *unifolia*.
- Asphodelus *ramosus*.
- Gamaõ*.
- Vis. Rad. diuretica, emmenagoga, maturans.
- *fistulosus*.
- Anthericum *planifolium*.
- Asparagus *officinalis*.
- Aspargo*.
- Vis. Rad. Sem. diluens, humectans, debilitans, diuretica, aphrodisiaca.
- *acutifolius*.
- *aphyllus*.
- Dracaena *Draco*. *
- Pharm*. Draconis sanguis.
- Vis. incrassans, adstringens.
- Convallaria *polygonatum*.
- Vis. Rad. vulneraria.
- *majalis*. * *Campainhas*.
- Vis. Fl. narcotica, antispasmodica, errhina.
- Hyacinthus *non scriptus*.
- *serotinus*. *amez*

- *amethystinus.*
- *orientalis.* * *Jacinto.*
- *comosus.*
- *muscari.* *
- Agave *americana.* B. L. *
 Piteira.
- Juncus. *acutus.* *Funco.*
- *conglomeratus.*
- *effusus.* B.
- *filiformis.*
- *bufonius.*
- *pilosus.*
- Bursera *gummifera.* B.
 Vis. *Lign. cort.* in Dysenteria! Diarrhoea.
- Berberis *vulgaris.*
 Vis. *Cort. Bac.* refrigerans, attenuans, antiseptica, tonica. *Cort.* purgans.
 Cortex luteo tingit colore.
- Loranthus *americanus.* B.

FEREIRIA. Fig. 8.

- CAL. Perianthium. O.
- COR. monopetala, infera, *tubus* cylindræus, ad faucem ventricosus. *Limbus* tubo brevior 5-fidus, laciniis lateralibus revolutis, patulis, acutis.
 Faux angustata.
- STAM. Filamenta sex, mi-

- nima. *Antheræ* sex oblongæ intra faucem ventricosam corollæ.
- PIST. Germen - - superum.
- Stylus* longitudine corollæ.
- Stigma* capitatum, emarginatum.
- PER. . . .
- SEM. paposa. B. *Vellozo.*
- Burmannia foliis ovatis, acuminatis, integerrimis, foliolis vaginantibus; racemis terminalibus; caule prostrato. B.
 - racemo terminali, foliaceo: foliis superioribus majoribus, lato-lanceolatis, vaginantibus, subtus coloratis, caule erecto. B.
 Obs. Rudimentum sexti filamenti.

BARBACENIA. Fig. 9

- CAL. Per. 6-fidum, monophyllum, ventricosum, maximum, persistens, 6-aut 7-dentatum, totum adpersum glandulis pedunculatis, humorem viscosum ejicientibus. COR.

COR. Petala sex, ovata, obtusa, patentia, æqualia.

STAM. Filamenta sex petaliformia, apicibus dentata. *Antheræ* filamentis lateraliter adhærentes, didymæ, longitudine filamentorum, acuminatæ, erectæ.

PIST. Germen obovatum: *Stylus* cylindraceus, staminibus longior. *Stigma* crassiusculum, ovato-acuminatum, linea longitudinali exaratum.

PER. Capsula oblonga, pedunculata, coronata, glandulosa, 3-valvis.

SEM. plurima, parva, subrotunda. B. *Vellozo*.
Frankenia levis.

DIGYNIA.

Oriza sativa. * *Arrôz*.

Vis. *Sem.* nutriens.

← *mutica*. B.

TRIGYNIA.

Rumex patientia.

← *crispus*. *Labaga*.

← *acutus*.

Vis. adstringens, ecoprotica.

← *obtusifolius*.

← *bucephalophorus*.

← *aquaticus*.

Vis. *Rad.* adstringens.

← *tingitanus*.

← *acetosa*. * *Azedas*.

Vis. refrigerans, tonica, obstipans.

Radix exsiccata rubro colore inficit Decocta Pharmacopæorum.

← *acetosella*.

Triglochin palustre.

← *maritimum*.

Colchicum autumnale.

Dedo de Mercurio:

Vis. *Rad.* narcotica; phantastica, dementans, drastica, exanthematica.

← *montanum*.

POLYGYNIA.

Alisma plantago.



CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

- Æsculus hippocastanum.* * Vis. Cort. antifebrilis;
Castanbeiro da India. — *Pavia.* B.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

- Tropæolum minus.* * *Chagas.* *Amyris elemifera.* B.
 Vis. Res. diuretica. ex.
Rhexia acifanthera. B. *Chlora perfoliata.*
 — *brasiliana*, foliis sub- *Vaccinium racemis ter-*
 sessilibus, alternis: flo- *minalibus, nutantibus,*
 ribus alternis, axillari- *foliis lato-lanceolatis,*
 bus, subpendunculatis. B. *integerrimis.* B.
Obs. caulis tetragonus, — *vitis idea.*
 angulis membranaceis. *Vis. refrigerans, atte-*
 Folia ovata, lanceolata, *nuans.*
 subsessilia, multinervia, *QUELUSIA.* Fig. 10
 glabra, ramulis oppo- *CAL.* Per. monophyllum,
 sitis. Internodia rubra. *coloratum, infundib uli-*
 Flores solitarii, axilla- *forme, superum, qua-*
 res, subsessiles, flavi. *drifidum; laciniis lan-*
Epilobium montanum. *ceolatis, erectis tubo*
 — *tetragonum.* *duplo*
 — *palusire.*

- duplo longioribus. Tubus nectariferus.
- COR.** Petala 4, subrotunda, submarginata, laciniis calycis interjecta, iis duplo minora, circa stamina convoluta.
- STAM.** Filamenta 8, laciniis longiora, fauciperianthii inserta, filiformia, erecta. 4 longiora *Antheræ* oblongæ, filamentis insidentes.
- PIST.** Germen oblongum. *Stylus* filiformis, pilosus, staminibus longior. *Stigma* oblongum, acutum.
- PER.** Bacea 4-locularis, infera.
- SEM.** plurima. B.
Obs. a *Skinnera* Forster gen. 29. differt laciniis calycis, corolla, *stygmate*, & Bacea.
- Foliis ternis, petiolatis, subverticillatis, ovato-lanceolatis, denticulatis, nervis rubris: stipulis tribus rubris, acutis ad petiolos. Floribus cernuis: Caulis teres. B.
- Erica vulgaris.* Urze.
- *viridi-purpurea.*
- *cinerea.*
- *ciliaris.*
- Obs.* Folliculi imbricati in hac *Erica* instar illorum salicis rosei, in quorum centro larva flavescens.
- *umbellata.*
- Daphne villosa.*
- *laureola.*
- Vis. *Cort.* corrodens; rubefaciens, excorians, drastica.
- *gnidium.* Trovisco.
- Vis. eadem ac præcedentis.
- Passerina hirsuta.*
- Moehringia muscosa.*

TRIGYNIA.

- Polygonum hydropiper.*
- *maritimum.*
- *aviculare.* Centinodia.
- Vis. subadstringens; vulneraria. exol.
- *fagopyrum.* *
- Vis. *Sem.* refrigerans, obstipans, nutriens.
- *convolvulus.*
- Sapindus saponaria.* B.
- Vis. *fruct.* saponacea.
- Paullinia pinnata.* B.
- foliis biternatis, foliolis

lis lanceolato-ovatis ,
caule , foliisque villosis.

B.

Cardiospermum corindum.

B.

TETRAGYNIA,

Elatine hydropiper.



CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

Laurus ? foliis subreni-
formibus, integerrimis,
coriaceis: floribus race-
mosis, monoicis. B.

Obs. filamenta 9. 12.,
singulis antherae 4 dif-
positae. *Stylus* longitu-
dine staminum. *Stigma*
capitatum.

— Foliis oblongo-lanceo-
latis, utrinque villosis:
Floribus axillaribus, rac-
emosis. B.

— foliis lato-lanceolatis,
coriaceis, planis, sub-
tus tomentoso-coloratis,
integerrimis, margini-
bus reflexis: floribus
racemosis: caule arbo-
reo. B.

— foliis cordatis, coria-
ceis, integerrimis, a-
cutis, subtus albicanti-
bus. Floribus racemosis:
B.

Obs. Cal. o, nisi co-
rol: dicas.

COR. calycina 6-partita:
filamenta 3 interiora ba-
si glandula utrinque.

PIST. Sterile? an ad mo-
noeciam? *Vellozo.*

— *cinnamomum* *S. Thomé.*
B. * *Canella.*

Vis. *Cort.* cordialis,
corroborans, calefaci-
ens, perspirans, anti-
febrilis, carminativa.

— *nobilis.* * *Louro.*

D

Vis.

Vis. *Bac.* : calefaciens, Anacardium *occidentale*. B.
 resolvens, pellens, car-
 minativa. Vis. *Nuc.* excorians,
 tinctoria.

— *persea*. B.

— *sassafras*. B.

Vis. *Lign. Cort.* dia-
 phoretica, pellens, cor-
 roborans, purificans. Batomus *umbellatus*.

HEXAGYNIA.



CLASSIS X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

Jussiaea *octovalvis*. B.

Cercis *filiquastrum*. *Olaya*.

Bauhinia *aculeata*. B.

— *purpurea*. B.

Hymenaea *courbaril*. B.

Cassia foliis quadrijugis,
 oblongis, auritis, mu-
 cronatis; glandula or-
 biculari ad basin pe-
 tiolorum, magna. B.

Obs. Antherae superio-
 res 3, steriles.

— foliis bijugis, oblon-
 go-lanceolatis, auritis:
 glandula ovata inter in-
 fima. B.

— foliis octojugis, ob-

longo-acuminatis, infe-
 rioribus minoribus, pe-
 tiolis eglandulatis: cau-
 le angulato, tuberculä-
 to. B.

Obs. variat foliis sep-
 temjugis. *Vellozo*.

— *planifiliqua*. B.

— *hirsuta*. B. *Fedegozo*.

Vis. *fol.* purgans:

— *chamæcrista*. B.

— *flexuosa*. B.

Cæsalpina *brasiliensis*. B.

Lignum rubro inficere co-
 lore in arte tinctoria vul-
 gatissimum est.

Gua-

Guajacum officinale. B.

Vis. Cort. aperiens,
purificans, pellens.

Ruta graveolens. Arruda.

Vis. resolvens, pellens,
carminativa, emmena-
goga, exanthematica,
sudorifera, anthelmin-
tica.

Trichilia glabra. B.

Melia azederach. * *Sicomoro*.

Tribulus terrestris.

Thryallis brasiliensis. B.

Copaifera officinalis. B.

Vis. Bals. vulneraria,
laxans, mundificans.

Melastoma holofericea. B.

— *malabathrica*. B.

— foliis integerrimis,
quinque nerviis, lato-
lanceolatis, scabris. B.

Flor de quaresma.

— Foliis lanceolatis, den-
ticulatis, denticulo u-
trinque ad apicem tri-
nerviis. B.

— *Obs.* Caps: 3-ocularis,
4-ocularis.

— Foliis ovatis, acutis,
quinquenerviis, villosis,
ferratis, pagina superi-
ore tuberculata. B.

Obs. demit $\frac{1}{4}$ e fru-
ctificatione.

— Foliis integerrimis tri-
nerviis, lanceolatis, ob-
tusis: pagina inferiore
subtomentosa. B.

— Foliis integerrimis,
trinerviis, cordato-acu-
tis, sessilibus, revolu-
tis: caule, foliisque pi-
lofis. B.

— Foliis integerrimis, o-
vatis, 3-5-nerviis, vil-
lofis, caule piloso. B.

Obs. Capsula 3-locu-
laris.

— Foliis ovatis, carina-
tis, sessilibus, ciliatis,
in quadrangulum dispo-
sitis: floribus termina-
libus, solitariis. B.

Obs. auget $\frac{1}{4}$ fructif.

— Foliis ovato-subcorda-
tis, acutis, crenatis, cre-
nulis spinosis, septem
nerviis: foliis, caule,
calycibusque spinosis. B.

Obs. Bacca 3-locul.

— Foliis lanceolatis, in-
tegerrimis, trinerviis

D 2 sub-

subtus, nervo intermedio, superne marginibus, & caule pilosis. B.

Obs. Bac. 2-3-locul.

Reliquæ fructificationis partes variant defectu. $\frac{1}{5}$

— Folii ovatis, quinque-nerviis, serratis, acutis, utrinque pilosis: caule tetragono, membranaceo, piloso, pilis inflexis. B.

Obs. demit $\frac{1}{2}$ e fructific.

— Folii acerossis. B.

Vaçoura do Tapantua-canga.

Baccæ nigro colore tingunt.

CORRELA. Fig. II.

CAL. Per. 5-phyllum, persistens, inferum: foliis ovato-acutis, concavis, marginibus membranaceis.

Receptaculum magnum, carnosum.

COR. Petala 5., obovata.

STAM. Filamenta 10. brevissima. *Antheræ* oblon-

gæ, dydimæ, fere in cylindrum approximata.

PIST. Germen. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* simplex.

PER. Baccæ 5. receptaculo carnosio insertæ, loculis 1-spermis. B.

— foliis ovato-oblongis, serratis, coriaceis. B.

— foliis lanceolatis, integerrimis. B. *Vellozo.*

Rhododendron ponticum.

Andromeda racemis secundis, terminalibus, bracteatis: corollis ovatis:

foliis alternis, ovato-subrotundis, integerrimis, supra tomentosis,

infra lanatis, glandula cylindrica terminatis. B.

Vellozo.

Arbutus unedo. *Medronheiro.*

— *andrachne.* *

— *uva ursi.*

Vis. fol. adstringens, coriaria, obstipans.

Folia cinereo colore tingunt.

DIGYNIA.

Saxifraga punctata.

geum.

— *geum.*

— *autumnalis.*

— *granulata.*

Vis. diuretica.

Gypsophila struthium.

Radicula Struthionis, quæ lavandis lanis succum habet mirum quantum conferens candori molitiaeque. *Plin. L. 19. c.*

3. Hac etiamnum Hispanos in Lamancha vestimenta coquere, & abluere haud minori effectu ac si sapone aut smegmate uterentur

Loefl.

— *perfoliata.*

Saponaria officinalis.

Vis. pellens, sudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelmintica.

Dianthus barbatus. *

— *carthusianorum.*

— *prolifer. Cravinba.*

— *Chærophyllus.* * *Cravo.*

Vis. *Flor. cordialis*, sudorifera.

— *glaucus.*

— *chinensis.* *

— *arenarius.*

TRIGYNIA.

Cucubalus italicus.

Silene lusitanica.

— *gallica.*

— *cerastoides.*

— *behen.*

— *viridiflora.*

— *rubella.*

— *inaperta.*

— *portensis.*

— *muscipula.*

Stellaria arenaria.

Arenaria multicaulis.

— *rubra.*

Garidella nigellastrum.

Malpighia glabra. B.

— *crassifolia.* B.

— Foliis ovato-subcuneiformibus, integris, subtus tomentosis: spicis terminalibus: floribus pedunculatis: caule arboreo. B.

Banisteria purpurea. B.

— foliis ovato-oblongis, acuminatis: racemis brachiatis, axillaribus, terminalibus: caule volubili. B.

Obj. Calycis laciniæ eglandulatæ.

— *fulgens.* B.

varietas. Foliis oblongo-lanceolatis, integerimis, subtus tomentosis, basi utrinque glandulosis: racemis brachiatis.

chiatis : pedunculis umbellatis : caule volubili. *Oxalis acetosella*. Trevo azedo.

PENTAGYNIA.

- Vis. refrigerans, attenuans.
- *violacea*. B.
 — *Barrilieiri*.
Agrostema githago.
 — *coronaria*. *
Lychnis viscaria.
 — *dioica*.
Cerastium vulgatum.
 — *pentandrum*.
 — *dichotomum*.
Spergula arvensis.
Phytolaca decandra. *
 Baccæ colorem roseum fugacem conciliant.
- Spondias myrobalanus*. B.
Cotyledon umbilicus. *Conchela*.
 — *hispanica*.
Sedum telephium. *Sempre noiva*.
 — *stellatum*.
 — *cepaca*.
 — *dasyphyllum*.
 — *hispanicum*.
 — *album*.
 — *acre*.
 Vis. incidens, vomito-




CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

- Triumphetta lappula*. B.
Balsamona Pinto. B.
Fasc. plant. pag. 15.
Obs. affinitas cum Lythro.
 Foliis ovato-lanceo-
- latis. B.
 — foliis ovato-sublanceo-
 latis ; caule hispido, fetis glandula hyalina terminatis. B.
Portulaca oleracea. *
 Bat-

- Baldroegas.*
 Vis. diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac coagulans.
 — foliis ovato-lanceolatis, carnosis, racemo composito. B.
Obs. Stamina plurima: caps. 3-valvis.
 — *triangularis.* B.
- Lythrum salicaria.*
 — *thymifolium.*
- Agrimonia eupatoria.*
 Vis. diuretica, adstringens, roborans, vulneraria, pellens.
- Reseda luteola.* *Lirio dos Tintoreiros, ou erva dos ensalmos.*
- Herba luteum pulcherrimum* dat colorem.
 — *purpurea.*
 — *sesamoides.*
 — *alba.*
 — *undata.*
 — *phyteuma.* β.
- Euphorbia peplis.*
- *Ipecacuanha.* B.
 Vis. emetica.
 — *peplus.*
 — *falcata.*
 — *exigua.*
 — *terracina.*
 — *portlandica.*
 — *helioscopia.*
 — *ferrata.*
 — *pilosa.*
 — *esula.*
 — *palustris.*
 Vis. corrodens, rube-faciens, vesicans, excorians, stimulans, drastica.
 — *characias.*
- Sempervivum arboreum.*
Enfayaõ.
Obs. Perianthium 10-partitum. Petala 10. filamenta modo 16. 18. 19. modo 22. squamæ 7-dentatæ filamentorum principia tegunt. Germina 9 aut 10.
 — *teflorum.*
 Vis. refrigerans, adstringens.



CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

- Cactus mammilaris.* B.
 — *melocactus.* B.
 — *tetragonus.* B.
 — *repandus.* B.
 — *lanuginosus.* B.
 — *opuntia.* B. L. * *Figuei-
ra do Inferno.*
 — *ficusindica.* B.
 — *cochenillifer.* B.
 — articulato-prolifer, la-
 xus : caule arboreo,
 subtereti, spinoso : fo-
 liis cuneiformibus, sub-
 retusis. B.
Obs. profert Coccinel-
 lam.
Myrtus communis. Mur-
 ta.
 Vis. *Fol. Bac.* calefaci-
 ens, corroborans, ad-
 stringens.
 — *brasiliana.* B.
- VELLOZIA.* Fig. 12.
CAL. Per. maximum, cor-
- riaceum, triquetrum ;
 lævigatum : laciniis ma-
 ximis, coloratis, erectis,
 petaliformibus, ovato-
 lanceolatis, petala men-
 timentibus.
 COR. O.
 Stamina. Filamenta 15. ;
 filiformia, basi lacinia-
 rum calycis inserta, an-
 theris breviora. *Anthe-
re* longissimæ, acumi-
 natæ.
 PIST. Germen subtrian-
 gulare, oblongum.
Stylus staminibus vix lon-
 gior, cylindræus.
Stigma capitatum, bilo-
 bum.
 PER. Capsula triangula-
 ris, 3-ocularis, coro-
 nata.
 SEM. plurima. B.
 — capsulis glabris, scapis
 hispidis. B. *Canella. de
Ema.*

Ema.

Caulis fibrosus pro metal-
lis laevigandis, & ex-
polliendis.

— Capfulis, scapisque gla-
bris. B. *Lingoa de To-
cano.*

Obj. Stamina inæqua-
lia, 6 reliquis maiora,
per tria paria basi la-
ciniarum calycis inserta

LAFOENSIA fig. 13.

CAL. Per. monophyllum,
inferum, campanulatum,
femidecemfidum, acu-
tum, coriaceum.

COR. Petala 10, oblonga,
subserrata, apice emar-
ginata, basi squama ne-
ctarifera, calyci inserta.

STAM. Filamenta 20 fili-
formia, erecta, calyci
inserta, corolla longi-
ora.

Antherae simplices, versa-
tiles.

PIST. Germen subrotun-
dum, pedicellatum. *Sty-
lus* subulatus, incurvus,
staminibus longior. *Sti-
gma* simplex.

PÉR. Capsula cucullata,
2-locularis, polysperma.

SEM. plurima, compres-
sa, membranaceo-alata,
receptaculo capsulae af-
fixa. B.

Psidium pyriferum. B.

Guajava.

— *pomiferum.* B.

— foliis lineatis, obtusi-
usculis, subcuneiformi-
bus, pedunculis uniflo-
ris. B. *Aracá.*

Vis. corticis adstrin-
gens, usus. *Bacca* ef-
culenta, acidula.

Obj. Cal. 4. 5-fidus. Pe-
tala 4. s: 5. *Bacca* mul-
tilocularis.

Punica gránatum. * *Romã.*

Vis. Sem. adstringens,
laxans, anodyna. *Flor:*
pellens, diuretica, an-
thelmintica.

Amygdalus communis. *

Amendoeira.

Vis. Nucl. Olei anody-
na, carminativa, pel-
lens, diuretica, anthel-
mintica.

— *persica.* * *Pesegueiro.*

Prunus. padus. *

— *lusitanica.* *Azarero.*

— *cerasus.* * *Cerajeira.*

Vis. fruct. refrigerans.

— *lauro-cerasus.* *

E

Vis.

Vis. *fol.* diuretica, ec-
coprotica, narcotica.

— *domestica.* * *Amexieira.*

Vis. *Pulpae.* refrige-
rans, humectans, lubri-
cans, eccoprotica.

Cortex luteum colorem
præbet.

— *damaſcena.* * *Damaſ-
queiro.*

— *juliana.* *

— *armeniaca.* * *Albrico-
que.*

DIGYNIA.

Cratægus aria.

— *oxyacantha.*

— *azarolus.* * *Lazorola.*

TRIGYNIA.

Sorbus domestica. * *Sor-
veiro.*

PENTAGYNIA.

Mespilus germanica. *
Nespra.

Vis. *fruct.* Sem. ad-
stringens, refrigerans.

Pyrus communis. * *Pe-
reira.*

— *ſalerna.* *

— *malus.* * *Maçeira.*

Vis. refrigerans, toni-

ca.

Cortex luteum tinctori-
bus colorem præbet.

— *cydonia.* * *Marmeleiro.*

Vis. inspissans, adstrin-
gens, refrigerans.

— *pyraſter.*

Spiræa filipendula.

Vis. adstringens, vul-
neraria.

POLYGYNIA.

Rosa ſpinoſiſſima.

Vis. *Flor. fruct.* ecco-
protica, adstringens.

— *centifolia.* * *Roseira.*

Vis. *Flor.* corroborans;
adstringens.

— *gallica.* *

— *alba.* *

Vis. *Flor.* analeptica.

Rubus fruticosus. *Amoras
de ſylva.*

Fragraria veſca. *Morangos.*

Vis. diluens, hume-
ctans, diuretica, ecco-
protica.

— *ſterilis.*

Potentilla anſerina.

Vis. adstringens.

— *reptans.* *Cinco em ra-
ma.*

Vis. vulneraria, ad-
stringens.

stringens.
 - *nivea*.
 - *grandiflora*.
 Tormentilla *erecta*.
Pè de Leão.
 Vis. adstringens, co-

riaria, diuretica.
 Radix rubrum colorem
 masticata & inuncta co-
 riis inducit.
 Geum *urbanum*.
 Vis. Adstringens, pel-
 lens, fudorifera.



CLASSIS XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

DAVILLA. Fig. 14.

CAL. Periant. 5-phyllum,
 laciniis duabus superi-
 oribus æqualibus, con-
 cavis, magnis, reliquis
 tribus parvis, inæqua-
 libus.

COR. Petala. 2. s : 3.

STAM. filamenta plurima.

PIST. Germen... *Stylus*.

PER. Nucula rugosa, 1-
 locularis, membrana te-
 cta, intra lacinias supe-
 rioris calycis clausa post
 florescentiam.

LEMIA. Fig. 15.

CAL. Per. 2-partitum, mem-

branaceum, persistens.
COR. monopetala, rota-
 ta, 5. vel 6-partita, la-
 ciniis subemarginatis :
 supera.

STAM. filamenta nume-
 rosa, corollæ inferta,
 capillaria. *Antheræ* fu-
 brotundæ.

PIST. Germen subrotun-
 dum. *Stylus* filiformis,
Stigma. multifidum.

PER. Capsula 1-locularis,
 circumscissa.

SEM. plurima
Capparis spinosa, *
Alcaparras.

Vis. Cort. rad. Flor.
 E 2 con-

- condit*: adstringens, diuretica, emmenagoga.
- Chelidonium majus.** *Celidonia major.*
 Vis. diuretica, diaphoretica.
- *glaucium.* *Nigreta.*
- Papaver Rhoeas.** *Poupolbas.*
 Vis. flor. narcotica.
- Nymphaea lutea.** *Golfañ.*
 — *alba.*
 Vis. Flor. refrigerans, anodyna, hypnotica.
 Rad. vesicatoria. *exol.*
- Bixa orellana.** B. *Urucñ.*
 Semen fæculæ sistunt colorem rubrum tinctoribus in usu frequentissimum, eoque sylvestres Americani nuda sua corpora pingunt.
- Sloanea dentata.** B.
- Ochna Jabotapita.** B.
- Tilia europæa.** *
 Vis. Flor. anodyna, antispasmodica.
- Cistus ladaniferus.** *Estevas.*
 Ab hac planta Ladanum elicetur.
- β .
- *salvifolius.*
- *albildus.*
- *crispus.*
- *halimifolius.*
- *libanotis.*
- *umbellatus.*
- *canus.*
- *tuberaria.*
- *guttatus.*
- *salicifolius.*
- *thymifolius.*
- *helianthemum.*
- *verticillatus.*
- Obs.* Rami villosi: folia nervosa in mucronem desinentia: differt ab *incano* floribus subsessilibus, verticillatis.

DIGYNIA.

Pæonia officinalis.

Pionia.

Vis. Rad. narcotica; antispasmodica, anodyna, hypnotica, pellens, emmenagoga. Flor. sporifera.

Delphinium consolida. *Esporas.*

Corollæ succus coeruleum pigmentum, cum alumine coctus, constituit.

— *staphysagria.* *Paparras.*
 Vis. sem. drastica, anthematica, anthelminthica.

TETRA.

- TETRAGYNIA.** — *squammosa*. B.
Anemone pulsatilla. *
- MARIALVA.** Fig. 16. Vis. corrodens, rube-
 faciens.
- CAL.** Per. diphyllum, fo-
 liolis reflexis, conca-
 vis.
- *coronaria*. * *Anemola*.
 — *palmata*.
 — *decapetala*. B.
- COR.** Petala 4, reflexo-
 concava, infera. *Clematis viticella*.
 — *vitalba*.
 — *flammula*.
- STAM.** Filamenta nume-
 rosa: *Antheræ* simplices. *Thalictrum flavum*.
- PIST.** Germen ovatum; *Radix, & folia luteo co-*
Stylus nullus: Stigma lore lanas tingunt.
 peltato-fessile, planum, *Adonis vernalis*.
 margine profunde cre- *Ranunculus flammula*.
 natum, persistens. — *gramineus*.
 — *bullatus*.
 — *ficaria*.
- PER.** Capsula 4-ocularis, *Vis. cosmetica*.
 loculis 1-spermis. — *sceleratus*.
 — *asiaticus*. * *Bourboletas, Ranunculos*.
 — *acris*.
 — *arvensis*.
 — *muricatus*.
 — *aquatilis*.
- SEM.** 4. B. *Helleborus foetidus*.
Caltha palustris.
- PENTAGYNIA.** *Corollæ succus luteum a-*
 — *tramentum, cum alumi-*
 — *ne coctus, edit.*
- Aquilegia vulgaris*. *
 Vis. pellens, exanthe-
 matica.
- Nigella damascena*.
 — *hispanica*.
- POLYGYNIA.**
- Anona muricata*. B.
Fruta do Conde.



CLASSIS XV.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

- Ajuga orientalis.*
 — *pyramidalis.*
 Vis. subadstringens ,
 vulneraria.
Teucrium nissolianum.
 — *iva.*
 — *chamaepytis.*
 Vis. resolvens, pellens,
 emmenagoga.
 — *fruticans.*
 — *marum.* *
 Vis. resolvens , nervi-
 na , pellens, emmenago-
 ga, errhina , cordialis.
 — *scorodonia.*
 — *scordium.*
 Vis. balsamica , toni-
 ca , antiseptica ! antife-
 brilis , pellens , diapho-
 retica , anthelmintica.
 — *flavum.*
 — *polium.*
 — *spinosum.*
Satureja montana.
 — *hortensis.* * *Segurelha.*
 Vis. resolvens , exci-
 tans , pellens , aphrodisi-
 fiaca.
Nepeta cataria.
 Vis. pellens , cephalica ,
 anthelmintica.
 — *tuberosa.*
Lavandula spica. * *Alfazema.*
 Vis. Flor. nervina, ce-
 phalica , uterina.
 — *foechas.* *Rosmaninbo.*
 Vis. Flor. cephalica ;
 nervina.
Sideritis incana.
Mentha rotundifolia:
 — *crispa.* * *Hortelã.*
 Vis. resolvens, pellens,
 carminativa , emmena-
 goga , stomachica.
 — *aquatica.*
 — *sativa.* *
 — *arvensis.*
 — *pulegium.* *Poejo.*
 Vis. *M-crispae*, sed forti-
 or , minisque adstrin-
 gens

- gens, emmenagoga.
Glecoma hederacea. Era
terrestre.
 Vis. adstringens, vul-
 neraria.
Lamium purpureum.
 — *amplexicaule.*
Galeopsis tetrahit.
Betonica officinalis.
 Vis. nervina, tonica,
 errhina, sternutatoria,
Rad. emetica.
 — *alopecurus.*
Stachys sylvatica.
 • *Herba luteo tingit colore.*
 — *recta.*
Marrubium allysson.
 — *candidissimum.*
 — *vulgare. Maroio.*
 Vis. pellens, emmena-
 goga, stomachica, an-
 thelmintica.
 — *pseudo dictamnus.*
Phlomis fruticosa.
 — *purpurea.*
 — *nepetifolia. B.*
Origanum creticum. Ore-
go.
 Vis. stimulans.
 — *vulgare.*
 Summitates purpurascen-
 tem colorem sistant.
 — *majorana. * Mangero-*
na.
 Vis. resolvens, nervi-
 na, cephalica; stoma-
 chica.
Thymus capitulis subver-
ticillatis, multifloris.
 Foliis cordatis, acutis,
 duplicato-ferratis, fessi-
 libus, nervosis; caule
 erecto. B.
 — floribus spicato-pedun-
 culatis, pedunculis revo-
 lutis: foliis oblongis,
 acuminatis, ferratis, re-
 flexis, subtus villosis:
 caule erecto, ramofo. B.
 — *serpillum. Serpaõ.*
 Vis. resolvens, exci-
 tans, adstringens. exol.
 — *vulgaris. Tomilho.*
 Vis. resolvens, exci-
 tans, nervina, corro-
 borans.
 — *zygis.*
 — *cephalotus. β. Ψ.*
 — *villosus. β.*
*Melissa officinalis. * Er-*
va cidreira.
 Vis. resolvens, exci-
 tans, cordialis.
 — *calamintha.*
 Vis. resolvens, expe-
 ctorans, stomachica.
 — *nepeta.*
 — *cretica.*
Dracocephalum austria-
cum.

- cum.*
 Melittis *mellissophyllum.*
 Ocimum *basilicum.* *
Basilico.
 Vis. nervina, cordialis.
 Scutellaria *galericulata.*
 Prunella *vulgaris.*
 Vis. adstringens. *exol.*
 — *grandiflora.*
 Cleonia *lusitanica.*
- ANGIOSPERMIA.
- PALIAVANA. Fig. 17.
 CAL. Per. monophyllum, superum, 5-fidum, persistens.
 COR. monopetala, campanulata. *Tubus* magnus, patens, superius ventricosus, basi cylindracea. *Limbus* parvus, 5-fidus, laciniis subæqualibus, parvis, revolutis, obtusis.
 STAM. Filamenta 4. subulata, basi corollæ inserta, quorum duo longiora per paria approximata. Rudimentum quinti filamenti. *Antheræ* didymæ.
 PIST. Germen acuminatum. *Stylus* subulatus, staminibus longior. *Stigma* capita tum.
- PÉR. Capsula 5-ocularis; polysperma.
 SEM. plurima. B.
 Rhinanthus *crista galli.* 3.
 Euphrasia *latifolia.*
 — *linifolia.*
 Pedicularis *sylvatica.*
 — *flammea.*
 Antirrhinum *cymbalaria.*
 — *elatine.*
 — *spurium.*
 — *sparteum.*
 — *bipunctatum.*
 — *triste.*
 — *arvense.*
 — *pelisserianum.*
 — *saxatile.*
 — *tricornitophorum.*
 — *junceum.*
 — *linaria.*
 Vis. anodyna, pellens; diuretica. *exol.*
 — *majus.* Cabeça de bezero.
 — *orontium.*
 Scrophularia *nodosa.* Escrofularia.
 Vis. anodyna, repellens, sudorifera, carminativa, anthelmintica.
 — *aquatica.* auri

- ┆ *auriculata.*
- ┆ *scorodonia.*
- ┆ *betonicifolia.*
- ┆ *frutescens.*
- ┆ *sambucifolia.* B.
- ┆ *canina.*

Digitalis purpurea.

- ┆ *thapsi.*
- ┆ *lutea.*

Bignonia pentaphylla. B.

- ┆ foliis conjugatis, ternatisque, cirrhosis, foliis oblongo-ovatis: racemis terminalibus: caule volubili. B.

Obj. cal. 5-fidus, 5-angularis, angulis membranaceis: *Cor.* hypocrateriformis, 5-fida. Rudimentum quinti filamenti. *Vellozo.*

┆ *unguis.* B.

┆ *leucoxydon.* B.

Obj. cal. 2-fidus, cyathiformis. *Cor.* infundibuliformis, 5-fida. Stamina propria approximata. Rudimentum quinti filamenti. Siliqua 2-ocularis. Semina membranaceo-alata.

- ┆ foliis conjugatis, ternatisque, foliolis oblongo-lanceolatis, subtus tomentosis: pedunculis

multifloris, caule erecto. B.

Obj. Cal. inflatus, maximus, irregulariter dentatus, longitudinaliter ruptus, spongiosus: *Cor.* 5-fida, fauce campanulata, ad basin coarctata: Stam. per paria approximata: Rudimentum quinti filamenti. Siliqua 2-ocularis: semina membranaceo-alata. *Vellozo.*

OROBANCHIA. fig. 18. 19.

COR. Per: monophyllum, pentagonum, persistens, laciniis acutis, inferioribus, brevioribus.

COR. monopetala, infera, villosa. Tubus subincurvus ad basin cylindraceus, superius ventricosus, ad apicem gibbus. *Limbus* 5-fidus, parvus: Faux coarctata, parva, laciniis subrotundis, minimis, æqualibus.

STAM. Filamenta 4 subulata, quorum duo longiora, per paria approximata.

- ximata, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ, conniventes.
- Nectarium glandula maxima, emarginata unilaterali germine, & ad ejus basin affixa.
- PIST.* Germen oblongum: *Stylus* filiformis, pilosus, staminibus brevior. *Stigma* bilobum.
- PER.* Capsula 1-ocularis, 2-capsularis: semina plurima. B.
- Obs.* ad Orobanchem accedit ob glandulam.
- foliis lato-lanceolatis, calycis laciniis subrotundis, dentatis, glabris. B. *fig.* 18.
- Obs.* Caulis radicans scandens: petiolis purpurascentibus: Cal. coccineus: Corolla laciniis flavicantibus, hirsuta.
- foliis oblongis, calycis laciniis lanceolato-ovatis, marginibus pilosis. B. *fig.* 19. *Vellozo.*
- CONTARENIA fig.* 20.
- CAL.* Per. tubulosum, bifidum, persistens.
- COR.* monopetala, ligulata, recta, apice tridentata, persistens, calyce minor.
- STAM.* Filamenta 4. filiformia, corolla breviora. *Antheræ* simplices, incumbentes.
- PIST.* Germen ovatum. *Stylus* filiformis, incurvus, persistens. *Stigma* capitatum.
- PER.* Capsula 2-ocularis: *SEM.* plurima, oblonga. B.
- foliis lineari-lanceolatis, 3-nerviis, sessilibus, pilosis, crispis: spicis comosis, coloratis. B.
- LIMIA Fig.* 21.
- CAL.* Per. monophyllum, 5-dentatum.
- COR.* monopetala, ringens. Tubus cylindraceus, calyce longior: *Limbus* 5-fidus, lacinia inferiore majore crenulata, basi supra pilosa: Lacinia superior semibifida.
- STAM.* Filamenta 4. quorum duo lateralia majora, interiora minora, tubo

tubo longiora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. Germen subrotundum: *Stylus* filiformis, *Stigma* bifidum.

PER. Drupa: Nux 4-ocularis, loculis 1-spermis.

SEM. 4. B.

— foliis quinatis, integerrimis, lato-lanceolatis: Floribus in capitulum congestis, axillaribus. B.

MENDONCIA fig. 22.

CAL. Per. 2-foliaceum, inferum, persistens, foliolis maximis, ciliatis, lanatis, conniventibus, Costa longitudinali prominentibus.

COR. monopetala, infera, *Tubus* basi, & apice gibbus: *Limbus* 5-fidus, laciniis minimis, obtusis, revolutis.

STAM. Filamenta minima, medio tubi affixa, duo majora: *Antheræ* maximæ, didymæ, oblongæ, acutæ, insidentes.

PIST. Germen subrotun-

dum. *Stylus* filiformis; persistens, *Stigma* bifidum.

PER. Drupa carnosâ. B.

— foliis ovatis, acutis, villosis, caule volubili: calycibus pedunculisque pilosis B. *Vellozo*.

MELLA Fig. 23.

CAL. Per. 5-phyllum, foliolis inæqualibus, ovato-lanceolatis, superior coeteris longior.

COR. monopetala, campanulata, *Tubus* cylindraceus, subincurvus, calyce brevior. *Limbus* 5-fidus, laciniis parvis, obtusis.

STAM. Filamenta 4, quorum duo breviora, tubo inserta, corolla breviora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. Germen rotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bifidum.

PER. Capsula 2-ocularis, 4-valvis, polysperma.

SEM. plurima. B.

— foliis lato-lanceolatis, F 2 serratis

- ferratis. B.
 Crescentia cuyete. B.
 Lantana camara. B.
 — involucrata. B.
 — aculeata. B.
 — prostrata. B.
 Erinus alpinus.
 Sibthorpia europaea
 Orobanche major.
- cernua.
 Acanthus mollis. Erva gigantea.
 Herbam luteo inficere ab antiquissimis temporibus constat.
 Et circumtextum croceo velamen Acantho.
 Virg. Aen. 1. 653.



CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

SILICULOSA.

- Myagrum perenne.
 — hispanicum.
 — perfoliatum.
 — paniculatum.
 Draba incana.
 Lepidium nudicaule.
 — petraeum.
 — latifolium.
 Thlaspi campestre.
 — montanum.
 — perfoliatum. Mostardeira brava.
 — bursa pastoris.
 Cochlearia officinalis.
 Vis. diuretica, mundificans.
- coronopus.
 — draba.
 Iberis linifolia.
 Alyssum spinosum.
 — incanum.
 — minimum.
 — montanum.
 Clypeola maritima.
 Biscutella auriculata.
 — apula.
 Lunaria rediviva.
 SILIQUOSA.
 Cardamine bellidifolia.
 — petraea.
 — pratensis.
- Sifyma

- Sisymbrium nasturtium.*
Agricoens.
 Vis. diuretica.
 — *amphibium.*
 — *Para.*
 — *catholicum.*
 — *valentinum.*
 — *asperum.*
 — *sophia.*
Erysimum officinale.
Saramago, ou Rinchaõ.
 Vis. abstergens, diuretica.
 — *barbarea.*
 — *cheirantoides.*
*Cheiranthus cheiri.**
Goivo.
 Vis. narcotica, nervina, anodyna, pellens uterina.
 — *annuus.*
 — *tricuspidatus.*
Hesperis inodora.
- Arabis thaliana.*
 — *turrita.*
Turritis hirsuta.
Brasica napus. Nabo.*
 — *rapa.* Rabo redondo.*
 Vis. diluens, flatulenta.
 — *oleracea.* Couve.*
 — *erucastrum.*
Sinapis orientalis.
 — *nigra.* Mostardeira.*
 Vis. incidens, rubefaciens, stimulans, diuretica, aphrodisiaca.
 — *incana.*
 — *laevigata.*
Raphanus sativus. Rabo.*
Bunias cakile.
Ifatis lusitanica.
Herbae fæcula coeruleum
 colorem gignit.
Cleome spinosa. B.
 — *ferrata. B.*
 — *violacea.*





CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

PENTANDRIA.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Walteria americana. B. | Sida rhombifolia. B. |
| β. foliis ovatis. | — triquetra. B. |
| Melochia pyramidata. B. | — paniculata. B. |
| | — periplocifolia. B. |
| | — abutilon. B. |
| | Althaea officinalis. Mal- |
| | vaisco. |
| | Vis. emolliens, invis- |
| | cans, nutriens, lubri- |
| | cans. |
| | — hirsuta. |
| | Alcea rosea. * |
| | Vis. emolliens, invis- |
| | cans, lubricans. |
| | — ficifolia. * |
| | Malva bryonifolia. |
| | — parviflora, |
| | — rotundifolia. Malva. |
| | Vis. emolliens, invis- |
| | cans, lubricans, nutri- |
| | ens. |
| | — sylvestris. |
| | — mauritana. |
| | — crispa. |
| | — moschata. |
| | Lavatera micans. |
| | tril- |
- DECANDRIA.
- Geranium romanum.
- cicutarium. Bico de ci-
- conba.
- moschatum
- Vis. anodyna, vulne-
- raria, exanthematica.
- malacoides.
- gruinum.
- ciconium.
- phoeum.
- sylvaticum.
- palustre.
- robertianum.
- Vis. anodyna, pellens,
- adstringens, vulneraria.
- dissectum.
- rotundifolium
- POLYANDRIA.
- Bombax ceiba. B.

- *triloba*.
- *lusitanica*.
- *trimestrit*.
- Gossypium *arborescens*: B.
- Algodão.
- *hirsutum*. B.
- Hibiscus *brasiliensis*. B.
- *rosa sinensis*. *
- *esculentus*. B. Quiaios



CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

- Fumaria *enneaphylla*.
- *officinalis*. Erva mo-
lerrinha.
Vis. balsamica, toni-
ca, antacida, corrobo-
rans, pellens.
- *capreolata*.
- *spicata*.
- *paniculata*. β. B.
- Floribus cristatis, subspi-
catis: caule herbaceo,
erecto, superne ramoso:
foliis lineari-lanceolatis.
B.
- Securidica *volubilis*. B.

OCTANDRIA.

DECANDRIA.

- Polygala *asphaltica*. B.
- *brasiliensis*. B.
- floribus imberbibus,
racemosis, caule subar-
boreo: foliis lato-lan-
ceolatis, integris, gla-
bris. B.
- *monspeliaca*.
- *microphylla*.
- Abrus *preparatorius*. B.
- Erythrina *coralloden-
dron*. B.
- *cristagalli*. B.
- Spartium *junceum*. Giesta.
- *monospermum*.
- *scorpius*.
- *patens*.
- Genista *tridentata*. Car-
queja.

- queja.*
 — *florida.*
 — *lusitanica.*
Ulex europaeus. Tojo & β.
Crotalaria sagittalis. B.
Ononis floribus sessilibus, subspiatis, unguibus longis: foliis inferioribus ternatis, petiolatis, basi stipulis lateralibus membranaceis, connatis, piloso-ciliatis: foliis superioribus simplicibus: ramis inermibus, pilosis. B. *Vellozo.*
 — *arvensis.*
 Vis. diuretica, emmenagoga.
 — *mitissima.*
 — *alopecuroides.*
 — *cherleiri.*
 — *viscosa.*
 — *natrix.*
 — *crispa.*
Anthyllis tetraphylla.
 — *vulneraria.*
Luteo colore tingit.
 — *montana.*
 — *lotoides.*
 — *heterophylla.*
Arachis hypogaea. *Mundubi.*
Lupinus calycibus alternis, appendiculatis: labio superiore 2-fido; inferiore 3-fido: foliis oblongo-sublanceolatis, mucronatis, integerrimis, utrinque villosis. B.
 — *albus.* * *Tremoços.*
 Vis. flatulenta, anthelmintica.
 — *varius.*
 — *luteus.*
Phaseolus vulgaris. * *Feijão.*
 Vis. nutriens, flatulenta, cosmetica.
 — *inamoenus.* *
 — *caracalla.* * *Caracoleiro.*
 — *nanus.* *
 — *radiatus.* *
Dolichos caule erecto; perenni, angulato: pedunculis multifloris: leguminibus pendulis: petiolis angulatis, basi callosis. B. *Guandos*
Usus: Legumen esculentum.
 — *lablab.* B. *Mangaio.*
 — *urens.* B.
 — *lignosus.* *
Pisum sativum. * *Ervilhas.*
 Vis. nutriens, flatulenta.
 — *ocbrus.*

Glycine

- Glycine *subterranea*. B. Hippocrepis *multifiliquosa*
 Clitoria *brasiliana*. B. Scorpiurus *vermiculata*.
 Orobus *pyrenaicus*.
 Lathyrus *aphaca*. Erv-
 lbaca. Hedyfarum Wade. B.
 setifolius. Fasc. plant. pag. 17.
 angulatus. — *retroflexum*. B.
 articulatus. Carrapixo de amores.
 tuberosus. — foliis ternatis, ovato-
 pratensis. oblongis, lateralibus;
 sylvestris. ab altera parte majori-
 latifolius. bus: caule volubili, ra-
 cemis axillaribus. B.
 Vicia *sativa*. * Cruanha.
 lutea. — *diphyllum*. β. foliis bi-
 Faba * *Favas*. natis, petiolatis: stipu-
 Vis. nutriens, flatulen- lis geminis, lanceolatis,
 ta. fessilibus, peltatis: flo-
 Cicer *arietinum*. * *Ciceros*. ribus spicatis: spica dis-
 Vis. nutriens, flatulen- ticha, stipulata. B.
 ta, pellens. — *humile*.
 Cytisus *laburnum*. — *spinosissimum*.
 supinus. Indigofera *hirsuta*. B.
 Geoffroya *spinosa*. B. — *Anil*. B.
 Glycirrhiza *echinata*. Faeculae coeruleæ (Indi-
 glabra. *Alcaçus*. dige. s. succus coerule-
 Vis. edulcorans, in- us) inter omnes colo-
 crassans, expectorans, res præstantissimus.
 anthelmintica. — *argentea*. B.
 Coronilla *juncea*. Galega *officinalis*.
 emerus. * Phaca *boetica*.
 valentina. Astragalus *alopecuroides*.
 securidica. — *hamosus*.
 Ornithopus *perpusillus*. — *boeticus*.
 compressus. — *epiglottis*.
 scorpioides. G glaux.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - <i>glauca.</i> | - <i>spumosum.</i> |
| Biferrula <i>pelecinus.</i> | - <i>tomentosum.</i> |
| Pforalea <i>bituminosa.</i> | - <i>fragiferum.</i> |
| Trifolium <i>M. officinale.</i> | Lotus <i>creticus.</i> |
| <i>Trevo de cheiro.</i> | - <i>rectus.</i> |
| Vis. <i>resolvens, emol-</i> | - <i>corniculatus.</i> |
| <i>liens, lubricans.</i> | - <i>cytisoides.</i> |
| - <i>M. ornithopoides.</i> | - <i>doricnium.</i> |
| - <i>strictum.</i> | Trigonella <i>foenum grae-</i> |
| - <i>hybridum.</i> | <i>cum. Ervinba, ou Al-</i> |
| - <i>pratense. Trevo.</i> | <i>foura.</i> |
| Vis. <i>Florum capitula</i> | Vis. <i>emolliens, invit-</i> |
| <i>viridi colore vestimen-</i> | <i>cans, lubricans.</i> |
| <i>ta lanca inficiunt.</i> | Medicago <i>sativa.</i> |
| - <i>squarrosum.</i> | - <i>falcata.</i> |
| - <i>angustifolium.</i> | - <i>marina.</i> |
| - <i>arvense.</i> | - <i>polymorpha.</i> |
| - <i>stellatum.</i> | - <i>intertexta.</i> |
| - <i>striatum.</i> | |



CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

- | | |
|--|----------------------------------|
| Theobroma <i>Cacao. B.</i> | ecc. |
| Vis. <i>fruct. nutriens,</i> | Vis. <i>flav. cardiaca, pel-</i> |
| <i>aphrodisiaca.</i> | <i>lens, stomachica. Pulp.</i> |
| | <i>refrigerans, attenuans,</i> |
| ICOSANDRIA. | <i>diuretica. Sem. anhel-</i> |
| | <i>mintica.</i> |
| Citrus <i>medica</i> * <i>Limociro</i> | <i>auran-</i> |

— *aurantinn* * *Larangei-
ra*.

Vis. *fruct.* Corrobo-
rans, anthelmintica,
pellens.

POLYANDRIA.

VISMIA. Fig. 24.

CAL. Per. coriaceum, mo-
nophyllum, inferum, 5-
partitum, persistens,
foliis ovato-acutis,
concavis.

COR. Petala 5, ovata,
intus pilosa.

STAM. filamenta plura in
5 phalanges s: corpora
connata, brevia, plana
incurva, apice multifida,
filamentis capillaribus,

villosis: *Anthera* pluri-
mae, subrotundae facie
externa filamenti spi-
rae instar dispositae, s:
fecundae.

Nectaria corpuscula s:
Glandulae 5. ovatae, pi-
lofae inter phalanges.

PIST. Germen subrotun-
dum. *Styli* 5. filiformes.

Stigmata peltata.

PER. Capsula 5-ocularis,
pentagona.

SEM. plurima. B.

Hypericum androsaemum.

— *quadrangulare.*

— *perforatum. Ipericab.*

Vis. vulneraria, resol-
vens, anthelmintica.

— *humifusum.*

— *crispum.*

— *montanum.*



CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

ÆQUALIS.

Tragopogon pratense.

Vis. nutriens.

— *porrifolium.*

— *villosum.*

— *picroides.*

*Scorzonera hispanica. Es-
corzoneira.*

G 2

gra-

- *graminisfolia.*
- *laciniata.*
- *tingitana.*
- *picroides.*
- Picris *echioides.*
- *hieracioides.*
- Sonchus *arvensis.*
- *oleraceus.*
- *tenerimus.*
- Lactuca *fativa.* * *Alfacia*
- Vis. diluens, humectans, paregorica, antivenerea.
- *scariola. Serralba.*
- *virosa.*
- *perennis.*
- Chondrilla *juncea.*
- Prenanthes *viminea.*
- Leontodon *taraxacum.*
- Vis. saponacea, diluens, humectans, diuretica.
- *tuberosum.*
- *bispidium.*
- *hirtum.*
- Hieracium *pillosela.*
- Vis. adstringens, vulneraria.
- *murorum.*
- *spregerianum.*
- Crepis *barbata.*
- *Dioscoridis.*
- Andryala *integrifolia.*
- Hyoferis *bedypnois.*
- *Rbagadioloides.*
- Lapsana *communis.*
- *stellata.*
- *rbagadiolus.*
- Cichorium *intybus.*
- Almeiraõ.*
- Vis. diluens, humectans, tonica.
- *endivia.* * *Cicoria.*
- Vis. aperiens, diuretica.
- *spinosum.*
- Scolymus *maculatus.*
- *hispanicus.*
- Arctium *lappa. Bardana;*
ou pegamaça.
- Vis. diuretica, semipur-gans.
- Carduus *lanceolatus.*
- *acanthoides.*
- *palustris.*
- *pycnocephalus.*
- *tuberosus.*
- *marianus. Cardo.*
de S. Maria.
- Vis. *sem. thoracica;*
sudorifera, diuretica.
- *Foliis petiolatis, integerrimis, ovato-lanceolatis: caule aculeato, aculeis geminis: floribus terminalibus, foliariis. B.*
- *eriophorus.*
- *acaulis.*
- Cnicus *acarna.* cen-

- *centauroides*.
 — Folii lato-lanceolatis : caule ramofo : floribus axillaribus , pedunculatis , pedunculis longiffimis : squamis calycinis muticis , coloratis : bracteis maximis : calycibus glutinosis. B.
Obs. Receptaculum subpaleaceum : Pappus apice subplumofus : folia fubtus albida. *Vellozo*.
 — Folii femiamplexicaulibus , integerrimis , inferioribus lato-sublanceolatis , superioribus ovato-sublanceolatis : caule ramofo : floribus axillaribus , sessilibus : squamis calycinis apice spinosis. B.
Obs. Receptaculum paleaceum : Pappus apice plumofus : Calycis squamæ spina simplici terminatæ. Folia utrinque albida. *Vellozo*.
Onopordum illyricum.
 — *arabicum*.
Cynara scolymus. * *Alcachofra*.
 — *cardunculus*. * *Cardo*.
Carlina corymbosa.
 — *racemosa*.
- *pyrenaica*.
Atractylis gummifera.
 — *cancellata*.
Carthamus tinctoria. *
Açafroa.
 Vis. purgans, diuretica.
 Corollæ roseum colorem , acido præparatæ , præbent nitidiffimum.
 — *coeruleus*.
Bidens cernua.
 — *bullata*. B.
 β. foliis ternatis , ovatis , ferratis , intermedio majori : corollis femiradiatis. B.
Eupatorium Dalea. B.
 — *odoratum*. B.
 — *cannabinum*.
 Vis. corroborans , vulneraria : *Rad.* purgans.
 — Folii ovato-oblongis , obtusis , subtus tomentosis. B.
 — Folii linearibus , infra tomentosis , capitulis terminalibus. B.
Obs. Pappus paleaceus , calyces triflori : *Vellozo*.
 — *coyzoides*. B.
 — *coelestinum*. β. B.
Obs. folia cordata , dentata.
- Folii

- Foliis ovato-lanceolatis, ferratis, petiolatis, calycibus multifloris. B.
Obs. Petala subulata. Folia, & caules villosi.
- Foliis ovato-oblongis, bullatis, subtus sericeis: calycibus decemfloris. B.
Obs. Calycis lacinae exteriores foliaceae, subtus sericeae, interiores membranaceae, apicibus pilosis. B.
- Variat calycibus octo-floris: petioli ancipites.
- Foliis lanceolatis, ad apicem ferratis, trinerviis: calycibus multifloris; squamis calycinis membranaceis, medio macula notatis. B.
Obs. Pappus vix aut ne vix quidem plumosus.
- Foliis ovato-oblongis, obtusis, integerrimis: utrinque villosis: calycibus multifloris. B.
Obs. Pappus subplumosus: Cal: imbricatus.
- Foliis cuneiformibus, ad apicem dentatis, calycibus multifloris. B.
Obs. Flores, & calyces resina agglutinati. Pappus apice subplumosus.
- Foliis lato-lanceolatis, obtuse ferratis, subtus tomentosus: caule summo pilosissimo: calycibus 12. floris. B.
Obs. Pappus pilosus, calyces 11-12-flori.
- Foliis ovatis, basi integerrimis, supra dentatis, subtus perforatis, villosis. B.
Obs. Pappus pilosus.
- Foliis angusto-lanceolatis, enerviis, integerrimis, subtus nigropunctatis: calycibus multifloris. B.
Obs. Pappus pilosus. *Vellozo.*
- Cacalia repens.* B.
 — *sonchifolia.* B. β.
Obs. Folia semiamplexicaulia: lacinae foliorum dentato-spinosae: folia, & caules spinosi.
- *incana.* β. B.
- Foliis lato-lanceolatis, serrato-dentatis, subhastatis. B.
- Stachlina dubia.*
- Santolina chamaecyparissus.* *
- Vis. balsamica, tonica, diaphoretica, carminativa,

tiva, anthelmintica.
 — *rosmarinifolia*.
 Athanasia *maritima*.
 POLYGAMIA
superflua.
 Tanacetum *annuum*.
 — *balsamita*. * *Balsamo*.
 Vis. stomachica, pel-
 lens, emmenagoga.
 Artemisia *crithmifolia*.
 — *absinthium*. *Losna*.
 Vis. balsamica, anta-
 cidica, antiseptica, an-
 thelmintica, antivene-
 rea, antiophthalmica.
 — *vulgaris*.
 Vis. corroborans, ana-
 leptica, uterina, pellens.
 Gnaphalium *staechas*.
 — *arenarium*.
 Vis. exsiccans.
 — *luteo-album*.
 — *margaritaceum*.
 — *sylvaticum*.
 Xeranthemum *annuum*.
 Baccharis *brasiliensis*. B.
 Conyza *squarrosa*.
 — *hirsuta*. B.
 Erigeron *viscosum*.
 — *bonariense*. B.
 Senecio corollis revolutis:
 foliis semiamplexicauli-
 bus, hastato-lanceolatis,

dentatis, viscidis: squa-
 mis calycinis laxis, spha-
 celatis, integris, magnis.
 B.
 — *vulgaris*.
 — *elegans*. *
 — *Jacobaea*. *Tasneira*.
 Tingit colore viridi.
 Aster *tripolium*.
 Solidago *virga aurea*.
 Vis. vulneraria, diu-
 retica.
 Inula *belenium*.
 — *dysenterica*.
 — *pulicaria*.
 — *crithmifolia*.
 Arnica *montana*.
 Vis. pellens, resolvens;
 narcotica, vomitoria,
 purgans, diuretica.
 Doronicum *plantagine-
 um*.
 Perdicium *brasiliense*. B.
 Bellis *perennis*.
 Vis. vulneraria, ecco-
 protica.
 — *annua*.
 Tagetes *patula*. *
 Cravo de defuntos.
 — *erecta*. *
 Chrysanthemum *leucanthe-
 mum*.
 Vis. diuretica, vulne-
 raria.
 sege-

- *segetum*.
 — *myconis*.
 — *coronarium*. Bem me-
 queres.
 Matricaria *parthenium*. *
 Artemisia.
 Vis. anodyna, hysteri-
 ca!
 — *chamomilla*. Macella.
 Vis. emolliens.
 Cotula *anthemoides*.
 Anacyclus *valentinus*.
 Anthemis *maritima*.
 — *mixta*.
 — *nobilis*.
 Vis. balsamica, pare-
 gorica, antispasmodica,
 emmenagoga, carmina-
 tiva.
 — *arvensis*.
 — *cotula*.
 Vis. anodyna, pellens.
 — *valentina*.
 — *repanda*.
 Achillea *ageratum*.
 Macella *Francesca*.
 — *ptarmica*.
 — *millefolium*. * Millefo-
 lio.
 Vis. narcotica, inebri-
 ans, tonica, sistens e-
 vacuationes, vulneraria.
 Buphtalmum. *spinosum*.
 Olho de Boi.
 — *aquaticum*.
- POLYGAMIA
frustanea.
 Helianthus *annuus*. *
 Girasol.
 — *tuberosus*. * *Batatas*
 vermelhas.
 Coreopsis *reptans* B.
 Centaurea *moschata*. *
 — *pullata*.
 — *sempervirens*. *Lavapé*,
 Viornal.
 — *stoebe*.
 — *jacea*.
 Luteum *colorem* praebet.
 — *alba*.
 — *Isnardi*.
 — *napifolia*.
 — *aspera*.
 — *eriophora*.
 — *calcitrapa*.
 Vis. balsamica, tonica,
 — *solstitialis*.
 — *salmantica*.
- POLYGAMIA
necessaria.
 Calendula *officinalis*. *Erva*
vaguira.
 Vis. pellens, emmena-
 goga, sudurifora, exan-
 thematica.
 Othonna *maritima*.
 Fila-

Vis. inviscans, lubri- — *incarnata*. B.
cans, nutriens, aphro- — *coerulea*. B.
disiaca. Martirio. *

— *papilionacea*.

Ophris *spiralis*.

— *anthropophora*.

— *insectifera*.

— *myodes*. Abelhas.

Serapias *latifolia*.

— *rubra*.

— *lingua*.

Epidendrum *Vanilla*. B;

Vainilha.

Vis. Melancholia.

— *nodosum*. B.

TRIANDRIA:

Sifyrinchium *palmifolium*.

β.

PENTANDRIA.

Passiflora foliis indivisis ;
ovatis, integerrimis ;
bracteis dentatis : peti-
olis 4-glandulosis, caule
tetragono, membrana-
ceo. B.

Obs. a *laurifolia*
differt petiolis 4-glan-
dulosis.

— *pallida*. B.

— *maliformis*. B.

— *rubra*. B.

— *murucujá*. B.

HEXANDRIA.

Aristolochia *peltata*. B.

Farrinho.

— *maxima*. B.

— *pistlochhia*.

— *rotunda*.

Vis. incidens, vomito-
ria, pellens, diureti-
ca, emmenagoga.

— *longa*.

Vis. praecedentis.

Pestia *stratiotes*. B.

DECANDRIA;

Helicteres *Ijora*. B.

DODECANDRIA.

Cytinus *hypocystis*. *Ipoctis-*
tides.

Vis. adstringens.

POLYANDRIA.

Arum acaule : foliis cor-
dato-sagittatis : angulis
posticis rotundatis. B.
Tanberaõ.

Obs.

- Obs.* Discus foliorum coccineus.
- *triphyllum*. B.
- *colocossia*. * *Igname*.
- *esculentum*. B.
- *maculatum*.
- Vis. calefaciens, inci-
- dens, saponacea, expectorans, cosmetica. *Rad.* corrodens, rubefaciens, vesicans.
- *arisarum*.
- Zoster marina*.



CLASSIS XXI.

MONOECIA

DIANDRIA.

Lemna trisulca.

TRIANDRIA.

Typha angustifolia.

Sparganium erectum.

Espadana delgada.

Zea mays. B. * *L. Milho*.

Tripsacum dactyloides. B.

Carex dioica.

— *loliacea*.

— *montana*.

— *capillaris*.

— *pallescens*.

— *caespitosa*.

— *acuta*.

Phyllanthus Niruri. B.

— Foliis subcuneiformibus, crenis floriferis. B.

Obs. stamina monadel-

phia.

— Foliis pinnatis: foliolis ovato-acuminatis, pedunculatis: caule erecto, frutescente. B.

Obs. Nectar. 5., cuneiformia, receptaculo inferta.

TETRANDRIA.

Betula alba.

Vis. Diaphoretica.

folia luteo debili colore inficiunt.

— *alnus*.

Cortex rufo colore inficit.

Buxus sempervirens. *

Vis. sudorifera, mun-

H 2

difi-

- dificans; *fol.* purgans, pellens.
Urtica urens. Urtiga.
 - *dioica.*
 Vis. diuretica, *extus* stimulans: *Radix* luteum colorem praebet.
 - *aesvuans. B.*
*Morus alba. * Amoreira.*
 - *nigra. **
 Vis. refrigerans, corroborans.
 - *tinctoria. B. Jataiba.*

PENTANDRIA.

- Xanthium spinosum.*
*Amaranthus tristis. **
 - *blitum. Bredos.*
 - *viridis. B.*
 - *hypocondriacus. **
 - *caudatus. **

POLYANDRIA:

- Ceratophyllum demersum.*
Sagittaria sagittifolia.
Theligonum cynocrambe.
Poterium sanguisorba.
Pimpinella.
 Vis. adstringens, vulneraria.
 - *hybridum.*
Quercus ilex.
 - *nana.*

- *suber. Sobreiro.*
 Vis. adstringens, coriaria.
 - *esculus. Bolota.*
 - *robur. Carvalho.*
 Vis. adstringens, coriaria, obstipans; *Nigrum martiale* intensius reddit.
*Juglans regia. * Nogueira.*
 Vis. narcotica, pellens, emmenagoga, anthelmintica, paralytica.
Fagus castanea. Castanbeiro.
 Vis. fruct. flatulenta, temulentans, febrilis.
 - *sylvatica. Faja.*
*Corylus avellana. * Avelã.*
 Vis. olei anodyna.

MONADELPHIA.

- Pinus sylvestris. Pinheiro.*
 Vis. diuretica, mundificans.
 - *pineae. Pinheiro manço.*
 Vis. fruct. nutriens, a phrodifiaca.
 - *maximo fructu. B.*
*Cupressus sempervirens. **
Arcipreste.
 Vis. adstringens.
Acalypha indica. B.
Croton cascarilla. B.
 Vis.

Vis. tonica, subec-
protica, thoracica.

— *tinctorium*.

Vis. acidum indicandi,
caeruleo colore inficit.

— *lobatum*. B.

— Foliis trilobo-cordatis,
lobis lanceolatis, ferra-
tis, subtus tomentosis,
supra punctis villosis,
stellatis: ramulis, spicis,
calycibus faeminarum
tomentosis: floribus pe-
dunculatis, subspicatis.
B.

Obs. Masc. Cal. 5-fi-
dus. Stam. 13. 18. basi
connexa. Faem. Cal. 5-
partitus: *Stylis* 3., mul-
tifidi. Nectar: in utro-
que sexu glandulae 5.
receptaculo affixae. *Vel-
lozo*.

— *Tiglium*. β. B.

— Foliis cordato-acumi-
natis, utrinque tomen-
tosis, basi 4-glandulosis,
subdenticulatis, denticu-
lis glandiferis: ramulis,
petiolisque scabris: pe-
tiolis basi utrinque sti-
pulis subulatis: caule
arboreo. B. *Sangu de
Drago*.

Obs. Cal. 5-fidus. Stam.

30. Faem. Cal. 10-par-
titus: lacinae alternae
5, minimae, subulatae.
Styl. 3. 2-fidi. Capsula
aculeata.

— *variegatum*. β. B.

Obs. Cal. 5-partitus.
Stam. 11. Faem. calyx
5-phyllus, foliolis pe-
tiolatis, inaequalibus.
Styli 3, 2-fidi. Capsu-
la glandulosa. Folia lan-
ceolata, irregulariter
crenata, glabra, supra
punctis albicantibus,
subtus flavescensibus ma-
culata, obtusa cum mu-
crone petiolata

Jatropha curcas. B.

Vis. *fruct.* drastica, in-
flammatoria.

— *multifida*. B.

— *Manihot*. B.

Mandioca.

— *Manihot*. β. B.

Aipim.

Obs. filamenta 10.

— *urens*. B.

Ricinus communis. B. * L.

Vis. *fruct.* drastica. *Ol.*
anthelmintica.

SYNGENESIA.

Momordica elaterium. *Pf-
pi-*

- pino de S. Gregorio.*
 Vis. drastica, hydra-
 goga, emmenagoga.
 — *Balsamina.* *
Cucurbita lagenaria. *
Cabaço.
 Vis. edulcorans, refri-
 gerans.
 — *pepo* * *Abobora.*
 — *melo* *pepo.* *
 — *citrullus.* * *Melancia.*
- Vis. cucurbitae.
Cucumis melo. *Melaõ.*
 Vis. cucurbitae.
 — *sativus.* *Pepino.* *
 — *anguinus.* *
Bryonia. alba. *Brioa,* ou
Norca.
 Vis. purgans, pellens,
 anthelmintica, emmen-
 goga.
Sicyos laciniata. B.



CLASSIS XXII.

DIOECIA

DIANDRIA.

Salix amygdalina. *Sal-*
gueiro.

Vis. Cort: antifebrilis.

— *arenaria.*

— *viminalis.*

— *alba.*

Vis. antivenerea.

— *babylonica.* *

TRIANDRIA.

Empetrum album. *Cama-*
rinheira.

Osyris alba.

PENTANDRIA.

Pistacia terebinthus. *Cor-*
nilheira.

Vis. *Resinae* resolvens,
 emolliens, vulneraria,
 diuretica.

— *Lentiscus.* *Aroeira.*

Vis. corroborans, sto-
 machica.

Spinacia oleracea. *

Espinafres.

Vis. diluens, humectans:

Cannabis sativa. *Linbo.*

canba:

canhamo.

Vis. narcotica, phantastica, dementans, anodyna, repellens.

Humulus lupulus.

Vis. tonica, anodyna, phantastica, narcotica.
Fevillea trilobata. B.

HEXANDRIA.

Tamus communis.

Smilax aspera. Legacaõ.

— *sarsaparilla.* B. *sarsaparilha.*

Vis. Rad. diuretica, sudorifera, purificans.

OCTANDRIA.

Populus alba. Choupo.

— *nigra.*

Vis. Gem: obtundens, emolliens, soporifera.

ENNEANDRIA.

Mercurialis ambigua.

— *annua.* *Mercuriaes.*

Vis. purgans, repellens,

cosmetica.

Hydrocharis morsus ranae.

DECANDRIA.

Carica papaya. B. *Mamaõ.*

Schinus Areira. B.

MONADELPHIA.

Juniperus sabina.

Vis. emmenagoga! antihelmintica, exanthematica, diuretica, depilans.

— *communis.*

Vis. vulneraria.

— *oxycedrus.* *Simbro.*

Cissampelos Pareira. B.

Vis. Rad. diuretica; demulcens, purificans.

SYNGENESIA.

Ruscus aculeatus. *Gilbarbeira.*

Vis. Rad. corroborans; demulcens, emmenagoga, diuretica, coriaria.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| pectorans. | lubricans ; emolliens ; |
| <i>Ficus carica. Figueira.</i> | hepatica, diuretica, ec- |
| Vis. fruct. nutriens ; | coprotica, exanthema- |
| impinguans, obtundens, | tica. |



CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES.

- | | |
|--|------------------------------|
| <i>Equisetum arvense. Cavalina.</i> | — <i>cruciatum.</i> B. |
| Vis. adstringens, diuretica. | — <i>calomelanos.</i> β. B. |
| — <i>palustre.</i> | Pinnulis decurrentibus ; |
| — <i>fluviatile.</i> | sessilibus. |
| — <i>hyemale.</i> | — Frondibus supradecom- |
| <i>Ophioglossum lusitanicum.</i> | positis, pinnis laciniatis, |
| — <i>scandens.</i> B. | alternis : stipulis |
| <i>Osmunda hirsuta.</i> B. | pilosis. B. |
| — <i>regalis.</i> | <i>Pteris furcata.</i> B. |
| <i>Acrosticum citrifolium.</i> B. | — Frondibus bipinnatis : |
| — Frondibus pinnatis, foli- | pinnis, foliolis subcu- |
| olis binatis ; inferioribus | neiformibus integerrimis, |
| inaequalibus, linearilanceolatis, | alternis. B. |
| ferratis ; superioribus solitariis. B. | — Frondibus pinnatis : |
| — Frondibus pinnatis : | pinnis pinnatifidis, al- |
| pinnis alternis, pinnatifidis, | ternis ; lobis subovatis : |
| sessilibus, summis brevissimis, | glandula baseos pinna- |
| subtus basi glandulosis. B. | rum subtus. B. |
| | <i>Obs.</i> fructificatio in |
| | punctis marginalibus. B. |
| | <i>Vellozo.</i> |
| | I Fron- |

- Frondibus pinnatifidis: laciniis sub. 7. oblongo-lanceolatis, integerrimis, obtusis. B.
 — *aquilina. Feto.*
 Vis. Rad. anthelmintica.
 Lonchitis frondibus supradecompositis, aculeatis: pinnis pinnatifidis, obtusis, terminali crena. B.
 Asplenium frondibus pinnatis; pinnis alternis, lineari-acuminatis, subcrenatis. B.
 — Frondibus simplicibus, lanceolatis, crenatis, undulatis, glabris, decurrentibus. B.
 — *hemionitis. Douradinha.*
 — *scolopendrium. Lingoa cervina.*
 Vis. exsiccans.
 — *ceterach.*
 Vis. exsiccans, tonica.
 — *ruta muraria.*
 Vis. exsiccans, roborans.
 — *adiantum nigrum.*
 Polypodium vulgare. Polypodio.
 Vis. Rad. edulcorans, incrassans, expectorans, ecoprotica.
 — *felix mas,*
- Vis. Rad. anthelmintica, tonica.
 — *felix faemina.*
 — *leptophyllum.*
 — *lycopodioides. B.*
 — *auriculatum. B.*
 β. frondibus pinnatis: pinnis lineari-acuminatis, falcatis, alternis, basi interne auriculatis, auriculis frondi adnatis, externe petiolatis. B.
Vellozo.
 — Frondibus pinnatifidis: lobis lineari-lanceolatis, acuminatis, falcatis, alternis, integerrimis, basi utrinque dilatatis, remotis. B.
 — Frondibus supradecompositis: foliolis lateralibus falcatis, ferratis, obtusis, alternis, basi connexis: suprema dentata, acuminata: stipite aculeato, caudiceque arboreo, scabrò-squamoso. B.
Obs. Puncta in linea congesta. *Vellozo.*
 — Frondibus bipinnatis: pinnis cordato-linearibus, duplicato-crenatis, acuminatis: fronde aculeata:

leata : caudice arboreo ,
scabro , squamoso. B.

- Frondibus pinnatifidis : pinnis lineari-lanceolatis, subferratis, obtusis, undatis : punctis marginalibus depressis per paginam superiorem : radice squamosa. B.

Obs. Pagina inferior albicans.

- Frondibus supradecompositis : pinnis pinnatifidis, alternis : foliolis linearibus, falcatis, obtusissimis, crenatis, pilosis : subtus petiolis, nervis inter fructificationem squamosis : stipite aculeato, piloso, subsquamoso : Caudice arboreo, squamoso-scabro. B. *Vellozo.*

- *spinosum.* β. B.

Obs. frondes subferratae : fructificatio linea una, seu puncta ad latera nervi longitudinalis disci.

Adiantum capillus veneris.

Avenca.

- Vis. corroborans, exsiccans, splenitica, diuretica.

— *cristatum.* B.

Trichomanes canariense.

- Frondibus supradecompositis : pinnis laciniatis, alternis : foliolis apice crenatis, alternis : fronde, pinnisque, pagina inferiore pilosis. B.

Obs. fructificationes solitariae, margini frondis insertae : Cal : campanulatus, erectus, fovens fasciculum seminum. *Vellozo.*

MUSCI.

Lycopodium denticulatum

- *clavatum.*

Vis. exsiccans.

- *cernuum.* B.

- foliis oblique verticillatis, subulatis, ciliatis, decurrentibus : spicis terminalibus, dichotomis, foliaceis. B.

Polytrichum commune.

Mnium setaceum.

- *pyriforme.*

- *serpyllifolium.*

- *undulatum.*

Bryum striatum.

- *poniforme.*

- *subulatum.*

- murale.
- caespitosum.
- Hypnum crispum.
- velutinum.
- sciuroides.

ALGAE.

- Jungermannia asplenoides.
- lanceolata.
- Marchantia polymorpha.
- hemisphaerica.
- Lichen calcarius.
- cinereus.
- saxatilis.
- omphalodes.
- olivaceus.
- parietinus.
- farinaceus.
- pustulatus.
- cocciferus.
- pyxidatus.
- uncialis.
- usnea.
- Tremella nostoc:
- purpurea.
- Fucus serratus.
- vesiculosus.
- divaricatus.
- ceranoides.
- spiralis.
- concatenatus.
- palmatus.
- rubens.
- abrotanifolius.

- Ulva latissima.
- lactuca.
- Conferva fontinalis.
- bullosa.
- littoralis.
- aeruginosa.
- Byssus flos aquae.
- phosphorea.
- velutina.
- antiquitatis.
- candelaris.
- lactea.

FUNGI.

- Agaricus integer.
- muscarius.
- deliciosus.
- fimetarius.
- separatus.
- quercinus.
- Boletus perennis. Cucumel-
lo.
- Clathrus cancellatus.
- Helvella mitra.
- Peziza lentifera.
- Clavaria digitata.
- Lycoperdon tuber.
- Tubera da terra.
- Vis. aphrodisiaca, fla-
tulenta.
- bovista.
- Vis. adstringens, obsti-
pans, absorbens, increas-
ans.

fans.

Mucor sphaerocephalus.

- *lichenoides.*
- *embolus.*
- *mucedo. Muffo.*
- *glaucus.*
- *crustaceus.*
- *caespitosus.*

PALMAE.

Chamaerops humilis.*Palmeira de baçoiras***Cocos nucifera. B. ****Phoenix dactylifera. ****Areca oleracea. B.**



I.

Viro Amplissimo, & Celeberrimo
D. D. DOMINICO VANDELLIO
 PHILOSOPHO ET MEDICO
 ACUTISSIMO.

S. Pl. D.

CAR. LINNAEUS.

ISCE diebus, nihil minus tale speranti, accessit Tuum, Vir Celeberrime, vere divinum opus, s: Dissertationes tres; ut Tabulas inspexi, sepofui negotia omnia, nec prius acquiescere potui, quam totum librum a capite ad calcem devorarem.

Stupefactus vidi Te gentis Tuae Phoenicem, non contentum exteriori Naturae cortice, non in vestibulo ejus haerere, sed introspicere, in divina secreta descendere, & quae in interiori Naturae Sacratio clausa fuere, in apricum educere.

Perplacuerunt omnia, imprimis meo palato sapiebant *Holothuria tab. 2. fig. 12. & tab. 3.* nec non *Uva marina tab. 2. fig. 11. & Cochlea tab. 2. fig. 1. 2.* mihi plane ignota animalia, qui tamen ultra 4000. novam, & in Systemate Naturae enumeravi.

Mihi semper paradoxa fuit doctrina *Halleri de Insensibilitate Perioetii, tendinum &c. contrarium ve-*



ro ita graphice demonstraſti, ut dubium ulterius ſu-
perſit nullum.

Pari certitudine eviciſti falaciam doctrinae Reau-
murianae de redintegratione *Lumbricorum*, quam auc-
toritate acutiſſimi Auctoris, haecenus credideramus.

Prodiit *Systematis Naturae* editionis decimae to-
mus primus de animalibus; ſudat tomus ſecundus de
plantis; tomus tertius continuabit de lapidibus. Uti-
nam velles & poſſes mecum communicare *Holothu-
ria* tua, & *Uvam marinam*, ut haec tua inventa in-
fererem appendici in tomo tertio *Systematis*.

Utinam ſcirem, qua ratione ad Te mitterem va-
ria opuscula mea, quae nuper prodire, ut teſtarem
quanti Te faciam.

Faxit Deus, ut vivas ſano corpore, & alacri a-
nimo in augmentum, & ornamentum Artis. Vale,
& me porro ama.

Dabam Upſaliae die 3. Februarii. 1759.

II.

Datas a Te, Vir ampliffime, literas, id: Janua-
rii ante triduum accepi, ex iis novo experimento Tu-
am in me amicitiam prorfus ſingularem intellexi; u-
tinam aliquo experimento mutua teſtari queam offi-
cia, quibus mihi nihil charius, antiquius nihil erit.

Pro egregia collectione rerum naturalium, quam
per D. *Treues* ad me miſiſti, devotiſſimam perſolvo
mentem.

1. Lithantrax matrix Naphtae rarum, & in hoc
tempus uſque obſcurum eſt.

2. *Sal foſſile Aegypti* procul dubio veterum ve-
rum Natrum, quod ita exercuit eruditorum ingenia;
tamen dubium, nec ulli rite cognitum.



3. *Tophus seleniticus cum pisolithis* nec umquam mihi visus.

Zoophyton, cujus historiam & figuram omnium pulcherrime exposuisti, non potui non gratissimum esse. Hoc idem animal, rude delineatum, & imperfecte descriptum ante dimidium annum accepi a D. *Ellis* Anglo; nec potui extricare ejus genus, & characterem, antequam tua acceperam; quae hoc ita exposuit, ut nihil supra; adeoque eo auxisti rerum Naturalium historiam pulcherrime; utinam admitteres inserere hanc tuam historiam in Actis Scientiarum Societatis Upsaliensis, quae propediem praelum subibunt; ut omnes a tua face lumen mutuarentur circa singulare hoc animal.

Cum multo labore alpes vestrates peragrasti, quem laborem novi, qui ipse nostras alpes peragravi; nullas dubito quin plurimas legisti pulcherrimas, rarissimasque plantas.

Dolui diu, quod nullus dederit veram *Floram Romanam*, istius enim *Sabbathi* non sufficit, miscet enim exoticas cum indigenis, nec satis certus de speciebus; ane ullus Romae sit verus Botanicus?

Si umquam Tibi occurrat *Cynips* s. *Ichaeneumon* qui in grossis *Fici*, & *Caprifici* habitat, a *Pontedera* descriptus, mittas oro in litteris, ut queam illum ntueri.

D. *Clerck* nostras delineavit, & edidit ultra 120 phalaenas novas, a me in Systemate nominatas, nec apud alios Authores obvias; nunc pingit ultra centum Papiliones indicas, vivis coloribus, ut praecedentes, qui in Museo Reginae Nostrae asservantur.

Utinam velles observare quo die apud vos folia sua explicant, sive erumpant Arbores *Betula*, *Fraxinus*, *Ulmus*, *Quercus*, *Tilia*, *Hippocastanum*, *Sorbus*,



Carpinus, quo possem idem hoc vere apud nos observando, inde mensurare differentiam aestatum vos inter & nos. Sic observarunt Botanici Monspelienses; unde conclusi, quod aestas 31. dies prius incipiat Monspelii, quam apud nos, & autumnus 30 dies prius apud nos desinat, quam Monspelii; adeoque Monspelii aestas 2. mensibus longior, quam apud nos.

Miratus sum diu qualis sit *Avicula*, quam *Rajus* viderat Florentiae, & dicit ibi vocari *Spipoleta*.

Discipulus meus *Forsgard* hodie Professor Hafniensis, petit navibus Arabiam in eundem finem ac *Donati*.


In Lapponiae conterminis oris quotannis grassatur vermis, qui maximam stragem infert Hominibus, & Pecoribus; decidit enim ex aethere in nuda corpora, momento citius penetrat partes musculosas, & intra quadrantem horae saepe occidit dirissimo dolore.

Coeternem valeas, & vigeas in incrementum artis; Ego Te omni cultu, & studio, dum vixero, prosequar.

Dabam Upsaliae. 1760. d. 4. Martii.

III.

Dudum accepi dona Tua vere aurea, heri vero litteras Tuas id. Octobris datas. Ad priores diu responsum distuli, cum animus erat omnia, & singula rite examinare, digerere, & suis locis inserere, antequam responderem; per plurimas occupationes in causa fuere, quod nondum omnes merces Tuas rite ponderare potueram, at brevi absolvam; interim ad ultimas responsum non differere consultum judicavi, ne me ingratum crederes. Audi-




Audivi quod in Hispania consultatum fuerit, num me vocarent, imprimis postquam fatalis morbus D. *Ortegam* occupaverit; nec video, quomodo Hortus amplissime instituendus rite adornari potest in illa terra... Me vero non vocatorias accepisse certum est.

Quod scripsisti Apologiam contra *Hallerum*, virum omnibus infensum, laetor, nec dubito, quin ipse omnibus numeris par sis, uti ex prioribus Tuis facile intellexi.

Uva ista a Te delineata miraculum Naturae est; dicas mihi in quo libro posita sit figura, ut illam allegare queam in nova editione Systematis: Nova plane est, nec aliis visa; figura omnium optima, descriptio etiam tam egregia, ut non possem eam imitari.

Laetor, quod *Donati* iter continuetur in Arabiam; hisce diebus Rex Danorum misit meum Discipulum in Arabiam in eundem finem. Semina, quae in Aegypto legit ingratus *Donati* comes *Rogue*, ego accepi; sunt haec pulchra, & novas plantas continent.

Insectum istud, quod ex aethere decidit in Lapponia, & misere trucidat Homines, & animalia, est vermis novum genus *Furia infernalis* a *Solandro* dictum,  hujus figurae.

Ex Tuo calculo de arboribus frondescentibus collato cum frondescentia arborum Upsaliae, concludo Paduam Botanice distare Upsaliae 48 diebus; sive quod arbores explicant sua folia 7. hebdomadibus antequam Upsaliae: ergo aestas vestra in regione 14 hebdomadibus longior est, quam in nostra. Vale.

Upsaliae. 1761. d. 11. Januarii.

IV.

Tuas die 30 Martii rite accepi, moram responsi
fa-



facere caussae innumerae , quas enumerare supersedeo ;
ne Tibi sim molestus.

Insatiabili desiderio expecto quotidie egregium
tuum opus de Thermis agri Patavini , ut queam du-
as reliquas *Uvas* intueri.

Procul omni dubio multa detexisti in augmentum
artis per Regionem Mutinensem , utinam quibusdam
me participem reddere velles.

Patavium ex Tuis observatis distat Upsaliae 48
diebus vernis , & totidem autumnalibus , adeoque gau-
detis tribus mensibus aestatis , quibus nos caremus.

Te fervet D. T. O. incolumen , quaeso mei me-
mor vivas.

Dabam Upsaliae. 1761. August.

V.


Heri accepi novum Tuum sincerae Tuae in me
amicitiae documentum cum inclusis plurimis , rarissi-
mis , pulcherrimisque floribus , pro quibus omnibus
ac singulis me Tibi plurimum devinctum agnosco ,
& mentem devotissimam reddo.

1. *Saxifraga burseriana* , cujus sine dubio varie-
tas , Tua triplo major , pluribus floribus & foliis
magis triquetris.

2. *Saxifraga hypnoides* ? sed flos albus , folia ad
radicem congesta. *Saxifraga hypnoides* multum variat ;
talem varietatem antea non vidi ; an differens species
sit , nec ne , asserere nequeo.

3. *Arenaria rotundifolia* , Plantam aliquoties ha-
bui ex alpibus Italiae ; sed semper absque fructifica-
tione , haec mihi nova est , & mereretur delineari ,
& describi.

Theam accepi e China , forte prima , quae um-
quam



quam fuit in ullo Europaeo horto.

Vallisneria erat pulcherrimum specimen, quod numquam antea habui, videtur *Jussaeus* statuere, quod sit flos *Junci Lacustris* e loco profundiore, sed distinctissima planta.

Miratus sum unde D. *Arduinus* haberet tot raras pulchraeque plantas Brasilienses. Sed unde eas obtinuit *Pontedera*? Hisce vale, & me porro ama.

Dabam Upsaliae d. 1. octobris. 1763.

VI.

Id: Decembr. datas laetus accepi, qui diu metueram, quod Te fregerant mala aliqua fata in periculoso itinere alpino.

Quod enemata raro transcendent valvulam coli ad coecum, communis fuit sententia; injecto autem per anum fumo tabaci, quod multoties praescripsi, adscendit ille usque in fauces, & solvit colicas omnium pessimas; praesertim si totum abdomen prius inungatur copiose oleo olivarum aceto maritato.


Audivi de singulari illo exemplari *Dioscoridis* antiquissimo, cum figuris satis selectis; fateor, quod lubenter hoc viderem.

Scopoli promisit Faunam Carniolicam, utinam praestaret. Sed bona fide Tibi dicam, quod 300 novas insectorum species numquam praestabit in Europa.

Ab eo tempore, quo Systema Naturae editionis decimae emiseram, dedi 200. nova insecta in altera editione Faunae. Habeo nunc nova 200. europaea, & 100. exotica; sed non credam, quod *Scopoli* praestabit 300., ut ut plurima forte sint in australibus Europae, mihi non visa. *Govani* egregie insecta indagat *Montepelii*.

His Vale.

Da-



Dabam Upsaliae. 1763. d. 12. Febr.

VII.

Ut Tuas habui, scripsi ad Amicum, quem habeo
Petropoli:

Carta tua naturalis erat valde singularis; vidi fe-
re similem in itinere Dalekarchico, & plane niveam ab
insolatione ortam a *Byssø flos aquae* dicto, de qua
in Flora Lapponica 529. *occurrit in rivulis exsiccatis,*
ubi lapides tegit, & laevi adhibita manu ab iis fa-
cile discedit instar frustuli papyri niveae, minus-
que tenacis.

Donati praematurum, & infelicem obitum, & ja-
cturam observationum ejusdem ex toto animo doleo.
His Vale. Upsaliae. d. 8. Febr. 1764.

VIII.

Diu Te omissum dolui; nec noveram, quam petieras
orbis partem, antequam exoptatissimae Tuae die idus
octobris scriptae, heri primum accedebant. Laetor
quod vivas; fara viam inveniunt.

Pro seminibus, & affectu Tuo in me sincero grates
reddo devotissimas; difficile est viva semina obtine-
re e Brasilia; certe haec omnia mortua erant, exce-
pto solo *Cassiae*.

XX
O utinam posses ipse adire Brasiliam, Terram;
quam nemo calcavit, excepto *Marcgravio* cum suo
fure *Pisone*; sed in tempore quo nondum fax erat ac-
censa in Historia Naturali; adeoque debent om-
nia e novo describi ad lucem. Tu fores prae reli-
quis aptus, qui in *Re Naturali* solidissimus es, in
inquirendo indefessus, in pulcherrime depingendo dex-
ter-



terrimus. Sed forte nullus in Lusitania agnoscit finem Creationis esse Gloriam Dei ex opere; nos vero agnoscimus D. T. O. scripsisse duos libros & Naturam & Revelationem; ideoque illi haerent in tenebris, sed feliciter exteris. Bone Deus si Hispani, & Lusitani noscent sua Bona Naturae, quam infelices essent plerique alii, qui non possident terras exoticas!

Litterae Tuae me tecum duxere per tempe Lusitanica, ubi Tecum quasi in blando somnio legi pulcherrimas plantas.

Postquam tota Europa calcata est a Botanicorum pedibus, restat etiamnum sola Lusitania, quae India Europaea dicenda, & felicissima Terra. Habemus tantum *Grfsley Viridarium Lusitanicum*, miserrimum opus, cujus plantas Oedipus sit, qui intelligat. Alit ista Terra quamplurrimas rarissimas plantas, uti constat ex numerosis istis Tournesfortii Lusitanicis in Institutionibus R. Herbariae nominatis, sed nullibi descriptis, aut delineatis; adeoque etiamnum novis, quam nemo nisi alter Oedipus intelligat: Anne ullus sit in toto Regno pulcherrimo, qui possit Orbi Litterato dare genuinam Floram Regionis? Bone Deus! quam pulchrum, & desideratum opus praestaret ille, qui ejusmodi Floram sifteret.

Zoophyton ad Fretum Herculeum a te lectum, & pulcherrime delineatum est profecto rarissimum *Alcyonium*, quod nullibi vidi, sed nuper est delineatum in *Aëtis Anglicanis* vol. 53. p. 434. t. 21. f. 3. ab *Ellisio*, & pro *Penatulæ* specie perperam propositum, sub nomine *Cynomorii* ad similitudinem plantae ejusdem faciei; sed tua figura longe praestat; mala est *Epipetrum* *Jonst. exsang.* t. 20.

Medici nostrates nil nisi extractum Cicutae praescripserunt, & fatigarunt Pharmacopoeos comparare quocun-



cunque pretio ; nunc vero cessavit usus.

Quod *Colchicum* non sit venenatum hoc miror. Nonne eo omnes servi olim sibi manus violentas intulere ?

Utinam velles hoc vere observare quo die *Ulmus* promat Flores , & quo die prima *folia* ostendat ; ego hoc observabo Upsaliae , & inde possumus calculum inire , quantum distat Upsalia Olissipone.

Annon velles , & posses ad me mittere *Florem Arboris Draconis* in epistola ; crescit prope Ulissipone , in Horto quodam Regio ad *Alcantara*.

Crescit in Lusitania *Lentiscus* frequentissima cum suis folliculis rubris & magnis ; undenam hi *folliculi* generantur ? etiamnum haereo ; alii dicunt eos repletos esse *Aphidibus* , *Cherme* alii , alii *Cynipe* ; Tu qui es in loco posses me docere certissima , ut rite collocarem hanc speciem in proxima editione Systematis ; gloria tua erit. His Vale.

Dabam Upsaliae 1765. d. 12. Febr.

IX.

Accepi pridie Tuas V. C. & suavissimas Littéras ; & doctas observationes , & pulcherrimam Floram Ulissiponensem , quae omnia , & singula summo me perfundebant oblectamento.

Gladiolus utrinque Floridus , an diversus a vulgari , qui hinc floridus ? *Sempervivum arboreum*. Pulchra observatio de squamis ad basin staminum septemdentatis.

Fumaria capreolata recensiores statuunt hanc memram esse varietatem *Fumariae vulgaris* natam ad parietes ; Tu judica in loco.

Lysimachia Linum stellatum. Haec singularis planta ;



ta, a reliquis *Lyfimachiis* diversa. Ex corolla putarem esse *Centunculi* florem, sed quinquefidum, sed capsula 5-valvis est *Lyfimachiae*. *Centunculi* & *Anagallis* capsula est circumscissa. Si me liceat conjugere *Anagallidem* cum *Lyfimachia*, neq: licet distinguere *Linum stellatum* a *Lyfimachia*. Vale.

Dabam Upsaliae. 1765. d. 16. August:

X.

Inclusa intra litteras Tuas d. 16. sextilis datas, habui, pulcherrimas omnium observationes.

Draconis flores tam egregie asservatos vidi cum summa admiratione, quos antea numquam obtinui; ita referunt *Asparagi graminifolii terminales* flores, ut distingui nequeant. Si possem *Aspar: graminifolium, terminalem*, & *Draconem* sub proprio genere, distincto ab *Asparagis* tradere, hoc magnopere exoptarem, cum istae 2. species (*graminif.*, & *termin.*) crescant caule erecto, apice tantum folioso, foliis magnis oblongis. Tuus character erat evidentissimus, & confirmat affinitatem summam cum *Asparagis*.

Medusam tuam novam inferui systemati Naturae, quod praelum jam adiit, quae sub tuo nomine militabit.

Apud nos pluit hoc anno fere per totam aestatem, ut vix possimus dicere, nos habuisse aestatem 8 diebus; nullus apud nos recordatur talem aestatem, adeo pluviosam.

Plurimum Te valere jubent Societatis nostrae Socii.

Dabam Upsaliae. 1765. d. 15. Octobris.

XI.

Ante triduum accessere duae cistae in altera erat *Erythrina* Tua, in altera radix nescio cujus, torte *Draconis*;

L 2

utramque



utramque me Tibi debere intelligo, & grates quas possum maximas rependo.

Praelegi ambas Tuas observationes Societati Scientiarum; altera erat Historia Naturalis triplicis Regni Naturae per Ulissiponensem tractum; altera *Draconis* complectebatur Historiam; utraque Societati perplacuit; mihi in mandatis datum est tibi grates summas quas possum reddere, & te salutant omnes, ac singuli, suaque devota officia referunt. Ambae observationes mox debent prelum cum Societatis Actis subire. Dicas mihi oro quaenam sit patria *Erythrinae* tuae?

Anne poteris apud Lusitanos tuos Maecenates inquirere, & obtinere specimina sicca *Jalappae*, *Ipecacuanhae*, & *Balsami peruviani*, quae omnia sine dubio in Brasilia eorum occurrunt. Nullus etiamnum audet asseverare utrum *Jalapa longiflora*, aut *Convolutulus foliis variis* sit *Jalapa officinarum*.

Ipecacuanha etiamnum quoad genus ignota est; licet Medicis frequentissima.

Balsamus Peruvianus aequè ignotus est.

X Archiatri Petropolitani comparant sibi *Spigeliameam*, eaque curant vermes quosquunque; dosis herbae venit ducato uno. Tu qui habitas in Lusitania, quibus paret Brasilia, ubi spontanea, posses comparare ingentem copiam, & vendere summo lucro per Europam; emtores numquam deficerent, nec potest cum lucro in hortis coli, cum fervidissimum expe-rit solum. Hac sola posses tibi comparare thesauros.

Nuper pulchrum habui experimentum, quod mor-
fura Gordii excitet Paronychias.

Vale, meque tuis annumera. Dabam Uplaliae 1765.
d. 19 Novemb.



XII.

• Quanta cum laetitia tuas excepi literas d. 26. Augusti datas, quas heri accepi, effari vix possum. Laetor animitus quod propitia fata te promovere ad Historiae Naturalis provinciam in Lusitania, ad quam feliciter capessendam fausta quaevis, & felicia exopto.

Lusitania a condito Orbe cimeriis tenebris involuta jacuit, nunc per te magnum in ista regione fidus exortum est. Fata tibi reservarunt in ista regione nimis multa. Spero brevi nos visuros veram Floram Lusitanicam, & Faunam, & reliqua, quae illustrant regionem in Europa fere indicam.

Accepi nuper cistam cum Insectis ultra 200, sed nescio a quo; ex australissima Europa missa fuit; crederam a te, nullae enim litterae aderant, sed tantum numeri; cum vero ne verbum de ea facias in epistola muto sententiam, & eam cistam potius credam ex Italia missam.


Nunc omnes volunt referre fungos ad ultimos Vermes; cum semina aquae immissa se se moveant uti viva. His vale & me semper tuis sinceris annumera.

Dabam Upsaliae e Praedio. 1766. d. Octobris.

XIII.

Ante tres hebdomadas fasciculum tuum plantarum exsicatarum cum tabellario accepi Hamburgo; & ante duas hebdomadas litteras tuas; mox vero insurgens horribile incendium, quod consumpsit tertiam partem urbis nostrae, unde debui transportare omnes meas res, omnemque supelectilem in praedium meum, quamvis D. G. incendium meam aedem reliquit incolumen; nunc recollectis viribus, has reddo.

In



In plantis mihi antea incognita erant

Agrostis australis.

Poa spicata.

Bromus geniculatus

— *ringens.*

Sifymbrium catholicum.

Plantago Lagopus.

His vale. Dabam Upsaliae e Praedio 1766 d. 11.

Mají

XIV.

Summa laetitia perfusus tuas d. 3. Septembris datus excepi; cum a longo tempore tuas non habui; metuebam, quod in morbum incidisti; laetor ex animo, quod valeas.

Adiantum Trichomanes canariensis; vide ejus flores cum microscopio; anne quidquam de structura filicum florum ex hac specie posset erui?

Immortalis gloria debetur Illustrissimo D. d' *Angeja*, qui primus mortalium in Lusitania promovet Naturae scientiam felicissimae Regionis Europae, & natura plane indicae.


Cures pro tuo opere pulcherrimam figuram rarissimae *Sibthorpiæ*, & flores cum microscopio delineare ne intermittas.

Te plurimum valere jubent omnes Societatis nostrae Socii.

Dabam Upsaliae 1767. d. 21. Octob.

XV.

Toto hoc anno morbis laboravi, & nunc primum convalescere incipio, dum video totam mensam repletam litteris eruditorum; primum itaque meum erit te salutare, quam prae reliquis multum facio. Praeterito



terito autumno edidi Dissertationem, in qua demonstravi fungorum semina exclusa evadere vermes, nudis oculis non visibiles, in aqua currentes, tandem figi in fundo vasis, & excrefcere in fungos.

Systematis editionis 12. tomus primus e prelo prodit; ex eo videbis, quod fideliter, quae a te accipi, allegavi.

Alter tomus de plantis ad $\frac{1}{2}$ impressus est, in ejus *Didynamia* dedi characterem, & descriptionem novae plantae *Vandelliae*; distinctae ab omnibus angiospermis corolla ringente, cui e medio labii inferioris (non e fauce) 2. stamina inferiora enascuntur. Crescit in Insula S. Thomae.

Avidissime jam scire opto quomodo tu valeas, & tua Flora, omnes curiosi, qui ad me scripsere, avide expectant scire quod ferat Lusitania tua.

D. *Kuhn*, qui natus in Virginia, meus fuit Discipulus per quadriennium, nunc factus primus Botanicus Professor in Philadelphia, egregius juvenis; alter meus Discipulus *Beckman* Gottingae Historiae Naturalis Professor; tertius meus *Zoega* Demonstrator plantarum Haffniae.


In tomo primo Systematis habeo 6500. animalia.

In tomo secundo circiter 50 Genera plantarum, quae antea non habui, adjeci, interque memorabile est *Dracaena Vandellii*.

Schreberus incepit dare figuras graminum, si vivat omnium possibilem.

Filius ad prelum misit tertiam suam Decuriam rariorum plantarum.

Gunnerus Episcopus Norvegiae in Actis Nidrosiensibus describit Poli arctici Animalia, & Zoophyta graphice.



X Omnes Societatis nostrae Socii te plurimum valere jubent.

Quam generose misisti *Erythrinam cristam galli* alui per quadrantem anni, tandem periit, & vidi, quod Hortulanus tuus detruncaverat omnes radices, unde mirum non fuerat, quod crescere recusabat.

Plura proxime, que nunc vetat aegra manus.

Dabam Upsaliae. 1767. d. 15. Julii.

XVI.

Multas tibi refero, Vir amicissime, grates pro ultimis tuis, Ericis plurimis, refertis, quae mihi maximam creabant voluptatem.

Anthericum tuum mihi novum est; neque est *Anth. serotinum*, neque *A. graecum*, utramque harum habeo; ambae filamentis nudis, neque barbatis sunt. Caeterum in mea collectione reperio specimen tuae plantae simillimum, & forte ejusdem speciei, sed floribus dimidio minoribus in Hispania lectum, etiam filamentis lanatis. Speciem apud Authores non novi.

Vale.


Dabam Upsal. 1769. Jun. 9.

XVII.

Accepi litteras tuas a Bipliopola Salvio.

X Optarem vivere eo die, quo Flora tua Lusitanica prodiret, quae dives erit rarissimis plantis europaeis, cum ne unus aut alter vestras viderit.

XXX Poteris sine dubio e Brasilia obtinere semina rariorum plantarum, & ea in vestra calidissima regione sub dio ferere, cum nulla hyems apud vos plantas destruat. Varias habet *Marcgraphius* plantas, quas nul-



Ius Botanicus Systematicus potuerit ad sua genera
amandare. In Insula S. Thomae omnium omnino
plantarum ibi nascentium vulgatissima est tua Vandel-
lia.

Vale & vive felix.

Upsaliae. 1769. d. 13. Maji.

XVIII.

Accepi epistolam tuam absque litteris, cui inclusae
erant plantae rarissimae, & fasciculus tuus plantarum,
pro utrisque grates reddo maximas. Fasciculus iste
tuus perplacuit, non tantum ob raras plantas, sed
non minus adeo acute descriptas.

O utinam brevi prodiret *Hortus Olisiponensis* tuus;
non dubito, quia inde addiscerem plurima. XX

In horto meo jam floret *Sisymbrium parrá*, *Spar-*
tium floribus sub ramis pendentibus. *Cytisus Tournef*,
quas plantas a te accepi. Vale, Vir amplissime.

Upsaliae 1772. d. 1. Julii.

XIX.

A multo tempore nihil quidquam de te audivi;
utinam viveres, & valeres optime, quod audire ex-
optatissimum mihi foret.

Anni ingravescentes, passim morbi, passim Aula
me occuparunt.

Avidissime exoptarem scire quo usque penetrasti
cum Flora, Fauna Lusitanica; cum tu unus & primus
sis, qui umquam apertis oculis felicissimam, fertilissi-
mamque regionem coluisti. Dicas mihi an ulla de his-
ce a te jam edita sit, vel quando eam expectare li-
ceat.



Mantissa mea altera prodiit, in qua descripsi *Symbium Parrá*, cujus semina a te accepi, notum pedunculis ante florescentiam reflexis.

Jam *Sparrman* Historiae Naturalis caussa adiit Cap. Bonae Spei. *Thunberg* Japoniam, *Solander* propediem cum *Gadnio*, & *Bertino* terras novas australes. *Gemelinus* junior est in Persia, *Pallas* in Tartaria, *Mutis* in Mexico, *Koenig* in Tranquebar.

Forskali plantae Arabicae, & *Rolandri* Surinamenses propediem prelum subibunt.

Jacquin edit cum figuris pictis plantas Horti Vindobonensis, & rariores Austriacas, sic ditescit Flora quotidie.

Vale & vive diu felix.

Upsaliae 1770. d. 7. Januarii.

XX.

Habui graphics tuas litteras d. 17 Maii ultimi datas, ex quibus laetus perspexi fata tua & totius reformatae Academiae. Propalavi apud omnes Amicos meos qualis quantusque sit *Illustr. Pombalius* scientiarum Protector, & Restaurator, cui felicia fata omnes, qui mecum scientias colunt, animitus exoptant.

Quid jam novi molietur Flora in tuo Paradiso? In meo tuam memoriam quotidie mihi revocant tres insignes plantae.

Cycas, & *Zamia*, quas omnes habuere pro *Palmis*, sunt re ipsa filices.

Vale, vive felix.

Upsaliae 1773 d. 24. Julii.



XXI.

Caroli a Linné Filius.

Ante plures annos plurimas a te habuit Pater litteras, & varias illi misisti plantas; sed nunc per plures annos ne verbum quidem. Cur hoc? an ullo errore erga te peccavit? parens annis, & morbo paralytico valde debilitatus, me rogat te salutare omnibus verbis ad salutandum ustandis. Ego nunc omnia ejus munera a Rege obtinui, ut nunc sum & Professor, & Horti Regii Praefectus. Vale.

Upsaliae. 1777 d. 16. Decemb.


XXII.

Gratissimas tuas litteras responsorias per D. Strömrite habui, & pro quibus gratias debeo plurimas, etiam pro *Convulvulo grandifloro*, quem ut novum determinavi in *Supplemento Systematis*, quod nunc sub prelo sudat, cujus gloriam inventionis tuam dixi.

Desideratis meis in scientia fuit scire originem *Balsami peruviani*, *Ipecacuanhae fuscae* & plura ex officinalibus; omnia nunc hac aestate habui; sed nulla harum mihi magis placuit, quam *Balsami peruviani* planta, figura *Marcgravii*, & *Pisonis* satis bona est, genus novum est & decandrum.

Nunc gratulor tibi, Vir Celeberrime, quod occasionem habuisti impensis vestrae Reginae in Americam mittere Discipulos tuos, nunc sine dubio plura habebis pulchra.

Inter plantas maxime singulares, & cujus simile in rerum Natura non datur, est planta quem in Horto Upsaliensi colo, est ex Bengala, habet continuo motum cum foliis, quasi voluntarium, sensationem vero



nullam; ut aliae Sensitivae videntur habere; sed nunc illud nunc alterum movet folium absque certo ordine s. tempore, nec noctu dormit, est species *Hedysarum* & quam speciem dixi *gyrantem*.

His vale, & me favere non dedigneris.

Upsaliae d. 12. Octob. 1779.

XXIII.

CLARISSIMO ET DOCTISSIMO

VIRO


D. PROFESSORI VANDELLII

S. P. D.

A. de HAEN.

MIRRO tomum VII. Rat. Med. Omnia prospere tibi tam animo, quam corpori novi ineuntis anni more ex corde exopto. Literis a doctissimo *Benvenuti* acceptis intellexi te novi quid contra *Halleriana* pariturum, videbis & ab alio simile opus in VII. meo tomo indicari.

Ex quo tempore *Hallero* respondi, D. . . . me aggressus est epistola gallice scripta ad D. *Hirzel* admodum prolixa. Praeter atroces calumnias suas, & mendacia nocendi animo ficta, invasit me 1. propter sedem *Pleuritidis*. 2. Doctrinam de miliaribus, quam adeo egregie in Libro suo de febribus exposuerat vester P. *Valcarengi*, vir dignissimus. 3. propter inoculationem *Variolarum* 4. propter *Systematis Hallerianae* refutationem. Latuit me haec epistola per medium annum fere, & haud non pridem ad manus demum pervenit. Calumnias, & mendacia ipsi condono toto ex corde, utpote ferendis, iisdem dudum assuetus,



ex quo tempore ingenue fassus sum ultra 120 experimēta mea, dedita operā pro magna parte publice in Nosocomio cum Cicuta capta, & quotidie per biennium & ultra fidelissime adnotata, effectu caruisse, quo eodem modo multi graves viri in Gallia, in Hispania, in Angla, in Hollandia, & complures etiam Vienneses, de hac planta sentiunt. Cum interim hīc mordicus defendatur decantata ejusdem virtus, vehemens, in me dirigitur impetus, qui cum veritate non possit, calumniis, & mendaciis perficitur. Unde his assuetus T... mendacem floccifacerem, nisi errores practicos capitales & perniciosos protulisset, quos publicus praxeos Professor impellere propediem conabor. Vale, Vir celeberrime, meque quod facis amare perge. Dabam Vindobonae 5. Jan. 1763.

XXIV.

Legi & relegi mirabundus ultimas litteras tuas, quod Europae Paradisum pro horrido Septentrione permutare cogitas.

Interim quae animo volvis, his serio matureque meditere: liceatque praeprimis ab amico petat amicus, quid demum te moveat patrios deserere Lares? Responsum praevideo: Scilicet etiam me, cui in patria arrisisset fortuna, mutasse domicilium, exterumque patrio praetulisse. Sed concede mihi ut animum sincere exponam. Fortuna, & aulici favores, ut splendidi aliquando, tamen, quemadmodum res sublunares omnes, obnoxii inconstantiae haerent. Tristis ne experior idem? Quondam fortuna, & regius favor, merita, ut ita dicam, superabant; jam vero & quae pauca mereor, ne agnoscuntur quidem.

Cogita quid tibi forsitan impendeat. Si veritatem, quod



quod sciam, Vir praestantissime, tueri; si gloriam Dei; ac proximi salutem cordi habere; si ubique honestatem colere, animus est; non transibis, crede mihi, dies tuos, ea, qua nunc, tranquillitate. Equidem cum res ita mecum comparata sit, ferendum est, quod tolli non potest, onus; sed cui onus necdum incumbit, ille sane ne incumbat unquam, evitet; --- at vero cui licet adhuc evitare tempestatem haud conscendendo navim, ille naufragii averruncare periculum potest.

Est praeterea, quod differentiam, Vir celeberrime, utrisque consideres Aulae. Aequissima, religiosissima, optimaque intentionis, ac voluntatis, nostra Augustissima est: jubeor inde mutatis temporibus plenam justitiam expectare.
Ignosce mihi, vir amicissime, quod erga te veris expleam amici partes. Perpende Tecum omnia serio, cum optimis tuis amicis confer sedulo, & propositum tuum, quo maturescat, tempori aliquantum committe.

Legisti Authorem narrantem ab unico fere grano *Colchici*, eoque adhuc pane involuto, mortis ad limina fuisse; sed potu acido, & vitam sibi servasse, & simul *Colchici*, acido cicurati, vim diureticam potentem, innocuam autem, didicisse. Interim *Colchici* radice duas primo dragmas studiosus Botanophilus coram me, deinde drachmas tres coram Cel. *Lau-gier* Botanices Professore, comedit: idque pluries repetivit. Semel detinui illum trihorio apud me, verum nec mali quidquam, nec ulla ad urinas determinationem adverti. Alter postea venit & coram me integrum bulbum, una scilicet cum interiore recenti, e quo flos hoc autumno surgebat, comedit; & portionem, cum sapore ejus delectari se afferret, bulbi secundi. Jam octo homines novi, qui & impune comede-


mederint, & nunquam inde vel minimam experti diu-
resin sint.

Demonstrarunt sic veritatem ejus, quod scripserit
Prosper Alpinus in *Hist. Nat. Aegypt. pars 1. Lib.*
3. cap. 14. scilicet ad demulcendos Podagricorum
dolores, ob vim acria involventem, exhiberi;
faeminas aegyptiacas, quo impinguescant vorare co-
piose &c.

Verum demonstrarunt Discipuli mei plus, quam
Alpinus. Optimus ille Vir cum *Serapione*, & *Dioscori-*
de, aliisque Colchicum inter summe venenatas plan-
tas videret recenseri, tunc demum toxicum credidit,
autumno si colligeretur, aliis vero temporibus mini-
me: nostri vero comederunt aequae autumnali, dum
flore, quam aestivo, quam vernali, dum folia facit,
tempore. & ut jam monui, comederunt tempore
autumnali, vel bulbum exteriorem, qui folia vere
dederat, vel interiorem, quae nunc florem gerit,
utrumque simul. Ut proinde venenata vis non nisi in
animalibus, v. g. canibus, ut bis experimento didici,
patefcatur; in homine neutiquam.

Ut remedii *Colchici*, & *Cicutae* decantatas vires
Fautores sustineant, potentia diuretica miscent cum
oxymelle colchicico, ut valida solventia, & roboran-
tia admiscant *Cicutae* extracto; interea dum, si qua
cura successerit, ea decantatis suis tribuant remediis.

Quod autem *Cicutae* fomentum videatur aliquan-
do maligna ulcera sanare, ea profecto non, ut talis
sanat. Ex *Dioscoride*, *Dodonaeo* monitus sum, si
experimenta in ulceribus malignis, estiomenis, fere
cancrosis, maxime pedum; ea lege, ut semper aegri
ajcerent, ut vel *chaerophyllii*, vel *Althaeae*, vel *Bras-*
sicae, vel *Seminum Lupinorum*, decoctum linteami-
ne exceptum, diu, noctuque validum, & spongia



eodem decocto impraegnata, continuo renovatum;
 locis ulcerosis applicatum maneret; utque subinde,
 ut fit, dum *Cicuta* adhibetur, purgans daretur, aut
 decocta antiscorbutica potarentur. Est proprie quies
 cruris, & aquae calidae aut simplicis, aut, ne ho-
 mines simplicitatem vilipendant, cum aliqua herba
 coctae, applicatio, qua sanatur. Addere tamen de-
 beo multas sive ulcerum, sive cancrorum per cicu-
 tam curas, typo evulgatas, ulteriore examine palli-
 ativas fuisse constare, hominumque plures, qui jam
 curati leguntur, repullulante malo periisse.

Interim peto velis responsionem me dignari


Vale, res tuas cum Deo, a quo omnia, & quae
 sine nihil, feliciter age, & perge me amare.

Dabam Viennae Austr. 17. Nov. 1763.







Vochija



Galuana




Biastia




Perciria



Urceola



Tapahuacanga






Lasradia




Barbaccaria









Orobanchia




Fig. 19.



Fig. 17.



Paliavana

Fig. 22



Mendocia

Fig. 20.



Contarenia

Fig. 21.



Limia

Fig. 23.




Mella

Fig. 24.



Vismia



BALSAMONA

Pinto



FAB 21

1870

1870



Viola

Specacuanha



1871

1871

1871

1871

074



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Departamento de Botânica



1322547494