



M^h L^h M^h

Requisei aos poucos de Benguelia, e
com a fim de contribuir p.^o o estudo
do flou branchedu de districto seu
que servi, trouxe alguns exemplares
de plantas productoras de branchedu por-
ta dos povos koji tomam a liberdade
de offerecer - W.

o portador d'ellas como seu allyo,
o qual os possui chego os seus de
W.

Além das plantas contadas da ul-
ta pinta, envio mais - W.

1: Caixa contendo como seis Tubercu-
liforme a qual contém latex branchedu-
fero (julgo que se trata de uma especie
nova); fructos e sementes d'ella flou-
ta; uma corolla da mesma; 1 fructo
de acubi ou Malubi (Convolvulus
lanceolatus(?) exemplar n.^o 2) e uma or-
ta de otorampa (C. Chyloukiza (?) ex-
plar n.^o 4).

A caixa a que allinea me refiro,
pertence a mesma planta conhecida

nos riki' pto. serra de El Canda e
 nos fanguellas pto de Marianga.
 Vegeta em terrenos acuosos ou aren-
 osos e em terrenos de sub-colo. fraco.
 Encontrar-se nos rai'lentes (pocos abun-
 dante) riki' e fanguellas.

Os folhos apresentam-se rai'tos e
 rai'tos. Os folhos colhidos nos riki'
 (exemplares n.º 6) tinham as ver-
 vores serrilhadas, as faces por os
 seu lathi nos fanguellas (exemplares n.º
 5) tinham a rai'to serrilhada.

Apezor d'esta planta apresentam-se rai'tos
 flores rai'tas encontra-se rai'tas
 nos rai'tos rai'tos de 2 fuctos (um
 fucto rai'to rai'to). rai'to rai'to
 exemplar com flos por rai'to rai'to
 os rai'to rai'to. Obre rai'to rai'to
 rai'to, rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to
 ta planta.

Por rai'to rai'to - rai'to. favor de rai'to rai'to,
 rai'to o rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to
 rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to
 e rai'to rai'to (exemplares n.º 3).

Por rai'to rai'to favor rai'to rai'to rai'to rai'to
 rai'to rai'to, rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to
 rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to
 rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to
 rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to rai'to

lobus) e o bimurço da Cladophora hum-
isporiana (em vez de clitorea hum-
isporia) - Vide "reoue de culture etrangeres"
no. 150 - 157 -

A gravura por a encontrar no livro
de Worburg, representando a C. lanceola-
tus por a correspondente a planta com
nhecida em Senegalla pelo nome de
acubi ou Matanti (com o W. fort-
isporia comparando-a com os exemplares
della planta por euin - no. 2). Os
rhizomas do acubi por nós contém la-
tex. Lembrando-se por a controvérsia
debe resultar, de os ramos acesos obser-
vados por alguns por Senegalla no ac-
ubi ou Matanti e os rhizomas a o-
stampa. A respeito da Clita-
rea humisporiana (bimurço) tenho a
dizer a W. por os seus rhizomas
contém uma substancia montida
de latex, e este produz uma borra
que se facilmente se torna vis-
cosa. Repetidas observações por fiz
sobre este assumpto, levaram-me a
esta conclusão, e por isso, sou le-
vado a crer por os rhizomas anoly-
sados por Heina (vide - Worburg, p. 214) por
tenciam a ostampa e nos os bimurço.

- Relação -

Nº=1 Planta colhida nos Jangueiros, cu-
jo nome indígena não consegui saber,
(*Conjunctum* (?)). Flores brancas com
rosto amarelo. Folhas de cor glauca.
Rizomas vol. pouco viscoso latex. Lati e
pouco densos e poucas bracteas pro-
prio. Planta pouco abundante.

Nº=2 *Acubi* (em *Tchico*) *Mabubi*
(no sul dos Jangueiros) *Conjunctum*
concoloratum? Flores de cor amarela
clara. Rizomas pouco viscosos de
latex, de cor mais clara do que os do
Otarampa. Contém ~~uma~~ região dos
jangueiros e Ambrillo, no mesocampo
num terreno com um vegetal *Otarampa*
m.

Nº=3 *Piranga* (*Chitanda* *humifragosa*)
2 exemplares: 1 com folhas oppostas, ou-
tro com folhas verticilladas (3 fol.).

Nº=4 *Otarampa* (*Conjunctum* *Chytrubi-*
qu(?)) - 150 exemplares tem as folhas ver-
ticilladas (3 f.); 1 raro.

Nº=5 Folhas da planta cuja raiz tuberculifera
seu nome, nos Jangueiros e desovino-
da *Marianga*, no ribeirão. Lati e
lati exemplares foram colhidos nos Jan-
gueiros (proximo de rio Coração), em



Janeiro de 1865).

Nº 6 a mesma planta por a anterior
 (ou variada ou especie proxima; utri-
 que ut exemplar em Novembro (o por
 tem flors) e Fevereiro (o por tem rife-
 ras).

Nº 7: Landolphia de grande porte. Contem
 mil. semen latex e ut perfora bona
em viscoso. A coroa e' em ped. com
 titula por semen comum tuberoso.
 Encontram-se nos rios Norte e N.E. de dis-
 trictos de Penafiel. Não e' replanta.

Nº 8 Landolphia (?) de pequena porte. semen
rhizomas semen viscoso latex. Encon-
 tra-se nos montes do rio Cubal (alto Andara).
 Não e' replanta.

Nº 9 Salsaparrilla. Encontram-se em quasi
tudo os rios de Penafiel.

Nº 10 Rhizoma de Acacia ou Malva.
 (Cratichneum lanceolatum (?)).