



Prague, 13 Avril 1894

Monsieur et cher collègue,

Je vous suis extrêmement obligé à vous et à M. Marié,
 que vous voulez donner au genre nouveau découvert par
 M. Davcau le nom Willkommia, mais je regrette infiniment
 que je ne peux pas accepter ce nom, parceque M. Haxel
 m'a dédié déjà un genre, il y a quelques ans, qu'il a dédié
 aux deux Graminées de l'Asie tropicale. Je regrette
 sincèrement cette publication de M. Haxel, parceque j'ai
 voulu vivement de voir mon nom d'inscrire dans un genre de
 la péninsule ibérique, mais après avoir accepté alors la dédi-
 cation de M. Haxel je ne peux pas admettre un autre Willkom-
mia, la dénomination de M. Haxel ayant la priorité. Je
 vous propose donc de donner au nouveau genre porteur le
 nom du Botaniste qui l'a découvert, celui de M. Davcau :
Davcaea antioquiensis Marié. Si vous pouvez me

de cette plante
procurez en outre d'autres échantillons avec des calottes
mieux conservées, je vous ^{en} suis très obligé, de même des bons
échantillons des deux espèces en vert de la zone *Phlox-*
carpum, dont la dernière (*Chry. serotinum* Hoffm. L.) n'a
rien de tel.

En vous avisant que je vous enverrai bientôt un
paquet de plantes séchées pour l'herbier de votre illustre
site, je vous prie, Monsieur, d'agréer l'assurance de mes
respectueux et de mes sentiments les plus distingués.

M. Willkomm

Daveana Willd.

Novum Chrysanthemearum genus.

Anthodium concavum, squamis biseriatis, apice scarisatis. Receptaculum concavum nudum. Flores radii ex parte feminei ex parte neutri, ligula lingue-
formi apice subulata, basi in tubum linearem contracta. Flores disci hermaphroditi, corolla campanulata, tubo tereti basi valde dilatato ampliato
(subovulato), disco epigynum amplectente, limbo equaliter quinque-dentato.
Achnemia radii (probabiliter sterilia) curvata, a dorso valde compressa,
angusta, antice concava tricostrata (costis certe contiguis), postice con-
vexa, utroque latere margine late alata (alio membranaceo superiore dilatatis,
margine infero laeviter), corone membranacea tubulosa fructu longiore, tubum
corollae aequante, apice irregulariter dilatata, antice obtusa, postice longita-
dinaliter fissura lateque aperta. Achnemia disci curvata, a latere compressa,
diametro medio rhomboides-quadrangula, quadricostrata, basi attenuata apice
truncata, calva, disco epigynum margine crenulato orato, papilla occidiali
in corollae tubum prominente. - Genus quoad ^{taxi} Disci in hermaphroditum et Daveana
qui hinc plantam nomenclatam Disci, inter Pinnadium et Colostophan
collocandum. Species hactenus unice:

D. anthemoides Willd. Annua, glabra, laete viridis, ~~sa~~ uni- aut plari-
caulis, caulibus erectis simplicibus aut furcatis, vix a medio altiore ramo-
sis, angulatis, striatis, foliosis; foliis crassiusculis (?), bipinnatis, ~~lanceatis~~
~~lineamentis~~ ~~uniseriatis~~ inferioribus medioque bipinnatis, superioribus pinnati-
geris, laciniis omnium ^{tenuibus} linearibus nervoratis, caulibus ramisque apice longe
natis monocephalis, calathis erectis, squamis anthodii exterioribus angulis
lineamentis obtusis parum crenatis, interioribus ^{oblongis} ~~lineamentis~~ late scariosis,
margine membranaceo crenatis, omnibus dorso carinatis viridibus; radiis
albo, disco flavo. - Caulis gracilis 20 - 35 ~~cm~~ cm. longi. Calathia radiis ex -

Manus 20 num. Dico. Cas.

Habitat in Lusitania

M. Willkomm.



HERBARIUM
MUSEUM
SIBIRIENSE
S. PETERSBURG



BIBLIOTECA

