

Jacobson

18. 2. 80.

$\frac{24}{2}$.

(+ 20-24 Exemplare)

Gechter Herr!

Anbei der Mollerschen Flecht +
soweit als möglich bestirbt. Von
der Sorte in dem Säutler habe
ich selbst einen ganzen Kasten
voll zur Bestimmung hier liegen,
aber um solcher Bruchstücke
willen lohnt es kaum das
Mikroskop zur Hand zu nehmen.

2) Dr. Kriempelhuber's Recension ueber Protus Flor. Alp. gest. Algae.



Felicitas A. Protus Flor. Alp. Nippon. 1804 Tom 2, 8^{vo}.

Die Flechten im Band II pag 438-462 unter der Ordnung
Algae von Linnæus'schen Hauptabtheilungen und im
Gattungsrahmen Lichen aufgezählt, im Ganzen 78
Arten jede mit kurzen latein. Diagnose, dem gewöhnl.
Standorte, einzelne jedoch die neuen Species
mit ausführlichen Beschreibungen.

Es befinden sich darunter folgende 6 neue Arten.

Lichen helcodetes. Prot. p. 444. Lichen hydromelas Prot. 455

— jaspellatus s. p. 449. — endivellus Prot. p. 459.

— contractus s. p. 451. — atropetiger p. 454

l = L. boucomelas L.

Sie sind jaeter nicht als solche + anerkannt worden
+ von den Lichenologen.

Dr. von Kriempelhuber's Geschichte und Literatur der Lichenologie
I Tom. pag 155 München 1867.