



Est. 77
Tab. 3-B
N. 40° N.
155


18 11 15
11 11 15

18 11 15



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO







ILLUSTRISSIMO VIRO D. D.
GUIDONI CRESCENTIO
FAGON,
COMITI CONSISTORIANO,
ARCHIATRORUM PRINCIPI,
REGIÆ SCIENTIARUM ACADEMIÆ SOCIO HONORARIO,
NECNON
SUMMO HORTI REGII PARISIENSIS
ADMINISTRO,
MOECENATI SUO OPTIMO
S. P. D.
ADDICTISSIMUS OBSEQUENTISSIMUSQUE
ANTONIUS DE JUSSIEU.

ALIO quàm tuo sub sydere, VIR
PRÆSTANTISSIME, lucem
ab annis plusquam quadraginta
refugisse Barrelieri Opus videtur; quibus
enim felicioribus prodisset auspiciis, quàm

EPISTOLA

ejus, cui jacens olim, nunc tandem exsuscitata in Gallis Botanice se totam debet? locupletissima hac materia Medica pars, quâ neglectâ, sterilis & manca foret ars medendi, in Scholis suasores solum, indefessos in agris nondum duces sibi patronos adsciverat, donec Te, labore itinerum improbo, difficillimarum regionum perlustratione, sudoribusque potius quàm voce præconem habuerit; sed non præconem modò in eruditissimis his quibus animos omnium demonstrationibus atque lectionibus Botanicis, Chymicis & Pharmaceuticis quondam rapiebas. Imò ipsius Apollinis æmulum in numerosâ curationum serie quarum favore unico Regiæ tibi salutis Provinciam promeruisti. Doctrinam probavit eventus; quot enim Arte divinâ Ludovici Magni annis annos, tot tibi laureas addis: sicque summæ ipsius gloriæ factus particeps, Principis perpetuam imperii sui tranquillitatem stabilientis incolumitate, æternum tibi apud posteritatem Gallicam nomen consecras; nec annoso tanti Regis ævo minus celebrabere, quàm generoso usu flagrantissimæ ejus in te gratiæ ac munificentiae, quas non in privatam, sed publicam utilitatem convertis; Ma-

NUNCUPATORIA.

gis de Medicina quàm de rei domesticæ augmento sollicitus, plusque Parisiensis Scholæ, quàm familiæ splendoris ampliandi studiosus, quas alii importunâ prece dignitates aucupantur, Tu eas modestâ tuorum oblivione his consequeris. Quæ verò tuum opum contemptum, innatumque salutis publicæ amorem magis arguent, quàm ditissimum illud naturalis historiæ suppellectilis gazophylacium in rei Medicæ studiosorum gratiam instructum, quàm Horti Regii tantis sumptibus locupletati, tot laboribus in faciliorem melioremque ordinem dispositi instauratio, quàm tua innumera in homines delectos beneficia, ore institutisque tuis efformatos, quorum opera tui in Re herbariâ progressus publici Juris fiunt? Quis autem MOECENAS OPTIME, his me cumulator, cui recens ex Provinciâ advenæ, Te adeò facilem præbuiisti, quem ex itineribus plantarum inquisitionis ergò reducem tam benignè, tam comiter excepisti, quem Regio Botanices Professoris munere, priùs à Te honestato, moxque ab insigni Turnefortio decorato spontè donasti, quem deniquè Tibi socium in saluberrimâ Parisiensium Medicorum Facultate cooptatum

EPISTOLA.

*esse jussisti ? Tot in me benemerita, nec ci-
ves, nec indigenas, nec peregrinos, me vivo
fugient; celebris eorum memoria, Bota-
nophylis, me accepta à Te illis reddente,
instaurabitur; donecque ex penu nostro
potiora grati animi tradenda posteris mo-
numenta prodeant, hocce penè extinctum,
lucubrationibus nostris tibi redivivum
opus ne aspernare. Vale, VIR EX-
CELLENTISSIME.*

Parisiis, Kalendis Martii anni Domini 1714.

R. P. JACOBI BARRELIERI VITA.

JACOBUS BARRELIERUS natus est Parisiis anno Domini 1606 ex nobili genere, parentibus Francisco Barrelier & Magdalenâ Bochetâ. Adolescens ita optimis disciplinis operam dedit, ut Græcè Latinèque brevi doctissimus evaderet. Dehinc Philosophiæ studiis sedulò imbutus, Medicinæ utrò se addixit, atque in Facultate Parisiensi Baccalaurei titulo ornatus, mox cum Theses Medicas magnâ cum laude propugnasset, examiniq; ad praxim spectante se subjecisset, Licentiatûs gradum adeptus est, Lauream tamen Doctoris Medici anno 1634, sibi debitam neglexit, cum secularem vitam fastidians, regularem amplexari cogitaret. Arridente ergò ei præ cæteris Fratrum Prædicatorum Instituto, in Dominicanorum Novitiatum Lutetiæ in Sangermanensi suburbio situm se recepit, atque anno 1635 Novembris die 29^a se votis obstrinxit. Theologiæ quidem tunc præcipuè incubuit, atque in SS. Scripturarum Lectione ita versatus est, ut eas penè ad verbum teneret. Interea tamen horis subsecivis Herbarum quoque scientiæ, quâ semper flagraverat, nonnihil temporis ac curæ impendebat. Anno autem 1646. R. P. Thomas TURCO totius Ordinis FF. Prædicatorum summus Præpositus ac Magister Generalis Lutetiam cum venisset, Barrelierum ob ingenii acumen ac solertiam sibi adjungendum statuit, & Assistentis Gallici, ut vocant, munere ornavit; hunc itaque Barrelierus Conventus Ordinis visitandi causâ Parisiis discedentem comitatus est; quâ datâ itinerum occasione, dum Occitaniam, Aquitaniam & varias Galliæ Provincias, dumque exinde Hispaniam peragrarent, amplissimam Botanicarum observationum suppellectilem congeffit. Siquidem ut quamque urbem pertransibat Barrelierus, adibant eum Botanophili & Historiæ naturalis periti & studiosi, ac quidquid singulare vel observatum dignum investigaverant, deinceps in hortos suos translatum aut in Museis collectum ei impertiebant, quorum per litteras commercio non mediocriter postea in penitiori Plantarum perscrutatione adjutus est. Hujus scientiæ amore ductus, Valentiniæ Castiliæque Regnorum loca deserta & inculta maximo cum labore tum fructu emensus est, ignotas aut nondum, vel malè descriptas stirpes manu propriâ delineans. Ex Hispaniis Italiam adiit, ac viginti trium annorum spatio quibus Romæ præcipuè commoratus est, R. P. TURCO hujusque successor operam longè utilissimam navavit. Sub Pontificibus Innocentio X. Alexandro VII. & Clemente IX. exortis disceptationibus in religione valdè intricatis, S. Thomæ Aquinatis dogmata acerrimè prudenterque propugnavit, atque ad impetranda in eorum favorem decreta plurimum contulit. Ibidem etiam studio Plantarum incubuit, & Medicinales, si quæ rariores erant Apenninjs & Æquicolorum montibus, plurimas asportabat, quibus hortum

R. P. Jacobi Barrelieri Vita.

in Conventu S. Xylti adornaret, construeretque; necnon & Portum Ostiensem, ita jubente Eminentiss. Cardinale Barberino, Urbani VIII. Nepote, Plantas investigandi causâ perlustravit, Marinasque plurimas, Insecta simul & Conchylia depinxit; tot laboribus ad Historiam generalem Plantarum adornandam susceptis scopus erat opus evulgare sub hoc titulo *Hortus Mundi vel Orbis Botanicus*. Hunc in finem exactissimè delineatas à se Plantas in ære incidi curabat; floris & fructûs anatome & proportionibus in figuris ad Fabii Columnæ normam diligenter observatis. Ac dum operi tanto ipse insudabat, simul eruditorum ex variis regionibus Botanophilorum, quibuscum per litteras consuetudinem alebat, consiliis inventisque utebatur. Sereniss. Principis Gastonis, Aurelianensium Ducis jussu Apenninas Gratianopolitanas, & Allobrogum Alpes perlustravit. E Regno Neapolitano, Montibus Æquicolorum aliisque Italiæ locis quæ obibat, semina stirpesque colligebat ad Sereniss. Principem dirigenda. Anno autem 1672. Lutetiam redux in Cœnobio Dominicanorum, quod in Vico S. Honorati situm est, magno cum gaudio exceptus est, ibique dum inchoatum opus ad umbilicum perficere nititur, asthma quod in reditu ex Italiâ contraxerat, extinctus est anno 1673. die 17^a Septembris manè.

Scriptorum, Itinerum Physicarumque observationum ad Plantas, Fungos, Conchylia Insectaque marina spectantium seriem, Topographiamque universalem Botanicam hîc ad vitæ ejus Coronidem subjungere locus esset; at proh litteratorum dolor? Extremum factum in Historiæ naturalis perniciem subiere inopinato ejus funere, quo vel descriptiones nonnullæ fuerunt tantum leviter adumbratæ; Chartæ verò quamplures vel absque ordine relictæ, vel penitus dissipatæ. Cùm eadem sorte perierint innumeræ virorum toto litterario orbe Physicâ eruditione illustrium Epistolæ ad Barrelierum, ita & ejus de eo elogiorum Myriades quibus erant refertæ, desiderantur. Solus ergo fragrans adhuc pietatis eruditionisque ejus odor in FF. Prædicatorum tabulariis Botanophilorumque memoriâ diu post eum erit superstes. Nisi de prudentiâ, sapientiâ ejusque de suo Ordine meritis, ex his quæ diximus, abundè constaret, Litteras quas vocant Encyclicas, in obitu ejus à R. P. Francisco Penon ejusdem Ordinis Cœnobiique Parisiensis in vico S. Honorati Priore eleganter conscriptas hûc referrem.

De Barreliero mentionem faciunt Robertus Morisson in Horto Regio Blæsensi, dum Melissam Romanam describit, & in Historiâ Oxoniensi, in quâ Poliorum nonnullæ species ex Iconibus Barrelieri, Iconum Parisiensium nomine recensentur. Boccone Musæo suo Venetiis cuso. Is enim plerasque Musei sui & Icones & Plantas à Barreliero accepit, si quæ omnes quas ab eo mutuatus est, citasset, Barrelierianum, non suum opus evulgasset. Turnefortius in Institutionibus Rei Herbariæ multas ab eo detectas numerat, & Plumerius qui Americanam Plantam novi generis, Barrelieri nomine nuncupavit.

PRÆFATIO

A D

LECTOREM BOTANOPHILUM

DE RATIONE OPERIS.

OPERA posthuma edentibus ea est sors, ut dum alieno labori perficiendo incumbunt, gratum sibi neminem reddant; dumque defuncti Authoris gloriæ student, nullam fere sibi, aut certè minimam promercantur. Quanto autem fastidio, quanto temporis dispendio perfectum quid in lucem emittunt? Si maxime multorum dierum, auctoritatum collationumque opus iis sit evulgandum, quale Barrelierianum?

Illud altero tantum supra quadragesimum anno à R. Patris Barrelieri funere in possessionem nostram venit. Quo verò in statu? *Æneæ* tabulæ ob metalli sui duritiem ab incendio servatæ, æruginem ex humore jam contrahere cœperant. Ad Plantarum iis expressarum Icones pertinens volumen nullam eas comitabatur; quædam tantum nobis transmissæ, nec sibi coherentes schedæ flammarum reliquias blattis tineisque pabulum fiebant. Nuda illis stirpium nomina, per pauca descriptionibus ornata. Ad effigies suas singula referre, convenientibusque synonymis illustrare *Herculeus* labor erat.

Adde quod nullum ex schedis istis pateret indicium, nulla mentio locorum, ubi delineatæ Plantæ adolebant; qui defectus sive ex Authoris per Gallias, Hispanias, Italiamque diariorum combustionem acciderit, sive ex fugitivarum Chartularum quibus id notatum erat, jacturâ, certè non sine difficili operâ reparabilis erat.

Ut erant tamen elegantiores hæ tabulæ, summæque diligentia ad naturæ veritatem incisæ, & exempla singularum nonnulla jam excusa partim vivo, partim defuncto Authore pervenerant ad Botanographos, qui Icones in iis depictas in operibus suis ex Barreliero retulerant, hoc munere Medicos remque litterariam defraudari peccatum gravius fore existimavi, tum ob delineatarum stirpium raritatem, tum erroris tollendi gratiâ Botanophylis, qui harum Iconum ignari Plantas à Barreliero exaratas, deinceps colligentes nondum notas arbitrati, quasi novas publicarent, & repetitâ nominum crambe, Catalogorum molem auxissent.

Atque utinam hic in Plantarum indices error minus frequens irreperet? nullâ confusione Rei Herbariæ scientia intricaretur, nec tantus incertarum Plantarum numerus memoriam gravaret, si nullarum stirpium nomina absque descriptione traderentur. Hoc ipse incommodum Horti Catholici editor sensit, & animadvertente eruditissimo Sherardo, quas velut recens notas

P R Æ F A T I O.

protulerat, additis in supplemento synonymis, jam descriptas bonâ fide confessus est.

Ad utilitatis rationem accessit injuriæ stimulus Barreliero à Paulo Boccone illata, qui cum per multa ab eo, dum viveret, Iconum suarum exempla mutuò accepisset, ea defuncto Authore, ejus nomine prætermisso ut plurimum, & sub iisdem nominibus recusa in Museo suo Venetiis edito sibi arrogavit, & levioribus parumque accuratis Plantarum Siciliae ac Norciani Montis descriptionibus autopsiam minimè redolentibus, furtum detexit.

Labori igitur minùs parcens, quàm utilitati publicæ consulens, Barreliani Operis ad saniozem Turnefortii normam restituendi pensum suscepi. Alphabetica dispositionis in permiscendis generibus confusionem respuens, & Institutionum Rei Herbariæ ordinem secutus, cōgeneres Plantas congeneribus adjunxi, species ad genera, genera ad classes suas revocaui; delineatis duntaxat à Barreliero, necdum descriptis synonyma descriptionesque addidi, & jam datas descriptiones non repetitione fastidiosâ quæ supra modum volumen amplificasset, sed solâ locorum ex utroque Bauhino & Raio indicatione exhibui, quorum delectum ceteros inter Authores improbatum neminem arbitror; ac tandem quas ab Authoribus mutuatus est Barrelierus recensui, ne quid in opere nostro desideraretur.

Fuabit sanè supra modum Turnefortii Lectorem designatarum ab eo stirpium Hispanicarum, ac Italicarum ex Barreliero Icones apud nos reperire, eò magis Institutionum methodo accommodatas, quod hanc Barrelierus ipse animo præcepisse visus est, dum more Fabii Columnæ, ipsiusque post Columnam Turnefortii, florum fructuum seminumque effigies seorsim depinxit & characterismum ab hisce partibus esse desumendum censuit.

Non mediocris ergò utilitatis in Botanices scientiâ labor iste futurus est, qui quod Raii Turnefortiique descriptionibus deerat, additis eorum operi Iconibus specierum designantium genera expleverit. Adeò ut in hac Authorum Triade, quâ carere nequit ullus Rei Herbariæ studiosus, accuratissima jam Historiæ Generalis habeat primordia, eoque utiliora, quò faciliorem novis progressibus viam aperient.

Ceterum hac in Barrelieri Editione culpabit fortasse quispiam Icones nonnullas aliis elegantia inferiores reperiri; quod acciderit vel quia ex aliorum Authorum Iconibus vel ex schedis Corvini Equitis Romani & Plantarum studiosi minùs accuratè delineatis sint expressæ. Necnon & plures fortè arguent hoc in opere, Plantarum bulbosarum effigies velut Narcissorum, Hyacinthorum florumque ut Aquilegiarum varietates, quæ non sine Botanophilorum damno suppressi potuissent; parcant tamen melius consulti censores, si ad religiosam Editoris sedulitatem attendant, qui vel minimam Authoris sui Operum particulam deperire noluit.

ADMON.

ADMONITIO.

*N*onnulla, Lector benevole, super hac Editione monitum te volo.

Primum ad frontem operis spectat, in quâ nequid Botanicem non redoleret, duas Granadillæ species nullibi æpietas, & ex Plumerii Collectaneis manuscriptis desumptas tradidi, ratum nullum tibi prioris pagine ornatum fore gratiorem eo qui menti pariter ac oculis novitate suâ arrideret, quod ex sequentibus harum stirpium descriptionibus magis agnosces.

I. **G**RANADILLA fructu rubente, folio bicorni *Plum. Cat.* Hæc elegans Granadillæ species sarmenta edit rara, minimum digitum vix crassa, rubentia, subhirsuta, & triangula: Rara per intervalla & satis distita folium, flos & clavicula erumpunt. Clavicula satis longa & tenuis ab ipso pediculi folii exortu enascitur. Folium palmam manûs antipitudine suâ quandoque superat, cordatum & bicorni, pergamaceum, læto virore utrinque nitens, tribus nervis conspicuis striatum, longoque nixum pediculo; ex cujus sinu flos paulò magis pollicem amplius, quinque petalis angustis, acuminatis & candidissimis constans, quibus incumbit corona radiata, è radiis tenuibus, longiusculis etiam & candidissimis constructa. E fundo calycis in quinque segmenta multò quam ipsa floris petala ampliora & longiora dissecti, interius albicantis, exterius verò virentis surgit pistillum columnulæ rubicundæ instar & in apice embryone ex viridi albicante, & ovato instructum, cui insident clavæ tres & subsunt stamina quinque apicibus suis luteis onustæ. Embryo autem abit dein in fructum utrinque acuminatum, hexagonum, rubentem, seminibus plenum ovatis, nigris, calyptrâ albissimâ & membranaceâ involutis. Semel vel bis reperit Plumerius Leoganæ in Insulâ Sandominicanâ: de eâque mentionem fecit pag. 68. descript. Plantar. Americ.

II. Granadilla folio Hederaceo, flore albo, fructu globoso, villosa *Plum. Cat. & Inst. R. Herb. 241.* Aliarum more altissimas scandit arbores, capreolis suis sarmenta tenuia alligando. Folia ad singulos nodos promit circinata rotunditatis, sed duobus veluti sinubus in tres cuspides obtusas & breves incisa & membranacea, palmam manûs paulò excedentia, lætè virentia, nervulis obliquis striata. Flos ex alâ cujusque folii singularis erumpit, longo & tenui innixus pediculo, paulò magis pollicem amplius, petalis floris albissimis, quibus incumbit corona radiata, candida, punctulis rubentibus insignita. Calyx in segmenta quinque, petalis ampliora sectus, intus est albissimus, foris è viridi pallidus. Ex cujus centro surgit pistillum columnæ instar, ad basim corollâ simbriatâ, in apice verò embryone instructum globoso & subviridi, cui insident clavæ tres rubentes & subsunt stamina quinque suis apicibus lutescentibus ornata. Embryo dein abit in fructum globosum, Nuce juglandis æqualem, carnosum, saturè violaceum, totumque villis subtilibus & albicantibus pilosum, seminibus tandem factum multis, nigris zegrinatis, & calyptrâ membranaceâ & albâ obductis. Maio mense flores fructusque maturos proferebat; circa montem vulgò dictum *le morne de la Calebasse* in insulâ Martinicanâ provenit.

*A*lterum ad operis intelligentiam necessariò notandum observationum & Iconum series inter se dissonantium spectat; cum enim Icones Barrelierus non congeneres, sed prout cœlatu dignas & forma magnitudine pares binatim in unâquâque *Encâ Tabulâ* incidendas curasset; nec earum dispositionis ordinem in observationum serie servare jucundum fore censeremus, reductis ad Turnefortii Normam observationibus, earum cum Iconum serie dissonantia incommodo occurrimus, accuratissimo indice per ordinem alphabeticum composito in quo cujuslibet plantæ Icon & observatio ei congrua, ope *Caractheris Arithmetici* cuius apppositi designata, uno intuitu facillimè reperiri possint.

Quos verò didacticus generum ordo magis juvabit, hunc iis subiecimus in altero indice per genera plantarum speciesque distributo, necnon & Gallicè in nostratum gratiam reddito.

Observabis denique folia Iconum ad decimum quartum usque Alphabetum litterâ *M.* absolutum producta esse, quorum tamen Alphabetorum prior nullus numerus Arithmeticus subiungitur.

EXPLICATIO NOMINUM ABBREVIATORUM,
& recensio Auctorum Rei-Herbariæ, quorum operâ usi sumus.

A. R. Par. Academia Regia Parisiensis. Hoc titulo designantur Acta Botanica, Typis Regiis Cusa anno 1676. & quæ Gallicè inscribuntur. *Memoires pour servir à l'Histoire des Plantes, dressés par M. Dodart de l'Academie Royale des Sciences, Docteur en Medecine de la Faculté de Paris. in fol.*

Act. A. R. Par. Acta Academiæ Regiæ Parisiensis. *Histoire de l'Academie Royale des Sciences, avec les Memoires de Mathematique & de Physique. A Paris, in 4.*

Adv. Adversaria Lobelii. Vide Lob.

Adv. part. 2. Adversariorum Lobelii pars altera. Vide Lob.

Ald. H. Farnes. Aldini Hortus Farnesianus. Descriptio exactissima rariorum quarundam Plantarum quæ continentur in Horto Farnesiano. Auctore Tobia. Aldino, seu potius Petro Castello. Romæ. 1625. in folio.

Aldrov. Dendr. Aldrovandi Dendrologia naturalis, seu Arborum Historia. Bononiæ 1688. in folio.

Ambros. Ambrosinus. Hyacinthi Ambrosini Horti publici Bononiensis Præfati Phytologia, sive de Plantis partis primæ, Tomus 1. Bononiæ 1666. in folio.

Amm. Caract. Pl. Ammanni Character Plantarum. Lipsiæ 1685. in 12.

Amm. Supp. Bot. Ammanni suppellex Botanica. Lipsiæ 1675. in-8.

Anguill. Anguillara. Simplicii dell'excellente M. Luigi Anguillara. In Venetiâ 1561. in 8.

Apul. Apuleius Platonius de Herbarum virtutibus. Parisiis 1528. in folio, & Lugdunæ 1587. Basil. 1560. in-8.

Banist. Banisterus. Johannis Banisteri Plantarum in Virginiâ observatarum Catalogus recensitus in Historiâ Raii, pag. 1926.

Barr. Icon. Barrelieri Icones Plantarum quales ære incidi curavit, & quales excusas nunc tradidimus.

Barth. Act. Hafn. Bartholini Acta Hafniensia.

Bellon. Obs. Bellonii Observationes. *Les Observations de plusieurs singularitez & choses memorables trouvées en Grece, en Asie, Judée, Egypte, &c. Par Pierre Belon du Mans. A Paris 1554. 1588. in 4. vel quas Clusius è Gallico in latinum sermonem translatus libro de Exoticis inseruit.*

Bellon. Conif. Bellonius de Coniferis. Petri Bellonii Cenomani de Arboribus Coniferis Resiniferis & aliis perpetuâ fronde virentibus. Parisiis 1553. in 4. Jungitur libris de Admirabili opere antiquorum, & de Medicato funere ejusdem auctoris.

Besl. Fasc. Bessleri Fasciculus. Basilii Bessleri Fasciculus rariorum animalium, lapidum, fructuum, marinarum plantarum, &c. Norinbergæ 1616. in formâ longâ.

Besl. Gazoph. Bessleri Gazophylacium. Gazophylacium rerum naturalium Michaëlis Rupertii Bessleri Medici. Norinbergæ 1613. in folio.

Bont. vel Bont. Hist. Bontii Historia. Jacobi Bontii Medici in Javâ Historiæ naturalis & Medicæ Indiæ Orientalis libri sex à Guillelmo Pifone in ordinem redacti & ad calcem Historiæ naturalis Indiæ Occidentalis Pifonis editi Amstelodami 1658. in folio.

Bocc. Mus. part. 1. Tab. 40. Boccone in Musæi sui parte primâ, Tabulâ 40.

Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 50. Boccone in Musæi sui parte secundâ, paginâ 50. Tabulâ 50. Museo di Fifica, di Pianto, &c. di Paulo Boccone. In Venetiâ 1697. in 4. 2. vol.

Bocc. Rar. Plant. Boccone Rariores Plantæ. Icones & descriptiones rariorum plantarum: Auctore Paulo Boccone. Oxonii 1674. in 4.

Boer. Ind. H. L. Bat. Boerhave Index Horti Lugduno-Batavi. Lugduno-Batavi 1710. in 8.

Bot. Monsp. Botanicum Monspeliense, sive Plantarum circa Monspelim nascentium Index. Authore Petro Magnol Doctore Medico Monspeliensi. Monspeli 1686. in 8.

Bot. Monsp. App. Botanici Monspeliensis Appendix. Huic altera accessit Plantas septem complectens.

Borell. H. Simpl. Borelli Hortus Simplicium, mineralium, animalium & plantarum ad artem medicam utilium. Castris 1666. in 8.

Breyn. Cent. 1. Breynii Centuria prima. Jacobi Breynii Gedanensis Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum Centuria prima, Gedani 1678. in folio.

Breyn. Prodr. 1. Breynii Prodrômus primus. Jacobi Breynii Prodrômus fasciculi rariorum plantarum primus. Gedani 1680. in 4.

- Breyn. Prodr.* 2. Breynii Prodrômus secundus. Jacobi Breynii Prodrômus fasciculi rariorum plantarum secundus. Gedani 1689. in 4.
- Bod. Stap. Theoph.* Theophrasti Eresii Historiæ plantarum libri decem à Joanne Bodæo à Stapel illustrati. Amstelodami 1644. in folio.
- Bross. Brossæus.* Description du Jardin Royal des Plantes Medicinales de Paris, par Guy de la Brosse Medecin ordinaire du Roy, & Intendant dudit Jardin. A Paris 1636. in 4.
- Bross. Nat. Plant.* Brossæus de Naturâ Plantarum. De la nature, vertu & utilité des Plantes, par Guy de la Brosse, Conseiller, Medecin ordinaire du Roy. A Paris 1628. in 8.
- Bumald. Bibli. Bot.* Bumaldi Bibliotheca Botanica. Bononiæ 1657. in-24.
- Camer. Epit.* Epitome Mathioli à Camerario. De plantis Epitome utilissima Petri Andreæ Mathioli Senensis aucta & locupletata à Joachimo Camerario Medico Norimbergenfi. Francofurti ad Mœnum 1586. in-4.
- Camer. Hort.* Camerarii Hortus. Hortus Medicus & Philosophicus, in quo plurimarum stirpium breves descriptiones, novæ Icones, &c. continentur. Auctore Joachimo Camerario Medico Norimbergenfi. Francofurti ad Mœnum 1588. in-4. huic horto annectitur sylva Hercynia, sive Index plantarum sponte nascentium in montibus & locis vicinis Hercyniæ, à Thelio conscriptus.
- Campeg. Hort. Gall.* Campegi Hortus Gallicus, in quo Gallos in Galliâ omnium ægritudinum remedia reperire docet. Lugduni 1543. in-8.
- C. B. Animadv.* Caspari Bauhini Animadversiones in Historiam generalem Plantarum Lugduni eusam. Francofurti 1600. in-4.
- C. B. Math.* Casparus Bathinus in Mathiolum. Petri Andreæ Mathioli opera sive Commentarii in Dioscoridem Iconibus novis synonymis notisque illustrati à Casparo Bauhino. Basileæ 1598. in-folio.
- C. B. Phytop.* Caspari Bauhini Phytopina. Basileæ 1596. in-4.
- C. B. Pin.* Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. Basileæ 1623. & 1671. in-4.
- C. B. Prodr.* Caspari Bauhini Prodrômus Theatri Botanici. Francofurti 1620. & Basileæ 1671. in-4.
- C. B. Theat.* Caspari Bauhini Theatri Botanici liber primus. Basileæ 1665. in-folio.
- C. B. Plant. Bas.* Caspari Bauhini Plantarum circa Basileam sponte nascentium Catalogus. Basileæ 1622. in-8.
- Castor. Durant.* Castor Dürantes. Herbario novo di Castore Durante, Medico & Cittadino Romano. Romæ 1585. in Venetiâ 1636. in-4. & 1684. in-folio.
- Cat. Plant. Holl.* Catalogus Plantarum indigenarum Hollandiæ. Auctore Joanne Commelino. Amstelodami 1685. in-12.
- Cat. H. Amst.* Catalogus Plantarum Horti Amstelædamensis. Auctore Joanne Commelino, 1762. in-8.
- Cat. us. H. Harl.* Catalogus Plantarum usualium Horti Medici Harlemensis. Auctore Egidio de Koker. Harlemi 1702. in-8.
- Chabr. Chabræus.* Stirpium Icones & Sciagraphia. Auctore Dominico Chabræo Medico. Genevæ. 1666. in-folio.
- Chomel. Abregé de l'Histoire des Plantes usuelles,* par M. Chomel Conseiller Medecin du Roy & de l'Académie Royale des Sciences. A Paris 1712. in-12.
- Clus. App.* Clusius in Appendice Historiæ Plantarum.
- Clus. App. Alt.* Clusius in Appendice alterâ ad librum vi.
- Clus. Cur. Post.* Clusii curæ posteriores Antuerpiæ, 1611. in-folio & in-4.
- Clus. Exot.* Clusii Exotica. Caroli Clusii exoticorum libri decem. Antuerpiæ 1605. in-fol.
- Clus. Hisp.* Clusii rariorum Plantarum per Hispanias observatarum Historiæ. Antuerpiæ, 1576. in-8.
- Clus. Hist.* Clusii Historia. Caroli Clusii Atrebatensis rariorum Plantarum Historia. Antuerpiæ 1601. in-folio.
- Clus. Pann.* Clusii rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam, &c. observatarum Historia. Antuerpiæ 1583. in-8.
- Col. Columella.* L. Junii Moderati Columellæ de re Rusticâ libri 12. & de Arboribus liber unus. Lugduni 1541. in-8.
- Col. in Rech.* Columna in Rechum. Vide Hernandes.
- Col. Obs.* Columnæ observationes Aquatiliū Animalium, ad calcem partis primæ.
- Col. part. i.* Columnæ Ecphrasidis pars prima. Fabii Columnæ Lyncei minus cognitarum stirpium Expansio 1616. in-4.
- Col. part. alt. vel part. 2.* Columnæ Ecphrasidis pars altera seu secunda. Romæ 1616. in-4.
- Col. Phycob.* Columnæ Phytobasanos. Neapoli 1592. in-4.
- Com. Ac. R. Scient.* Commentarii Academiæ Regiæ Scientiarum. Vide, Acta Academiæ Regiæ Parisiensis.
- Constant. Constantinus.* Traité de la Pharmacie Provinciale, ou plutôt Provençale & famili-

- tière, pour montrer qu'on peut faire la Médecine avec les Plantes qui naissent en chaque Province. Par Antoine Constantin Médecin d'Aix en Provence. A Lion 1590. in-8.
- Contant. Les Oeuvres de Jacques & Paul Contant M^{rs} Apotiquaires de Poitiers, divisées en 5. traites, sçavoir un Commentaire sur Dioscoride, un Synopsis Plantarum, &c. A Poitiers 1628. in-fol.
- Cord. Hist. Valerii Cordi Historiæ stirpium libri iv. Argentinx 1561. in-folio.
- Cord. Annot. Cordi Annotationes. Valerii Cordi Simesusii Annotationes in Pedacii Dioscoridis libros de Materiâ Medicâ. Libris Historiæ stirpium Cordi Argentinx cufis 1561. præfiguntur, & ad calcem Dioscoridis Editi à Gualtero Rivio, Vid. Riv. Diosc.
- Cord. Jud. Cordi Judicium. Euricii Cordi Simesusii Judicium de herbis & simplicibus Medicinæ. Ad Calcem Dioscoridis editi à Gualtero Rivio.
- Corn. vel Corn. Hist. Cornuti. Cornuti Historia. Jacobi Cornuti Doct. Med. Parisiens. Canadensium Plantarum aliarumque nondum editarum Historia, cui accessit Elenchus Plantarum circa Parisios nascentium. 1635. in-4.
- Cor. Inst. R. Herb. Corollarium Institutionum Rei-Herbariæ. Josephi Pitton Tournefort. Parisiis 1703. in-4.
- Cresc. Crescentius. Petrus Crescentius vel de Crescentiis Bononiensis de Agriculturæ partibus libri 12. Basileæ 1548. in-folio.
- Dod. Gall. Dodonæi Historia Gallicè reddita. L'Histoire des Plantes communes, étrangères ou rares, &c. composée par Dadoens ou Dodonée, & traduite du bas Allemand ou Flamand en François par Charles de l'Ecluse ou Clusius. A Anvers 1557. in-folio.
- Dod. Pempt. Dodonæi Pemptades. Remberti Dodonæi Mechliniensis, Medici Casarei stirpium Historiæ Pemptades sex seu libri xxx. Antuerpiæ 1616. in-folio.
- Dod. stirp. Imag. Dodonæi stirpium Imagines seorsim cufæ cum nomenclaturâ variâ & brevibus annotatiunculis, in-8. 1553. Antuerpiæ.
- Donat. Donatus. Trattato de semplici, pietre & pesci marini di Antonio Donati. In Venetiâ 1631. in-4.
- Dorst. Bot. Dorstenii Botanicon. Botanicon continens herbarum aliorumque simplicium quorum usus in Medicina est, &c. Auctore Theodorico Dorstenio Medico. Francofurti 1540. in-folio.
- Duret. Duretus. Histoire admirable des Plantes & Herbes miraculeuses en nature. Par Claude Duret President à Moulins. A Paris 1605. in-8.
- Du Tertre. Histoire naturelle des Isles Antilles. Par le R. P. du Tertre de l'Ordre des Freres Prescheurs. A Paris 1667. in-4.
- Duval. Phyt. Duvallii Phytologia. Phytologia sive Philosophia Plantarum. Auctore Guillelmo Duval Doct. Med. Parisiens. Parisiis 1647. in-8.
- Elem. Bot. Elementa Botanices. Elemens de Botanique par M. Pitton Tournefort Professeur en Botanique au Jardin Royal de Paris. A Paris de l'Imprimerie Royale, 1694. in-8. 3. vol.
- Eyfl. Eyfsterensis Hortus, operâ Basilii Besleri Philatri & Pharmacopæi. Norimbergæ 1613. in folio. 2. vol.
- Ferr. Hesp. Ferrarii Hesperides. Joannis Baptistæ Ferrarii Senensis, è Societate Jesu Hesperides sive de Malorum aureorum culturâ & usu libri iv. Romæ 1646. in-folio.
- Ferr. Flor. Cult. Ferrarii Florum cultura. Joannis Baptistæ Ferrarii, &c. de Florum culturâ libri iv. Romæ 1633. in-4. & Amstælodami.
- Flor. Altdorf. Floræ Altdorffinæ, Deliciæ Sylvestres sive Catalogus Plantarum in agro Altdorffino spontè nascentium, à Mauritio Hoffmanno. Altdorffi 1662. 1677. in-4.
- Florileg. Altdorff. Florilegium Altdorffinum, Deliciæ Hortenses, sive Catalogus Plantarum Horti Medici Altdorffini. Altdorffi 1660. & 1676. in-4.
- Flor. Bat. Floræ Lugduno-Batavæ Flores seu Enumeratio stirpium Horti Lugduno Batavi, in ordinem dispositarum; ex Lectionibus Hermanni. Lugduni Batavorum 1690. in-8.
- Flor. Malab. Flora Malabarica, sive Horti Malabari Catalogus quem in ordinem digessit, synonymisque illustravit Casparus Commelia. Lugduni Batavorum 1696. in-folio & in-8.
- Flor. Norib. Flora Noribergensis sive Catalogus Plantarum in agro Noribergensi tam spontè nascentium, quam Exoticarum in Viridariis aut Horto Medico educatarum. Auctore Joanne Georgio Volckamero Medico Noribergensi. Noribergæ. 1700. in-4.
- Flor. Pruss. Flora Prussica sive Plantæ in Regno Prussicæ spontè nascentes, quarum Catalogus à Joanne Loeselio primùm editus est absque figuris, denuò recusum Notis & Iconibus illustravit Joannes Gottsched. Regio Monti 1703. in-4.
- Flor. Pruss. quas. Flora Prussica quasimodo genita seu Enumeratio plantarum Indigenarum Prussicæ Auctore Georgio Andréâ Helving. Philippus Breynius Medicus Gedanensis. Jacobi Breynii filius operi huic præfationem de scriptoribus rerum naturalium Borussia, animadversionesque in Floram Prussicam Lozalii præfuit. Gedani 1712. in-4.
- Franc. Trif. Fib. Franci Trifolii Fibrini Historia. Francofurti 1701. in-8.
- Franc. Ver. Theez. Joannis Franci Veronica Théezans. Lipsiæ 1700. in-12.

- 5
- Fuchf.* Fuchsius. De Historiâ stirpium Commentarii insignes. Auctore Leonhardo Fuchsi. Basileæ 1542. in-folio, Lugduni 1551. in-8.
- Fuchf. Parad.* Fuchsi Paradoxorum Medicorum libri tres. Parisiis 1555. in-8.
- Ger. Emac.* Gerardus Emaculatus. Joannis Gerardi Angli Historia Plantarum emaculata, Anglicè conscripta. Londini 1597. in-folio.
- Gesn. Epist.* Gesneri Epistolæ. Epistolarum Medicinalium Conradi Gesneri Philosophi & Medici Tigurini libri tres. Tiguri 1577. in-4.
- Gesn. Epist. à Bauh. Edit.* Gesneri Epistolæ à C. Bauhino editæ Basileæ 1591. in-8.
- Gesn. de Fig. Lapid.* Gesnerus de figuratis lapidibus. Conradi Gesneri de rerum fossilium, lapidum & gemmarum maximè figuris & similitudinibus liber. Tiguri 1565. in-8.
- Gesn. H. Germ.* Gesnerus de Hortis Germaniæ liber cum historiâ stirpium Valerii Cordi editus.
- Gesn. Lunar.* Gesnerus de Lunariis herbis & rebus noctu lucentibus. Tiguri 1555. in-4.
- Gesn. Mont. Fract.* Gesneri descriptio Montis Fracti, seu Montis Pilati juxta Lucernam. Tiguri 1555. in-4.
- Goiffon.* D. Joannes-Baptista Goiffon Doctor Medicus Monspeliensis, Collegio Lugdunensi Aggregatus, rerum Anatomicarum & Botanicarum peritissimus, in Italiâ & Hispaniis, dum utriusque Coronæ exercituum Medici munere fungeretur, plantas plurimas rariores & nondum descriptas observavit & collegit; in Lugdunensi quoque agro, quod adolescens adhuc eum in primis meis Botanices studiis ducem secutus sum, multas non vulgares detexit quas cum Elencho stirpium Lugdunensis agri propediem evulgabit.
- Hannem. Meth.* Hannemanni Methodus. Nova & accurata Methodus cognoscendi vegetabilia juxta triplicem cognitionem Grammaticam, Philosophicam & Medicam. Auctore Joan. Ludovico Hannemann. Kilonii 1677. in-4.
- Hernand.* Hernandez. Rerum Medicarum Novæ Hispaniæ Thesaurus, seu Plantarum Animalium, Mineralium Mexicanorum historia ex Francisci Hernandi relationibus scripta, à Nardo Antonio Reccho in ordinem digesta, à Joanne Terentio Syneco notis illustrata, ac additionibus Fabii Columnæ Lyncei locupletata. Romæ 1618. in-folio.
- H. Amst.* Hortus Amstelodamensis. Horti Medici Amstelodamensis rariores plantarum historia. Auctore Joanne Commelino. Amstelodami 1697. in-folio.
- H. Amst. p. Alt.* Horti Amstelodamensis pars altera. Auctore Casparo Commelino. Amstelodami 1701. in-folio.
- H. Argent.* Hortus Argentinenfis. Catalogus Plantarum Horti Academici Argentinenfis. Authore Marco Mappo Medico Argentinenfi. Argentorati 1691. in-12.
- H. Beaum.* Hortus Beaumontianus. Horti Beaumontiani Exoticarum Plantarum Catalogus. Hagæ Comitum 1690. in-8.
- H. Cath.* Hortus Catholicus. Auctore R. P. Francisco Cupani. Neapoli 1696. in-4. ad calcem supplementum addidit.
- H. Cath. supp. Alt.* Horti Catholici supplementum alterum. Auctore R. P. Francisco Cupani. Panormi 1697. in-4.
- H. Edinb.* Hortus Medicus Edinburgensis. Auctore Jacobo Sutherland. Edinburgi 1683. in-8.
- H. L. Bat. Vorst.* Horti Lugduno-Batavi Catalogus. Præfector ejusdem Horti Adolfo Vorstio Med. ad calcem Isagoges rei-herbariæ Spigellii.
- H. L. Bat.* Hortus Academicus, Lugduno-Batavi Pauli Hermanni. Lugduni-Batavorum 1687. in-8.
- H. Mal.* Hortus Malabaricus duodecim voluminibus in-folio comprehensus, quorum primum 1678. ultimum verò 1693. fuit editum Amstelodami.
- H. Pat.* Hortus Patavinus Georgii à Turre. Patavii 1662. in-12.
- H. Pisan.* Hortus Pisanus Thomæ Bellutii Pistoriensis. Florentiæ 1662. in-16.
- H. R. Bles.* Hortus Regius Blesensis. Parisiis 1655. in-folio.
- H. R. Monsp.* Hortus Regius Monspeliensis Petri Magnol. Monspeli 1697. in-8.
- H. R. Par.* Hortus Regius Parisiensis. Parisiis 1665. in-folio.
- H. Vitemberg.* Hortus Vitembergensis. Index Plantarum Horti Medici Academiae Vitembergensis. Auctore Joanne Henrico Heuchero Med. Vitembergæ 1711. in-4.
- J. B. Absinth.* Joannes Bauhinus de Absinthio, seu de Plantis Absinthii nomen habentibus, cum tractatu de Absinthiis Claudii Rocardii. Montisbeligardi 1593. in-12.
- J. B. 1. 150.* Joannis Bauhini tomus primus, pagina 150. Historia Plantarum universalis, tribus voluminibus comprehensa; auctoribus Joanne Bauhino Archiatro, Joanne Henrico Cherlero Doctore, Basileensibus; quam recensuit & auxit Dominicus Chabræus Doct. Med. Genevensis. Ebroduni 1650. in-folio.
- J. B. Plant. à Div.* Joannes Bauhinus de Plantis à Divis denominatis. Basileæ 1591. in-8.
- J. B. Boll.* Joannes Bauhinus de Aquis Medicatis Bollenfis libri quatuor, item de variis

fossilibus, stirpibus & insectis Agri Bollenfis. Montisbeligardi 1607. in-4.

Icon. Robert. Icones Roberti. Variæ ac multiformes florum species appressæ ad vivum. Auctore Nicolao Robert. Parisiis apud Franciscum Poilly viâ Jacobæâ. in-4.

Imp. Imperatus. Historia naturale di Ferrante Imperato Neapolitano. Neapoli 1599. Venetiis 1672. in-folio.

Imp. lat. Imperati Historia latinè reddita.

Inst. R. Herb. Institutiones Rei-herbariæ Josephi Pitton Tournefort. Parisiis 1700. & Typographiâ Regiâ, 3. vol. in-4.

Inst. R. Herb. App. Institutionum Rei-herbariæ Appendix.

Joncq. Hort. Joncqueti Hortus. Dyonisii Joncquet Medici Parisiensis Hortus. Parisiis 1659. in-4.

Jonst. Dendr. Jonstonii Dendrologia. Joannis Jonstonii Dendrologia sive Historia de Arboribus. Francofurti 1662. in-folio.

Lauremb. H. Cult. Laurembergii de Horti Cultura libri duo. Francofurti ad Mœnum 1654. in-4.

Lauremb. App. Plant. Laurembergius Apparatus Plantarius, sive de Plantis Bulbosis & Tuberosis libri duo. Francofurti ad Mœnum 1654. in-4.

Lippi. Augustinus Lippi Parisinus, Medicus Parisiensis. Domino Du Roule Regio in Æthiopiam Legato, Botanices amore, itineris nec non & mortis à Barbaris illata comes fuit.

Lovell. Robert Lovell herball compleat sive Enchiridion Botanicum Anglice scriptum. Oxonii 1665. in-8.

Lob. Adv. Lobelii Adversaria. Stirpium Adversaria nova auctoribus Petro Penâ & Mathiâ de Lobel Medicis. Londini 1570. 1605. in-folio, & Antuerpiæ 1576.

Lob. Adv. p. alt. Lobelii Adversariorum pars altera. Antuerpiæ, Londini 1576. & 1605. in-fol.

Lob. Icon. Lobelii Icones. Icones stirpium. Antuerpiæ 1587. in formâ longâ.

Lob. Illust. Lobelii Illustrationes. Mathiæ de Lobel Botanographi Regii stirpium illustrationes, accurate Guillelmo How Anglo editæ. Londini 1655. in-4.

Lob. Obs. Lobelii Observationes, stirpium historia Mathiæ de Lobel Insulani. Antuerpiæ 1576. in-folio.

L. c. id est loco citato, vel locis citatis.

Lugd. vel Lugd. Hist. Lugdunensis Historia. Historia Generalis Plantarum à Dalecham-
pio Medico Lugdunensi elaborata. Lugduni 1586. in-fol. 2. vol.

Lugd. App. Lugdunensis Historiæ Appendix.

Lugd. Gall. Lugdunensis Historia Gallicè reddita. Lugduni 1676. in-folio 2. vol.

Marcgr. Marcgravius. Georgii Marcgravi de Liebstad, Misnici Germani historia rerum naturalium Brasiliæ libri octo editi cum historiâ Pisonis Lugduni - Batavorum 1648. in-fol.

Math. Lat. Valgrif. Mathiolus latinè editus à Valgrifio. Petri Andreæ Mathioli Senensis, Medici, Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis. Venetiis ex officinâ Valgrifianâ cum magnis figuris, 1565. in-folio. Italicè primùm, dein variis formis, linguis, & locis prodierunt in publicum.

Mentz. Mentzelius. Index nominum Plantarum multilinguis. Operâ Christiani Mentze-
lii. Berolini 1682. in-folio.

Mentz. Pugil. Mentzelii Pugillus rariorum Plantarum ad calcem Indicis multi-linguis editus.

Merret. Pinax. r. Brit. Merett. Pinax rerum naturalium Britannicarum. Londini 1667. in-8.

Mor. Hist. Oxon. part. 2. Morissonii Historiæ Oxoniensis pars secunda. Plantarum histo-
riæ universalis Oxoniensis pars secunda. Auctore Roberto Morisson. Oxonii 1680. in-folio.

Mor. Hist. Oxon. part. 3. Morissonii Historiæ Oxoniensis pars tertia. Auctore Roberto Morisson, à Jacobo Boberto edita & illustrata. Oxonii 1699. in-folio.

Mor. H. R. Blef. Morissonii Hortus Regius Blefensis auctus, seu præludia Botanica. Londini 1669. in-8.

Mor. Umb. Morissonii Umbelliferarum plantarum distributio nova. Oxonii 1679. in-fol.

Munting. Aloid. Muntingii Aloidarium. Sive Aloes mucronato folio, Americanæ majo-
ris, aliarumque specierum historia. Amstelodami 1680. in-4.

Munting. Herb. Brit. Muntingii de herbâ Britannicâ. De verâ antiquorum herbâ Britan-
nicâ ejusdemque efficacità. Auctore Abrahamo Muntingio Med. Doct. & Bot. Prof. Amste-
lodami 1681. in-4.

Munting. Phyt. Muntingii Phytographia curiosa. Amstelodami 1711. in-fol.

Mus. Petiv. Cent. Musei Petiveriani Centuriæ octo quæ variis prodire temporibus Lon-
dini. 1^a. 1695. & ultima 1700. in-8.

Olhaf. Elench. Plant. Dant. Olhafii Elenchus plantarum circa Dantiscum nascentium. Gedani. 1656. in-8.

Par. Bat. Paradisus Batavus Pauli Hermanni. Lugduni Batavorum 1698. & 1705. in-4.

Park. Parad. Parkinsoni Paradisus terrestris Anglicè conscriptus. Londini 1629 in-folio.
Park. Theat. Parkinsoni Theatrum Botanicum Anglicè scriptum. Londini 1640 in-fol.

Pass. Icon. Passæ Icones: Hortus floridus in quo rariorum & minus vulgarium florum Icones ad vivum delineatæ & secundum anni tempora divisæ exhibentur à Crispo Passæ juniore. Arnheimi, & Trajecti ad Rhenum 1614 in formâ longâ.

Petiv. Gazoph. Petiverii Gazophylacium naturæ & artis. Londini 1702 in-folio.

Pison. Hist. Pisonis historia naturalis Brasiliæ. Lugduni-Batavorum 1648 in-folio.

Pillet. Pilleterius. Plantarum in Walachriâ Zelandiæ insulâ nascentium synonymia, Autore Casparo Pilleterio. Middelburgi 1610 in-8.

Plin. Plinius. Caii Plinii secundi historiæ mundi libri xxxvii.

Pluk. Almag. Plukenetii Almagestum Botanicum sive Phytographiæ Plukenetianæ Onomasticon. Londini 1696 in-folio.

Pluk. Amalth. Plukenetii Amalthæum Botanicum idest stirpium Indicarum alterum cornu copiæ. Londini 1703 in-folio.

Pluk. Phyt. Plukenetii Phytographia seu stirpium Icones ad vivum delineatæ, cujus Phytographiæ partes priores editæ sunt Londini 1691 in-folio; tertia 1692 in-fol.

Pluk. Mantiss. Plukenetii Mantissa Almagesti Botanici. Londini 1700 in-fol.

Plum. Plumerius. *Description des Plantes de l'Amerique, avec leurs Figures. Par le R. P. Plumier Minime. A Paris 1693. edition du Louvre in-fol.*

Plum. Fil. Plumerius de Filicibus Americanis. Parisiis 1705 ex Typographia regiâ in-fol.

Plum. Nov. Plant. Amer. gen. Plumerii nova Plantarum Americanarum genera. Parisiis 1703 in-4.

Plum. Cat. Plumerii Catalogus Plantarum Americanarum ab ipso descriptarum, & delinearum ac in Institutionibus Rei-herbariæ recensitarum. Jungitur cum Novis Plantarum Americanarum generibus.

Bon. Bald. Ital. Pona Montis Baldi descriptio Italicè scripta. Monte Baldo descritto da Giovanni Pona Veronese. In Venetia 1617 in-4. Eadem descriptio latinam reddidit Clusius, & suæ Plantarum historiæ adjecit.

Pon. Bald. latin. Pona Montis Baldi descriptio latinè reddita, cui apposita est disceptatio de Ammono veterum habita à Nicolao Maronæ Medico Veronenfi. Basileæ 1608 in-4.

Pons Animad. in hist. Lugd. Jacobi Pons Medici Lugdunensis Animadversiones in historiam generalem Plantarum Lugduni cufam. Lugduni 1600 in-8.

Prodr. Par. Bat. Prodromus Paradisi Batavi cum scholâ Botanicâ editus. Vid. Schol. Bot.

P. Alp. Egypt. Prosper Alpinus de Plantis Egypti. Venetiis 1592 in-4.

P. Alp. Egypt. cum Not. Vessing. Prosper Alpinus de Plantis Egypti cum notis Vessingii. Patavii 1640 in-4.

P. Alp. Exot. Prosper Alpinus de Exoticis Plantis. Venetiis 1627 in-4.

Raii Cat. Angl. Raii Catalogus Plantarum Angliæ & Insularum adjacentium. Londini 1677 in-8.

Raii Cat. Cant. Raii Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam nascentium. Cantabrigiæ 1660 in-12.

Raii Cat. Cant. App. Raii ad Catalogum Plantarum agri Cantabrigiensis appendix. Cantabrigiæ 1685 in-12.

Raii Hist. Raii Historia Plantarum. Londini 1686. 2. vol. in-fol.

Raii Hist. 3. Raii Historiæ Plantarum tomus tertius. Londini 1704 in-folio.

Raii Meth. Raii Methodus Plantarum nova, synopticè in tabulis exhibita. Londini 1682 in-8.

Raii Meth. Emend. Raii Methodus Plantarum emendata & aucta. Londini 1703 in-8.

Raii Syll. Raii Sylloge plantarum extra Britannias nascentium. Londini 1694 in-8.

Raii Synops. Raii Synopsis Methodica stirpium Britannicarum. Londini 1690 & 1696 in-8.

Raii Meth. Var. Raii de Methodis Plantarum variis dissertatio. Londini 1696 in-8.

Renealm. Renealmus. Pauli Renealmi Blæfensis Doct. Med. specimen historiæ Plantarum. Parisiis 1611 in-4.

Richier Anomat. Richieri Onomatologia, seu Nomenclatura stirpium Horti Regii Montpelienensis recens constructi, à Richiero de Belleval Medico Regio, Anatomes & Botanices Professore. Montpelii 1598 in-12.

Richier. Richierus de Belleval. *Dessein touchant la recherche des Plantes du Languedoc, par M. Richier de Belleval. A Montpellier 1605 in-8.*

Rivin. Rivinus. Introductio generalis in Rem-herbariam cum ordine Plantarum quæ sunt flore regulari monopetalo. Authore Quirino Rivino Med. Prof. Lipsiæ 1690 in-folio. Ordo vero Plantarum quæ sunt flore regulari, pentapetalo. Lipsiæ 1699 editus est in-folio.

Rob. Cat. Robini Botanici Regii Catalogus seu Enchiridion Isagogicum stirpium quas Luteriæ colebat. Parisiis 1624 in-8.

Rob. Florileg. Robini Florilegium à Petro Vallet cufum. *Le Jardin du Roy Tres-Chrestien Louis XIII. A Paris 1625 in-folio.*

- Rolfinc.* Rolfincius de Vegetabilibus. Jenæ 1670. in-4.
Rondel. Rondeletius de Piscibus. Lugduni 1554. in-fol.
Ruell. Ruellius. De naturâ stirpium libri tres Joanne Ruellio Auctore. Parisiis 1536. in-fol.
Scheuchz. Scheuchzerus. *O'ryzophorum Helveticus*, sive Itineris Alpini descriptio 1. 2. & 3. Authore Joanne Jacobo Scheuchzero Medico Tigurino. Londini 1708. in-4.
Scheuchz. *Agrostograph. Prodr.* Joannis Scheuchzeri Med. Tigurini Agrostographiæ Helveticæ Prodomus. Tiguri 1708. in-fol.
Schol. Bot. Schola Botanica sive Catalogus Plantarum quas in Horto Regio Parisiensi indigitavit Turnefortius, ut & Prodomus Paradisi Batavi P. Hermannii. Amstelædami 1689. in-12.
Scheuvenck. Scheuvenckius. Stirpium & Fossilium Silesiæ Catalogus à Casparo Schuvenckfelt. Lipsiæ 1600. in-4.
Scot. Illust. Scotia illustrata. Authore Roberto Sibbaldo. Edinburgi 1684. in-folio.
Sim. Paul. Quadr. Simonis Pauli quadripartitum Botanicum. Argentorati 1667. in-4.
Sim. Paul. abus. Tab. & Thé. Simonis Pauli de abusu Tabaci & Herbariæ Théæ Commentarius. Argentorati 1665. in-4.
Sloan. Cat. Jamaic. D. Hans Sloane Catalogus Plantarum Insulæ Jamaicæ. Londini 1696. in-8.
Sloan. Hist. Jamaic. D. Hans Sloane Medici Londinensis Historia Naturalis Jamaicæ Anglicè scripta. Londini 1707. in-folio.
Stephan. Prad. Caroli Stephani Prædium rusticum. Parisiis 1629. in-8.
Stephan. de re Hort. Carolus Stephanus de re Hortensi. Parisiis 1535. in-8.
Stephan. Semin. Caroli Stephani Seminarium seu Plantarium arborum quas post Hortos conferere solet vulgus. Parisiis 1536. in-8.
Suvert. Suvertius. Emanuelis Suvertii Florilegium. Francofurti 1612. Amstelodami 1647. in-folio.
Tabern. Hist. Tabernæ montani Historia Plantarum Germanicè scripta. Francofurti 1613. in-folio.
Tabern. Icon. Tabernæ montani Icones Plantarum. Francofurti 1590. in formâ longâ.
Thal. Sylv. Herc. Thalii Sylva Hercynia sive Catalogus Plantarum sponte nascentium in montibus & locis vicinis Hercyniæ. Francofurti 1558. in-4. Cum Camerarii horto editus.
Thev. Franc. Antarct. *Les singularitez de la France Antarctique*, par André Thevet. A Paris 1558. in-4.
Thev. Cosmograph. Theveti Cosmographia. *Cosmographie du Levant* par André Thevet d'Angonlesme. A Lyon 1554. in-4.
Thurneiss. Thurneisseri Historia seu descriptio Plantarum tam domesticarum, quàm exoticarum, earumdem vires influentiales & signaturas complectens. Berlini 1578. in-folio.
Trag. Tragus. Hyeronimi Tragi de stirpibus libri tres. Argentorati 1552. in-4.
Triumf. Observ. Triumphetti Observationes de Ortu ac vegetatione Plantarum. Romæ 1685. in-4.
Triumf. Prælus. Triumphetti Prælusio Botanica habita anno Jubilæi. Romæ 1700. in-4.
Triumf. Syllab. Triumphetti Syllabus Plantarum horto Medico Romano additarum. Romæ 1688. in-4.
Turnef. de Opt. Meth. Turnefortii Medici Parisiensis, & Bot. Profess. de Optimâ methodo instituendâ in re herbariâ, ad sapientem virum G. Sherardum Anglum Epistola. Parisiis 1697. in-8.
Turnef. Plant. Paris. Hist. Turnefortii Plantarum circa Parisios nascentium Historia. *Histoire des Plantes qui naissent aux environs de Paris*, avec leur usage dans la Médecine. Par M. Pitton de Tournefort. A Paris de l'Imprimerie Royale 1698. in-8.
Vaillant. D. Sebastianus Vaillant in Horto Regio Parisiensi Plantarum Prodemonstrator, à quo Plantarum in agro Parisiensi nascentium Turnefortianâ auctiorem perfectioremque historiam mox edendam expectamus.
Wepf. Wepferus de Cicutâ Aquaticâ. Basileæ 1679. in-4.
Vesling. in P. Alp. Veslingius in Prosperum Alpinum. Patavii 1638. in-4.
V. Lust. Viridarium Lusitanicum Gabrielis Grisley. Ulyssipone 1660. in-12.
Whel. Itin. Wheleri Itinerarium. *Voyage de Dalmatie, de Grece & du Levant*, par George Wheeler, traduit de l'Anglois. A Anvers 1699. in 8. 2. vol.
Zan. Hist. Zanoni Historia. Istoria Botanica di Giacomo Zanoni simplicista e sopra intendente all'horto publico di Bologna. In Bologna 1675. in-folio.

PLANTÆ

PER

GALLIAM, HISPANIAM ET ITALIAM
OBSERVATÆ,

ICONIBUS ÆNEIS EXHIBITÆ

A R. P. JACOBO BARRELIERO
PARISINO,

In sacrâ Theologiâ Magistro, Generalium Præpositorum Ordinis
FF. Prædicatorum Socio à Secretis, Alumno Provinciæ
sancti Ludovici, olimque Medico Parisiensi.

OPUS POSTHUMUM,

Accurante ANTONIO DE JUSSIEU, Lugdunæo, utriusque Facultatis
Monspelienfis & Parisiensis Doctore Medico, è Regiâ Scientiarum
Academiâ, necnon in Horto Regio Parisiensi Botanices Professore,
in lucem editum, & ad recentiorum normam digestum.

CUI ACCESSIT EJUSDEM AUCTORIS SPECIMEN
de Insectis quibusdam marinis, Mollibus, Crustaceis & Testaceis.



PARISIIS,

Apud STEPHANUM GANEAU, viâ Jacobæâ, ad Insignia
Dombarum, è regione Fontis Sancti Severini.

MDCCXIV.

CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIS.

P L A N T A

P E R

GALLIAM, HISPANIAM ET ITALIAM

O B S E R V A T A

ICONIBUS AENEIS EXHIBITA

A R P JACOBO BARRERERO

P A R I S I N O

In sacra Theologiae Magistro, Gualtero Pignatelli Ordinis
P. R. Praedicatorum Sancti Iacobi, Alano Provine
fratris Ludovici, clauis & libro Pignatelli.

O P U S P O S T H U M U M

Accuravit Antonio de Jussieu, Ingeniensis, antequam Pignatelli
Montpellier & Tullensis Doctoris, & Regis Scholasticum
Academici, necnon in sacra Theologiae Praedicatoris
in sacra Theologia, & in sacra Theologiae Doctoris.

QUI ACCESSIT, EIVSDEM AUCTORIS, EXEMPLUM
ad hunc per hunc, & hunc, & hunc, & hunc.



P A R I S I N O

Apud STEPHANUM GARNIERUM, vii Jacobini, ad insignia
Dombani, & regione Fontis Sancti Severini.

M D C C X V

CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIS



I N D E X

I C O N U M B A R R E L I E R I

Prior numerus Iconem, alter observationem indicat.

A

	<i>Icon.</i>	<i>Observ.</i>
A BROTANUM fœmina, incanum, albo Achilleæ flore, Cre- ticum.	572.	1118
— fœmina incanum, Hispanicum.	463.	1018
— fœmina, virens, vermiculato, serrato folio.	464.	1019
— fœmina, Hispanicum, tenuifolium, virens.	429.	1020
— fœmina, tenuifolium, incanum, Hispanicum.	430.	1021
— fœmina, tomentosum, crispum, incanum, Hispanicum.	216.	1022
— tenuifolium, incanum, minimum.	448.	1013
— mas, tenuifolium, latifolium, Hispanicum, <i>πλυσταφυλλον</i> .	447.	1014
Abinthium incanum, lanuginosum, crispum, cristatofolio, longiori pe- diculo, seu majus, acrius, amarius, densiorique folio.	433.	1009
— incanum cristato, crispum, tenuiorique folio, medium.	434.	1010
— incanum minus, tenuifolium, crispum, Hispanicum.	485.	1011
— minus, majoribus altiusque incisus foliis, cinereis, Hispanicum.	459.	1007
— minus, tenuifolium, altè incisus foliis, cinereum, salsum, His- panicum.	460.	1008
— minus, oblongis dentatisque foliis cineritiis, Hispanicum.	461.	1012
— pumilum, palmatum, minus, argenteo sericeoque folio, Hispa- nicum.	462.	1006
— pumilum, palmatum, crasso, tomentoso, pallescenteque folio.	481.	1005
Acacia Ægyptia.	1138.	1366
— Americana, albo Cytisi flore Cornuti.	740.	1384
Acanthium virens, majoribus capitis spinis.	501.	910
— tomentosum, capite & semine majoribus, crispantibus caulium alis.	502.	909
Acarna Atractylidis folio, amplo, purpureo capite, prolifera.	483.	1124
— latifolia, spinosior, amplo capite.	484.	931
— Theophrasti Imperato, Ilvensis seu Italica.	1211.	912
Aconitum reticulatâ radice, flore sulfureo albicante, latifolium.	599.	871
— reticulatâ radice, flore sulfureo albicante, angustifolium.	600.	872
Adiantum Filicinum, aquaticum, mollius, minimum.	432.	1267
— Filicinum, durius, crispum, minimum.	432.	1268
— Filicinum, Leptophyllum, elatius, Hispanicum.	431.	1270
— stellatum, Canadense, Polypodii radice.	1206.	1269
Æthiopis laciniatis foliis.	188.	233
Ageratum minus, saxatile, flore albo.	1192.	219
Agrifolium dorso folii echinato.	518.	1364
Agrimonium odoratum.	611.	604
Agrimonoides semine glabrò.	612.	605
Alcea Betonica folio, flore purpureo-violaceo.	1189.	72
— hirsuta, minima, flore cæsis, Hispanica.	1169.	71
— minor, variis foliis.	1201.	68
— Syriaca arborescens, Ketmia Syrorum Imperati.	1176.	73
— Veneta, seu Vesicaria, trifolia, hirsuta, flore sulfureo, unguibus purpureis.	471.	75
— Africana, seu Vesicaria, trifolia, glabra, flore sulfureo cum un- guibus purpureis.	472.	76
Alchimilla argentea, montana, pentaphyllea.	756.	1140
— minor, hirsuta, cineritia, Italica.	928.	1139
Alectorolophos Italica, versicolor, spicata.	666.	208

	Icon.	Obser.
— Italica, luteopallida.	665.	209
— Montana, flore albo.	469.	210
Allium saxatile, Acori radice, flore purpureo.	1022.	782
Althæa frutex, flore albo, rubro, carneo, purpureo-violaceo.	491.	73
— fruticans, incana, minore folio, Hispanica.	428.	69
— rugosior, rubro flore, Hispanica.	427.	70
— virens, rotundifolia, flore amplo, purpurascens, Italica.	479.	66
Alyssum Creticum, incanum, orbiculatis siliquis.	862.	396
Amaranthus major, purpureus, crispis paniculis, semine rufo.	658.	435
— major, incurvâ & obsoletè rubrâ paniculâ, semine albo.	657.	436
— major coccineus, sparsis & longioribus thyrsi flagellis, semine nigro.	642.	437
— purpureus, crassioribus setis, nutante crispâ jubâ, semine nigro.	641.	438
— Æstivus, majoribus, coccineis nutantibusque flagellis, semine pallido.	659.	439
— major, purpureo-violaceus, erectis congestisque spicæ flagellis semine nigro.	649.	440
— major, purpureo-violaceus, tenuibus, transversis spicarum flagellis, semine nigro.	650.	441
— major, virentibus spicarum paniculis, semine nigro.	648.	442
— tricolore folio, è viridi pallidis flosculis.	647.	443
— purpureo-violaceus, tenuibus setis, nutante & crispâ jubâ, semine nigro.	645.	444
— coccineus, thyrsoides, semine nigro.	646.	445
— serotinus, major, purpureus, oblongâ sparsâque spicâ, semine nigro.	639.	447
— serotinus, major, purpureo-violaceus, tenuioribus spicis & flagellis, semine nigro.	640.	446
— major, præcox, nutantibus, roseis flagellis, semine carneo.	664.	448
— major, serotinus, arborescens, nutantibus, roseis flagellis, semine carneo.	663.	449
— major, præcox, crassâ, congestâ & coccineâ spicâ, semine albo.	662.	450
— serotinus, medius, purpureâ, crassâ, congestâque spicâ, semine pallido.	661.	451
— major, purpureus, rarioribus thyrsorum flagellis, semine nigro.	677.	452
— præcox, incurvis, crassioribus coccineisque flagellis, semine albo.	660.	453
— præcox, minor, coccineis erectis flagellis, semine albo.	678.	454
— minor, coccineus, paniculâ tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ.	506.	455
— minor, pallidus, paniculâ, tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ.	505.	456
— minor, aureus, pyramidalis, flagellis hispidis, crispis & cristatis.	476.	457
— minor, luteo-paleaceus, pyramidalis, flagellis erectioribus, cristatis.	475.	458
— minor, aureus, latâ & cristatâ paniculâ.	507.	459
— minor, coccineo-purpureus, latâ cristatâque in globum paniculâ.	508.	460
— minor, purpureo-violaceus, amplâ, latâ, globosâ, crispâ & cristatâ paniculâ.	478.	461
— minor luteo-purpureus, pyramidalis, longis, sparsis & cristatis flagellis.	477.	462
— minor, simplici paniculâ, semine nigro.	643.	463
— minor, coccineus, simplici & nutante paniculâ, semine albo.	644.	464
— minor, serotinus, obsoletè rubente spicâ, semine nigro.	671.	465
— minor, atro-purpureus, cristatis spicis.	672.	466
— minor, coccineus, sparsis thyrsi flagellis, semine rufo.	653.	467
— minor, serotinus, purpureo-violaceus, crassioribus & rarioribus spicæ flagellis, semine nigro.	654.	468
— minor, violaceo-purpureus, brevi, congestâ, acutâ spicâ.	679.	469
— viridi spicâ, Indicus, minor.	680.	470
— minor, spicâ singulari, albo-purpureâ luteâque, lunatis circum caulem foliis.	1195.	471
Ambrosia vulgaris.	1144.	907
Amelanchier Gallo-provinciæ.	527.	1381
Ammi Sii, vel Laveris folio, flore albo, semine nigro.	1190.	614
Amomum.	571.	1393

Anagyris foetida, Cretica, oblongo folio, violaceis-luteis floribus.	569.	1383
Anchusa angustis, villosis foliis, Hispanica.	577.	148
— angustis, dentatis foliis, Hispanica.	578.	142
— Lignosior, Monspeliensium, flore violaceo.	1168.	143
Androsæmum montanum, minus.	490.	543
Anemone latifolia, flava, 1. Clusii.	792.	574
Angelica Atropurpurea, Canadensis.	1319.	627
— lucida, Canadensis.	1320.	628
Aninga lba Bras. Ari facie.	282.	175
Anonis non spinosa, flore thyrsoides, carneo, Polonica.	1214.	830
— non spinosa, purpurascens, minor, Italica.	354.	831
— purpurea, non spinosa, minor.	1106.	832
— luteo-purpurea, minima, angustifolia, Hispanica.	1104.	833
— non spinosa, trifolia, glabra, luteo-purpurascens, saxatilis.	762.	834
— non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, Hispanica.	258.	835
— lutea, viscosa, minor, marina, latifolia, Hispanica.	1105.	836
— non spinosa, villosa & viscosa, Hispanica.	775.	837
— trifolia, pallidis nutantibusque flosculis, maritima.	766.	838
— lutea, Trixaginis folio, maritima.	776.	839
— lutea, viscosa, latifolia, minor, flore pallido.	1239.	840
— lutea, montana, non spinosa, minima.	1107.	841
Anthora vera, flore luteo.	609.	874
Anthyllis Alsinifolia, Polygonoides, major.	534.	1134
— Alsinifolia, incana, marina, minima.	529.	485
— trycophyllos, Lychnitos, minima, flore albo.	530.	482
— recta, trycophyllos, inverso flore albo, Hispanica.	533.	481
— Lychnites, annua, seu minor, angustifolia, flore albo.	580.	483
— Polygonoides, angustifolia.	579.	484
— Lychnoides, perenni radice, trycophyllos, minor.	531.	480
— Linifolia, flore albo, Polygonoides.	532.	572
— leguminosa, vesicaria, lutea.	554.	798
— leguminosa, montana, caeruleo flore.	553.	797
— leguminosa, lutea, Italica.	575.	796
— Lunaria, flore luteo, Italica.	576.	848
Antirrhinum majus, saxatile, angustissimis foliis, flore purpurascen-		
te, minori.	637.	192
— majus, angustifolium, amplo flore, purpureo, Romanum.	638.	191
— latifolium, pallido, amplo flore.	655.	190
— minus, flore carneo.	651.	195
— minus, flore carneo, elatius.	652.	194
— minus, albo, amplo flore.	656.	193
— saxatile, minus, Origani folio, viscoso & villoso, flore albo,		
amplo.	597.	203
— saxatile, villosum, folio Origani glutinoso.	598.	199
Aparine minima, flore albo.	58.	94
Apocynum minus, rectum, Canadense.	72.	65
Aquilegia.	627.	903
— simplex, corniculata, flore caeruleo.	628.	875
— alba, multiplex, è purpureo-violaceo variegata.	618.	876
— corniculata, violacea, umbellâ reflexâ.	614.	877
— corniculata, flore albo, minore.	31.	878
— corniculata, flore caeruleo, minore.	32.	879
— corniculata, rosea, prælongo flore albo.	616.	880
— corniculata, rosea, caerulea, brevi & densissimo flore.	615.	881
— corniculata, rosea, altera.	676.	882
— corniculata, crispa, longior.	675.	883
— corniculata, crispa, saturè rubra, major.	630.	884
— corniculata, crispa, minor, rubra.	629.	885
— promiscua, vario flore.	623.	886
— inversa, pleno flore.	613.	887
— stellata, simplex, violaceo-purpurea, major.	624.	888
— stellata, purpurea, albis foliorum acuminibus.	626.	889
— stellata, purpureo-violacea, minor.	625.	890
— stellata, albo violacea, variegata.	621.	891

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obsero.
— stellata, maxima, alba, <i>μελανοστιχες</i> .	622.	892
— stellata, umbellâ reflexâ, flore pleno, tenuifolia, violacea.	634.	893
— stellata, violacea, minor, latifolio & plenissimo flore.	633.	894
— stellata, alba.	673.	895
— stellata, cærulea.	674.	896
— stellata, flore violaceo, latifolio, crispo.	620.	897
— stellata, flore violaceo, latifolio.	619.	898
— stellata, crispa, minor, violacea.	635.	899
— stellata, crispa, minor, rubra.	636.	900
— degener, virescens, stellata, rosea.	608.	901
— rosea, cæruleo-violacea, rara.	607.	902
— tenuifolia, præcox, Canadensis, purpuro-luteo simplici flore.	617.	904
Arbor tristis Shardonii.	1196.	1363
Arbutus vulgaris.	674.	1361
— oblongo & acuto fructu.	673.	1362
Arctium montanum, angustifolium, Hispanicum.	1193.	961
— montanum, minus, incano Taraxaci folio.	386.	962
Argemone lutea Ponæ.	764.	475
Arisarum dulce, non lactescens, latifolium, minus, Brasilianum.	283.	183
— majus, caulescens, aquaticum, Brasilianum.	281.	184
— angustifolium, majus.	284.	177
— latifolium, minus, repens, cespitosum.	1150.	182
— latifolium, colubrinum, repens.	1130.	181
— serpentinum, rotundiore folio, radice globosâ, Italicum.	573.	180
Arthemisia tenuifolia, major, Hispanica.	550.	1015
— tenuifolia, media, Hispanica.	589.	1016
Arum Ægyptiacum, longâ radice.	669.	171
— Ægyptiacum, transversâ & repente radice.	670.	172
— Ægyptium, vulgatum, rotundâ minorique radice.	667.	169
— Ægyptium, rotundâ crassâque radice.	668.	170
Asperula erecta, cærulea, incana, angustifolia.	765.	97
— cærulea, supina, latifolia.	766.	96
— flore carneâ, acuto folio.	541.	96
— folio obtuso.	541.	105
Asplenium crispum, subrotundis dentatisque foliorum alis.	603.	1274
— majus, oblongis, serratis foliorum alis.	604.	1275
Alter Autumnalis, latifolius, parvo, purpureo, medio luteo flore.	546.	1074
— angustifolius, Tripolii flore.	606.	1065
— cernuus, flore citrino Columnæ.	1142.	1023
— Conyzoides, luteus, Pilosellæ folio, Hispanicus.	1208.	1061
— Conyzoides, angustissimo Linariæ folio, Hispanicus.	605.	1064
— legitimus Clusii alter, seu spinosus, luteus.	551.	1120
— legitimus Clusii, mollior, luteus.	552.	1121
— luteus, alato caule, Canadensis.	535.	1091
— supinus, luteus, Massilioticus.	1151.	1122
Astragaloides incana, flore purpureo, Lentis siliquis.	537.	850
— montana, incana, major, flore albo.	557.	849
— pusilla, incana, amplo, purpureo flore.	537.	851
— pumila, incana, hispida, flore albo.	537.	852
Astragalus incanus, tomentosus, pallido, globoso flore, Italicus.	722.	1391
Atractylis cærulea, incisis foliis, Hispanica.	591.	971
— Hispanica, integro & cinereo folio, flore citrino.	593.	1126
— Hispanica, tenuifolia, flore luteo.	594.	1125
Attriplex Lovitensis Corvini, semine anguloso.	1210.	1131
— sylvestris, major, anguloso folio.	540.	1132

B

Baccharis minor, Italica, flore Asteris luteo.	1145.	1060
Balsamina lutea, Polonica.	1197.	855
Barba Jovis Cytisi folio, flore rubello, seu altera Anguillaræ.	377.	1389
— Lentifolia, incana, flore luteo, 1. Anguillaræ.	378.	1388
Bellis montana, maxima, glabra, ramosa, subrotundo folio, Indica.	438.	1097
montana,		

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Obfer. V</i>
—montana, minor, ramosa, glabra, Cotyledonoides, Nursina.	1237.	1099
—montana, major, hirsuta, caule folioso, non ramoso, Nursina.	437.	1098
—minima, incisus caulis foliis, Hispanica.	1153.	1103
—ramosa, umbellifera, Canadensis.	388.	1068
Betonica Alpina, incana, purpurea.	340.	294
—montana, lutea.	339.	295
Bistorta montana, minima.	489.	1150
Blattaria flore albo Corvini.	1249.	158
Blitum angustifolium, verticillatum.	1181.	1130
Botrys Bœtica, Atriplicis sylvestris facie, vulgò Botrys Mexicana.	1185.	1133
—incana, ferratis foliis, Hispanica, Abrotani facie.	486.	1017
Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliquâ.	353.	403
Bromos sterilis, erectâ paniculâ, major.	76.	1238
Brunella latifolia, Italica, flore carneo.	562.	239
Bruscus seu Ruscus rotundifolius, vel Myrtacantha latifolia.	517.	4
Bugla media, flore cæruleo.	338.	349
—minima, glabra, flore azureo.	337.	350
Buglossum minus, angustifolium, flore violaceo, albo umbilico, Italicum.	1207.	140
—scorpioides, hirsutum, flore cæruleo, Italicum.	403.	141
—sylvestre, angustifolium.	325.	137
—sylvestre.	326.	136
—sylvestre, minus, flore azureo, radice perenni, Italicum.	333.	138
—sylvestre, minus, flore carneo, parvo, retuso.	1253.	149
Bulbocastanum alterum, caule firmiore.	244.	613
Buplevrum fruticans, angustifolium, Hispanicum.	1255.	623
—3. minimum Fabii Columnæ.	1248.	622

C

C Acalia verior, Urticæ folio, purpurascente Leucosii flore.	357.	405
—Urticæ folio, flore albo.	358.	1003
Capœa montana, minor, albido flore.	1170.	554
Calamagrostis Nastoides, Avenacæ paniculâ.	363.	1243
Calamintha montana, præstantior, flore purpureo.	398.	265
—Pulegii odore, minor, Italis Mentuccia minore, ô Nepetella.	1166.	266
Calathiana verna, cæruleo-purpurea Dalechampii.	509.	22
—verna, cæruleo-purpurea Dalechampii Joan. Bauh.	509.	22
Calceolus Marianus, albo sandalio & brevior, Canadensis.	260.	906
Campanula minor, Alpina, folio Cochleariæ.	454.	81
—Montana, minor, angustifolia.	487.	77
—saxatilis, rotundifolia, hispida, flore cæsis, amplo, Italica.	453.	80
Cannabis sputia, angustifolia, variegato flore, Polonica.	1158.	241
Caprifolium erectum, minus, Xylostei Dodonei species.	511.	1367
Cardamine aquatica, Cotyledonoides, flore albo.	1163.	419
—sylvestris, minor, Italica.	455.	418
Cardamomi species III. Ponæ.	571.	1394
Carduncellus purpureus, tenuifolius, singulari flore.	345.	972
Carduus Cypis Theophrasti.	376.	918
—ferox, Hispanicus, spinis majoribus.	474.	929
—ferox, mitior, Hispanicus.	473.	930
—nemorosus, Italicus.	417.	925
—purpureus, Cyani folio.	418.	917
—stellatus, luteus, aculeatis & profunde incisus foliis.	346.	916
—sphærocephalus, latifolius, cæruleus, major.	412.	1027
—sphærocephalus, latifolius, albus.	143.	1026
—sphærocephalus, cæruleus, capite ferrugineo, major.	413.	1029
—sphærocephalus, cæruleus, capite ferrugineo, minor.	414.	1030
—sphærocephalus, cæruleus, minor.	411.	1027
—sphærocephalus, tenuifolius, violaceus.	144.	1028
Carlina minima, caulodes, Hispanica.	592.	1127
—Montana, minor, acaulos.	492.	967
Caryophyllata Alpina, minima, flore aureo.	399.	588
—Alpina, tenuifolia, incana, flore luteo, longius radicata.	400.	589

	Icon.	Observ.
Caryophyllus minor, foetidus, purpureo-violaceus.	495.	647
— montanus, umbellatus, floribus variis, luteis ferrugineis, Italicus.	497.	648
Cedrus Lybani.	499.	1345
Centaurium majus, purpureum, foliis Cynaræ, Pyrenæum.	513.	968
— luteum, majus, Alpinum.	514.	969
Centaurium minus, vulgare, flore albo, latifolium.	424.	110
— minus, purpureum, angustifolium.	425.	113
— minus, angusto prælongoque folio, flore rubello.	435.	111
— minus, leptophyllum, polyanthes, accenso, acutoque flore.	436.	112
— minus, ramosum.	1242.	114
— minus perfoliatum, luteum, umbellatum.	515.	115
— minus, perfoliatum, luteum, non umbellatum, rarioribus & crassioribus florum capitellis.	516.	115
— minus, perfoliatum, luteum, crassioribus capitellis.	516.	115
— minus, luteum, latifolium, non perfoliatum.	468.	116
— minus, luteum, angustifolium, non perfoliatum.	467.	117
— minus, luteum, Allinoides, Polonicum.	1156.	118
Ceterac officinarum majus, seu Asplenium majus.	1044.	1272
— officinarum vulgare, seu Asplenium Mathioli.	1051.	1271
— officinarum minus, seu Asplenium minus.	1052.	1273
Chamæchrysocome prælongis purpurascensibusque Jaceæ capitulis.	406.	940
Chamæcistus mas, flore rubello, Thymi foliis.	328.	519
— luteus, Thymi durioris folio.	441.	521
— luteus, imis Thymi foliis.	442.	523
— luteus, Thymi folio, polyanthes seu major.	443.	517
— Thymi folio, oliganthes seu minor.	444.	518
— incanus, Tragorigani folio, Hispanicus.	415.	512
— angusto Thymi folio, Hispanicus.	416.	513
— luteus, toroso folio, Hispanicus.	439.	520
— luteus, imis Serpilli foliis.	440.	522
— luteus, vermiculato folio, major.	445.	515
— brevi vermiculatoque folio, minor, Hispanicus.	446.	514
— supinus, Hysopi foliis villosis.	818.	535
Chamælea pumila, saxatilis, flore pallido, Italica.	234.	1351
Chamælinaria violacea, Italica.	1162.	202
Chamælinum subrotundo folio.	1165.	684
— gramineo, seu acuto folio.	1165.	479
Chamæmelum marinum.	521.	1110
— montanum, incanum, Absinthioides, Italicum.	457.	1111
Chamærubus odoratus, Vitis folio, Canadensis.	396.	1375
Chamæspartium supinum, caule folioso, Hispanicum.	570.	1382
Chondrilla Cyanoides, cærulea, Coronopi folio.	1134.	1054
— Cyanoides, lutea, Coronopi folio non diviso.	1135.	1055
— purpurea, tenuifolia, capite Jaceæ, semine Cardui.	1136.	948
Chrysanthemum Bellidis folio, seu Bellis lutea.	1244.	1092
— majus, latiori Chamæmeli folio, flore aureo folioso, Italicum.	451.	1094
— pallidum, minimis imisque foliis incisis, superioribus integris & capillaribus.	421.	1093
— Tanacetii folio, flore aureo, Italicum.	465.	1113
— Tanacetii folio, flore albo, montanum, Italicum.	466.	1114
— Valentinum, seu tenuifolium, flore aureo, aphylo.	449.	1112
— tenuifolium, flore bullato, aureo.	450.	1095
— tenuifolium, flore luteo, aphylo, minore.	452.	1096
Chrysocome citrina, supina, latifolia, Italica.	367.	985
— latifolia, major, singulari flore.	426.	981
— latifolia, minima, singulari flore.	425.	980
— marina, umbellata.	1125.	976
— major, Rorismarini folio.	278.	973
— media, seu Stachas citrina, vulgaris.	409.	974
— seu Stachas citrina, minor.	410.	975
— mollior, singulari, minorique capitello.	407.	979
— muralis, paucioribus, congestis fuscisque capitellis.	277.	978
Cicer montanum, fruticans, incanum, angustifolium, serratum, minus	419.	844

Index Iconum Barrelieri.

vij

	<i>Icon.</i>	<i>Observa.</i>
— montanum, fruticans, incanum, latifolium, caule tortuoso & tomentoso, flore purpureo, Hispanicum.	420.	843
— sylvestre, fruticans, incanum, angustifolium, ferratum, flore purpureo, Hispanicum.	299.	844
— sylvestre, fruticans, angustifolium, non ferratum, Hispanicum.	300.	845
Cichorium spinosum Imperati.	1159.	1056
Cicuta montana, tenuifolia.	1161.	612
Cirsium Acanthii Illyrici folio, purpureum.	1117.	966
Cistus Halimi folio, flore luteo, majore, Italicus.	291.	526
— Halimi folio, flore luteo, amplo, maximus, Hispanicus.	292.	525
— Halimi minoris folio.	287.	527
— Halimi minoris folio, minor.	289.	529
— Halimi minoris folio, Hispanicus.	1316.	528
— incanus, Majoranæ folio, Hispanicus.	313.	531
— Lavandulæ latifoliæ folio.	288.	532
— Lavandulæ folio, thyrsoides.	293.	533
— angusto Libanotidis folio, flore singulari.	294.	534
— latifolius, magno flore.	1315.	547
— Ledum, Salviæ folio, Hispanicus.	314.	548
— Oleæ folio villosus, flore aureo, Italicus.	365.	509
— Serpilli folio, villosus, flore pallido, Italicus.	366.	510
— Thymi folio, saxatilis, Italicus.	290.	516
— angusto Serpilli folio, villosus, flore aureo, Italicus.	488.	511
— minor, Thymi folio, flore ferrugineo.	285.	524
— minor, brevi vermiculato folio, Hispanicus.	286.	514
— humilis, compactis in verticillos minoris Halimi foliis.	327.	530
Clematitis cærulea, Pannonica.	397.	587
— trifolia, flore Melanthii clavato; Granadilla Monardi, Maracot Peruvianis.	1243.	477
Coccygia Theophrasti, Cotinus Plinii.	528.	1368
Coccus Indorum Corvini.	1314.	1397
Cochlearia Arctica.	1305.	381
Colchicum autumnale, angustifolium, album; an Hermodactylus?	304.	706
Contraerva.	482.	1398
Convolvulus longifolius, azureus, niveo umbilico, erectus.	321.	29
— longifolius, azureus, niveo umbilico, supinus.	322.	28
— marinus, repens, angusto & oblongo folio, flore purpurascens.	1132.	31
— minor, spicæfolius, Hispanicus.	311.	30
— Betonicæ Althææque foliis, repens, argenteus, flore purpureo.	312.	34
— saxatilis, erectus, villosus, perennis, flore ex albo purpurascens, Hispanicus.	470.	32
— quinquefolius, sive foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo Bauhini Prodrumi.	319.	35
— henneaphyllos, flore purpureo.	320.	36
— pinnato folio, muriceo Gelsemini flore.	60.	106
Conyza montana, Bellidis folio, croceo flore singulari, Italica.	361.	1058
— montana, incana, villosa, folio acuto, flore aureo, non singulari.	362.	1057
— marina, tuberosa.	157.	1062
— major, Chrysocomes folio.	405.	1001
— minor, Chrysocomes folio.	408.	1002
— minor, fruticans, viridi Stæchadis citrinæ folio, flore folioso, luteo, Italica.	369.	1066
— minor, vera Lobelii, lutea.	370.	1072
— minor, unicaulis, annua, pallido flore.	1164.	1073
— montana, saxatilis, Hyssopi folio villosa & glutinosa, Hispanica.	158.	1063
— palustris, minima, Hispanica.	1175.	1067
Coralloides ramis longioribus prædita.	1280.	1305
— ramosa, palmata.	1279.	1306
Coris lutea, Ericoides, fruticans, Hispanica.	351.	542
Cratægonum pumilum, luteum, Absinthii foliis, Hispanicum.	375. 376.	580
Crocus vernus, minor, violaceus, medio purpureo flore, Italicus.	383.	710
— autumnalis, flore albo, verus.	303.	709
— vernus latifolius, flore violaceo, diluto, Italicus, maximus.	384.	708

	Icon.	Observ.
Cruciata montana, minor, flore cæruleo.	584.	154
— major, villosa, flore Molluginis albo.	324.	100
— minor, glabra, flore Molluginis albo.	323.	101
— marina, villosa, minor, duriuscula.	542.	103
Cucumis marinus Rondeletii, Aldorovandi, fortè dens lupi, fungus marinus, zoophytos.	1293.	1312
Cyanus purpureus, capite spinoso, Syriacus.	503.	927
— montanus, angustifolius, purpureus.	1323.	964
— montanus, medius, caule folioso, seu multifolius.	389.	963
Cynocrambe Alfinis folio.	335.	1260
Cynoglossum montanum, minus, angustifolium, purpureum.	334.	152

D

D aucus tertius Lugdunensis Historiæ.	1199.	616
— Mathioli, minor, tenuifolius.	1241.	641
— Selinoides, tuberosis geniculis, Illyridis semine.	1177.	614
Dentaria, major, αφύλλος, Orobanches facie.	80.	220
Diſtamnus albus officinarum, minor, Hispanicus.	1318.	905
— falsus verticillatus, pericarpio conoide, Creticus.	129.	248
— Creticus, verticillatus, odoratus.	130.	250
Digitalis Verbasci folio, purpurea, minor, Hispanica, perennis.	1183.	187
Doronicum minus, rotundifolium.	1149.	1190
Dorychnium luteum, Hispanicum, carnosius.	133.	1386
— luteum, majus.	134.	1387
— luteum, minus, incanum.	1179.	806
Draba, seu Arabis latifolia, flore albo.	213.	382
— angustifolia, Babylonica, flore albo.	213.	382
— angustifolia, major.	270.	413
— angustifolia, media.	269.	
— angustifolia, minima.	269.	
Dracunculus palustris, Polonicus Corvini.	574.	176

E

E chioides minus, globoso, echinato & singulari semine.	1246.	139
Echium luteum, minimum, Hispanicum.	1254.	144
Elleboraster Indicus, trifolius.	1143.	573
Elleborus Ferulaceus Lobelii, Bupthalmum Dodonæi, forte Pulsatilla lutea Corvini.	1178.	583
Elichrysum. Vide Helichrysum.		
Endivia major, lactucina, spinosa.	135.	1046
— minor, lactucina, spinosa.	136.	1047
Eruca sylvestris, flore albo, Italica.	132.	428
— sylvestris, minor, lutea, Bursa pastoris folio, Italica.	1016.	422
— Viminea, Iberidis folio, luteo flore.	131.	421
— minor, bulbi napique radice, siliquâ rotundâ.	1198.	426
— minimâ, oblongâ & hastatâ siliquâ.	1198.	427
— maxima, Canadensis, lutea.	706.	425
Erucula hirsuta, floribus albis.	195.	423
— flore rubello, Hispanica.	195.	424
Eryngium planum, cæruleum, campestre, Polonicum Corvini.	1174.	642
— pumilum, polyrrhizon.	1247.	645
— pumilum, Amethystinum.	376.	644
— minimum, trifidum, Hispanicum.	36.	643
— umbellatum, Hispanicum.	35.	646
Erysimum tertium, præcox, flore carneo.	196.	420
Esula fruticans, seu Pithyusa Romanorum.	197.	55
— minor, πολυχλυσ, aculeata.	85.	62
— minor, Myrtifolia, longius radicata.	211.	54
— rotundifolia, serrata, carnosior.	212.	57
Eupatoria foliis Enulæ, seu latifolia.	71.	1004
Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum.	1209.	1024
Euphrasia vulgaris, latifolia, atropurpurea.	276.	212

vulgaris,

Index Iconum Barrelieri.

- vulgaris, vera, flore albo.
- sylvestris, major, purpurea.
- rotundifolia, forte Alfine, an Anthylloides rotundifolium?
- vermiculato folio, Hispanica.

<i>Icon.</i>	<i>Obser. ix</i>
276.	213
276.	211
275.	214
1204.	215

F

- F** Aba minor.
- Ferula durior, seu rigidis, & brevissimis foliis.
- Filix baccifera Cornuti.
- florida, minor, Hispanica.
- Festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescentibus.
- gracilis, paucis utriculis.
- Graminea, hirsutis Bryzæ glumis, compactior.
- Graminea, glumis non hirsutis, erectior.
- Fragaria flore pleno, fructu rubello.
- spinoso fructu.
- Fucus spiralis, serratus.
- folliculaceus, serrato folio.
- pilosus erectus, minor.
- Fumaria henneaphylla, Hispanica, saxatilis, flore vario.
- tenuifolia, erecta, purpurea, Hispanica.
- tuberosa, insipida, Canadensis.
- siliquosa, sempervirens, Canadensis, flore carneo, rictu aureo.
- Fungus palmatus.
- foliatus, major, carnosior, dendroides, cristatus.
- cespitosus, ramosus, umbellatus, major, pallidè luteus.
- cespitosus, ramosus, umbellatus, minor, albus.
- ramosus, cristatus, medius.
- ramosus, cristatus, angustioribus lobis & crispis.
- ramosus, Abietinus, niveus.
- ramosus, crispus, violaceus.
- ramosus, Coralloides, purpureus.
- Coralloides, luteus, Italicus.
- Coralloides, roseus, Italicus.
- ramosus, comosus.
- Coralloides, cancellatus, purpureus.
- Coralloides, cancellatus, flavesceus.
- Phalloides, Gallus.
- Phalloides, Batavus.
- Amanita, marinus, purpurascens.
- Amanita, gilvoluteus marinus.

193.	799
77.	638
1120.	1262
37.	1277
75.	1229
83.	1155
83.	1228
75.	
89.	590
90.	591
1303.	1307
1122.	1308
1292.	1335
42.	866
41.	865
107.	867
108.	868
1267.	1295
1268.	1296
1269.	1289
1270.	1290
1271.	1297
1272.	1298
1257.	1299
1261.	1300
1262.	1301
1260.	1302
1259.	1303
1266.	1304
1263.	1291
1265.	1292
1264.	1293
1258.	1294
1294.	1310
1293.	1311

G

- G** Allium villosum.
- aquaticum, flore albo.
- album, minimum,
- Gelseminum, Arantii folio, flore albo, duplici, odoratissimo, seu Alexandrinum.
- trifolium, odoratissimum, semper virens, exoticum, seu Indicum.
- Clematites, flore igneo amplo, seu Virginianum.
- Gentiana major, vulgaris, pallido & parvo flore.
- Alpina, major, flore aureo & purpureo obsoleto.
- major, purpureo flore Clusii.
- Asclepiadis folio.
- minor, cruciata, flore cæruleo, erectior.
- minor, cruciata, flore purpureo, supina.
- cærulea, punctata, annua Pennæ, xij Clusii.
- minima Mathioli.
- autumnalis, minor, annua, flore cruciata, ad latera, piloso, fugax.
- cærulea, fimbriata, angustifolia, autumnalis Columnæ.
- concava, Anglica Gerardi.
- fugax Clusii, Bauhini purpureo-cærulea.
- minor, cærulea, stellato & per oras crenato flore, Dalechampii.

81.	95
82.	102
57.	98
61.	1360
62.	1359
59.	186
63.	7
69.	8
64.	9
70.	10
65.	11
66.	12
91.	13
51.	14
121.	15
97.	15
92.	669
510.	20
109.	25

	Icon.	Obfer.
Gentianella Alpina, lato, acuto folio, flore minus patulo, albo, cæruleo & cælio.	106.	
— Alpina, lato, rotundiore folio, flore amplo reflexo, colore azureo.	105.	24
— Helvetia, amplo, azureo flore.	47.	
— minor, purpurea, Violæ Marianæ flore.	110.	
— minor, ἀκαυλός, Violæ & maximi Convolvuli flore.	110.	
— fugax, Alpina, flore aureo.	104.	23
— minor, verna, cæruleo, stellato flore Clusii.	109.	25
— Alpina, minor, verna, subrotundo folio, flore cæruleo.	98.	25
— fugax, æstiva, cærulea, minor.	103.	22
— fugax, æstiva, stellata, cærulea, minor.	103.	22
— fugax Clusii, Bauhini subcærulea.	510.	21
— autumnalis, annua, cæruleo-purpurea, multiflora.	102.	19
— annua, azureo flore.	48.	18
— cærulea, cordata Columnæ.	122.	18
— fugax Clusii.	103.	17.
— purpurea, minima Columnæ.	97.	16
— seu Calathiana Viola Lugdunensis Historiæ.	52.	14
— seu Campanula pratensis Lugdunensis Historiæ.	52.	14
— autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, major.	101.	26
— autumnalis, Serpillifolia, flore crenato, Bavarica, minor.	101.	27
Geranium Batrachioides, flore purpureo, reflexo, Italicum.	39.	565
— Creticum, maximum Corvini.	1167.	570
— Creticum, minus, seu alterum, villosum.	492.	569
— hæmatodes, purpureum, parvo flore, Italicum.	67.	566
— minus, Saniculæ folio, albo flore.	87.	564
— montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore.	40.	567
— Myrrhinum, tenuifolium, amplo flore purpureo.	1245.	568
— noctu odorum, Indicum, Geranium triste Cornuti.	68.	571
Glans unguentaria, seu Myrobolanus Plinii.	1238.	1399
Gnaphalium vulgare, majus, flore citrino, amplo, Hispanicum.	33.	990
— majus, album, repente & cespitosâ radice.	74.	988
— majus, flore citrino, amplo.	73.	986
— Syriacum, flore purpureo.	34.	989
— sylvestre, supinum, retusis foliis, Hispanicum.	1147.	908
— roseum, supinum, caulescens.	127.	994
— roseum, I. Casp. Bauhin.	127.	991
— roseum, hortense, seu II. latifolium Casp. Bauhini.	127.	992
— roseum, supinum, Serpillifolium.	128.	997
— roseum, acutioribus foliis, acaulon, Italicum & Hispanicum.	1147.	993
— bombycinum, Serpillifolio, minimum.	128.	998
— minimum, supinum, Hispanicum.	295.	1000
— Leontopodium, erectum.	127. 128.	995
— Leontopodium, supinum.	127.	
— erectum, angustifolium, minus.	128.	996
Gramen Sparteum, spicatâ, Bryzæ paniculâ & corniculatâ.	25.	1154
— Sparteum, longâ & spicatâ paniculâ, Lolii utriculis, Festucæ potius, majus.	13.	1156
— Sparteum, spicatum, Lolii utriculis, majus.	748.	1157
— palustre, locustis Eruçæformibus.	2.	1158
— Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, maximum.	905.	1159
— Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, medium, seu vulgare.	905.	1160
— Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, minus.	905.	1161
— Loliaceum, Junceum, majus.	5.	1162
— Loliaceum, Junceum, minus.	6.	1163
— Junceum, nodosum, minimum, capillare.	117.	1164
— Junceum, spicatum, minus.	117.	1165
— Caryophyllatum, Loliaceum, repens.	906.	1167
— caninum, maritimum, spicatum, echinatis glumis.	718.	1169
— Sparteum, pennatum, majus.	46.	1170
— Hordaceum, δισκόβ, majus, ciliaribus glumis, durius.	112.	1171
— Secalinum, bulbosâ radice, seu ex Alepo Bauhini.	112.	1172

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obs. &]
— Hordeaceum, minimum.	111.	1173
— spicatum, folio aspero, spicâ grumosâ, longiore.	26.	} 1175
— spicatum, folio aspero, spicâ grumosâ, brevior.	26.	
— capite globofo, echinato, minus.	863.	} 1176
— minimum, spicâ globosâ, echinatâ.	28.	
— Alopecurum, majus, spicâ virescente, divulsâ, pilis longioribus.	115.	1153
— Alopecurum, minus, spicâ virescente, divulsâ.	115.	1152
— Alopecurum, molle, spicâ incanâ, obtusâ, majus.	116.	} 1178
— Alopecurum, molle, spicâ incanâ, acutâ, minore.	116.	
— Alopecurum, spicâ asperâ.	123.	1177
— Alopecurum, viridi & molli spicâ.	123.	1179
— Sciurum, seu Alopecurum, minus, heteromallâ paniculâ.	4.	1180
— Alopecurum, spicâ glumosâ, luteâ, villis crispis.	124.	1181
— Myurum, spicâ è viridi albescente.	124.	1182
— Sparteum, Alopecuroides, spicâ sericeâ.	13.	1183
— Sparteum, Alopecurum spicâ sericeâ, grumosâ.	3.	1184
— Sparteum, Alopecurum, spicâ sericeâ, glumosâ, Typhinâ.	3.	1185
— Typhinum, Plantaginis spicâ glumosâ, digitatâ, heteromallon, majus.	27.	1186
— Typhinum, Plantaginis spicâ glumosâ, digitatâ, heteromallon, minus.	27.	1187
— pratense, Alopecurum, sericeâ paniculâ.	11.	1188
— Typhinum, pratense, tuberosum, spicâ asperâ.	22.	1189
— Typhinum, arvense, radice tuberosâ, spicâ asperâ, longâ.	22.	1190
— Typhinum supinum, tuberosum, spicâ non asperâ.	53.	1191
— Typhinum, supinum, Italicum, minus.	54.	1192
— Typhinum, maritimum, longius radicat.	717.	1193
— Typhinum, spicâ conoide, striatâ, culmo violaceo.	21.	1194
— Typhinum, Junceum, perenne.	21.	1195
— Typhinum, longissimâ spicâ Phalaridis, molli, albicante.	14.	1196
— Typhinum, minori spicâ Phalaridis, durior, subfuscâ.	14.	1197
— Typhinum, Paniceum, utriculatum, amplo utriculo.	28.	1198
— Typhinum, Plantaginis spicâ, aristis geniculatis.	699.	1199
— Typhinum, Phalaroides, majus, bulbosum, aquaticum.	700.	1200
— Typhinum, Phalaroides, minus, bulbosum, aquaticum.	6700.	1201
— Typhinum, Phalaroides, pilosâ spicâ, aquaticum, bulbosum.	699.	1202
— Typhinum, Phalaroides, arvense, bulbosâ radice.	10.	1203
— Phalaroides, verius, bulbosâ radice.	9.	1204
— Crucis, seu cruciatum, tetradactylon.	753.	1205
— daetylum, spicatum, aristis geniculatis.	763.	1206
— Caninum, pratense, paniculatum, glumis Asparagi foliis similibus, mucronatis, sylvestre.	364.	1207
— palustre, Arundinaceum, Mili Paniculâ, semine Phalaridis.	8.	1151
— Miliaceum, majus, nutante paniculâ, Arundinaceum.	754.	1208
— Miliaceum, aquaticum, Bryzæ locustis, semine rufo.	7.	1209
— Miliari paniculâ, minus.	704.	1210
— arvense, paniculâ crispâ, pallidâ, seu majus.	703.	} 1211
— arvense, paniculâ crispâ, Janthinâ, folio geniculato, minus.	703.	
— murale, Junceum, minus, Allii radicibus, paniculâ Janthinâ, non crispâ.	272.	} 1212
— arvense, Filicinâ duriori paniculâ, gracilius.	49.	
— arvense, Polypodii paniculâ crassiore.	50.	1213
— Eranthemum, seu <i>sp. sp. sp.</i> , Phalaroides, paniculatum, multiplici, & tenui Brizæ spicâ.	43.	1215
— Eranthemum, palustre, tenui & sparsâ Bryzæ paniculâ.	743.	1216
— Eranthemum, supinum, congestâ Bryzæ paniculâ.	744.	1214
— Phalaroides, sparsâ Bryzæ paniculâ, minus.	44.	1217
— Phalaroides, sparsâ paniculâ, minimum, angustifolium.	44.	1218
— tremulum, seu Phalaroides, minus latâ, sparsâ paniculâ.	16.	1219
— tremulum, seu Phalaroides, majus, erectâ paniculâ, rufum.	23.	1221
— tremulum, seu Phalaroides majus, erectâ paniculâ, citrinum.	23.	1222
— Phalaroides, majus, ferrugineâ nutante paniculâ.	15.	1220
— Phalaroides, minus, erectâ collectâque paniculâ.	15.	1223
— Phalaroides, majus, acerosâ erectâ, parvâ paniculâ.	9.	1224

	Icon.	Observ.
— Phalaroides, majus, acerosum, nutante spicâ.	24.	1225
— Phalaroides, minus, erectâ spicâ, obliquis aristis.	24.	1226
— Phalaroides, sparsâ & nutante Bryzæ paniculâ, obliquis aristis, minus.	84.	1227
— Bromoides, Festuceâ tenuique paniculâ, minus.	76.	1239
— Festuceum, Myurum, minori spicâ heteromallâ.	99.	1240
— Festuceum, Myurum, elatius, spicâ heteromallâ, gracili.	99.	1241
— hirsutum, angustifolium, perenne, Lini utriculis.	748.	498
— Avenaceum, longâ erectâque paniculâ, violaceâ.	96.	1230
— Avenaceum, tenui spicatâque paniculâ, albis utriculis.	96.	1231
— Avenaceum, latifolium, minus, sparsâ paniculâ.	95.	1232
— Avenaceum, angustifolium, paniculâ pyramidalî.	95.	1233
— Sparteum, Bromoides, brevioribus utriculis, nutante paniculâ.	17.	1234
— Sparteum, Bromoides, longioribus & erectis utriculis.	17.	1235
— Sparteum, Bromoides, paniculâ spicatâ, majoribus utriculis.	18.	1236
— Sparteum, Festuceum, seu <i>Aegylops</i> Sparteâ, villosa.	18.	1237
— exile, Junceum, mollius, Festuceâ paniculâ, radice rufâ.	100.	1242
— Sparteum, Cyperoides, echinatâ spicâ, nemorum, majus.	19.	1251
— Cyperoides, echinatâ & rarâ spicâ, nemorum, minus.	20.	1252
— Cyperoides, palustre, echinatâ spicâ, medium.	20.	1253
— Cyperoides, Typhinum, latifolium, minus.	1.	1256
— Cyperoides, latifolium, Typhâ pendulâ, longiore.	45.	1255
— Cyperoides, latifolium, Typhâ erectâ, minus.	113.	1257
— Cyperoides, angustifolium, Typhâ nutante, minus.	113.	1258
— pratense, Junceum, nutante, amplâ, sparsâ & bombycinâ paniculâ.	12.	1259
— Bufonium, glomeratis utriculis.	94.	497
— Bufonium, supinum, mollius, seu umbellatum.	93.	496
— Bufonium, erectum, latifolium.	263.	495
— Bufonium, erectum, angustifolium, majus.	264.	
— Bufonium, erectum, angustifolium minus.	263.	
— Junceum, Sorghi capitulis.	747.	492
— Junceum, Milii paniculâ.	747.	493
— paniculatum, latifolium.	1307.	1244
— paniculatum, angustifolium.	1308.	1245
Gribeque Polonorum Corvini.	1171.	1400

H

H edera quinquefolia, Virginiana.	227.	1372
— trifolia, racemosa, Canadensis.	228.	1369
Hedysarum congestis & utrinque lunatis siliquis.	1137.	853
— clypeatum, minus, suave rubens.	1180.	802
— triphyllum, purpureum, Canadense.	1140.	801
— minimum, trifolium, torosâ siliquâ.	257.	846
Helichrysum trifidis foliis, Hispanicum, majus.	189.	983
— trifidis foliis, Hispanicum, minus.	190.	984
— Hispanicum, maximum.	225.	982
Heliotropium medium, strigosius, Italicum.	219.	151
Hieracium purpureum, incisiss foliis, montanum.	209.	1043
— purpureum, integris foliis, montanum.	210.	1042
— incanum, tomentosum, integro folio.	238.	1044
— seu Taraxacon tenuifolium, laxatile, Italicum.	237.	1041
Hippoglossum. Vide Hypoglossum.		
Horminum Creticum, comâ purpuro-violaceâ.	1233.	226
— sylvestre, majus, flore albo, integris foliis.	187.	235
— sylvestre, majus, hæmatodes, glabrum, flore cæruleo, Italicum.	185.	234
— sylvestre, majus, hastato folio, flore cæcio, Hispanicum.	186.	236
— sylvestre, hirsutum, Lampsanæ foliis, flore cæcio.	199.	225
— subrotundo folio, flore cæcio, Hispanicum.	200.	232
— sylvestre, inciso folio, flore cæcio, Italicum.	220.	219
— minus, Beronicæ folio, flore purpureo.	167.	230
— hæmatodes, minus, flore purpureo.	168.	231
— minus, subrotundo scabro folio.	207.	227
		sylvestre,

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Observ. xiiij</i>
— sylvestre, minus, inciso folio, flore azureo.	208.	228
— Hispanicum, foliis Herbæ venti, flore cæruleo.	1317.	237
Hyacinthus Orientalis, parvo flore, polyanthos, serotinus, cæruleus.	175.	693
— cæruleo-violaceus, caule folioso.	176.	694
— purpureo-violaceus, serotinus, semiduplex, φυλλοφύεος, Italis comosus.	173.	695
— roseus, cæruleus, flore duplici.	174.	696
— Januario.	987.	697
— Passa Januario.	988.	698
— Italis Pellucino.	982.	699
— Medicæus, Capucino affinis.	985.	700
— rusticus.	986.	701
— Italis sancto Bernardo.	981.	702
— cæruleus, pleno flore, præcox; Italis Fiorentino.	169.	703
— cæruleus, plenissimo flore, serotinus, Italis Stradoppio.	170.	704
— tuberosus, albus, odoratissimus, autumnalis.	1213.	705
— stellatus, cæruleo-violaceus, campanulatus.	183.	780
— stellatus, cæruleus, Borraginis flore.	184.	781
Hyoscyamus Indicus, Solani folio, flore atropurpureo Corvini.	247.	108
— Creticus, sulfureo flore, medio atropurpureo.	248.	107
Hypecoum Clusii, tenuifolium, flore pallido.	352.	429
Hyppoglossum, seu bislingua.	249.	5
Hyppuris setaceus.	1123.	1338
Hyssopus montana, verticillata, major.	239.	261
— montana, verticillata, minor.	240.	262

I

J acea nigra, major, foliis integris.	1324.	932
— maritima, incana, capite purpureo, spinoso, major.	1217.	913
— marina, cinerea, capite spinoso, purpurea, media.	235.	914
— marina, incano folio integro, caule folioso, capite purpureo, spinoso, minor.	236.	915
— minor, Globulariæ folio, flore purpureo, Hispanica.	159.	936
— minima, Globulariæ folio, flore purpureo, Hispanica.	162.	937
— minor, Hieracii folio, capite spinoso, Hispanica.	160.	921
— minor, purpurea, parvis & integris foliis.	139.	939
— minor, Stæchadis citrinæ folio.	141.	942
— minima, tenuifolia, erecta, Hispanica.	161.	943
— tenuifolia, purpurea, Hispanica.	140.	947
— Hispanica, latifolia, nervis foliorum lanuginosis.	137.	959
— Intybacea, capite rubro, spinoso.	1218.	926
— purpurea, Intybacea, breviori folio.	390.	960
— rubra, foliis Intybaceis, capite μελανόκεντρο.	1219.	958
— pumila, supina, purpurea, integro folio.	142.	938
— pumila, tenuifolia, supina, capite brevi, spinoso.	181.	920
— pumila, tenuifolia, supina, capite brevi, non spinoso.	182.	944
— pumila, incana, cespitosa, latiusculis foliis.	177.	945
— pumila, incana, cespitosa, tenuifolia.	178.	946
— pumila, incana, tenuifolia, capite spinoso, erecta.	179.	918
— pumila, incana, tenuifolia, capite spinoso, supina.	180.	919
— pusilla, Oleæ folio, purpureis congestisque floribus.	1126.	1123
Jacobæa Doronici foliis & flore, montana.	229.	1087
— Cretica, incana, integro Limonii folio.	217.	1059
— Cretica, argentea, foliis incisis, seu Argentea Alpini.	218.	951
— Linifolia, Hispanica.	802.	1083
— Linifolia, Italica.	268.	1082
— major, Arthemisiæ folio, incana, latifolia, non repens.	267.	1076
— incana, repens.	153.	1075
— Alpina, incana, minor.	262.	1078
— minor, Abrotani folio.	262.	1077
— maritima, minima, glabra, Senecionis folio, Italica.	261.	1079
— montana, integro, rotundo folio.	145.	1084

	Icon.	Observ.
—montana, integro, sublongo, folio.	146.	1086
—montana, croceo, amplo, singulari flore, spatulæ folio, elatior.	265.	1088
—montana, polyanthemos, flore aureo, foliis longis & integris, Italica.	266.	1089
—montana, Betonica folio.	801.	1085
Jondraba Alyssoides, spicata, lutea, major.	1219.	378
—Apula, Alyssoides, spicata.	253.	377
—Alyssoides, lutea, angustifolia.	230.	378
Jonthlaspi, seu Leucoium montanum, luteum, subrotundo Thlaspi utriculo, Italicum.	850.	399
—Alyssoides, angustifolium, luteum.	254.	379
Iris stellata, Cyclaminis radice, pullo flore.	1216.	791
Juncus repens, grumosâ & echinatâ spicâ.	114.	1254
—maritimus, spicâ subrotundâ, glumosâ.	203.	1246
—maritimus, minor, glumosâ & parvâ, fuscâque Phalaridis spicâ.	256.	1248
—maritimus, minor, graciliore spicâ.	256.	1247
—Graminis Cyperoidis radice, tenuifolius, elatior.	118.	499
—Gramineus, Cyperi radice rufâ & hirsutâ spicâ.	255.	500
—Gramineus, minimus, capillari folio, capite squamoso.	118.	1250
—minor, globoso, singulari capitulo, radice tomentosâ.	255.	1249
—repens, <i>δυσσέδρος</i> , minor, botrioides.	114.	491
—maritimus, Sorgh; paniculâ utriculatâ.	203.	494
—cacumine, reflexo, minor, paniculâ majore.	204.	490
—cacumine reflexo, major, paniculâ minore.	204.	489
—bulbosus, maritimus, floridus, filiquosus.	271.	563

K

K Ali geniculatum, aphyllantes, gilvis paleaceis flosculis, Hispanicum.	215.	501
—geniculatum.	192.	1261
—Polygonoides, frutex polyspermos.	191.	505
—vermiculatum, albo & amplo Sedi rosei flore.	888.	507
—vermiculatum, albo, globoso flore.	119.	663
—vermiculatum, Hispanicum, incanum, fruticans.	205.	504
—vermiculatum, Hispanicum, viride, fruticans.	206.	503
—vermiculatum, fruticans, minori folio, Hispanicum.	216.	502
—Molluginis folio, umbellatum.	120.	508
—minus, tenuifolium, incanum, fruticosum, Siculum.	79.	506

L

L Agopus Creticus, incanus, marinus, spicâ rubente.	913.	1389
—angustifolia, minor, erectior.	901.	818
—altera, angustifolia, minor & verior, capite brevior.	902.	819
—minor, supinus, molli & compresso capite, flore albo.	859.	820
—minor, erectus, capite globoso, stellato, flore purpureo.	860.	813
Lamium purpureum, biflorum, Polonicum.	1220.	240
Lavandula serrato folio.	797.	283
—multifido folio.	798.	282
Lauro-cerasus.	873.	1377
Laurus Alexandrina, vera Dioscoridis & Theophrasti.	250.	6
Laurus latifolia, Indica.	877.	1358
Ledum folio Sampsuchi.	817.	549
Lens Brasiliensis, minor, flore subcæruleo.	194.	795
Leontopetalon vulgare.	1030.	609
—ramosum, polyanthes.	1029.	
Leontopodium verius Dioscoridis, Hispanicum.	296.	999
—legitimum Imperati.	1225.	123
Leucanthemum Alpinum, latifolium.	458.	100
—Alpinum, angustifolium.	458.	1101
—Alpinum, tenuifolium.	458.	1102
—fruticans, pinnatis superioribus Quamoclit foliis, imis vermiculatis & torosis	422.	1104

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Obfer.</i>	<i>XV</i>
Leucoium Alyssoides, umbellatum, montanum Fabii Columnæ.	253.	376	
— luteum, minus, fruticans.	1228.	402	
— minus, rotundifolium, flore purpureo; Chamæleucoium rotundifolium, minus, flore purpureo.	876.	414	
— purpureum, Bellidis folio, majus.	875.	415	
— minus, flore violaceo.	1127.	406	
— minus, purpureum, hamatis foliis.	1019.	409	
— minus, purpureum, angustifolium, longiori folio.	999.	410	
— minus, breviori folio, obsoleto flore.	999.	411	
— minus, angustifolium, luteum, Hispanicum.	1000.	412	
— minus, Lavandulæ folio, obsoleto flore, angustifolium.	803.	408	
— minus, fruticans, purpureum, Alyssi foliis.	804.	407	
— montanum, angustifolium, pallido flore.	884.	401	
— minus, marinum, subrotundo folio, purpureum.	1020.	404	
— luteum, minus, Hieracii folio.	1227.	375	
Libanotis tenuifolia, Fœniculi semine, Italica.	836.	640	
— tenuifolia, altera, Ferulæ folio & semine, Italica.	835.	637	
Lilac cærulea, laciniatis foliis.	903.	1365	
Lilio Martagon Canadense, luteum, maculis purpureis.	125.	778	
Lilio Narcissus vernus, angustifolius, flore purpurascens.	994.	783	
— Indicus, ruber, monanthos, Jacobæus Clusii, Robini.	1035.	785	
— Jacobæus, Indicus, phœniceus, polyanthos.	1036.	784	
— Indicus, saturè purpureus, polyanthos, Belladonaformos Italicorum.	1039.	786	
— Indicus, dilutè purpureus, Belladona Italis vulgarior.	1040.	787	
— Indicus, sphæriceus vulgò, polyanthos.	1037. 1038.	789	
— Indicus, polyanthos, coccineus, minor.	126.	788	
— Indicus, cruentus, <i>πλυσίμοι</i> , seu stamineus, flore singulari, squalioso Italis.	1041.	792	
Lilium convallium minus Casp. Bauhini; Unifolium Dodonæi, Gramen Parnassi Matthioli.	1212.	597	
Limonium incisum folio, Buglossi flore.	1124.	692	
— medium, Globulariæ folio, majus.	793.	686	
— medium, Globulariæ folio, minus.	794.	687	
— minus, Oleæ folio, <i>πλυνκλάδον</i> .	790.	689	
— minus, Oleæ folio lupino, alterum.	789.	688	
— minus, obtuso folio, viminibus foliosis.	806.	690	
— minimum, cordatum, seu folio retuso.	805.	691	
Linaria purpureo-violacea, major, non repens, Italica.	1021.	201	
Linum sylvestre, latifolium, flore albicante.	1002.	670	
— sylvestre, latis acutis foliis, flore amplo.	1007.	671	
— sylvestre, latifolium, vinoso amplo flore, Italicum.	1013.	672	
— sylvestre, montanum, acuto folio, flore albo.	1001.	673	
— Hispanicum, acutis foliis, amplo flore.	1014.	674	
— fruticans, leptophyllum, Hispanicum.	819.	675	
— sylvestre, acutis foliis, fruticans.	1008.	676	
— fruticans, oxyphyllum, Hispanicum.	330.	677	
— fruticans, angustis acutisque foliis.	1231.	678	
— sylvestre, fruticosum, crispum, Hispanicum, parvo flore albo.	795.	679	
— sylvestre, fruticans, trichodes, Thymi folio, polyanthos.	1003.	680	
— sylvestre, fruticosum, angustifolium.	1004.	681	
— sylvestre, album, oxyphyllum.	796.	682	
— montanum, luteum, Italicum.	820.	683	
— sylvestre, minus, flore cæcio, foliis verticillatis.	1226.	685	
— album, Blattariæ flore, semine discofo.	1234.	153	
Lolium aquaticum, acerosum; Phœnix aquatica.	906.	1166	
Lonchitis mollior, lanuginosa, Ceterach facie.	858.		
— mollior, lanuginosa, Ceterach facie, minor, Hispanica.	857.	1276	
— mas, seu latifolia, aspera, minor.	1121.	1263	
Lotus angustifolia, lutea, major.	879.	808	
— angustifolia, incana, pallida, minor.	880.	809	
— angustifolia, incana, spicata.	879.	810	
— coronatus, latifolius, siliquis nigris.	544.	804	
— hemorroidalis, flore albo & subrubescens.	1033.	803	

	Icon.	Obsev.
— Indicus, cæruleus, radice perenni.	1236.	811
— montanus, aureus, amplo Lupuli capite, annuus.	1024.	812
— pratensis, filiquosus, luteus, hirsutus.	1023.	805
— filiquosa, maritima, lutea, Cytisi facie.	1031.	807
Lunaria Borrytes.	252.	1278
Lupinus luteus, Italicus.	1032.	800
— Arabicus Ponæ, Mozambes di Angola herbariorum.	1235.	430
— quadrifolius, flore luteo, saturo, exoticus.	1215.	854
Lychnis coronata, alba, umbilico carneo.	1006.	650
— corollaria, umbellifera, Alpina, flore purpureo.	1005.	651
— sylvestris, hirsuta, purpurea, striato flore.	381.	652
— sylvestris, hirsuta, ij. Clusii, angustifolia.	1027.	653
— sylvestris, hirsuta, elatior, spicata, Lini colore.	1027.	654
— supina, hirsuta, spicatâ & nutante comâ, flore carneo.	1025.	655
— sylvestris, villosa, minor, purpurascens, latifolia.	1028.	656
— sylvestris, villosa, purpurea, minima, angustifolia.	1028.	657
— marina, hirsuta, purpurea, Leucii folio.	1010.	658
— lutea, montana, Globulariæ capite & facie.	498.	659
— prælongis foliis & calyce.	382.	660
— fruticosa, angustifolia, minima, flore albo, Hispanica.	997.	661
— corniculata, major, seu latifolia.	1017.	664
— corniculata, minor, seu angustifolia.	1018.	665
— Ocymoides, muscosa, latifolia.	380.	666
— Ocymoides, muscosa, strictiore folio.	379.	667
— pumila, Caryophyllata, flore rubello, Italis hemorrhoidalis Al-		
drovandi.	998.	668
— Linifolia, torosis & laxioribus capitulis.	1009.	662
Lycium latifolium, Hispanicum.	995.	1349
— angustifolium, Hispanicum.	996.	1350
Lycopsis lato Plantaginis folio, Italica.	1026.	145
— angustifolia, minor, Hispanica.	1011.	147
— spatulæ folio, Hispanica.	1012.	146
— montana, cærulea, seu Buglossum minimum, montanum.	404.	150
Lyfimachia latifolia, spicata, lutea, Lusitanica.	989.	607
— angustifolia, spicata, lutea, Lusitanica.	990.	608
— lutea, corniculata, latifolia, Lusitanica.	1252.	606
— galericulata, spicata, purpurea, Canadensis.	1152.	238

M

M Alva Canadensis, luteo-purpureo, pleno flore, arborefcens.	585.	74
— rosea, sulfurea, folio anguloso, & folio Ficûs Tartarica.	585.	67
Malum Æthiopicum, fructu luteo; an Mandragora Theophrasti.	30.	165
— Æthiopicum, fructu cristato, striato, duro, coccineo.	1108.	159
Mandragora fœmina, flore cæruleo.	29.	1
Marrubium Hispanicum, rotundifolium, album, majus, seu latifo-		
lium.	767.	249
— album, sericeo, parvo & rotundo folio.	685.	263
— album, Hispanicum, majus.	686.	
— repens, flore albo, exoticum.	768.	252
— aquaticum, incanum, profundè incisîs foliis.	154.	251
Marum Hispanicum, parvo, oblongo, obtuso folio.	689.	267
— Thymifolium, incanum, spicatum, crenato folio Pulegii odo-		
re, Hispanicum.	690.	268
— album, Hispanicum, minus, Dorychnii folio.	693.	356
— Hispanicum, nigrum, flore purpureo, Piperella Hispanis.	694.	354
— Sampsuchi folio, Hispanicum.	1224.	353
— tenuifolium, Thymi facie, Hispanicum.	771.	352
— nigrum, Hispanicum, flore purpureo, minor planta.	1223.	355
Melampyrum luteum, comâ cæruleâ Bauhini.	769.	216
— luteum, comâ albâ Bauhini.	769.	217
— minus, purpureum, Trixaginis folio.	1045.	218
Melanzana, seu Melongena fructu primùm albo, dein flavo.	1109.	164
Melilotus major, seu Cilicia filiquosa, inodora, luteo amplo flore.	543.	829

Melissa

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Obfer.</i>	<i>xvij</i>
Meliffa fylveftris, hirsuta, major, Italica.	1222.	264	
Mefpilus. Vide Oxianantha.			
Millefolium minus, album, Hispanicum.	1115.	1115	
— minimum, crispum, flore albo, Hispanicum.	1114.	1116	
Moly Liliū Indicum, rubrum.	1119.	794	
Mufcus fistulofus, corniculatus.	1277.	1286	
— Coralloides.	1277.	1307	
— Alcornis.	1277.	1285	
— Fœniculaceus.	1277.	1287	
— Pulmonarius, Fungoides.	1278.	1281	
— pyxidoides.	1278.	1284	
— cristatus.	1278.	1283	
— digitatus.	1278.	1282	
— fpicatus, capillaris.	1291.	1337	
— coralloides, Filicinus.	1276.	1327	
— coralloides, cristatus.	1276.	1328	
— coralloides, bifidus.	1276.	1329	
— coralloides, Fœniculaceus.	1276.	1330	
— coralloides, crispus.	1275.	1331	
— coralloides, bifidus, minor.	1275.	1332	
— Polygonoides, Salicorniæ folio, major.	1275.	1333	
— Polygonoides, Salicorniæ foliis, minor, feu bifidus.	1275.	1334	
— marinus, fruticans, leptophyllos, atropurpureus.	1289.	1326	
— marinus, niger, viscosus, vermiculatus, non crispus.	1297.	1317	
— marinus, latifolius, albicans, crispus, pilosus.	1300.	1318	
— marinus, angustifolius, fruticans, atropurpureus.	1299.	1319	
— fruticosus, aphyllantes, major.	1291.	1320	
— fruticosus, aphyllantes, minor.	1291.	1321	
— marinus, crispus, πακίκαυτος, loricatus, nigricans.	1301.	1323	
— marinus, crispus, λεπτόκαυτος, virens, & gilvoluteus.	1302.	1322	
— marinus, crispus, niger, crasso & nudo caule.	1290.	1324	
— marinus, reticulatus.	1123.	1329	
— marinus, crispus, niger, λεπτόκαυτος, comosus.	1290.	1325	
Myagroides subrotundis ferratisque foliis, flore albo.	816.	386	
Myagrum supinum, album, Erucae foliis.	1252.	358	
Myrrhis Cicutaria, minor, perennis, polyrrhizos.	555.	625	
Myrrhi & Chamœleæ media plantula.	538.	1392	

N

N arcissus Suvertii, vulgò scagliofo, flore cruento, παλαιομερον, feu stamineus Corvini.	1042.	792
Narcissus totus albus, maximus, calyce mediocri, ferotinus.	948.	711
— albus, sulfureus, maximus, mediocri calyce, ferotinus.	947.	712
— albo-sulfureus, calyce aureo, major, ferotinus.	965.	713
— albo-sulfureus, calyce luteo, oblongo.	966.	714
— albicans, calyce aureo, amplo, major.	932.	715
— albicans, calyce aureo, amplo, minor.	931.	716
— albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, major.	928.	717
— albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, minor.	927.	718
— fylvestris, pallidus, tubâ aureâ, major.	930.	719
— fylvestris, pallidus, tubâ luteâ, minor, vulgaris.	929.	720
— pallidus, calyce aureo, labiis inversis.	979.	721
— albicans, calyce aureo, labiis inversis.	980.	722
— fylvestris, albicans, oris tubæ luteis, minor.	924.	723
— fylvestris, pallidus, tubâ aureâ, minimus.	976.	724
— fylvestris, totus albicans, minor.	923.	725
— fylvestris, totus luteus, minor.	975.	726
— totus sulfureus, Anglici facie, flore singulari, Caietanus.	967.	727
— fylvestris, totus albus, luteis tubæ fimbriis, alter.	968.	728
— totus albus, nutans, amplâ tubâ.	953.	729
— totus albus, amplo nutante flore.	954.	730
— totus albus, nutante flore, longâ & angustâ tubâ.	945.	731
— albus, nutante flore, oblongâ & angustâ, pallidâ tubâ, minor.	946.	732

	Icon.	Observ.
— sylvestris, albicans, nutante flore, minor.	921.	733
— sylvestris, pallidus, tubâ aureâ, minor, serotinus.	922.	734
— pallidus, calyce aureo, flore pleno, maximus.	977.	735
— maximus, Tradescanti, flore pleno, calyce luteo, foliis sulfureis.	978.	736
— maximus, Tradescanti, totus luteus, flore pleno.	970.	737
— luteo-sulfureo flore pleno, minor, serotinus.	969.	738
— albicans, medio pallidus, major, amplo flore.	959.	739
— albus, calyce aureo, amplo, biflorus, major.	949.	740
— albus, calyce aureo, amplo, biflorus, minor.	950.	741
— latifolius, albus, mediocroceus, serotinus, amplo calyce, major; Vannec vulgò.	955.	743
— albus, calyce luteo, parvo, serotinus, minor; Vannec minor vulgò.	956.	745
— albicans, medio pallidus, medius, angustis florum foliis.	964.	747
— albo-sulfureus, calyce aureo, minori, maximus, serotinus.	960.	749
— albo-pallidus, calyce aureo, amplo, major Waldenec.	952.	750
— pallidus, calyce aureo, mediocri, serotinus, Waldenec medius.	951.	751
— albo-pallidus, calyce aureo, plano, roseus Waldenec.	933.	752
— albo-pallidus, calyce luteo, plano, stellatus Waldenec.	934.	753
— albicans, medio-pallidus, minor.	963.	754
— niveus, mediocroceus, maximus, roseus, serotinus.	972.	755
— niveus, mediocroceus, minor, roseus, serotinus.	971.	756
— niveus, mediocroceus, stellatus, major, calyce crispo & diviso, serotinus.	974.	757
— niveus, mediocroceus, stellatus, minor, serotinus.	973.	758
— latifolius, albo-pallidus, medioluteus, præcox.	925.	759
— præcocissimus, lacteus, calyce aureo.	943.	760
— albicans, calyce sulfureo.	940.	761
— latifolius, sulfureus, præcox, minor.	926.	762
— luteo pallidus, calyce intensè aureo.	944.	763
— latifolius, albicans, mediocroceus, amplo brevi calyce.	918.	742
— latifolius, albus, mediocroceus, pleno flore.	917.	744
— latifolius, albus, mediocroceus, calyce mediocri, præcox.	919.	746
— latifolius, sulfureus, maximus.	920.	748
— polyanthemus, præcox, sulfureus, maximus, calyce croceo, oris pallidis & fimbriatis.	936.	764
— polyanthemus, præcox, sulfureus, medius, stellatus, calyce croceo.	935.	765
— præcox, totus luteus, maximus, calyce aureo.	941.	766
— præcox, totus luteus, medius, stellatus, calyce aureo.	942.	767
— præcox, totus luteus, elatior, calyce aureo.	939.	768
— præcox, totus albus, major.	937.	769
— totus albus, minor, stellatus.	916.	776
— præcox, totus albus, medius.	938.	770
— præcox, totus albus, minor, roseus.	915.	771
— albus, mediocroceus, stellatus, majori calyce, serotinus, Romanus.	958.	772
— albus, mediocroceus, medius, stellatus, serotinus, Romanus.	962.	773
— albo-sulfureus, mediocroceus, stellatus, minor, serotinus, Romanus.	961.	774
— albus, mediocroceus, stellatus, parvo calyce, serotinus, Romanus.	957.	775
— autumnalis, luteus, minimus.	984.	707
— Persicus, luteus, vernus Corvini.	983.	790
— autumnalis, albus, latifolius.	993.	777
Nepetha montana, purpurea, major, sparsâ spicâ.	601.	289
— tuberosa, violacea, spicata, minor, Hispanica.	602.	290
— angustifolia, minor, Hispanica.	735.	293
— saxatilis, cærulea, minima, Hispanica.	736.	292
— tuberosa, spicata, purpurea, Hispanica.	1131.	291

	Icon.	Observ.
O		
O Cimum majus, vulgare.	1064.	296
— majus.	1071.	297
— majus, bullatum.	1072.	298
— majus, crispum, obtusè ferratum.	1053.	299
— majus, crispum, laciniatum.	1054.	300
— majus, crispum, profundè ferratum, maculatum, oblongâ spicâ.	1065.	301
— majus, crispum, profundè ferratum, verrucosum, brevi congestâque spicâ, subrubens.	1066.	302
— majus, crispum, leviter ferratum, verrucosum, brevi congestâque spicâ, viride.	1063.	303
— medium, vulgare.	1055.	304
— medium, non ferratum.	1056.	306
— medium, folio breviori, ferrato.	1056.	307
— medium, acuto & verrucoso folio.	1058.	308
— medium, crispo & verrucoso folio.	1058.	309
— medium, rubrum.	1057.	305
— medium, crispum, ferratum.	1060.	310
— minus, vulgare.	1069.	311
— minus, ferratum.	1067.	312
— minus, rotundifolium, rubrum.	1068.	313
— minus, crispum, ferratum.	1059.	314
— minimum, vulgare, folio acuto.	1077.	315
— minimum, rotundifolium.	1075.	316
— minimum, crispum, non ferratum.	1070.	317
Oenanthe Indica, semine cordato.	1240.	546
Onopyxus amplo capite, purpureus, angustifolius.	1116.	911
Ophioglossum latifolium, vulgare.	252.	1279
— angustifolium, minimum.	252.	1280
Oreoselinum rotundifolium, Hispanicum.	350.	611
Origanum Canadense, fistuloso flore, purpureo.	1221.	247
— inodorum, Polonicum.	1155.	1401
Ornithogalum luteo-virens, Indicum.	1118.	779
Orontium minus, villosum, angustifolium, flore purpurascens.	758.	200
— saxatile, Alsines folio, unctuosum & villosum, flore albo.	1102.	204
— saxatile, angusto Alsines folio villosum & unctuosum, flore albo.	1103.	205
— saxatile, Serpilli folio glabro, flore purpurascens.	1100.	196
— saxatile, Serpilli folio angustiore, villosum & unctuosum.	1101.	197
— saxatile, Thymi folio, flore rubello.	1313.	198
Oxalis, seu Acetosa Americana.	539.	1129
— seu Acetosa Americana, vesicaria.	1112.	1128
— tuberosa, Syriaca Aldini, flore luteo, reticulato, foliis maculatis Corvini.	1113.	610
Oxiacantha spinosa, minore folio; Mespilus anthedonoidis folio, minor.	563.	1380
— angustifolia, non spinosa; Hypericum fruticans, Canadense Robini.	564.	1376
P		
P Alma marina.	1292.	1336
Panax Heracleum, altè, acutè & tenuius incisus foliis, Italicum.	707.	632
— Heracleum, albo flore, altius incisus, acutioribusque foliis.	372.	633
— Heracleum, minoribus & rotundioribus foliis; An Laserpitium Lobelii.	708.	635
— <i>καρπίπος</i> , racemosa, Canadensis.	705.	596
Papaver Rhœas, flore carneo, pleno.	763.	473
— Rhœas, integro folio, Hispanicum.	1191.	474
— spinosum, flore luteo.	1141.	476
Penna marina, carnei coloris.	1273.	1313
— marina, coloris purpurei.	1273.	1314
— marina, spinosa, rubra.	1274.	1315
— marina, spinosa, grisea obsoleta.	1274.	1316

	Icon.	Obfer.
Pentaphyllum montanum, minus, luteo Tormentillæ flore, cineraceum.	709.	593
— minus, luteum, Alchimillæ facie, Hispanicum.	727.	594
Perfoliata minor, folio acuto.	1128.	621
Persea arbor semper virens, aromatica.	878.	1378
Petromarula, Rapunculum Creticum Imperati, Valerianæ foliis.	1154.	92
Peucedanum Italicum, longioribus foliis, seu majus.	78.	629
Picea <i>εξυπυλλος</i> , Polonica Corvini.	730.	1342
Pimpinella saxifraga, Hircina, major, foliis altè incisis, montana, Italica.	737.	617
— saxifraga, Hircina, minor, montana, foliis altè incisis.	738.	618
— Canadensis, maxima, longius spicata.	739.	166
— spinosa, seu Poterium quorumdam.	631.	168
— Agrimonoides, odorata.	632.	167
Pinus sylvestris, minor, cono parvo, Polonica Corvini.	729.	1343
— sylvestris, minor, Laricis strobilo; Larix Polonica Corvini.	500.	1344
Pithyusa minor, subrotundis & acutis foliis.	751.	58
— angustis acutisque Esulæ foliis, annua.	752.	59
— fruticans, angustis acutisque foliis, minima.	86.	63
Plantago angustifolia, ferrata, Hispanica.	749.	122
— angustifolia, lanuginosa, incana.	750.	121
— trinervia, latifolia, minor, incana, Hispanica.	745.	119
— major, spicâ foliosâ, Italica.	746.	120
— aquatica, angustifolia, Polonica Corvini.	1157.	586
Pneumonanthe Lobelii, Dodonæi, Clusii, Gerardi.	122.	} 14
— Cordi quoad figuram.	51.	
Polytricum aureum, majus.	251.	1288
Polium montanum, luteum; supinum, capite oblongo.	1082.	320
— montanum, luteum, tomentosum, dasyphyllum, ferratum.	1073.	321
— montanum, luteum, ferratis, angustioribus, incanis foliis.	1089.	322
— montanum, luteum, ferratis Amaraci foliis, comâ subluteâ.	1088.	323
— marinum, dasyphyllum, Gnaphalodes, flore albo.	1047.	324
— montanum, album, ferratum, latifolium, erectum, majus.	1079.	325
— montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, majus.	1074.	326
— montanum, Hispanicum, non crenatum, flore albo.	1049.	327
— montanum, erectum, crenatum, angustifolium, flore albo.	1050.	328
— montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, minus.	1078.	329
— montanum, album, angustifolium, ferratum, supinum, minus.	1091.	330
— Valentinum, fruticosum, angustifolium, flore albo.	1048.	331
— surrectum, majus, angustifolium, ferratum, incanum, tomentosum.	1096.	332
— montanum, album, non ferratum, longis angustisque foliis canescentibus.	1080.	333
— montanum, album, non ferratum, viride, longis angustisque foliis, caule incano.	1081.	334
— montanum, majus, erectum, Rorismarini folio, flore rubro.	1090.	335
— montanum, pumilum, rubrum, viride, Stæchadis foliis, caule tomentoso.	1092.	336
— montanum, pumilum, angusto viridique folio, caule incano.	1093.	337
— montanum, Gnaphalodes, incanum, flore rubro, supinum.	1083.	338
— saxatile, pumilum, ferratum, incanum, flore rubello.	1098.	339
— minus, erectum, angustis, crenatis brevibusque foliis, flore rubro.	1099.	340
— surrectum, minus, angustifolium, ferratum, è viridi canescens.	1097.	341
— saxatile, purpureum, ferrato Serpilli folio.	1061.	342
— saxatile, purpureum, non ferrato Serpilli folio, pressiori comâ.	1087.	343
— saxatile, minimum, Thymi folio, carneo flore.	1062.	344
— saxatile, purpureum, Chamædryoides, amplâ comâ.	1086.	345
— saxatile, Chamædryoides, rotundiori folio, supinum, rubrum.	1095.	346
— saxatile, Chamædryoides, oblongo folio, rubro exiguo flore.	1094.	347
Polygala montana, Italica, flore aureo.	721.	1385
Polygonatum latifolium, flore albo, majore, odorato.	711.	3
— latifolium, spicatum, flore albo, Virginianum.	711.	599
— latifolium, spicatum, majus, flore albo, Canadense.	712.	598

ramosum,

Index Iconum Barrelieri.

xxj

	<i>Icon.</i>	<i>Obfer.</i>
—ramosum, flore luteo, majus, seu latifolium & angustifolium, flore pallido, Canadense.	723.	603
—ramosum, perfoliatum, luteum, Alpinum.	719.	602
—latifolium, ramosum, flore albo, minore, Germanicum.	720.	601
—racemosum, flore albo, Canadense.	724.	600
Polygonum, angustifolium, majus.	546.	1141
—angustifolium, minus.	545.	1142
—aquaticum, majus.	773.	540
—aquaticum, minus.	773.	541
—fruticosum, erectum, Hispanicum.	713.	1146
—fruticans, supinum, majoribus foliis, Hispanicum.	716.	1147
—fruticans, supinum, Ericoides, cineritium, Thymi folio, Hispanicum.	714.	1149
—incanum, rotundifolium, Halimoides, fruticans, Hispanicum.	733.	1145
—supinum, fruticosum, verticillatum, foliis minimis, Hispanicum.	715.	1148
—fruticans, botrioides, majus, Hispanicum.	732.	1346
—fruticans, botrioides, Narbonense, minus, j. Clusii.	731.	1347
—fruticans, botrioides, Narbonense, minus, ij. Clusii.	731.	1347
—fruticans, aphyllum, crassioribus flagellis.	732.	1346
—fruticans, ἀφύλλον, corniculatum, minus.	1034.	1348
—fruticans, roseum, Thymi folio, Siculum.	1034.	506
—maritimum, minimum, Thymi folio.	559.	486
—maritimum, majus, incanum.	560.	1144
—rectum.	560.	1143
—montanum, niveum, roseum, majus, Hispanicum.	687.	1136
—montanum, roseum, minus, compactioribus foliolis, Hispanicum.	988.	1138
—montanum, niveum, polyanthes.	725.	1137
—montanum, niveum, minus.	726.	1135
Polypodium majus, serrato folio.	38.	1264
—majus, acuto folio, Viterbiense.	1110.	1265
—majus, acutioribus folis, Cordubense.	1111.	1266
Polytricum aureum, majus.	251.	1288
Portulaca Bætica, luteo flore, spuria, aquatica.	336.	478
Prunella odorata, Lusitanica, flore violaceo. <i>Vide Brunella.</i>	561.	269
Pulmonaria Gallorum, rotundifolia, lævior.	342.	1045
Pulsatilla trianthos, sulfurea, semine non papposo.	494.	582
Pyracantha sempervirens.	874.	1379
Pyrethrum alterum, minus cespitosâ radice, Anthemidis flore, Italicum.	522.	1105
Pyrola longo folio; flore albo, Polonica.	1156.	544

R

R Anunculus albus, Apenninus, Saniculæ majoris folio.	88.	581
—Alpinus, Coriandri folio, flore albo purpurascente.	456.	576
—aquaticus, albus, Fœniculi folio.	566.	585
—aquaticus, albus lato & Fœniculi folio, Italicus.	565.	584
—minor, Rutæ folio, flore simplici, grumosâ radice, Italicus.	1153.	578
—tenuifolius, luteus, grumosâ radice, Soractensis seu Italicus.	581.	577
—Tripolitanus, grumosâ radice, flore phœniceo Imperati.	582.	575
—minimus, Apulus Columnæ, luteus.	791.	579
Rapistrum maximum, monospermon, gemmâ luteâ, flore niveo.	387.	557
Rapunculum Alopecurum, flore albo, Italicum.	892.	88
—Teucris folio.	567.	78
—minimum, rotundifolium, verticillatum, flore purpureo-vio- laceo.	1133.	83
—coccineum, Americanum, vulgò Cardinalis Planta.	1148.	185
Rapunculus corniculatus, cæruleus, montanus, major, Italicus.	526.	89
—corniculatus, cæruleus, minor.	525.	89
—montanus, Gramineus, corniculatus.	523.	91
—lanceolatus, corniculatus.	523.	86
—calyculatus.	523.	87

	Icon.	Obsev.
<i>Refeda minor</i> , incis foliis.	587.	869
— minor, alba, dentatis foliis.	588.	870
<i>Rhamnus marinus</i> , Coralloides.	1304.	1341
<i>Ros solis minor</i> , seu rotundifolius.	251.	487
— major, seu longifolius.	251.	488
<i>Rubia Cretica</i> , incana, Buxifolio, seu rotundifolia, incana.	519.	93
— marina, strigosior, flore rubello.	355.	127
— minor, quadrifolia, atro-virens.	547.	104
— minor, quadrifolia, incana.	548.	124
— lævis, Linifolia, Montis Virginis.	583.	99
— lævis, Linifolia, floribus albis.	336.	99
— minor, spicata.	520.	125
— spicata, latifolia Imperati.	549.	125
— spicata, angustifolia.	550.	126
<i>Rubiola montana</i> , major, Hispanica.	596.	1357
— montana.	595.	649
<i>Rubus non spinosus</i> , major, fructu nigro.	395.	1373
— non spinosus, fructu nigro, majori, Polonicus.	1250.	1374
<i>Ruta sylvestris</i> , Linifolia, Hispanica	1186.	545

S

S <i>Alicaria Corvini</i> , Thyrsoides, flore purpureo-violaceo, Virgæ aureæ folio.	1205.	539
<i>Sanamunda argentea</i> , latifolia.	221.	1352
— argentea, angustifolia.	222.	1354
— iij. Clusii: <i>Erica Alexandrina Lobelii</i> .	233.	1353
— vermiculata,	231.	1355
— media, angusto breviorique folio.	232.	1356
<i>Satureia spicata</i> , minor, tenui Laricis folio, Hispanica	1251.	272
<i>Saxifraga major</i> , Germanica, foliis altius incis.	243.	615
— rotundifolia, flore albo, annua, Italica.	242.	619
— viminea, albis nutantibusque umbellulis, Italica.	1184.	620
<i>Scabiosa montana</i> , integro folio, Hispanica, major.	165.	1031
— montana, integro angustoque folio, Hispanica, minor.	166.	1032
— montana, integro, subrotundo folio, Hispanica, minor.	163.	1033
— montana, integro folio subrotundoque, Hispanica, minima.	164.	1034
— peregrina, integris, seu Bellidis folio, altera.	223.	1040
— peregrina, integris & acutis foliis.	224.	1039
— alba, Succisæ folio, Polonica.	770.	1035
— sulfurea, incis folis, Polonica.	770.	1036
— cærulea, Javana Bontii.	826.	1025
— maritima, Rutæ caninæ foliis.	245.	1038
— angustifolia, glabra.	246.	1037
<i>Scordium spinosum</i> , odoratum, annuum.	202.	319
<i>Scrophularia montana</i> , maxima, latifolia, flore luteo.	273.	188
— aquatica, montana, mollior.	274.	189
<i>Sedum majus</i> , non denticulatum, flore purpureo, montanum.	394.	550
— montanum, roseum, minus, reticulatum.	391. 393.	551
— majus, non reticulatum, flore purpureo, montanum, angustifolium.	391.	552
— montanum, umbilicatum, incanum, minus, flore saturo purpureo.	374.	553
— roseum, ferratum longius radicat.	392.	555
— acuto folio.	392.	556
— curvo folio.	392.	557
— obtuso folio.	392.	558
— majus.	392.	559
— montanum, roseum, ferratum, flore purpureo.	373.	536
— montanum, roseum, flore guttato.	{ 1311. }	537
	{ 1309. }	
	& 1311.	
— montanum, roseum, ferratum, foliis subrotundis.	1310.	538
<i>Senecio montanus</i> , mollior, parvo pallido flore.	401.	1081

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obfer. xxij
— montanus, amplo, aureo flore.	402.	1080
Serpentaria digitata, vulgaris, fructu rubro.	147.	178
— digitata, major, Indica, fructu pallido.	148.	179
Seseli subrotundo Selini folio, flore luteo, Italicum.	241.	626
Sideritis hirsuta, brevi acutoque folio, albo flore.	1046.	253
— montana, Scordioides, glabra.	343.	256
— montana, Scordioides, tomentosa.	1160.	255
— montana, vermiculato folio.	344.	260
— montana, Hyssopifolia, major.	329.	258
— montana, Hyssopifolia, minor.	172.	259
— montana, trifido folio.	171.	257
Sisymbrium montanum, tenuifolium, flore muscoso, purpureo.	155.	416
— montanum, latifolium, flore purpureo.	156.	417
Solanum frutex, rotundifolium, Hispanicum.	1173.	2
— majus, vesicarium, coralloides.	149.	160
— vesicarium, minimum, baccà luteà.	1129.	163
— vesicarium, annuum, procumbens.	152.	162
— vesicarium, annuum, erectum.	151.	161
— majus, racemosum.	150.	595
— triphyllum, bulbosum, Canadense.	259.	434
Soldanella marina, longo sinuato folio, seu Convolvulus marinus, lactescens, Soldanellæ congener Imperati.	856.	33
Solidago maxima, Americana.	201.	1070
Sonchus maritimus, angustifolius, asper.	341.	1048
Sparthum marinum.	1292.	1340
Spartium latifolium, parvo flore.	1182.	1390
Sphondilium vulgare, flore albo.	371.	630
— vulgare, foliis acutè incis.	56.	631
— glabrum, montanum, albo flore.	55.	634
— minus, Syriacum.	349.	636
Stachys alba, latifolia, major.	297.	243
— alba, latifolia, minor.	280.	244
— alba, angusto Salviæ folio.	279.	245
— nigra.	298.	246
— fruticans, latifolia, tomentosa, flore ferrugineo.	1322.	223
— fruticosa, repens, flore purpureo.	405.	222
— fruticans, vulgaris, flore aureo, seu Verbascum Salvifolium, fruticosum, flore luteo Lobelii.	406.	221
— prælongo angustoque folio, flore luteo; Phlomis Lychnitis Clusii.	1321.	224
— Lychnoides, incana, angustifolia, flore aureo, Italica.	1187.	254
Stœbe Erucae folio, rubro Cyani flore, Italica.	504.	965
— angustifolia, Intybaceis dentatisque imis foliis.	307.	933
— fruticans, incana, Hyssopi folio, major.	305.	735
— fruticans, incana, brevi Hyssopi folio, capite tereti & cirroso.	306.	934
— Linifolia, capite spinoso.	308.	922
— major, Pineis foliis, luteo flore, capite spinoso.	316.	923
— minor, laxioribus & longioribus capitis squamis.	360.	957
— montana, nivea, capite Cardui, subrotundis foliorum lobis.	309.	953
— montana, incana, Muscata, acutis foliorum lobis, Acanaceo, purpureo flore.	310.	954
— montana, tenuifolia, villosa, Hispanica.	317.	950
— montana, glabra, flore albicante.	318.	949
— montana, tenuifolia, foliis & capite spinosis, Italica.	385.	924
— Pineæ, amplo capite.	138.	970
— Stœchadis folio, flore luteo.	315.	941
— tenuifolia, erectior, Hispanica.	359.	956
— tenuifolia, incana, parvo capite, Cretica.	347.	952
— tenuifolia, incana, magno capite, Italica.	348.	955
Stœchas citrina, globoso & amplo flore, Cretica.	814.	987
— citrina, spuria, longioribus foliis.	368.	977
Stœchas Arabica, caule folioso, flore albo, Hispanica.	301.	288
Stramonium longioribus aculeis.	1172.	109
Symphitum petræum Dioscoridis, Thymifolium.	331.	1402

T

Icon. Observ.

T Aiaoba Ari species, Brassica Brasil.	1084.	173
— altera Ari species, Brassica Brasil.	1085.	174
Tanacetum, inodorum, latifolium, magno Bellidis flore.	781.	1106
— inodorum, latifolium, crispum, magno Bellidis flore.	782.	1108
— inodorum, tenuifolium, magno Bellidis flore.	785.	1109
— inodorum, latifolium, Alpinum, magno Bellidis flore.	786.	1107
— inodorum, Leucanthemum, Alpinum.	991.	1119
— minus, albo Millefolii flore, odorum.	992.	1117
Teucrium cæcio & amplo Rorismarini flore, Boeticum Clusii.	512.	348
— fruticans, amplo & albo flore, Italicum.	895.	242
— fruticans, incanum, Creticum, flore purpureo.	896.	318
Thaliætrum Batrachiodes, minus, flore albo, Italicum.	480.	572
Thapsia tenuifolia, lucido rigidoque folio, Hispanica.	556.	639
Thé frutex Chinenfis, Thia Japonensibus.	904.	1403
Thelephium angustifolium, minus, serratum, purpureum.	837.	560
— majus, subrotundo folio, floribus albicantibus.	838.	561
Thlaspi Alfine Teucrioidis folio, cordato pericarpio.	1015.	360
— Anglicum, flore albido Corvini.	894.	387
— aureo Leucoii flore, sylvestre, rotundifolium, majus.	883.	397
— Alysson, incanum, luteum, lunato utriculo.	908. 912.	392
— album, Leucoii flore & folio, Italicum.	911.	400
— biscutellatum, Hieracii folio, pallido flore.	900.	375
— biscutellatum, luteum, Anchusæ folio.	841.	380
— Creticum, perenne, flore albo.	214.	364
— Creticum, Iberidis folio, flore albo.	893.	366
— Creticum, montanum, luteum, Leucoii flore.	214.	370
— cordatum, minus, flore albo, insipidum.	815.	359
— flore albo, siliquâ triangulari, crenatâ.	846.	363
— fruticans, erectum, angustifolium, utriculis subrotundis, Hispanicum.	810.	390
— incanum, Mechliniense Corvini, flore albo.	893.	384
— Linifolium, minus, cineritium, flore albo.	908.	394
— Linifolium, minus, flore albo, virescens.	911.	395
— Linifolium, erectum, flore albo, turbinato utriculo, Italicum.	849.	373
— luteo Leucoii flore.	842.	398
— luteum, spanospermon.	899.	368
— Leucoii sylvestris facie, flore albo.	907.	388
— montanum, album, siliquâ hastatâ, acuto Globulariæ folio.	847.	372
— montanum, serrato Cepeæ folio, flore purpurascens, umbellato.	848.	365
— montanum, Bellidis folio, flore albo.	861.	367
— montanum, perenne, flore albo.	844.	388
— montanum, pingui folio, carneo flore, planâ & cordatâ siliquâ Gualdi.	845.	362
— minus, flore albo, subrotundo utriculo.	912.	393
— spinosum, Hispanicum.	808.	385
— supinum, minus, flore albicante.	894.	361
— fruticosum, semper virens, albo Cretici flore.	734.	364
— fruticosum, Leucoii marini minoris folio, flore albo.	1306.	371
— umbellatum, Nasturtii folio, flore albo.	1306.	344
— subrotundo folio, utriculo gruinali.	1305.	383
— supinum, minoribus foliis, congener Hispanico.	809.	391
— Thymi folio, rotundo utriculo, flore albo.	907.	389
— Virginianum, flore luteo.	843.	369
— Thymi folio, utriculo subrotundo, mucronato, Hispanicum.	807.	389
Thora Italica, seu Napellus minor, flore cæruleo.	610.	873
Thymbra spicata, verior, Hispanica.	1230.	281
Thymum cephalotum, Hispanicum.	302.	271
— Creticum, incanum, capitatum.	897.	270
— Creticum Ponæ, verticillatum.	898.	279
— Hircinum, Italicum.	887.	276

angusto

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obfer.	XXV
— angusto longiorique folio; an Serpillum Zygis Theophr.	777.	280	
— incanum, Camphoratum.	778.	277	
— angusto brevique folio.	780.	275	
— viridi tenuique folio.	779.	278	
— sylvestre, frondosum, oblongis foliis, Hispanicum.	787.	274	
Tithymalus Amygdaloides, major, tortuoso caule.	839.	38	
— Amygdaloides, minor, subglaber.	830.	39	
— Amygdaloides, minimus, glaber.	829.	40	
— bulbosus, Apios Fuchsi.	832.	46	
— dendroides, major & verior, Italicus.	910.	37	
— Lini folio, major, Italicus.	821.	60	
— marinus, latifolius, Italicus.	823.	49	
— marinus, rotundifolius, Italicus.	824.	48	
— marinus, folio retuso, Terracinensis.	833.	50	
— marinus, acuto Lini folio.	831.	53	
— marinus, ferratus, Italicus.	1202.	52	
— marinus, Myrtifolius, Italicus.	1203.	51	
— montanus, Esulæ folio, minor, Italicus.	822.	61	
— nemorosus, villosus, mollior.	198.	44	
— nemorosus, acutiori folio, dulcis.	834.	42	
— nemorosus, alter, foliis latioribus & firmioribus.	840.	43	
— Myrsinites, verior, pingui, crasso folio, è casto virens.	1200.	47	
— palustris, villosus, mollior, erectus.	885.	41	
— paralius, rubentibus & compressioribus foliis.	886.	56	
— dulcis, tuberosâ radice.	909.	45	
Trachelium Gramineum, minus, non crenatum, flore cæruleo.	924.	86	
— minus, Gramineum, cæruleo violaceum.	332.	85	
— majus, petræum, flore albo Ponæ.	890.	84	
— minus, petræum Ponæ.	889.	90	
— saxatile, Bellidis folio, cæruleum, Creticum.	813.	79	
Tragopogon montanum, angustifolium, flore ferrugineo, Italicum.	811.	1052	
— montanum, flore atropurpureo, Italicum.	812.	1053	
— Pinifolium, Hispanicum.	496.	1051	
— Resedæ minoris folio, erectum.	799.	1049	
— Resedæ minoris folio, supinum.	800.	1050	
Tragoriganum comosum, seu crispis & capillaribus foliis, Hispanicum.	772.	351	
— Dictamni capite, Hispanicum.	788.	273	
Tribulus terrestris minor, incanus, Hispanicus.	558.	562	
Trifolium acetosum, Americanum, rubro flore.	1139.	64	
— Alopecurum, majus, flore purpureo, stellato capite.	755.	814	
— Alopecurum, latifolium, spicâ longâ.	697.	815	
— Alopecurum, angustifolium, elatius.	698.	816	
— Alopecurum, spicâ globosâ.	1188.	817	
— arvense, supinum, verticillatum.	882.	828	
— Alphaltites, Canadense, siliquosum.	914.	433	
— Fragiferum, majus, repens, minori & rotundiori capite.	852.	825	
— Fragiferum, minus, oblongo capite, Italicum.	851.		
— luteum, capite rotundo, folliculoso, Italicum.	864.	826	
— minus, villosum, purpureum, capite parvo, echinato.	869.	823	
— minus, capite subrotundo, parvo, albo & echinato.	870.	822	
— montanum, luteo Tormentillæ flore, cineraceum.	710.	592	
— nemorosum, capite ovato, villosus, rubescens.	871.	821	
— peregrinum, alterum, flore luteo.	865.	432	
— siliquosum, flore violaceo, Lusitanicum.	866.	431	
— pratense, minus, purpureo Bellidis flore, capite globoso.	872.	824	
— luteum, cochleatum, echinatum, minus.	863.	847	
— pratense, supinum, καλαμύδα, seu capite humi merso.	881.	827	
Trixago Chamædryos foliis.	774.	206	
— altius ferratis foliis.	774.	207	

V

Valeriana Alpina, saxatilis, minor, flore albo.
— cærulea, Urticæ folio.

742. 131
683. 128
g

	Icon.	Obser.
— cærulea, altius inciso Urticæ folio.	684.	129
— bulbosa, suave olens, Italica Imperati.	867.	132
— tuberosa Imperati, seu Telephii radice.	825.	133
— montana, minor, integris foliis, Italica.	868.	130
— minor, Cornucopioides, alba, Indica.	741.	135
— minor, Cornucopioides, rubra, Hispanica.	741.	134
Verbena Indica, Myuros.	853.	287
— Lamii folio.	1146.	284
— nodiflora, Cretica, Julo longiore.	854.	286
— nodiflora, capite oblongo, seu Verbenaca nodiflora Imperati.	855.	285
Veronica mas, surrecta, elatior, seu Lysimachia spicata, cærulea.	891.	155
— mas, recta, latifolia, spicâ cæruleâ.	682.	156
— mas, recta, angustifolia, spicâ cæruleâ.	681.	157
Viola Martia, minor, flore violaceo.	695.	856
— Mariana, minor, cærulea, folio subrotundo, calyce corniculato.	759.	82
— montana, minima, flore albo, parvo.	760.	857
— montana, cærulea, tricolor, folio subrotundo, crenato.	692.	860
— montana, lutea, subrotundo, crenato folio.	691.	859
— tricolor, hortensis, violacea, alba, lutea incisus foliis.	696.	861
— tricolor, sylvestris, subrotundo folio, flore purpureo.	757.	862
— tricolor, sylvestris, angustifolia, flore albo.	757.	863
— tricolor, sylvestris, flore cæsis.	757.	864
— Hispanica, fruticans.	568.	858
Virga aurea angustifolia, cespitosa, exotica.	784.	1071
— montana, minor.	783.	1069
Vitis Cretica, alba, laciniatis foliis.	701.	1371
— Corinthiaca, alba, πολυφύλλος.	702.	1370

Y

Y Uca Indica, foliis Aloes, flore albo.	1194.	793
---	-------	-----

Z

Z Ea Briza barbata.	111.	1174
— Dioscoridis, mutica, μύσσαν's, minor.	111.	1168

Quæ sequuntur ad Insecta marina pertinent.

	Icon.	Obser.
Astacus minor, villosis chelibus, Pediculi marini facie alter.	1288.	pag. 131
Cancer quadratus, lividus, μακρόκελος.	1286.	pag. 131
— minor, rhomboides, luteo rubens.	1287.	pag. 131
Concha σιντιορράκος, Cancellifera, Anatifera.	1296.	pag. 131
— μελανοσφάκος, Cancellifera, Anatifera altera Lobelii.	1296.	pag. 132
Conchæ turbinatæ.	* 1321. * 1322. * 1323.	pag. 132 & 133
Eruca echinata, marina, griseo fusca.	1284.	pag. 131
— echinata, marina, minor.	Ibid.	
Holothurium Uvâ marinâ, seu Ovis Sepiæ fœcundis septum.	1298.	pag. 129
— Idem Ovis Sepiæ sterilibus septum.	Ibid.	
Pagurus, niger, βρακύκελος, remipes.	1287.	pag. 131
Squilla Urfa minor, altera, remipes.	1288.	pag. 131
Stella marina, major, spinosior, fusca.	1281.	pag. 129
— marina, major, Aranciata, minoribus spinis echinata.	1285.	pag. 130
— marina, media, lætè rubens, spinosa.	1283.	pag. 130
— marina, minor, non spinosa.	1295.	pag. 130
— marina, λευκόκελος, fimbriata.	1282.	pag. 130
— marina, λευκόκελος, spinosa.	1282.	pag. 130
— marina, οφιδόκελος, seu οφιδόκελος.	2295.	pag. 131

FINIS.



PLANTÆ

PER GALLIAM, HISPANIAM ET ITALIAM

OBSERVATÆ,

ICONIBUS EXHIBITÆ

A R. P. JACOBO BARRELIERO;

VARIIS EARUMDEM APUD AUCTORES


APPELLATIONIBUS,

RARIORUMQUE DESCRIPTIONIBUS ADJECTIS.

I.



ANDRAGORA fœmina, flore cœruleo *Barr. Icon. 29.*
Mandragora fœmina *Clus. Histor. lxxxvj.* Mandragora
foliis asperis, fructu parvo, ovato & acuminato *Cor. Inst.*
R. Herb. 1. Mandragora flore subcœruleo, purpurascēte
C. B. Pin. 169. Raii Histor. 669. La Mandragore femelle.
Vires vide in *Hist. Raii l.c.* & in *Observ. Lob. pag. 138.*



2. Belladonna frutescens, rotundifolia, Hispanica *Inst. R. Herb. 77.* Sola-
num frutex, rotundifolium, Hispanicum *Barr. Icon. 1173.*



3. Polygonatum latifolium, flore albo, majore, odorato *Barr. Icon. 711.*
n. 1. Polygonatum floribus ex singularibus pediculis *I. B. 3. 529. Raii Hist.*
665. Le Seau de Salomon à fleur odorante. Icon. Barr. & descriptio ex J. Bauhino
l. c. sunt depromptæ. Vires vide in Hist. Raii pag. 667.



4. Ruscus aculeatus, rotundiore & ampliore folio. Bruscus seu Ruscus
rotundifolius, vel Myrtacantha latifolia *Barr. Icon. 517. Le Houx-frelon, ou*
le petit Houx à feuilles larges. Varietas est Rusci vulgaris, à quo discrepat foliis
amplioribus & rotundioribus. Vires Rusci vide in *Hist. Raii 664.*

A

5. Ruscus

5. *Ruscus angustifolius*, fructu folio innascente *Inst. R. Herb.* 79. *Hippoglossum* seu *Bislingua* *Barr. Icon.* 249. *Bonifacia* sive *Bislingua* *J. B.* 1. 575. *Raii Hist.* 663.

6. *Ruscus latifolius*, fructu folio innascente *Inst. R. Herb.* 79. *Laurus Alexandrina* vera *Dioscoridis* & *Theophrasti* *Barr. Icon.* 250. *Laurus Alexandrina* *J. B.* 1. 574. *Col. part.* 1. 165. *Raii Hist.* 663. *Le Laurier Alexandrin.* *Vires* in *Hist.* *J. Bauh.* & *Raii* l. c. *Icon. Barr.* ex *Fab. Columnâ* l. c.



7. *Gentiana major*, vulgaris, pallido & parvo flore *Barr. Icon.* 63. *Gentiana major*, veterum *Clus. Hist.* 311. quoad *Iconem.* *La grande Gentiane à fleur pâle.* Varietas est *Gentianæ majoris*, luteæ *C. B. Pin.* 187. *Icon. Barr.* ex *Clusio* deprompta l. c. *Vires* recensentur apud *Schroderum*, & in *Hist.* *Raii* 716. Ex *Apenninis* & *Italiæ* montibus habuit *Barr.*

8. *Gentiana Alpina*, major, flore aureo & purpureo obsoleto *Barr. Icon.* 69. *Gentiana major*, alia *Camer. Epit.* 416. *Gentiana major*, pallido flore, punctis distincto *Clus. Hist.* 312. Hæc à superiori distinguitur foliis minoribus, acutioribus, alio virore nitentibus & rariora per intervalla cauli adnatis; Radice crassiore, & brachii quandoque crassitudinem æquanti, magis divaricatâ atque divisâ: caule ad summum cubitali; floribus denique minoribus nonnihil, ad oras tantum dissectis & denticulatis, verrucosis & nigro-purpureis maculis variegatis. In montibus *Delphinatûs* supra oppidum *Bourg-doyfan*, & circa *Gratianopolim* in monte *Charouffe*, atque in monte *Divi Hugonis* collegit *Barr.* Nos in monte *Grandson* supra *Cœnobium* *Majoris Carthusiæ* observavimus, necnon in celsioribus pratis *Vallis Barfilionensis.* *Icon. Barr.* ex *Camer.* l. c.

9. *Gentiana major*, purpureo flore *Clusii* *Barr. Icon.* 64. *Clus. Hist.* 312. *Gentiana major* purpurea *C. B. Pin.* 187. *Raii Hist.* 716. *La grande Gentiane à fleur purpurine.* *Icon. Barr.* ex *Clus.* l. c.

10. *Gentiana Asclepiadis* folio *Barr. Icon.* 70. *C. B. Pin.* 187. *Gentiana* 2. cæruleo flore *Clus. Hist.* 312. *Raii Hist.* 717. *Icon. Barr.* ex *Clus.* l. c. In *Maurianâ* sæpius invenit *Barr.* præsertim in monte *Armillon* dicto. Copiosè & satis frequenter in editioribus pratis supra *Vapincum* & in *Valle Barfilionensi* nobis fuit obvia.

11. *Gentiana minor*, cruciata, flore cæruleo, erectior *Barr. Icon.* 65. *Gentiana* 111. cruciata *Clus. Hist.* 313. *Gentiana cruciata* *C. B. Pin.* 188. *Raii Hist.* 717. *Icon. Barr.* ex *Clus.* l. c. *Vires* vide in *Hist.* *J. Bauh.* 3. 522. & in *Hist.* *Raii.* l. c.

12. *Gentiana minor*, cruciata, flore purpureo, supina *Barr. Icon.* 66. *Gentiana minor* *Camer. Epit.* 417. Varietas superioris. *Icon. Barr.* ex *Camer.* l. c. Ex *Apenninis* & *Æquicolorum* montibus habuit *Barr.*

13. *Gentiana cærulea*, punctata, annua *Pennæi*, xxi. *Clusii* *Barr. Icon.* 91. *Clus. Hist.* 316. *Gentiana palustris*, latifolia, flore punctato *C. B. Pin.* 188. *Raii Hist.* 721. *Icon. Barr.* ex *Clus.* l. c. In pratis humidioribus *Vallis Barfilionensis* provenit, necnon circa *Vapincum*, præsertim in pratis montis *la Chapelanie* dicti. Hujus prima folia depinxit *Boccone* in *Musei* sui part. 2. Tab. 119. nomine *Gentianæ Pyrolæ* folio.

14. *Gentiana autumnalis*, angustifolia, major, *C. B. Pin.* 188. 6. spec. *Raii Hist.* 719. *Gentiana minima* *Mathioli* *Barr. Icon.* 51. n. 2. & *Math. Edit. Bauh.* 481. *Pneumonanthe Cordi* quoad figuram *Barr. Icon.* 51. n. 1. & *Cord. Hist.* 162. *Pneumonanthe Lobelii*, *Dodonæi*, *Clusii*, *Gerardi* *Barr. Icon.* 122. n. 1. *Lob. Icon.* 309. *Lob. Obs.* 166. *Dod. Pempt.* 168. *Clus. Hist.* 313. & *Ger. emac.* 438. *Gentianella* seu *Calathiana* *Viola* *Lugd. Hist.* *Barr. Icon.* 51. n. 11. *Lugd.* 824. *Gentianella* seu *Campanula pratensis* *Lugd. Hist.* *Barr. Icon.* 52. n. 1. *Lugd.* 824. Hæ quinque *Icones* *Barr.* ex *Authoribus* citatis sunt depromptæ. Tertia aliis anteponenda. 15. Gen-

15. *Gentiana autumnalis*, minor, annua, flore cruciato ad latera piloso, fugax *Barr. Icon. 121*. *Gentianella autumnalis*, foliis *Centaureæ minoris*, flore cæruleo *Eyft.* *Gentiana cærulea*, fimbriata, angustifolia, autumnalis *Columnæ Barr. Icon. 97. n. 1. Col. part. 1. 222. 5. spec. Raii Hist. 719*. *Gentiana cærulea*, oris pilosis *Inst. R. Herb. 81*. Icones *Barr. ex Hort. Eyft. & Col. l. c.* Sæpius nobis fuit obvia mensibus Augusto & Septembri circa Geneviam, tum etiam supra Vapincum secus fluvium *Drac* dictum, necnon in Valle Barfilionensi.

16. *Gentiana Alpina*, pumila, verna, minor *Inst. R. Herb. 81*. *Gentianella purpurea*, minima *Columnæ Barr. Icon. 97. n. 11. Col. part. 1. 22. & Raii Hist. 718*. Icon. *Barr. ex Col. l. c.*

17. *Gentiana Alpina*, pumila, brevi folio *Inst. R. Herb. 81*. *Gentianella fugax Clusii Barr. Icon. 103. n. 111. iv. Clus. Hist. 315. Raii Hist. 720*. *Gentiana minima Lob. Icon. 310. Adv. 131*. Icon. *Barr. ex Lob. l. c.*

18. *Gentiana utriculis ventricosus C. B. Pin. 188*. *Gentianella cærulea*, cordata *Columnæ Barr. Icon. 122. n. 11. Col. part. 1. 221. & Raii Hist. 721*. *Gentianella annua*, azureo flore *Barr. Icon. 48*. prior Icon. *Barr. ex Col. l. c.* altera ex *Corvino*.

19. *Gentiana autumnalis*, ramosa *C. B. Pin. 188. Raii Hist. 720*. *Gentianella autumnalis*, annua, cæruleo-purpurea, multiflora *Barr. Icon. 102. & Eyft. Icon Barr. ex Hort. Eyft.*

20. *Gentiana pratensis*, flore lanuginoso *C. B. Pin. 188. Raii Hist. 719*. *Gentiana fugax Clusii*, Bauhini, purpureo-cærulea *Barr. Icon. 510. n. 11*. *Gentianellæ species quibusdam*, an *Cordo Pneumonanthe*, aut *Gentiana fugax altera Clusii I. B. 3. 526*. Icon. *Barr. ex J. Bauh. l. c.*

21. *Gentiana pratensis*, flore brevior & majore *C. B. Pin. 188. Raii Hist. 720*. *Gentianella fugax*, Clusii, Bauhini, sub cærulea *Barr. Icon 510. n. 1. 111. Clus. Hist. 315. & I. B. 3. 526*. Icon *Barr. ex J. Bauh. l. c.*

22. *Gentiana Alpina*, pumila, *Centaurei minoris folio Inst. R. Herb. 87*. *Calathiana verna*, cæruleo-purpurea *Dalechampii Barr. Icon. 509. n. 1. Lugd. 824*. *Calathiana verna*, cæruleo-purpurea *Dalechampii Joan. Bauhini, Barr. Icon. 509. n. 11. I. B. 3. 527*. *Gentianella fugax*, æstiva, stellata, cærulea, minor *Barr. Icon. 103. n. 11*. *Gentianella fugax v. Clusii*, flore cæruleo, colore elegantissimo *I. B. 3. 527. Raii Hist. 720*. *Gentianella fugax æstiva*, cærulea, minor *Barr. Icon. 103. n. 1*. *Gentiana xi. sive fugax v. Clus. Hist. 316*. Icones *Barr. ex Authoribus citatis sunt depromptæ*.

23. *Gentiana Alpina*, pumila, flore aureo. *Gentianella fugax*, Alpina, flore aureo *Barr. Icon. 104*. Elegans hæc species suâ Icone non major, ramosa, & multis donata cauliculis erectis, firmis, in latera magis quàm in figurâ non-nihil expansis, glabris, rotundis, pallentibus & erumpentibus ex radice tenui, lignosâ, paucis fibris capillatâ, brevi & subluteâ. Folia humifusa stellatim disponuntur Myrtina quæ minora acutioraque fiunt dum summum ramorum assequuntur, per singula internodia bina. Flores lutei seu aurei, Campanulæ aut Calathi formâ, in quinas acutas altasque lacinias per oras divisi è Calyce virenti & in quinque radios scisso emergunt. E tubi fundo surgit pistillum ventricosum, semine prægnans, pallidis quinque staminibus apices aureos bifidos gerentibus stipatum. Tota planta amara est. Ex Alpibus circa oppidum *Bourgdoysan* sitis habuit. *Barr. Suspicio hanc delineasse & descripsisse ex plantâ siccâ*. Color enim albus florum, præsertim *Gentianarum*, exsiccatione in flavum & sub flavum facillè mutatur.

24. *Gentiana Alpina*, magno flore *I. B. 3. 523. Raii Hist. 718*. *Gentianella Helvetia*, amplo azureo flore *Barr. Icon. 47*. *Gentianella Alpina*, lato acuto folio, flore minus patulo, albo, cæruleo & cæscio. *Barr. Icon. 106*. *Gentianella Alpina*, lato, rotundiore folio, flore amplo reflexo, colore azureo *Barr. Icon. 105*. *Gentianella minor*, purpurea, *Violæ Marianæ flore Barr. Icon. 110. n. 11. Bocc. Mus. part. 2. 21. Tab. 6*. *Gentiana Helvetia Lob. Icon. 310. & Adv.*

130. Gentianella minor, ἀγαυὸς, Violæ & maximi convolvuli flore Barr. Icon. 110. n. 1. Gentianella minima, latifolia Lugd. 828. Icones Barr. ultimæ ex Lob. & Dalech. depromptæ l. c. Frequens est in Alpibus supra Gratianopolim, circa Camberiacum, & in Valle Barfilionensi. Multum ludit foliis suis modò rotundioribus, acutioribus modò, nunc angustis, nunc amplioribus.

25. Gentiana Alpina, pumila, verna, major Inst. R. Herb. 80. Gentianella minor, verna, cæruleo stellato flore Clusii Barr. Icon. 109. n. 1. Clus. Hist. 315. 3. species Raii Hist. 718. Gentianella Alpina, minor, verna, subrotundo folio, flore cæruleo Barr. Icon. 98. Gentianella minima, verna, flore cæruleo Eyst. Gentiana minor, cæruleo, stellato & per oras crenato flore Dalechampii Barr. Icon. 109. n. 11. Gentianella angustifolia Lugd. 829. Icones Barr. ex Authoribus citatis desumptæ. Nec minus variat hæc quàm proximè recensita. In Alpibus sæpiùs occurrit & circa Genevam.

26. Gentiana autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, major. Gentianella autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, major Barr. Icon. 101. n. 1. Gentianella elegantissima, Bavarica Camer. Hort. Tab. xv. Icon. Barr. ex Camer. l. c.

27. Gentiana autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, minor. Gentianella autumnalis, Serpillifolia, flore crenato, Bavarica, minor Barr. Icon. 101. n. 11. Gentianella minor Camer. Hort. Tab. xv. Icon. Barr. ex Camer. l. c.



28. Convolvulus longifolius, azureus, niveo umbilico, supinus Barr. Icon. 322. Convolvulus peregrinus, cæruleus, folio oblongo C. B. P. 245. Prodr. 134. & Raii Hist. 727. Liseron de Portugal à fleur bleue.

29. Convolvulus longifolius, azureus, niveo umbilico, erectus Barr. Icon. 321. Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. 105. Africanus ejusdem Mus. part. 2. 76. Tab. 63. Varietas prioris. In Andalusia circa Cordubam reperit Barr.

30. Convolvulus minor, Spicæfolius, Hispanicus Barr. Icon. 311. Convolvulus minimus, Spicæfolius, vel Stachadis citrinæ aut Linariæ Lob. Adv. 274. Convolvulus Spicæfolius, angustifolius, radice repente Bot. Monsp. Humilis est Planta, nec repens, nec assurgens, sed in latus nonnihil inclinata, & subinde erecta, vix medium palmum alta, ex radicis cervice plura confertim emittens folia incana, tenui lanugine pubentia, spatulæ seu Limonii, Oleæ sed potius Sesamoidis majoris Hispanicæ Clusii formâ, molliora tamen, palmi quadrantem longa, quæ longissima, nonnihil contorta & convoluta, è quorum medio surgit brevis cauliculus, foliosus & ramosus, è cujus fastigiis & lateribus sese explicant flores Convolvuli majoris, sed minores, albi, stellâ carnei coloris foris radiati. Tota planta vix figurâ major. In Hispaniæ Montibus Mancie Aioræ oppido vicinis ad Orientem collegit Barr.

31. Convolvulus Marinus, repens, angusto & oblongo folio, flore purpurascens Barr. Icon. 1132. Folia huic incana pariter, sed latiora & acutiora. Radix alba, longa, lacteo succo turgens, sub arenis repens Soldanellæ modo, variosque per nodosa intervalla edens surculos carnosos, vix palmo altiores & repandos, & qui pauca in folia floresque abeunt. Flores mediocris sunt magnitudinis & ex albo-purpurascunt. Ad littus Maris Mediterranei juxta Centumcellas, vulgò Civitavechia Cornatum versùs in arenis serpit.

32. Convolvulus saxatilis, erectus, villosus, perennis, flore ex albo purpurascens, Hispanicus Barr. Icon. 470. Bocc. Mus. part. 2. 79. Tab. 70. Convolvulus argenteus, umbellatus, supinus Inst. R. Herb. 84. Campanula Lychnidea I. B. 2. 803. Raii Hist. 737. Tota villis hispida est & sericeo nitore albescit hæc planta, è Saxorum, rupium rimis erumpens, longâ & perenni gaudente radice, ex quâ sex aut septem, tenues, erecti modò, modò supini, villosi & argentei assurgunt cauliculi foliis Oleæ seu Spicæ vestiti, brevi & sericeâ lanugine incanis & molliusculis; cauliculi majores, vix palmum superant, desinuntque in fasciculum florum Convolvuli minoris & vulgaris, intùs alborum, foris è

è purpureo radiatorum. Pericarpium & semen ut aliis Convolvulis. In montibus campestribusque oppidi *Aioræ*, & in deserto *Mancia* Provinciæ Castiliæ novæ ad radices Montis Septentrionem versus, in confiniis Regni Valentini reperiēbat Barr. necnon in Catalauniæ locis aridis, deserto Montis Serrati.

33. Convolvulus maritimus, major, Italicus, sinuato & auriculato potius folio *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 37.* Soldanella marina, longo & sinuato folio seu Convolvulus marinus, lactescens, soldanellæ congener Imperati *Barr. Icon. 856.* Convolvulo marino *Imp. 671. Icon. Barr. ex Imp. l. c.* Alligatur Gramini spicato, sparteo, spicâ sericeâ ex utriculo prodeunte *Inst. R. Herb. 518.* Juxta mare in viâ Neapoli Puteolos ducente reperitur.

34. Convolvulus Beticæ Althææque foliis, repens, argenteus, flore purpureo *Barr. Icon. 312.* Convolvulus argenteus, Althææ folio, *C. B. Pin. 296. Raii Hist. 725.* Convolvulus Althææ folio *Clus. Hist. xlix.* Passim in Italiâ, locis incultis, Romæ in ascensu ad Montem Pincium prope Ecclesiam R. P. Minimorum. In Hispaniâ Beticæque Regno juxta Oppidum *Alhama*, observavit Barr. In Galliâ Narbonensi, Monte Cetio, sed frequentius in Gallo-Provinciâ circa Tolonam & Olbiam nobis occurrit.

35. Convolvulus quinquefolius, seu foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo Bauhini Prodrumi. *Barr. Icon. 319. C. B. Pin. 295. Prodr. 134. Raii Hist. 729.* Convolvulus multifidus, glaber *Inst. R. Herb. 84. Icon. Barr. ex Bauh. l. c.*

36. Convolvulus henneaphyllos, flore purpureo *Barr. Icon. 320.* Superioris varietas. Plantam pictam communicabat Barreliero Eques Corvinus.



37. Tithymalus dendroides, major & verior, Italicus *Barr. Icon. 910.* Tithymalus dendroides *J. B. 3. 675. Raii Hist. 864. Le Titimale, arbre.* In Regno Neapolitano juxta Terracinam urbem nascitur, ut monet Math.

38. Tithymalus Amygdaloides, major, tortuoso caule *Barr. Icon. 839.* Tortuoso caule donatur, multiplici, virente & nonnihil villosa. Folia sunt oblonga, Amygdalina, obtusè acuta, glabra, infernè glauca, supernè obscurius virentia, & transversim picta brevibus & è viridi albicantibus striis, lævia; duas uncias & semissem longa quæ majora & inferiora annotinaque, dodrantem uncia lata quæ ventricosiora, eò minora quò editiora. Flores per caulem disseminati, singularibus oblongisque pediculis innixi, sunt quadrilunares; ex eorum medio tria surgunt stamina virentia bifurcata, minutissimis & luteis onusta apicibus; fructus subrotundi.

39. Tithymalus Amygdaloides, minor, subglaber *Barr. Icon. 830.* Tithymalus sylvaticus, toto anno folia retinens *J. B. 3. 671. Raii Hist. 863.* A superiori distinguitur foliis angustioribus. In Monte *Guadagnolo* inter sylvas cæduas cum sequenti invenit Barr. Frequens in sylvis Galliæ. Subdulci est sapore, dum manditur, sed dein nonnihil linguam vellicantē.

40. Tithymalus Amygdaloides, minimus, glaber *Barr. Icon. 829.* Hujus folia multò minora, breviora & vix uncia unâ longiora, trientem uncia lata, extremâ parte latiuscula & obtusa, acutiora juxta exortum, & stricta, glabra, crassiuscula, carnosa, & minora quò altius erumpunt. Flores in summo caulium veluti in umbellam collecti, quadrilunati, lutei. Tota planta nullius est ferè saporis.

41. Tithymalus palustris, villosus, mollior, erectus *Barr. Icon. 885.* Radice nititur multifidâ, crassâ, fuscâ & perenni, è quâ multi, rotundi, rufescentes, hirsuti, sesquipediales ad summum surgunt caules foliis vestiti densioribus, surrectis, acutis, serratis, molliter hirsutis, subincanis & villosis. Flores & fructus quales cæteris. Forte Tithymalus incanus, hirsutus *C. B. Prodr. 133.* In locis paludosis cænosisque provenit, maximè circum Ostia Tyberina & in maritimis Galliæ.

42. *Tithymalus nemorosus*, acutiori folio, dulcis *Barr. Icon. 834*. E radice longâ, crassâ & gilvâ erumpunt plurimi caules rubri & glabri, quorum alii floridi, alii foliosi, qui foliosi, foliis vestiuntur Amygdaloidis sed longè minoribus, glabris, alternis, venosis & cæsi coloris: qui in flores desinunt, brevioribus, latioribus, rotundioribusque donantur foliis, iisque amplexicaulibus, umbellamque florum luteolorum, quadrilunatorum emittunt. Ex floris medio pericarpium exsurgit tricoccum, læve, inclinatum, stilo trifido armatum. Semina in pericarpio contenta ovata sunt, utrinque obtusâ instar Viciæ seminis. Tota planta lactescit, dulcescitque & subastringentis est saporis nec ingrati. Prope Pivernum Oppidum, vulgò *Piperno* in latio, viâ Appiâ quæ ducit Terracinam, in sylvæ declivi quâ itur ad Monasterium *Fossæ novæ*, Divi Thomæ Acquinatis obitu per celebre, fabuloso solo nascitur.

43. *Tithymalus nemorosus*, alter, foliis latioribus & firmioribus *Barr. Icon. 840*. Plures ex radice tenui surculos emittit rectos, pedales, ab imo ad summum foliosos; Folia illi duas uncias longa, dodrantem unciae lata, in exortu lata & amplexicaulia, in medio ventricosa, subacuta, surrecta firmaque. Latam in umbellam desinit caulis. Flores & fructus ut in præcedenti. Tota planta præcedenti lævior.

44. *Tithymalus nemorosus*, villosus, mollior *Barr. Icon. 198*. Tres aut quatuor pluresque etiam à tenui contortâ lignosâque radice cauliculos profert pedales & sesquipedales, villosos, è purpureo virentes, quos vestiunt duas quandoque uncias & amplius longa, semunciam lata folia villosa, mollia, infernè subineana, supernè lætè imò obscurè virentia & amplexicaulia & deorsum nutantia. Summum caulis desinit in umbellam tribus aut quinque radiis qui rursus in alios dividuntur, constantem, stellâque foliorum æquantium magnitudinem & formam eorum quæ sunt in caule, suffultam. Flores luteoli, in quatuor partes retusas divisi. Opacis in locis & sylvis crescit in Italiâ.

45. *Tithymalus dulcis*, tuberosâ radice *Barr. Icon. 909*. & *Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 44*. *Tithymalus montanus*, non acris *C. B. Pin. 292. Raii Hist. 870*. *Tithymalus tuberosus*, Germanicus *C. B. Pin. 292. Le Timale doux*. Hujus radix cum est annosa aut in solo pinguiori crescit, latum in cespitem densis propaginibus arundinaceis, crassis, nodosis, grumosisque serpit; in novitiâ plantâ radix tenuior, tuberculis tamen nodosa. In Montibus Apenninis Italiæ & Alpium observavit *Barr.* Circa Genevam & sparsim per sylvas Galliæ occurrit.

46. *Tithymalus bulbosus*, Apios Fuchsi *Barr. Icon. 832*. Multos ex radice grumosâ, nigricante, scabrâ, rugosâ, non exactè rotundâ, pueri caput ferè adæquante, cauliculos edit penè lignosos, tribus quandoque pedibus longos, nonnihil curvos & inflexos, graciles & debiles, quibus folia hærent vix trientem unciae lata, tres circiter uncias longa, supernè obscuro virore nitentia, lævia, glabra, acuta, venâ niveâ secundum nervi medii longitudinem decurrente, infernè dilutiora & subincana. Summum caulis desinit in umbellam radiis quinque conflata. Flores virent & in quatuor partes retusas, ac subrotundas dividuntur. Aprili florebat Romæ in horto sancti Xysti. Apios dicitur Græcè, quòd radix sit pyriformis & turbinata, *Fuch. Hist. 132*. Ab Equite Corvino accipiebat *Barr.* Radicibus suis & foliis discrepat hæc species ab eâ quæ vulgò dicitur Apios *Math. Clus. Bauhin. & Bellon.*

47. *Tithymalus Myrsinites*, verior, pingui, crasso folio, è cæcio virens *Barr. Icon. 1200*. *Tithymalus Myrsinites*, latifolius *C. B. Pin. 290. Raii Hist. 865*. Figuram mutat dum flores fructusque profert; unde non mirum Icones authorum esse inter se dissimiles. In Asprensis & Sabinæ locis lapidosis & siccis crescit.

48. *Tithymalus marinus*, rotundifolius, Italicus *Barr. Icon. 824*.

49. *Tithymalus marinus*, latifolius, Italicus *Barr. Icon. 823*.

50. *Tithymalus marinus*, folio retuso, Terracinensis *Barr. Icon. 833*. Species hæc inter arenas quibus oppletus est & cumulatus Portus Terracinensis oritur.

Foliis

Foliis donatur longis & angustis atque in extremo rotundis & retusis, vix quartâ uncia parte latioribus, & uncia longioribus, inferioribus idest quæ caulis partem infimam occupant, multò minoribus, magis retusis & vix semuncia longioribus. Caules plures edit palmares, succulentos, rubentes. Radix crassa, longa altèque in arenam demissa. Flores non vidit, nec fructus.

51. Tithymalus marinus, Myrtifolius, Italicus *Barr. Icon. 1203.*

52. Tithymalus marinus, ferratus, Italicus *Barr. Icon. 1202.*

53. Tithymalus marinus, acuto linifolio *Barr. Icon. 831.* Tithymalus Amygdaloides, angustifolius *Tabern. Icon. 591.* Hujus radix febrifuga censetur, Vomitus alvumque potentissimè ciet. Ex cortice radicum siccato paratur adversus febres remedium quod Regiæ liberalitati debemus. Datur autem ad dragm. semissem, & unâ vel alterâ hujus medicamenti dosi febres contumaces curantur. Frequens per Galliam & Italiam occurrit.

54. Tithymalus Myrti folio undulato. Esula minor, Myrti folia, longius radicata *Barr. Icon. 211.*

55. Tithymalus Epithymi fructu *Col. part. 2. 51. Raii Hist. 871.* Esula fruticans seu Pithyusa Romanorum *Barr. Icon. 197.* Corticem radicum pro Esulâ legitimâ accipiunt Pharmacopolæ Romani, inquit Barr. In colle Tiburtino meridiei obverso & urbi, ex alterâ fluvii parte inter saxa erumpit; sit exsiccatione ramorum spinosa. Nos verò in Valle Barsilionensi & præsertim circa oppidum SanStephanienſe in Dicecesi Nicienſi invenimus.

56. Tithymalus paralius, rubentibus & compressioribus foliis *Barr. Icon. 886.* Tithymalus maritimus *C. B. Pin. 291. Raii Hist. 865.* Ad littus Maris & Insulæ Tiburtinæ colligebat Barr.

57. Tithymalus helioscopius *C. B. Pin. 291. Raii Hist. 869.* Esula rotundifolia, ferrata, carnosior *Barr. Icon. 212.* Romæ initio Aprilis in viâ quâ itur ad Sanctum Laurentium extra muros juxta sepes carnosiores reperiebat Barr.

58. Tithymalus annuus, supinus, folio rotundiore acuminato *Inst. R. herb. 87.* Pithyusa minor, subrotundis & acutis foliis *Barr. Icon. 751.* Peplis minor *J. B. 3. 670. Raii Hist. 869.*

59. Tithymalus annuus, Lini folio acuto *Bot. Monsp. Raii Hist. 868.* Pithyusa angustis acutisque Esulæ foliis, annua *Barr. Icon. 752.*

60. Tithymalus Linifolio, major, Italicus *Barr. Icon. 821.* Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis Pithyusa *C. B. Pin. 292. Raii Hist. 867.* Radice est tenui, albicante, tortuosâ & siccâ, in biennium & usque ad exanthemum seu potius baccarum maturitatem durante: flore marcescente tota sensim marcescit planta. Primo anno quo non floret, restibilis. Caule est recto, unico, ramoso, purpurascens, pedali & sesquipedali, foliis vestito angustis, liniformibus, latioribus quâ umbellæ viciniora sunt, utrinque glabris & lævibus. Caulis & ramuli in umbellas florum desinunt. Flores pallide lutei, quadrilunares, è quorum medio surgit bacca tricocca, nutans, virens, & tribus in summo apicibus capillata. Vires ejus vide in Hist. Raii l. c.

61. Tithymalus montanus, Esulæ folio, minor, Italicus *Barr. Icon. 822.*

62. Tithymalus sive Esula exigua *C. B. Pin. 291. Raii Hist. 868.* Esula minor, *πολλυλως*, aculeata *Barr. Icon. 85.*

63. Tithymalus minimus, angustis acutisque foliis, fruticans. Pithyusa fruticans, angustis acutisque foliis, minima *Barr. Icon. 86.* Semipalmaris ut plurimum est plantula, fruticans, erecta, unicaulis, ab imo ad summum dense ramosa, foliis vestita angustis, acutis, densâ satis serie circum caulem adnatis, alternis, & vix uncia longioribus. Flores non tantum in summo cauliculi, sed in plerisque ramulorum extremis observantur iisque succedunt baccae rotundæ, trifidæ seu tricoccae, virentes, nec Cannabino grano majores. Radix est parva, lignosa, contorta, albicans, annua & paucis fibris capillata. Siccus ad Barrelierum missus est ex agro Urbevetano.

64. Oxy



64. *Oxys Americana*, flore rubro, fibrosâ radice *Inst. R. herb. 89.* *Trifolium acetosum*, *Americanum*, rubro flore *Barr. Icon. 1139.* & *Bocc. Mus. part. 2. 63. Tab. 51.* Unico assurgit caule recto, rotundo, æquali, lævi, alternis ramis ab imâ parte ad verticem brachiato, alternisque foliis vestito. Folia terna uni adhærent pediculo unciam unam aliquandò longo, inæqualia, ad terram nonnihil demissa, glabra, lævia supernè, infernè lævi subtilissimoque tomento nonnihil albentia, subrotunda, inæqualibus venis exarata, mediâ unciâ vix latiora, vixque unciam longa quæ longiora & majora sunt. E sinu singulorum pediculorum oriuntur rami seu pediculi duas uncias longi, nudi, versùs extremum in duas partes divisi, è quibus plures florum gemmæ duplici serie & alternæ propendent. Flores è rubro carnei in quinque partes sinuosas, cordatas & retusas divisi, in umbilico crocei, & staminibus quinque luteis stipati. Floribus succedunt siliquæ angulosæ, striatæ, tenerimæ & ita elasticæ, ut tactu simplici disrumpantur, seminaque effundant rubescentia, Milio minora, tribus in loculis inclusa. Calyx est quinquefidus. Totius plantæ sapor acetosus est. Romæ in horto Sancti Xysti colebat *Barr.*



65. *Apocynum minus*, rectum, *Canadense Barr. Icon. 72.* & *Corn. 93.* *Apocynum erectum*, *Canadense*, angustifolium *Par. Bat. L' Apocin de Canada. Icon. Barr. ex Corn. l. c.*



66. *Malva rotundifolia*, *Italica*, flore amplo purpurascente *Inst. R. herb. 96.* *Althæa virens*, *rotundifolia*, flore amplo, purpurascente, *Italica Barr. Icon. 479.* *La Mauve d'Italie à grande fleur purpurine.* Foliis donatur *Althææ* formâ, sed virentibus, mollibus, lævibus & leni velut lanugine & bombicinâ tectis, supernè tamen dilutius virentibus, & pediculo duas uncias ut plurimum longo cauli hærentibus. Inferiora autem folia majora, rotundiora, magis sinuosa & quatuor uncias longa lataque, superiora minora, quinque cuspidibus, tribus quandoque acuminata, sensim angustiora brevioraque, quò altius surgunt. Caulis rotundus, albus, rectus, bicubitalis, ramosus. In summo caulium & ramorum flores enascuntur *Malvæ*, sed paulò ampliores, purpurascences, venis paulò obscurioribus radiati, in quinque vel sex lacinias ad basim usque dissecti, staminibus plurimis stipati apices albo-pallidos gestantibus. Semina *Malvacea* sunt calyce inclusa pentaphyllo quem trifidus sustinet caliculus. Radix ab uno capite multiplex, multisque fibris circum capillata, longa, mollis, pallida & lenta. Florebat *Julio.*

67. *Malva Rosea*, sulfurea, folio anguloso & folio *Ficus*, *Tartarica Barr. Icon. 586.* *Malva Rosea*, folio *Ficus*, flore luteo *H. R. Paris.*

68. *Malva trimestris Clus. Hist. xxiiij. Raii Hist. 598.* *Alcea minor*, variis foliis *Barr. Icon. 1201.* *Florum lacinia magis ab invicem diductæ sunt, quam ut ex vivâ plantâ delineata esse videatur.*



69. *Althæa fruticans*, incana, minore folio, *Hispanica Barr. Icon. 428.* *Althæa frutescens*, folio rotundiore, incano *C. B. Pin. 316.* *Althæa frutex 1^a. Clus. Hist. xxiiij. Raii Hist. 603. La Guimauve arbre.*

70. *Althæa rugosior*, rubro flore, *Hispanica Barr. Icon. 427.*



71. *Alcea hirsuta*, minima, flore cœsio, *Hispanica Barr. Icon. 1169.* *Alcea villosa J. B. 2. 1067. Raii Hist. 605.*

72. *Mal-*



72. Malacoides Betonica folio, *Inst. R. herb.* 98. Alcea Betonica folio, flore purpuro-violaceo *Barr. Icon.* 1189. Althæa Sida dicta quibusdam *J. B.* 2. 957. Malva Betonica folio. *Bocc. Rar. Plant.* 15. *Raii Hist.* 599.



73. Kermia Syrorum quibusdam *C. B. Pin.* 316. Althæa frutex, flore albo, rubro, carneo, purpuro-violaceo *Barr. Icon.* 491. Alcea arborescens, glabra, Kermia dicta *I. B.* 2. 957. Alcea Syriaca, arborescens, Kermia Syrorum Imperati *Barr. Icon.* 1176. *Imp.* 670. Icones *Barr.* desumptæ sunt ex Authoribus citatis.

74. Kermia Sinensis, fructu subrotundo, flore pleno *Inst. R. Herb.* 100. Malva Canadensis, luteo purpureo, pleno flore, arborescens *Barr. Icon.* 585. Rosa Sinensis, foliosa *Ferr. Fl.* 492. *Raii Hist.* 1069. La Rose de Cayenne à fleur double. In hortis colitur, ex Insulis Americanis allata, non autem è Canadensi tractu, ut arbitrabatur *Barr.*

75. Kermia vesicaria, vulgaris *Inst. R. Herb.* 101. Alcea Veneta seu vesicaria, trifolia, hirsuta, flore sulfureo, unguibus purpureis, *Barr. Icon.* 471. Alcea solisequa multis, Veneta *I. B.* 2. 1068. *Raii Hist.* 1067.

76. Kermia Africana, vesicaria *Inst. R. Herb.* 101. Alcea Africana seu vesicaria, trifolia, glabra, flore sulfureo cum unguibus purpureis *Barr. Icon.* 472. Kermia Africana, vesicaria, folio tripartito, flore purpureo *Inst. R. Herb.* 100. Alcea vesicaria Capitis bonæ spei *Mor. Hist. Oxon. part.* 2. 593. *H. R. Blef. & Raii Hist.* 1067. Ex horto Ser. Princip. Gastonis Aurelianensium Ducis semen habuit Barrelierus nomine Alceæ Promontorii bonæ spei.



77. Campanula montana, minor, angustifolia *Barr. Icon.* 487. Campanule de Montagne à feuilles étroites. Exigua hæc planta radice est tenui, longâ, sulfureâ, è quâ se erigunt sursum folia nullo pediculo nixa, angusta, acuta & duas circiter uncias longa, lanceolata. Caules tenues, glabri, foliis vestiti in summo minoribus & angustioribus unicum florem sustinent, Campanulatum, ad latus nutantem, tenui pediculo innixum, semunciâ breviorē & calyce comprehensum quinquefido, cujus radii angusti & ita longi, ut ad oras floris pertingant. Tota planta exilis est & glabra, vix palmi dodrantem alta. In Montibus Apenninis Aprutii & Amatricensium crescit.

78. Campanula Alpina, Teucris folio angulato *Inst. R. Herb.* 110. Rapunculum Teucris folio *Barr. Icon.* 567. Rapunculus Alpinus, Teucris folio rhomboidali *Bocc. Mus. part.* 2. 75. *Tab.* 81. *Raii Hist.* 3. 383. Campanula Drabæ minoris folio *C. B. Pin.* 94. *Prodr.* 36. Rapunculi genus folio ferrato rotundiore *I. B.* 2. 798. *Raii Hist.* 741. Radix huic alba, longa, crassiuscula, fibris à latere capillata, ex quâ caules exeunt tres aut quatuor alternis foliis Teucris pratenfis facie, serratis, utrinque acutis muniti. In summis cauliculis sparguntur tres aut quatuor flores Campanulæ Persicæfoliæ formâ, nutantes, cærulei, sed minores multò, quinque acutis crenis per oras incisi, è viridi stellato calyce emergentes & tenui longoque pediculo innitentes. Lac defluit, dum læditur planta. Hæc à Bauhinianâ foliis tantum nutantibus discrepat. In Valle Barfiliensis, & in editioribus pratis supra Vapincum nascitur.

79. Campanula Cretica, saxatilis, Bellidis folio, magno flore *Inst. R. Herb.* 111. Trachelium saxatile, Bellidis folio, cæruleum, Creticum *Barr. Icon.* 813. *Bocc. Mus. part.* 2. 76. *Tab.* 64. Exotica hæc planta vix figurâ altior, læto virore nitens, glabra; foliis inferioribus Bellidis planè formâ, in ambitu leviter serratis; è quorum medio surgunt caules breves, semipalmes, tortuosi, glabri, subpurpurascens, è rotundo compressi, foliosi & floribus onusti non

B

minoribus

minoribus Campanulæ Urticæ foliis, quaternis, aut quinis ab unâ parte, thyrsi modo ordinatis, inclinatis, nutantibus, cæruleis, aut saltem cæsi coloris, & è calyce quinquefido emergentibus. Calyx eorum abit in fructum hemisphericum, quinis nervis seu costis gilvis secundum longitudinem striatum. Semen tenue. Tota planta saporis est subdulcis. Saxatilis est, è Cretæ scopuliseducta.

80. Campanula saxatilis, rotundifolia, hispida, flore cæsius, amplo. Italica Barr. Icon. 453. Campanula parva, rotundifolia, flore cæruleo, pentagono, grandi Raii Hist. 741. Inter saxorum rimas erumpit radice albâ; foliis rotundis in extremo acutis, crenatis, parvis, oblongo pediculo articulatis, villosis, hispidis, canescentibus; è quorum medio emergunt caules alternis foliis vestiti, è rotundo in longum protensis & angustis quò altius in caules surgunt. E foliorum sinu prorumpunt flores semunciali pediculo fulti, singulares, ampli, in quinque partes latas & acutas divisi, hiantes & latè se explicantes, calyce comprehensi quinquefido, virenti, hispido, angustis acutisque radiis distincto. In medio floris insidet tumidus stylus multis circumseptus staminibus. Marcescente flore, calycis pars media tumidior fit & abit in fructum semine tenui & pulverulento turgidum. In Valle Ananiæ ad Austrum primo circiter lapide ab urbe in rupibus oritur, necnon in circuitu Carthusiæ Divi Bartholomæi Trifulti ad pedes Apenninorum ad Austrum.

81. Campanula minor, Alpina, foliis Cochleariæ Barr. Icon. 454. Ex albâ, tenui fibrosâque radice plurima in orbem spargit humi folia ferrata, subrotunda; quorum prima latiora, magis compressa, & rotundiora quàm superiora quæ acutiora, in medio concava, Cochleariæ modo & triunciali donata pediculo. Caules floresque non vidit; lacteo succo turgabant folia.

82. Campanula hirsuta, Ocimi folio caulem ambiente, flore pendulo Bocc. Rar. Plant. 83. Viola Mariana, minor, cærulea, folio subrotundo, calyce corniculato Barr. Icon. 759. Semen habuit Barr. à P. Boccone.

83. Campanula pentagonia, perfoliata Mor. Hist. Oxon. part. 2. 457. Bocc. Mus. part. 1. Tab. v. n. 8. Rapunculum minimum, rotundifolium, verticillatum, flore purpuro-violaceo Barr. Icon. 1133. Speculum Veneris perfoliatum, seu Viola pentagonia, perfoliata Raii Hist. 743.

84. Campanula Alpina, sphærocephalos C. B. Pin. 94. Trachelium majus, petræum, flore albo Ponæ Barr. Icon. 890. Pon. Bald. Ital. 161. Clus. Hist. cccxxxij. & Raii Hist. 734. Icon. Barr. ex Clus. l. c.

85. Campanula Alpina, Tragopogi folio C. B. Pin. 94. Trachelium minus, Gramineum, cæruleo-violaceum Barr. Icon. 332. Trachelium Tragopogi folio, montanum Fabii Columnæ I. B. 2. 802. Col. Phytob. 2. 25. & Raii Hist. 736. Folia huic leviter hirsuta, crenata & veluti dentata. Tota planta vix palmo altior. E montibus Aprutii Sulmonæ vicinis habuit Barr.

86. Campanula umbellata, foliis oblongis hispidis Inst. R. Herb. 110. Rapunculus lanceolatus, corniculatus Barr. Icon. 523. n. 11. Rapunculus sylvestris, umbellatus 1. Thal. Icon. viij. Trachelium Gramineum, minus, non crenatum, flore cæruleo Barr. Icon. 524. Prior Icon. Barr. ex Thal. l. c. Alteram ex plantâ vivâ sculpsit; hanc junio florentem in Apenninis Aprutii apud Amatricenses in Monte Cardito eruebat. Tota planta, inquit, vix palmo altior radice gilvâ, longâ, lactescente, perenni tereti cespitosâque nititur, ex quâ folia plurima erumpunt Graminea, tres quatuor vel quinque uncias longa, tenui lanugine hispida, in caule breviora. Flores Trachelii, cærulei.

87. Campanula pratensis, flore conglomerato C. B. Pin. 94. Rapunculus caliculatus Barr. Icon. 523. n. iij. Rapunculus sylvestris, umbellatus 2. Thal. Icon. viij. Icon. Barr. ex Thal. l. c.

88. Rapunculus spicatus, albus C. B. Pin. 92. Raii Hist. 743. Rapunculum alopecurum, flore albo, Italicum Barr. Icon. 892. la Raiponce. In Monte Pilato agri Lugdunensis aliisque Galliæ montibus provenit.

89. Rapun.

89. Rapunculus corniculatus, cæruleus, montanus, major, Italicus *Barr. Icon. 526*. Rapunculus corniculatus, cæruleus, minor *Barr. Icon. 525*. Rapuntium corniculatum, montanum *Col. part. 1. 224. Raii Hist. 744*. Rapunculus folio oblongo, spicâ orbiculari *C. B. Pin. 92. Icones Barr. ex Col. l. c. Ex Apenninis habuit Barr.*

90. Rapunculus Alpinus, corniculatus *C. B. Pin. 93. Prodr. 33. Trachelium minus, petraeum, Ponæ Barr. Icon. 889. Pon. Bald. Ital. 174. Clus. Hist. cccxxxvi. Icon. Barr. ex Pon. l. c.*

91. Rapunculus montanus, Gramineus, corniculatus, *Barr. Icon. 523. n. 1. Rapuntium angustifolium Col. part. 2. 26. Raii Hist. 745. Rapunculus folio Gramineo Inst. R. Herb. 113. Icon. Barr. ex Col. l. c. In monte Divæ Virginis apud Hirpinos in Regno Neapolitano observavit Barr.*

92. Rapunculus Creticus seu Pyramidalis altera *C. B. Pin. 93. Raii Hist. 737. Petromarula, Rapunculum Creticum Imperati, Valerianæ foliis Barr. Icon. 1154. & Imper. 668. Icon. Barr. ex Imp. l. c.*

93. Rubia Cretica, incana, Buxi folio, seu rotundifolia, incana *Barr. Icon. 519. Tota planta Rubiam sativam refert, sed tota albicat; folia ejus Buxo similia, supernè ex albo virentia, infernè incana, firma, rigida, plana, glabra, quina aut sena circum caulem adnascentia. Caules quadrati & geniculati. Flores fructusque non vidit: sicca enim planta è Promontorio vulgò Cap de Spada Insulæ Candia ad Barrelierum missa.*



94. Aparine minima, flore albo *Barr. Icon. 58. Radice pollet unicâ subtor-tuosâ, tres uncias longâ, mediocri, obsoletè rubente, raris fibris capillatâ, è cujus capite plures humi spargit cauliculos supinos, ramosos, exiles, infirmos, quadrangulos, geniculatos, striatos, asperos, qualis est tota planta, sex foliis verticillatim nascentibus per intervalla vestitos, brevibus, angustis & asperis. Ramorum extrema floribus comantur albis, exiguis, quadrifidis, & quandoque quinquefidis, quibus succedunt Lapposâ semina aspera, hirsuta, grisea, & gemina. Annua est planta cujus fere magnitudinem habes in figurâ. Crescit in arvis locisque incultis, circum Villam Sancti Pastoris supra Gallicani oppidum in Latio.*

95. Aparine villosa. Gallium villosum *Barr. Icon. 81. Gallium villosum, erectum. Boec. Mus. part. 2. 110. Tab. 86. Folia fert Molluginis, minora & breviora, Gallio vulgari albo latiora, mollia, villosa, cineracei coloris, stellatim & densè circa cauliculos disposita; cauliculi pariter lanuginosi & canescentes desinunt in densam spicatamque paniculam florum pallidorum, & ita cum foliis intermixtorum ut panicula cinerea potiusquam pallida videatur. Perennis est planta. Occurrit juxta fontem Lentisci in Valle quâ Valentiâ ad Carthusiam Portæ cœli iter est. Eandem aut saltem congenerem observabat Barr. in viâ quæ Barcinonæ ducit Girundam vulgò Gironnes, in Catalauniâ.*

96. Aparine supina, pumila, flore cæruleo *Inst. R. Herb. 114. Asperula flore carneo, acuto folio Barr. Icon. 541. n. 1. Rubia parva, flore cæruleo, se spargens I. B. 3. 719. Raii Hist. 483. Asperula cærulea, supina, latifolia Barr. Icon. 766. Ludit hæc planta foliis modo latioribus, modo strictioribus. Latiore folio gaudentem reperiebat apud Gabios juxta Gallicanum in vineis.*



97. Gallium arvense, flore cæruleo *Inst. R. Herb. 115. Asperula erecta, cærulea, incana, angustifolia Barr. Icon. 765. Rubia cærulea, erectior, elatiorve I. B. 3. 719. Raii Hist. 483.*

98. Gallium album, minimum, *αυανόσπερον Barr. Icon. 57. Exilis & humilis planta vix palmo altior, supina, ramosa, cujus radix tenuis, brevis, subrubens, fusca & annua; caules glabri, geniculati, foliis octo circiter angustissimis,*

B ij capillaribus,

capillaribus, femunciâ vix longioribus coronati, per intervalla ramosi, quorum extrema effusam in umbellam desinunt florum brevissimis & capillaribus pediculis insidentium, exiguorum, alborum, quadrifidorum, quibus succedunt semina gemina, scabra, nigricantia & exigua.

99. *Gallium album Linifolium*. *Rubia lævis*, *Linifolia*, floribus albis *Barr. Icon. 354*. *Rubia lævis*, *Linifolia*, floribus albis *Montis Virginis Bocc. Musf. part. 2. 83. Tab. 75*. *Rubia lævis*, *Linifolia* *Montis Virginis Barr. Icon. 583*. Tota planta glabra est, lævis, erecta. Folia sunt Lini sed longiora & nonnihil angustiora, glabra, lætè virentia, septem aut octo adnata circa caulem quadratum, pedalem & bipedalem, teretem, geniculatum. Cauliculi in ramos plurimos in summo dividuntur, plurimis onustos floribus candidis quibus succedunt semina gemina. Radix serpens, geniculata, luteola, tenuior quàm *Rubia vulgaris*. In saltibus nemoribusque *Montis Virginis Regni Neapolitani*, medio in monte nascentem vidit, quod florebat in horto *Conventus Divi Francisci de Observantiâ Tarvisii urbis ditionis Venetæ*. Nos in monte *Ventoso* prope *Avenionem* Augusto mense florentem invenimus: Ibique folia nonnihil angustiora sunt quàm in *Icone Barr.*



100. *Cruciata major*, villosa, flore *Molluginis albo Barr. Icon. 324*. *Cruciata* floribus paniculatim nascentibus *Inst. R. Herb. 115*. *Rubia* semine duplici, hispido, latis & hirsutis foliis *Bocc. Rar. Plant. 10*. In *Monte Pilato* agri *Lugdunensis*, Julio mense florentem collegimus.

101. *Cruciata minor*, glabra, flore *Molluginis albo Barr. Icon. 323*. *Rubia quadrifolia*, semine duplici hispido *I. B. 3. 718*. *Cruciata Lusitanica*, latifolia, glabra, flore albo *Inst. R. Herb. 115*. In *sylvâ Montelli* observavit *Barr.*

102. *Cruciata palustris*, alba *Inst. R. Herb. 115*. *Gallium aquaticum*, flore albo *Barr. Icon. 82*. *Gallium palustre*, album *C. B. Pin. 335. Raii Hist. 481*. Ludit foliis quinis aut senis, unde *Galliorum* familiæ potest adscribi.

103. *Cruciata marina*, villosa, minor, duriuscula *Barr. Icon. 542*. Ex radice rubescente, tenui & tenuissimis fibris secundum longitudinem capillatâ sex aut octo exeunt furculi tenues, villosi, quadrati, quatuor aut quinque ad summum uncias longi, crebris per singula internodia foliis quaterno numero decussatim vestiti. Folia vix quartam unciae partem longa, lineâ latiora, rigidiuscula, è viridi albicantia, hispida, oris secundum longitudinem nonnihil pronè convolutis & reflexis. Tota planta vix *Icone* major densis villis albescebat prorsus, necdum floruerat. In littore *Ostiensis* occurrebat *Barr.*

104. *Cruciata Alpina*, latifolia, lævis *Inst. R. Herb. 115*. *Rubia minor*, quadrifolia, atrovirens *Barr. Icon. 547*. *Rubia major*, quadrifolia, atrovirens *Bocc. Musf. part. 2. 83. Tab. 75*. *Rubia quadrifolia*, Italica, hirsuta *I. B. 3. 717*. Siccam plantam accepit *Barr.* Boccone *Iconem* suam à *Barreliero* mutuatus est, ramumque tantum *Rubia sylvestris Monspesulanæ, majoris I. B.* addidit.

105. *Cruciata muralis*, minima, montana *Col. part. 1. 297*. *Asperula obtusifolia Barr. Icon. 541. n. 11*. *Rubia quadrifolia*, verticillato semine *I. B. 3. 719*. *Valantia quadrifolia*, verticillata *Att. Acad. Reg. Paris. ann. 1706. 86*. Circa *Massiliam & Monspelim* crescit.



106. *Quamoclit* foliis tenuiter incisfis & pennatis *Inst. R. Herb. 116*. *Convolvulus pinnato folio*, muriceo Gelsemini flore *Barr. Icon. 60*. *Convolvulus pennatus exoticus*, *Quamoclit Col. part. 1. lxxij*. *Quamoclit* sive *Jasminum Americanum Clus. Cur. Poster. fol. 5. Raii hist. 730*. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.*



107. *Hyoscyamus Creticus*, sulfureo flore, medio atropurpureo *Barr. Icon. 248*.

248. *Hyoscyamus major*, albo similis, umbilico floris atropurpureo *Cor. Inst. R. Herb. 5. la Jusquiamé de Candie*. Circa Monspelium crescit. Vires vid. in *Hist. Raii 711.*

108. *Hyoscyamus Indicus*, Solani folio, flore atropurpureo *Corvini Barr. Icon. 247.* *Hyoscyamus Ægyptius*, Betæ folio, flore luteo, intus atropurpureo *Lippi*. Ex Indiâ delatum fuisse dicebat *Corvinus*, pictumque communicabat *Barreliero*. Ab aliquot annis in Horto Regio colimus, semine à D. *Lippi Medico* ex Ægypto ad nos missò. Sicque descripsérat *Lippi*. Caules ex radice longâ, albidâ, & fibrosâ promit bipedales, plurimos, parvi digiti cassitie, densos, succulentos, erectos, quibus adnascuntur folia alterna pediculo satis longo donata, Tabaci vel Betæ foliis satis similia, succulenta pariter, leviter crenata, uncias duas longa, vix fescunciâ latiora. Summis cauliculis flores enascuntur monopetali, anomali, extus virescentes, intus atropurpurei, lineis flavescensibus virgati & calyce inclusi, ut alii *Hyoscyami*. Calycem sustinent folia alterna pariter sed minora, breviorique nixa pediculo. In Ægypto cum iret ab oppido *Rossète* ad Cairum, collegit *Lippi*.



109. *Stramonium longioribus aculeis Barr. Icon. 1172.* *Stramonium ferox Bocc. Rar. Plant. 50. Raii Hist. 748.* Vires *Stramonii* vide in *Hist. Raii l. c.*



110. *Centaurium minus*, Vulgare, flore albo, latifolium *Barr. Icon. 424.* *Centaurium minus*, flore albo *C. B. Pin. 278. I. B. 3. 353. Raii Hist. 1092.* *La Petite Centaurée à fleur blanche.* Vires vide in *Hist. Raii 1093.*

111. *Centaurium minus*, angusto prælongoque folio, flore rubello *Barr. Icon. 435.* *Centaurium minus*, *Linariæ* folio longiori *Inst. R. Herb. 122.*

112. *Centaurium minus*, leptophyllum, polyanthes, accenso acutoque flore *Barr. Icon. 436. Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 43.* *Centaurium minus*, *Linariæ* folio breviori *Inst. R. Herb. 122.*

113. *Centaurium minus*, purpureum, angustifolium *Barr. Icon. 423.* *Centaurium minus*, *Linariæ* folio brevissimo *Inst. R. Herb. 122.* A vulgari differt foliis & floribus. Folia enim huic longa, angustiora & Liniformia, juxta radicem humifusa, vix dodrantem uncia longa, lineam lata, in extremo acuta, in caule bina, opposita decussatim, raraque per intervalla adnascencia, arrectaque. Cauliculi quinque vel sex, recti, teretes, quadranguli & semipedales. Flores quàm in vulgari triplo majores sunt & fere dodrantem uncia diametro suo æquantes. Sapor idem ac in vulgari.

114. *Centaurium minus*, ramosum *Barr. Icon. 1242.* *Centaurium minus*, spicatum, flore rubro *H. R. Par.* Pictum communicabat *Barreliero* *Eques Corvinus*.

115. *Centaurium luteum*, perfoliatum *C. B. Pin. 278. Raii Hist. 1093.* *Centaurium minus*, perfoliatum, luteum, umbellatum *Barr. Icon. 515. n. 1.* *Centaurium minus*, perfoliatum, luteum crassioribus capitellis *Barr. Icon. 516. n. 11.* *Centaurium minus*, perfoliatum, luteum, non umbellatum, rarioribus & crassioribus floribus capitellis *Barr. Icon. 516. n. 111.* Has tres varietates in *Maritimis Portûs Ostiensis* observabat *Barr.*

116. *Centaurium minus*, luteum, latifolium, non perfoliatum *Barr. Icon. 468.* Brevis, lignosâ pallenteque è radice cauliculum emittit biuncialem aut triuncialem, angulosum, foliis vestitum per intervalla binis, latis, oblongis, acutis, cœsis, è cœruleo virentibus, ut in perfoliato sed longè minoribus, nec perfoliatis, etsi latiusculâ basi caulibus hæreant. Flores aurei, stellati, quinquefidi, calyce comprehensi viridi & quinquefido. Floribus succedunt capsulæ angulosæ, pulverulento semine refertæ. Juxta pontem *Salarium* in collibus aridis ad Orientem secundum *Tyberim* & *Albulam*, quâ confluunt, positus *Romæ* florens eruebat *Barr.*

117. Centaurium minus, luteum, angustifolium, non perfoliatum *Barr. Icon. 467.*

118. Centaurium minus, luteum, Alsinoides, Polonicum *Barr. Icon. 1156.*
n. 1. Eques Corvinus communicavit Barreliero.



119. Plantago trinervia, latifolia, minor, incana, Hispanica *Barr. Icon. 745. Plantain d'Espagne.* Radice est crassiusculâ, longâ, raris fibris capillatâ, è quâ erumpunt multa folia incana, lanuginosa, argentea, trinervia, fescunciam longa, unciâ vix latiora. Spicæ parvæ & Plantagineæ. Tota planta vix Icone major, tota incana tenuique pubens lanugine. Hispaniæ est indigena.

120. Plantago major, spicâ foliosâ, Italica *Barr. Icon. 746.* Plantago Rofea *Lob. Adv. 128. I. B. 3. 503.* Ex agro Urbevetano ad Barrelierum missa.

121. Plantago angustifolia, lanuginosa, incana *Barr. Icon. 750.* Plantago villosa seu incana, lanuginosa *C. B. Pin. 189.* Plantaginis angustifoliæ, trinervia vulgari planè similis est, villis, lanugine & magnitudine solum discrepat. Prima enim hujus folia humifusa, crispa, contorta, latiora & breviora, albâque & longâ lanugine villosa, incana, & ita obducta ut nervi non appareant; quæ tamen lanugo in aliis è medio surgentibus foliis sensim rarior fit, foliaque angustiora, longiora, paulò virentiora, & glabriora seu minus villosa fiunt. Spica uncialis palmari nudoque adnata pediculo. Radix perennis, in varia capita divaricatur fibris albidis capillata. In pratis ad confluentes usque Tyberim & Albulam, protensis, juxta aquam Acetosam frequens post feniscea, Plantaginis vires vide in *Hist. Raii 879.*

122. Plantago angustifolia, serrata, Hispanica *Barr. Icon. 749.* Plantago angustifolia, serrata, Hispalensis *C. B. Pin. 189.* E radice crassâ cervice in multas crassiores & longas fibras divisâ & capillatâ, folia edit multa, angusta, trinervia, per oras acutè serrata, virentia, glabra, ex quorum medio spicæ nudæ Plantagineæ surgunt. Occurrit in Montibus de la Sierra Morina, non procul ab oppido *Almadevar* Castiliæ novæ, & circa Cordubam. *Barr. Circa Hispalim observavit Clusius Cur. Post. fol. 34.*

123. Plantago Cretica, minima, tomentosa, caule adunco *Cor. Inst. R. Herb. 5.* Leontopodium legitimum Imperati *Barr. Icon. 1225. Imper. 672.* Holosteum seu Leontopodium Creticum *C. B. Pin. 190. Prodr. 98. & Raii Hist. 881. Icon. Barr. ex Imper. l. c.*



124. Rubeola maxima, incana, latifolia. Rubia minor, quadrifolia, incana *Barr. Icon. 548.* Pedalibus quandoque altius assurgit cauliculis quadratis, albidis, geniculatis, glabris, non nihil tamen scabris, qui foliis per singula genicula vestiuntur per oras leviter scabris, incanis, quaternis & quinis, quorum quæ inferiora, majora, longiora & acutiora; & quæ summis cauliculis hærent, minora & rotundiora, quina & sena; singula dura, coriacea & firma. Ex medio extremæ foliorum umbellæ flos surgit singulari pediculo nixus, oblongus, ad oras divisus, & rubeus. Ex Apenninis Aequicolorum eruta in horto suo Romæ alebat *Barr.*

125. Rubeola latiore folio *Inst. R. Herb. 130.* Rubia minor, spicata *Barr. Icon. 520.* Rubia spicata, latifolia, Imperati *Barr. Icon. 549. Imp. 666. I. B. 3. 727. & Raii Hist. 485. Icon. Barr. bis repetita & desumpta ex Imp. l. c.*

126. Rubeola angustiore folio *Inst. R. Herb. 130.* Rubia spicata, angustifolia *Barr. Icon. 550. C. B. Pin. 334. Prodr. 145.* Circa Monspelium frequens occurrit.

127. Rubeola maritima *Inst. R. Herb. 130.* Rubia marina, strigosior, flore rubello *Barr. Icon. 355.* Rubia maritima *C. B. Pin. 334. Dod. Pempt. 357. & Raii Hist. 485.* In maritimis Valentiaæ flore rubello reperiebat. *Barr. Icon. tamen ex Dod. l. c.*



128. *Trachelium azureum*, umbelliferum *Pon. Bald. Ital. 44.* *Valeriana cærulea*, *Urticæ folio Barr. Icon. 683.* *Cervicaria Valerianoides*, cærulea *C. B. Pin. 95.* Romæ locis humidis umbrosis, & muris fontium gaudet in Monte Cælio. Oritur quoque in Regni Valentini deserto vulgo *la Murtha* sex circiter ab urbe Valentia leucis, locis humidis, juxta pontem Monasterio Divi Hieronymi vicinum, ibique flore est quandoque candido.

129. *Trachelium umbelliferum*, violaceum, foliis laciniatis *Inst. R. Herb. 130.* *Valeriana cærulea*, altius incisa, *Urticæ folio Barr. Icon. 684.* *Valeriana Urticæ folio*, flore violaceo *Corn. 23.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



130. *Valeriana montana*, minor, integris foliis, Italica *Barr. Icon. 868* *Valeriana Alpina*, foliis integris, radice repente, inodora *Raii Hist. 389.* Radice est crassa, in alias minores divisâ & perenni, è quâ multa & supina emit tit folia unciali pediculo annexa, crassiuscula, rotunda, & Cochleariæ rotundifoliæ formâ, in medio concava, quæ summum attingunt paulò longiora, acutiora, per oras integra, trinervia. In hortum translata caulem emisit do drantalem, vixque pedalem, è cujus geniculo tria folia aliis inferioribus lon giora & angustiora adnascebantur. Caulis in summo trifidam latamque in um bellam desinebat, quam duo folia angusta, minoraque fulciebant. Flores erant purpurascens & *Valerianæ sylvestri* majori prorsus similes. Ex Apenninis Aprutii que Montibus in hortum secum Romæ transtulerat Barr.

131. *Valeriana Alpina*, Saxatilis, minor, flore albo *Barr. Icon. 742.* *Valeriana Alpina*, *Scrophulariæ folio C. B. Pin. 164. Prodr. 87. & Raii Hist. 390.* In summis Apenninorum jugis umbrosis crescit Barr.

132. *Valeriana bulbosa*, suaveolens, Italica, Imperati *Barr. Icon. 867.* *Imp. 659.* *Valeriana Cretica*, Fili pendulæ radice *Inst. R. Herb. 131.* *Valerianæ bulbosæ de Candie.* *Icon. Barr. ex Imp. l. c.*

133. *Valeriana tuberosa* Imperati seu Telephii radice *Barr. Icon. 825.* *Imp. 656. I. B. 3. 204. & Raii Hist. 390.* *Icon. Barr. ex Imp. l. c.*



134. *Valerianella Cornucopioides*, flore galeato *Mor. Umb. Valeriana minor*, *Cornucopioides*, rubra, Hispanica *Barr. Icon. 741. n. 11.* *Valeriana peregrina*, purpurea *C. B. Pin. 164. Prodr. 87. & Raii Hist. 394.*

135. *Valerianella Cornucopioides* flore albo. *Valeriana minor*, *Cornuco pioides*, alba, Indica *Barr. Icon. 741. n. 1.* Prioris varietas.



136. *Buglossum Sylvestre* *Barr. Icon. 326.* *La Buglose sauvage.*

137. *Buglossum Sylvestre*, angustifolium *Barr. Icon. 325.*

138. *Buglossum Sylvestre*, minus, flore azureo, radice perenni, Italicum *Barr. Icon. 333.* Ex Umbriæ montibus habuit. Hujus & superiorum descriptio nes non invenimus in scriptis Barr.

139. *Buglossum angustifolium*, semine echinato *Inst. R. Herb. 134.* *Echioi des minus*, globoso echinato & singulari semine *Barr. Icon. 1246.* *Cynoglos sum minus C. B. Pin. 257. I. B. 3. 600.*

140. *Buglossum minus*, angustifolium, flore violaceo, albo umbilico, Ita licum *Barr. Icon. 1207.* *Buglossum Creticum*, majus flore cæruleo purpurante *H. R. Par. Circa Romam* crescit.

141. *Buglossum scorpioides*, hirsutum, flore cæruleo, Italicum *Barr. Icon. 403. & Bocc. Mus. part. 2. 163. Tab. 130.*

142. *Buglossum angustis dentatis foliis* *Inst. R. Herb. 134.* *Anchusa angustis*

stis dentatis foliis, Hispanica *Barr. Icon. 578. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 77.*

143. Buglossum fruticosum, Rorismarini folio *Inst. R. Herb. 134.* Anchusa lignosior Monspeliensium, flore violaceo *Barr. Icon. 1168.* Anchusa angustifolia *C. B. Pin. 255. Raii Hist. 496.*

144. Buglossum luteum, annuum, minimum *Inst. R. Herb. 134.* Echium luteum, minimum, Hispanicum *Barr. Icon. 1254.* Anchusa lutea, minor *I. B. 3. 583. & Raii Hist. 497.* Monspeli circa Cellam novam & in sterilibus, *la colombiere*, provenit. Buglossi vires vide in *Hist. Raii 493.*



145. Echium lato Plantaginis folio, Italicum. Lycopsis lato Plantaginis folio, Italica *Barr. Icon. 1026.* *La Viperine à feuilles de Plantain*, Radice nititur crassâ, brachiata, longâ, albâ & leviter interdum inæqualiterque rubente; ex quâ multa prodeunt folia sex aut octo, unciali pediculo quandoque longiori adnata, Plantaginis instar venis distincta, molli lanugine leviter hispida; è quorum medio caulis assurgit durioribus pilis & punctis nigris hispidus & variegatus, quem folia alterna cingunt, angustiora, pediculo destituta, ad basim latiora & veluti amplexicaulia, non tamen ex toto caulem cingentia, sensim minora angustioraque. Summus caulis in tres aut quatuor florum thyrsos dividitur ut in Echiiis. Florum autem gemmæ antequam explicentur, lætâ purpurâ rubent, explicatæ purpureo-violaceo colore tinguntur, striis ab oris ad fundum ductis è cæruleo cæsiis, albicantibus, saturè & dilutè violaceis eleganter variantur. Flos explicatus tubulus est unciam quandoque longus, & semuncialis diametri, ad oras quinque crenis inæqualibus constans: Ex ejus fundo quinque enascuntur stamina rubentia, sursum reflexa, incurva, suis apicibus infernè nigricantibus & supernè cæsiis onusta; in medio stylus uncialis dilute rubeus & albescens. Maio mense florebat in agro Romano. Pro diversâ soli naturâ folia magnitudine variant, ut plurimum duas uncias lata, & tres longa præter pediculum qui in humi stratis & primis foliis uncialis & fescuncialis est longitudinis: Superiora longè breviora mollique pubent lanugine.

146. Echium maritimum, Insularum Stœchadum, flore maximo *Inst. R. Herb. 136.* Lycopsis spatulæ folio, Hispanica *Barr. Icon. 1012.* Lycopsis spatulæ folio, Hispanica & Sicala *Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 78.* Hujus & sequentium descriptiones non invenio.

147. Echium Rorismarini folio *Inst. R. Herb. 136.* Lycopsis angustifolia, minor, Hispanica *Barr. Icon. 1011. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 78.*

148. Echium foliis angustis & villosis *Inst. R. herb. 136.* Anchusa angustis, villosis foliis, Hispanica *Barr. Icon. 577. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 78.*



149. Pulmonaria flore parvo, carneo, intus reflexo. Buglossum Sylvestre, minus, flore carneo, parvo, retuso *Barr. Icon. 1253.* Crassâ & Buglossi radice donatur è fulvo nigricante, intus albâ, ramosâ & glutinosi saporis. Ex eâ surculi multi sursum exeunt rotundi, hirsuti, ramosi & pedales, è medio foliorum humifusorum emergentes; quæ folia Buglossi referunt faciem & colorem, minora, nec digito longiora aut latiora, juxta exortum angusta, in extremo obtusè ut plurimum acuta, plana, integra, nec dentata, nec sinuosa aut crispantia, pilis tamen hispida; ubi in caulem assurgunt, sensim breviora, ad basim latiora, & amplexicaulia, nonnihil obtusiora & alterna: Adultiore caule & in ramos floresque abeunte marcescunt caduntque inferiora. Flores in thyrsos densiores congesti, è virenti, brevi & quinquesido calyce emergentes carnei, in quinque lobulos rotundos superius dividuntur, quorum loborum summa in se intusque colliguntur, reflectuntur & in globum contrahuntur. Tubulum
floris

floris seu umbilicum occupant quinque flamina crassiuscula albaque, totidem apicibus rotundis albisque onusta. Deciduo flore superest stylus albus & supereminet. Nondum semen maturuerat, cum occurrit. Sub Æquinoctium Vernum Romæ florebat viâ quæ à Basilicâ sanctæ Mariæ Majoris recta ducit ad Basilicam sanctæ Crucis in Hierusalem, inter arbores in fossarum aggeribus, nec ullibi usquam observata.



150. Lithospermum palustre, minus, flore cæruleo *Inst. R. Herb. 137*. Lycopis montana, cærulea, seu Buglossum minimum, montanum *Barr. Icon. 404*. Echium scorpioides, palustre *C. B. Pin. 254*. *Raii Hist. 504*. Variat hæc planta in aridis vix Icone altior, in humidis & paludosis cubitalis est.



151. Heliotropium medium, strigosius, Italicum *Barr. Icon. 219*. Heliotropium majus, Siculum, amplo flore odorato *Bocc. Rar. Plant. 90*. *L'herbe aux Verrues à grande fleur.*



152. Cynoglossum montanum, minus, angustifolium, purpureum *Barr. Icon. 334*.



153. Omphalodes Lusitanica, Lini folio *Inst. R. Herb. 140*. Linum album, Blattariæ flore, semine discofo *Barr. Icon. 1234*. Linum umbilicatum *Park. Theat. 1687*. & *Raii Hist. 496*.



154. Anagallis Hispanica, latifolia, maximo flore *Inst. R. Herb. 142*. Cruciatâ montana, minor, flore cæruleo *Barr. Icon. 584*. *Le Mouron d'Espagne à grandes fleurs*. Hanc vivis coloribus depictam communicavit Barreliero Eques Corvinus.



155. Veronica mas, surrecta, elatior, seu Lysimachia spicata, cærulea *Barr. Icon. 891*. Veronica spicata, longifolia *Inst. R. Herb. 143*. Lysimachia spicata, cærulea *C. B. Pin. 246*. *Raii Hist. 845*. *La Veronique mâle, droite.*

156. Veronica mas, recta, latifolia, spicâ cæruleâ *Barr. Icon. 682*. Veronica spicata, latifolia *C. B. Pin. 246*.

157. Veronica mas, recta, angustifolia, spicâ cæruleâ *Barr. Icon. 681*. Veronica spicata, angustifolia *C. B. Pin. 246*. Veronicæ vires vide in *Hist. J. Bauh. 3. 284*. & in *Hist. Raii 845*.



158. Blattaria flore albo Corvini *Barr. Icon. 1249*. Blattaria flore albo *I. B. 3. app. 874*. *L'herbe aux Mittes à fleur blanche*. Pictam communicabat Barreliero Eques Corvinus.



159. Lycopersicon fructu striato, duro *Inst. R. Herb. 150*. Malum Æthiopicum, fructu cristato, striato, duro, coccineo *Barr. Icon. 1108*. Mala Æthiopica *Dod. Pempt. 459*. *Ger. Emac. 347*. & *Raii Hist. 673*.



160. Alkekengi fructu parvo, verticillato *Inst. R. Herb. 151*. Solanum majus, vesicarium, Coralloides *Barr. Icon. 149*. Solanum somniferum, verticillatum

C. B. Pin. 166. & Raii Hist. 682. Le Coqueret à petites bayes rangées comme par anneaux le long de la tige.

161. Alkekengi Indicum, majus Inst. R. herb. 151. Solanum vesicarium, annuum, erectum Barr. Icon. 151. Solanum sive Halicacabum Indicum I. B. 3. 609. & Raii Hist. 681. Le Coqueret des Indes.

162. Alkekengi Virginianum, fructu luteo Inst. R. Herb. 151. Solanum vesicarium, annuum, procumbens Barr. Icon. 152. Alkekengi sive Halicacabum Virginense Park. Theat. 463. & Raii Hist. 681. Le Coqueret de Virginie.

163. Alkekengi Indicum, minimum, fructu virescente & luteo Inst. R. Herb. 151. Solanum vesicarium, minimum, baccâ luteâ Barr. Icon. 1129. & Bocc. Mus. part. 2. 63. Tab. 51. Solanum vesicarium, Indicum, minimum H. L. Bat. Fructus hujus primum viridis, dum maturefcit subluteus, Alkekengi vires vide in Hist. Raii 681.



164. Melongena fructu oblongo, luteo Inst. R. Herb. 151. Melanzana seu Melongena fructu primum albo, dein flavo Barr. Icon. 1109. Solanum pomiferum, fructu oblongo, luteo C. B. Pin. 167. Raii Hist. 670. La Mayenne ou Melongene à fruit long.

165. Melongena fructu rotundo Inst. R. Herb. 151. Malum Æthiopicum, fructu luteo; An Mandragora Theophrasti Barr. Icon. 30. Solanum Pomiferum, fructu instar Mali rotundo C. B. Pin. 617. La Mayenne à fruit rond.



166. Pimpinella maxima, Canadensis, longius spicata Barr. Icon. 739. Pimpinella maxima, Canadensis Corn. 174. La Pimprenelle de Canada. Icon. ex Corn. l. c.

167. Pimpinella Agrimonoides, odorata Barr. Icon. 692. & H. R. Par. Pimpinella Agrimonoides Mor. H. R. Blef. Bocc. Rar. Plant. 58. La Pimprenelle à feuille d'Aigremoine.

168. Pimpinella spinosa seu Poterium quorumdam Barr. Icon. 631. Poterium quibusdam seu Pimpinella spinosa I. B. 1. part. 2. 409. Pimpinella spinosa, seu semper virens Mor. Umb. 57. La Pimprenelle épineuse. Pimpinellæ vires vide in Hist. Raii 401.



169. Arum Ægyptiacum, vulgatum, rotundâ minorique radice Barr. Icon. 667. Arum multiflorum, Ægyptium Col. part. 2. 1.

170. Arum Ægyptium, rotundâ crassâque radice Barr. Icon. 668. Colocassia Ægyptia, florida Vesling. Observ. 38.

171. Arum Ægyptium, longâ radice Barr. Icon. 669. Colocassia macroriza, idest longâ radice P. Alp. Exot. 230.

172. Arum Ægyptium, transversâ & repente radice Barr. Icon. 670. Culcas, Faba Ægyptia P. Alp. Ægypt. 102.

173. Arum minus, Nymphææ foliis, esculentum Sloan. Cat. Plant. Jam. 62. & Raii Hist. 3. 577. Taiaoba Ari species, Brassica Brasiliensium Barr. Icon. 1084. Taiaoba Brasiliensibus Pison. 95. Marcgr. 35. Choux Caraïbe du Tertre.

174. Arum minus, esculentum, Sagittariæ foliis è viridi-nigricantibus Sloan. Cat. Plant. Jam. 63. Raii Hist. 3. 577. Taiaoba altera Ari species, Brassica Brasiliensium Barr. Icon. 1085. Taiaoba 2. Pison 95. Marcgr. 36.

175. Arum caulescens, Cannæ Indicæ foliis Plum. 45. fig. lxj. Aninga Iba Brasiliensium, Ari facie Barr. Icon. 282. Aninga Iba Marcgr. 106. Aninga Pison. 103. Ex autoribus citatis Icones suas desumpsit Barr.

176. Arum palustre, Arundinacæ radice H. L. Bat. Dracunculus palustris, Polonicus Corvini Barr. Icon. 574. Dracunculus palustris Dod. Pempt. 331. Pi-
ctum

Ætium communicabat Eques Corvinus. Dodonæi figura accuratior eâ Barrelieri.

177. Arum Scorzonera folio *Inst. R. Herb. 160.* Arisarum angustifolium, majus *Barr. Icon. 284.* Arisarum angustifolium *I. B. 2. 787. Clus. Hist. lxxiiij & Raii Hist. 1211.* In sylvis umbrosis Italiæ crescit, flos sæpius atropurpureus. *Icon. Barr. ex Clus. & J. Bauh. l. c. Ari vires vide in Hist. Raii 1208.*



178. Dracunculus polyphyllus *C. B. Pin. 195. & Raii Hist. 1211.* Serpentaria digitata, vulgaris, fructu rubro *Barr. Icon. 147. La Serpentaire.* Vires vide in *Hist. Raii l. c. & apud. J. Bauh. tom. 2. 789.*



179. Serpentaria digitata, major, Indica, fructu pallido *Barr. Icon. 148.* Hiucca seu Mismaitb *Hernand. 378. Icon. Barr. ex Hernandez Historiâ l. c.*



180. Arisarum serpentinum, rotundiore folio, radice globosâ, Italicum *Barr. Icon. 573.* Globosâ est radice seu olivari, verrucosâ, circularibus lineis fasciatâ, juxta verticem exiguis albisque fibris capillatâ, aliisque crassioribus & transversis quibus repit & sese propagat. Folia subrotunda sunt, Violæ figurâ, sed carnosiora, circulari sulco circum oras prætexta, atrovirentia, nervo medio obliquisque venis variè distincta & rugosa, inter quæ surgit palmaris pediculus colubrinis maculis variegatus, vaginam sustinens fescuncialem, parvum digitum crassam, è pallido & atropurpureo secundum longitudinem striatam, pictam & cucullatam, & quâ parte hiat pistillumque emittit, deorsum reflexam & obtusam. Pistillum seu Phallus luteus est non rectâ assurgens, sed cum inflexo deorsum cucullo deorsum inflexus, in summo sensim crassiusculus, in imo ad basim versus flosculis pallidis in orbem comosus, qui marcido phallo in uvam rubellam abeunt superioribus congenerem. Tota planta acris est, mordax & urens. Itinere Romano ad Centum cellas, vigesimo ab urbe Mililiari, juxta hospitium quod trans arcem *Poli* ditionis Ducis Braciani, ponti lapideo adjacet, reperiebat *Barr.*

181. Arisarum latifolium, Colubrinum, repens *Barr. Icon. 1130.* Radice nititur grumosâ, inæquali & serpente, albo-sordidâ foris, intus albâ, ex cujus tuberibus folia duo aut tria erumpunt, oblonga, utrinque obtusa duplici sulco circum oras exarata, multis venis & nervis in medio distincta, in supernâ facie saturè, in infernâ lætiùs virentia, palmari pedalique donata pediculo junceo, lævi, rotundo, sub terrâ albo, infirmo & tortuoso, extra terram firmiori, erecto & usque ad medium, serpentum instar, maculato, in reliquâ parte ad foliorum usque insertionem viret. Florem nudus pariter ad cucullum usque variegatus sustinet cauliculus unâ aut alterâ uncia ad summum foliis altior. Vaginatus seu Cucullatus flos ab imâ sui parte ad summum usque ex albo & purpureo viridi secundum longitudinem est striatus, in summo tamen obsoletiori purpurâ discriminatur; parsque superior latiori hiatu diducta est, nec tam inflexa quàm in superiori. Pistillum seu Phallus unciam longus, atropurpureus, sensim usque ad extremum crassior & obtusior, foris incurvus & propendens, non adeò tamen inflexus ac superior. Ad pistilli medium excrescit uva ex confertis acinis rubris constans ut in cæteris. Novembri florebat in horto Barrelieri, & ex Apenninis Trisultique Montibus attulerat.

182. Arisarum latifolium, minus, repens, cespitosum *Barr. Icon. 1150.* Arisarum flore in tenuem caudam abeunte *Inst. R. Herb. 161.* Arisarum minus, proboscideum *Bocc. Mus. part. 2. 61. Tab. 50.* Radice est tenui, tuberosâ, longâ, tereti, albo-sordidâ, lineis transversis fasciatâ & annulatâ, flexuosâ, serpente, ad latera ramosâ & latè se propagante, fragili, vix pennâ anserinâ crassiore, tenuibus fibris depactâ; per singula nodorum germina (quæ frequentia satis)

folia edit tria aut quatuor ad summum, pediculo semipedali donata; infra terram albo, supra viridi, rotundo, succulento & tenui; lata, triangularia, acuta, amplo & longo sinu quâ pediculo hærent, bisulca, tenuia, lætè virentia, lævia, Violæ foliis vix paulò majora, nullo circum oras sulco exarata, mollia & facile marcentia. Sub foliis latet pusilla vagina digitum minimum vix crassa, semuncialis, ad basim rotunda, ex albo & atropurpureo striata, in summo atropurpurea, & deorsum inflexa, quæ in caudam tenuem aliquando uncias quatuor & amplius longam abit. Pistillus semunciam longus, quadrantem uncie latus deorsum nutat, fungosus, violaceus; hujus pistilli pars infima abit in uvam acinis rotundis, albis refertam, superioribus similem. Facies cuculli interior è colore violaceo & purpureo nitet, exterior obsoletiore languescit, venis magis atris striata & sulcata. Folia lætè splendent & cum pediculo vix quinque unciis longiora. Sapor isti acerrimus. In Apenninis altioribus obvia.

183. Arisarum dulce, non lactescens, minus, Brasilianum *Barr. Icon. 283. Taiaoba 3. Marcgr. 36. Pison 95.*

184. Arisarum majus, Caulescens, aquaticum, Brasilianum *Barr. Icon. 281. Aninga Iba Pison. 103. Arum arborescens, Sagittariæ foliis Plum. 44. fig. lx. Ex Pifone hæc ultimas deprompsit Icones Barr.*



185. Rapuntium maximum, coccineo, spicato flore *Col. in Rech. 880. Raii Hist. 746. Rapunculum coccineum, Americanum, vulgò Cardinalis planta Barr. Icon. 1147. La Cardinale couleur de feu.*



186. Bignonia Americana, Fraxini folio, flore amplo, phæniceo *Inst. R. Herb. 164. Gelseminum Clematites, flore igneo, amplo, seu Virginianum Barr. Icon. 59. Gelseminum hederaceum, Indicum Corn. 102. & Raii Hist. 1768. Le Jasmin de Virginie.*



187. Digitalis VerbasCIFolia, purpurea, minor, perennis, Hispanica *Barr. Icon. 1183. Digitalis Hispanica, purpurea, minor Inst. R. Herb. 165. Digitalis angusto VerbasCI folio, montana Bocc. Mus. part. 2. 107. Digitalis VerbasCIFolia Ejusd Tab. 85. La Digitale d'Espagne à petites fleurs rouges. Hæc in singulis suis partibus vulgari minor. Vires Digitalis vide in Hist. Raii 767.*



188. Scrophularia montana, maxima, latifolia, flore luteo *Barr. Icon. 273. Scrophularia flore luteo C. B. Pin. 236. Prodr. 112. & Raii Hist. 765. La Scrophulaire à fleur jaune.*

189. Scrophularia aquatica, montana, mollior *Barr. Icon. 274. Scrophularia Betonica folio Inst. R. Herb. 166. Scrophulariæ vires vide in Hist. Raii 765.*



190. Antirrhinum latifolium, pallido, amplo flore *Barr. Icon. 655. & Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab. 41. Varietas Antirrhini flore luteo. Le Musle de Veau à fleur pâle.*

191. Antirrhinum majus, angustifolium, amplo flore purpureo, Romanum *Barr. Icon. 638. Antirrhinum Hispanicum, altissimum, angustissimo folio Inst. R. Herb. 168. A vulgari distinguitur foliis multò angustioribus, vix sextantem uncie latis, quâ parte latiora sunt, idest in medio ad utrumque extremum acutis, duas uncias longis, per ramos plurimis, densis & alternis. Caulis in multos densosque dividitur ramos, quorum extrema in longam florum purpureorum spicam*

spicam desinunt. Floris color varius, modò albus, modò lacteus, purpureus, vel vinosus. In Italiâ agroque Romano observabat Barr. Turnefortius & D. Goiffon in Hispaniâ collegerunt.

192. Antirrhinum majus, saxatile, angustissimis foliis, flore purpurascente, minori Barr. Icon. 637. Folia huic tenuiora, strictiora & capillacea. Flos minor.

193. Antirrhinum minus, albo, amplo flore Barr. Icon. 656. Antirrhinum medium, flore albo, patulo V. Lusit. Ex radice annuâ, albâ, contortâ, divisâ, minore caulem edit pedalem quandoque cubitalem, unicum, rectum, ramosum, tenui lanugine pubescentem quâ radici jungitur; ut enim altius assurgit, totus glaber est, nitidè lætèque virens, alternis, angustis & duas tresve uncias longis foliis vix sextantem uncia latis, quandoque latioribus nonnihil & longioribus vestitus. E foliorum alis secundum caulem & in extremis ramis flores oriuntur longo pediculo donati, nivei, rictu lineis purpureis striato cui aureus hæret pulvis; minores quàm in præcedentibus, & majores quàm in sequentibus. Floribus succedunt fructus Calvariam Vitulinam referentes semineque prægnantes tenui. Sapor toti plantæ acerbus & nonnihil astringens. Sub Arcem Vaticanam ad Septentrionem in pratis & alibi in agro Romano occurrit.

194. Antirrhinum minus, flore carneo, elatius Barr. Icon. 652. Antirrhinum arvense, majus C. B. Pin. 212. & Raii Hist. 760. In Vineis Romanis colligebat Barr. frequens etiam in Vineis Galliæ.

195. Antirrhinum minus, flore carneo Barr. Icon. 651. Varietas prioris.

196. Antirrhinum saxatile, Serpilli folio glabro, flore purpurascente. Orontium Saxatile, Serpilli folio glabro, flore purpurascente Barr. Icon. 1100. Hujus & sequentium descriptiones non invenio.

197. Antirrhinum saxatile, Serpilli folio angustiore, villoso & unctuofo. Orontium saxatile, Serpilli folio angustiore, villoso & unctuofo Barr. Icon. 1101.

198. Antirrhinum saxatile, Thymi folio, flore rubello. Orontium saxatile, Thymi folio, flore rubello, Barr. Icon. 1313.

199. Antirrhinum saxatile, villosum, folio Origani glutinoso Barr. Icon. 598.

200. Antirrhinum minus, villosum, angustifolium, purpureum. Orontium minus, villosum, angustifolium, flore purpurascente Barr. Icon. 758. Annua & exilis planta palmo non major, caule recto, ramoso, folioso; foliis angustis, uncia non majoribus, villosis, ad singulos ramulorum nodos binis & ternis. Cuilibet ramulo insidet flos purpureus uncialis tenui fultus pediculo. Flori succedit fructus Antirrhinis superioribus rotundior & est rostri minus prominentis. In Vineis Pontis Milvii & juxta Tyberim Junio & Augusto floret.



201. Linaria purpuro-violacea, major, non repens, Italica Barr. Icon. 1021. Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin. 213. & Raii Hist. 756. La Linairé odorante à fleur couleur de pourpre.

202. Linaria annua, purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus Bot. Monsp. Chamælinaria violacea, Italica Barr. Icon. 1162. Linaria cærulea, calcaribus longis I. B. 3. 461. In agro Romano sparsim occurrit Barr.

203. Linaria Hispanica, Nummulariæ folio villoso Inst. R. Herb. 169. Antirrhinum saxatile, minus, Origani folio viscoso & villoso, flore albo amplo Barr. Icon. 597.

204. Linaria saxatilis, Alsines folio villoso Inst. R. Herb. 169. Orontium saxatile, Alsines folio, unctuofo & villoso, flore albo Barr. Icon. 1102.

205. Linaria saxatilis, Polygoni folio villoso Inst. R. Herb. 159. Orontium saxatile, angusto Alsines folio villoso & unctuofo, flore albo Barr. Icon. 113. Linariæ vires vide in Hist. Raii 754.



206. Pedicularis Chamædryos folio. Trixago Chamædryos foliis Barr. Icon. 774. n. 1. *Pédiculaire à feuille du petit Chesne.*

207. Pedicularis maritima, folio oblongo, ferrato Inst. R. Herb. 172. Trixago altiùs ferratis foliis Barr. Icon. 774. n. 11. Antirrhinum album, ferratis foliis I. B. 3. 437. Raii Hist. 770.

208. Pedicularis versicolor, spicata Inst. R. Herb. 172. Aleætorophos Italica, versicolor, spicata Barr. Icon. 666. Ex radice annuâ, lignosâ, rufescente & in varias fibras divisâ caulis surgit unicus, rectus firmusque & quadratus, pedalis & sesquipedalis, foliis vestitus binis & oppositis ex adverso, alternoque situ cruciatim & uncix intervallo à se invicem sejunctis, nullo pediculo nixis, ad basim latioribus, & amplexicaulibus, oblongis, angustis, obtusè & altiùs ferratis, rugosis, sulcatis, quorum crenæ inæquales, & incurvæ. E caulis vertice & è foliorum alis flores eminent spicæ in modum denso & alterno situ congesti, pro plantæ mole magni, personati, in duo labia hiantes; quorum labium superius in duos lobos divisum, inferius in tres lacinias incisum est, mediâ lacinia lateralibus minore. Versicolores ut plurimum sunt isti flores, labiis scilicet inferioribus albis aut luteis, galeâ vero rubellâ, interdum pallidè aut è pallido albentes, modo candidi. Stylum oblongum deorsum inflexum concomitantur quatuor stamina trientem uncix longa, suis armata apicibus flori concoloribus & albicantibus. Floribus succedunt pericarpia oblonga, globosa, è lateribus compressa, acuminata foliisque duobus cristatis sulcatis, & inæqualibus obvoluta, & tenui semine referta flavicante. Tota planta tenui canescit lanugine & nonnihil est viscosa & suaveolens. Sapore est amaro & acri. Maio & Junio mensibus floret in incultis locis circa Romam. Flores separati in Icone Barr. inversi sunt.

209. Pedicularis lutea, viscosa, ferrata, pratensis Inst. R. Herb. 172. Aleætorolophos Italica, luteo-pallida Barr. Icon. 665. Euphrasia lutea, latifolia, palustris Raii Hist. 772. & Synops. 162. A superiori distinguitur floribus & caule huic quandoque ramoso. Tota planta viscidior, magis glutinosa & acriuscula. In agro Romano circa Pontem Salarium sub finem Junii florere cœperat. Barr. Nos in Normanniâ circa urbem Saint-Lô, & in Britannia Armorica Septembri in pratis paludosis & humentibus invenimus.

210. Pedicularis Alpina, Asphodeli radice, flore albo. Aleætorolophos montana, flore albo Barr. Icon. 469. Aleætorolophos montana, flore albo, luteo Bocc. Mus. part. 1. Tab. viij n. 2. Filipendula montana, flore Pediculariæ C. B. Pin. 163. Raii Hist. 771. In Editoribus Moroni montibus Junio florebat, flores modò purpurei, modò albi.

211. Pedicularis serotina, purpurascens flore Inst. R. Herb. 172. Euphrasia sylvestris, major, purpurea Barr. Icon. 276. n. 11. & Col. part. 1. 202. Euphrasia pratensis, rubra C. B. Pin. 234. & Raii Hist. 772. Icon Barr. ex Col. l. c.

212. Pedicularis purpurea, annua, minima, verna Inst. R. Herb. 172. Euphrasia vulgaris, latifolia, atropurpurea Barr. Icon. 276. n. 111. Euphrasia purpurea, minor. C. B. Pin. 234. Prodr. 111. Bot. Monsp. & Raii Hist. 774.

213. Pedicularis alba, annua, minima, verna Inst. R. Herb. 172. Euphrasia vulgaris, vera, flore albo Barr. Icon. 276. n. 1. Superioris varietas.

214. Pedicularis minima, polyclonos, humifusa. Euphrasia rotundifolia, forte Alsine, an Anthylloides rotundifolium? Barr. Icon. 275. Anthylloides rotundifolia, sicula, Euphrasiæ floribus rubentibus Bocc. Mus. part. 2. 34. Tab. 24. Nec hujus nec sequentis descriptionem invenio.

215. Pedicularis Hispanica, vermiculato folio. Euphrasia vermiculato folio, Hispanica Barr. Icon. 1204. & Bocc. Mus. part. 2. 76. Tab. 63.



216. *Melampyrum luteum*, comâ cæruleâ, Bauhini *Barr. Icon. 769. n. 1.* *Melampyrum cæruleâ* comâ *C. B. Pin. 234. & Raii Hist. 775.* Circa Gratianopolim provenit, in Sylvulâ juxta Eremum Sancti Augustini, & eundo ad *Sapet*, viâ quæ ducit ad Majorem Carthusiam.

217. *Melampyrum luteum*, comâ albâ Bauhini *Barr. Icon. 769. n. 2.* *Melampyrum comâ albâ C. B. Pin. 234.* *Melampyro affinis*, *Parietaria cærulea* quorundam, comâ penitus candidâ, *I. B. 3. 440.* Prioris varietas.

218. *Melampyrum minus*, purpureum, *Trixaginis folio Barr. Icon. 1045.* & *Bocc. Mus. part. 2. 63. Tab. 51.* Descriptum non invenio.



219. *Ageratum minus*, saxatile, flore albo *Barr. Icon. 1192.* *Ageratum ferratum*, *Alpinum*, glabrum, flore albo *Inst. R. Herb. app. 651.* Varietas *Agerati purpurei* *Lugd. 1184.*



220. *Anblatum* flore è rufo candicante, sive *Anblatum Cordi Cor. Inst. R. Herb. 48.* *Dentaria major*, ἀφύλλος *Orobanches facie Barr. Icon. 80.* *Orobanche radice dentatâ*, major *C. B. Pin. 88. & Raii Hist. 1229. Cord. Hist. 89.*



221. *Phlomis fruticosa*, *Salviæ folio Inst. R. Herb. 177.* *Stachys fruticans*, vulgaris, flore aureo, seu *Verbascum Salvifolium*, fruticosum, flore luteo. *Lobellii Barr. Icon. 406.* *Verbascum latis salviæ foliis C. B. Pin. 240. & Raii Hist. 511.*

222. *Phlomis fruticosa*, *Lusitanica*, flore purpurascente, foliis acutioribus *Inst. R. Herb. 178.* *Stachys fruticosa*, repens, purpureo flore *Barr. Icon. 405.* A superiori discrepat radice tenuiori, repente, lateque se furculis propagante; furculis magis contortis, sparsis, humilioribus, mollioribus & flexilioribus; foliis rugosioribus, strigosioribus, magis asperis, ex basi latiori in acumen tenuius desinentibus, supernè virentibus, infernè canescentibus: floribus porrò minoribus, purpureis, & paucioribus numero. Junio Julioque mensibus florebat in Regni Valentini deserto Murrhenfi.

223. *Phlomis fruticosa*, candidissima, flore ferrugineo *Inst. R. Herb. 178.* *Stachys fruticans*, latifolia, tomentosa, flore ferrugineo *Barr. Icon. 1322.* Fruticat hæc duorum cubitorum & ampliùs altitudine, lignosis virgultis. Caules ejus quadrati, denso tomento hispidi, & nivei, ut & folia quæ ad singulos nodos bina ex adverso opposita & decussatim ordinata, triplo majora quàm in superiori, *Betonicæ* vel potius *Stachydis latifoliæ* formâ, è rotundâ sinuosâque circa pediculum quo cauli adhærent, basi, in longum acumen obtusum se explicantia, tres quandoque uncias lata, & quatuor longa, sed adeò crassâ densoque tomento farta rectaque, ut panni lacinias lævissimas mollissimasque potius diceres quàm folia. Floris magnitudinem naturalem habes in Icone expressam; color ejus est è luteo gilvus seu ferrugineus & obsoletus. Pictor pediculum filiorum longiorem facit, brevi enim hærent folia pediculo. In Regni Valentini fruticosis saltibus ad radices Montium viâ quæ *Aiorâ* *Setabitam* ducit, Maio florebat.

224. *Phlomis Lychnitis Clus. Hist. xxvij.* *Stachys prælongo angustoque folio*, flore luteo; *Phlomis Lychnitis Clusii Barr. Icon. 1321.* *Verbascum angusto Salviæ folio C. B. Pin. 240. & Raii Hist. 511.*



225. *Horminum sylvestre*, hirsutum, *Lampfanæ folio*, flore cæsis *Barr. Icon.*

Icon. 199. Horminum sylvestre, latifolium, verticillatum *C. B. Pin. 238. Raii Hist. 546. L' Hormin.*

226. Horminum Creticum, comâ purpuro-violaceâ *Barr. Icon. 1233.* Horminum comâ purpuro-violaceâ *I. B. 3. 309.* Flores in Icone Barrelieri majores sunt quàm solent, unde pro exoticâ plantâ habuit.

227. Horminum minus, subrotundo, scabro folio *Barr. Icon. 207* Radix illi tortuosa, crassâ nonnihil, fissaque & in alias tenuiores divisa. Folia ima atrovirent, subrotunda, rugosa, per oras crenata hispidaque sunt, in supremo caule longiora. Summis è caulibus quadrangulis parvos edit flores violaceos, & aliorum formâ. Sub finem Augusti florebat in agro Romano viâ Lauretanâ, secundùm rivulum quem vulgò *Aquam transversam* vocant, non procul à pratis per quæ in Tyberim mergitur, & alibi passim in glareosis locis provenit.

228. Horminum sylvestre, minus, inciso folio, flore azureo *Barr. Icon. 208.* Horminum sylvestre, lavandulæ flore *C. B. Pin. 239. & Raii Hist. 545.* Folia huic humi decumbentia, rugosa, atrovirentia, longa & per oras sinuosa ac crenata. Flores cœrulei modò, modò cœruleo-violacei, nunc albi. Radix longa, nonnihil crassa, fusca & corticosa. Romæ in agrorum viarumque marginibus frequens.

229. Horminum sylvestre, inciso folio, cæsis flore, Italicum *Barr. Icon.*

220. Horminum Verbenæ laciniis, angustifolium *Triumf. 66.* Radice potitur longâ, crassâ, multiplici, nigrâ, corticosâ, scabrâ & lignosâ, quæ ex capite multa fundit humi folia parva, lætè virentia, sinuosa, dentata; quorum prima ferè integra & Salviæ formâ, alia verò altiùs incisa & sinuosa, longissima vix parvo digito longiora. Cauliculi quadrati & villosi desinunt in thyrsum florum brevem è tumidis, virentibus, striatis, per oras radiatis patentibusque conflatum, calycibus, è quibus flores prodeunt exigui, cæsi, quorum pars superna cœrulea est, inferna verò albida. In Icone habes ferè magnitudinem totius plantæ. Mense Aprili florebat solo glareoso & arenoso in Campaniâ Romanâ, Romæ pariter viâ ad tres fontes Divo Paulo sacros. Hieme (inquit *Triumf. l. c.*) faciem mutat; parvula enim & abortiva minores crassiores magisque hirsutos edit caules, æstate verò elatiores majoresque.

230. Horminum minus, Betonicæ folio, flore purpureo *Barr. Icon. 167.* Horminum minus, Betonicæ folio, flore purpureo Bauhini Prodr. *Bocc. Mus. part. 1. Tab. v. n. 13.* Multa fert. humifusa folia Betonicæ formâ & magnitudine, crenata, in extremo obtusa, longo hærentia pediculo, rugosa, glabra, è quorum medio duo aut tres sursum assurgunt cauliculi recti, quadrangulares, cruciatim binis & binis secundùm longitudinem distincti foliis & florum verticillis ex alis foliorum emergentibus, quorum ex calycibus enascuntur flores purpurei. *Horminum Betonicæ folio Bauh. Prodr.* flore est albo. Vid. Prodr. 115.

231. Horminum hæmatodes, minus, flore purpureo *Barr. Icon. 168.*

232. Horminum subrotundo folio, flore cæsis, Hispanicum *Barr. Icon. 200. & Bocc. Mus. part. 2. 30. Tab. 13.* Folia huic lata, subrotunda, rugosa, aspera hispidaque, in ambitu ferrata, nonnihil sinuosa circa pediculum; caules nonnihil villosi, quadranguli, cubito majores, in quorum extremis spica verticillata infidet. Flores cæsi sunt coloris seu ex albo cœrulei, quibus succedunt semina quatuor rotunda, contenta in fundo calycis rigidi, asperi, villosi, patente orâ, fundoque angusto & in quatuor acumina divisi. Tota planta suave olet. In Hispaniâ, Valentia apud Patres Ordinis F.F. Prædicatorum observavit *Barr.* Hormini sclareæque vires vide in *Hist. Raii 543.*



233. Sclarea laciniatis foliis *Inst. R. Herb. 179.* Æthiopis laciniatis, foliis *Barr. Icon. 188.* Ab Æthiopide *Dod. Pempt. 148.* & Æthiopide laciniato folio *C. B. Prodr. 115.* differt foliis amplioribus, profundius incisis & sinuosis, semen habuit ex horto Reg. Blæf.

234. *Sclarea Asphodeli radice* *Inst. R. Herb. 179.* Horminum Sylvestre majus, hæmatodes, glabrum, flore cæruleo, Italicum *Barr. Icon. 185.* Radicem habet crassam, tortuosam, lignosam, longam & divaricatam; folia palmi dodrantem longa, circa basim & pediculum quatuor aut quinque uncias lata, glabra, rugosa, sed lato virore nitentia, sanguineis tamen maculis nullâ lege aut ordine sparsim cruentata, in caule sensim minora & angustiora, per oras leviter dentata, in extremo acuta; flores magni cærulei. In colle arenoso quâ itur à Basilicâ Divi Pauli ad tres fontes, in descensu, meridiem versus invenit Barr.

235. *Sclarea Syriaca*, flore albo *Inst. R. Herb. 179.* Horminum sylvestre, majus, flore albo, integris foliis *Barr. Icon. 187.*

236. *Sclarea maxima*, Bœtica, annua, floribus dilutè cæruleis *Inst. R. Herb. 179.* Horminum sylvestre, majus, hastato folio, flore cæcio, Hispanicum *Barr. Icon. 186.* Ex radice longâ, brachiata & corticosâ caules promit quadratos bicubitales & tricubitales, foliis vestitos palmum longis & amplioribus quandôque, juxta basim latis & sinuosis, angulosis auritisque, in longam & acutam cuspidem desinentibus, inæqualiter in ambitu ferratis & crispantibus, palmari juxta radicem articulatis pediculo, in caule breviori. Flores fert tres aut quatuor, modò plures, ex singulis spicæ verticillis enascentes, pediculo fultos, cæcios aut dilutè cæruleos, in duas partes scissos, quarum superior, longior & falcata, inferior verò trifida. Stylus pariter falcatus, staminibus geminis stipatus. Calyx striatus, villosus, acuminibus quinque dentatus. Semina ut in aliis. Inter urbem *Almagro* & *Almadovar* Oppidum Castiliæ novæ observavit Barr. cum è Castiliâ in Bœticam tenderet.

237. *Sclarea folio lanceolato*, Hispanica. Horminum Hispanicum, foliis *Herbæ venti*, flore cæruleo *Barr. Icon. 1317.* Folia fert semipalmum longa, & ampliora, duas uncias lata, quandôque angustiora in caule scilicet, *Herbæ venti* Lobelii foliorum formâ, scabra, aspera, hispida, per oras serrata, lanceolata & unciali nixa pediculo. Caules quadranguli, floribus ornati verticillatim nascentibus, cæruleis, quorum magnitudinem & formam habes in Icone expressam. Radix longa & lignosa. Tota planta Horminum olet, nec ingratum spirat odorem. In Regno Valentino septem leucis ab urbe Valentia, ad Austrum in loco mari vicino, quem vulgò *la Murtha* vocant, locis aridis & desertis occurrit Barr.



238. *Dracocephalon Americanum* *Breyn. Prodr. 1. 34.* *Lyfimachia gale-riculata*, spicata, purpurea, Canadensis *Barr. Icon. 1152.* *Pseudodigitalis* foliis dentatis, Persicæfoliis. *Bocc. Rar. Plant. 11. Raii Hist. 769.*



239. *Brunella latifolia*, Italica, flore carneò *Barr. Icon. 562.* *La Brunelle d'Italie à fleur couleur de chair.* Ex multis, tenuibus & filamentosis radicibus folia oriuntur plurima, in orbem humifusa, latifolia, oblonga, obtusè turbinata, ad basim latiora & circa pediculum sinuosa, glabra, lævia & obscuro virore nitentia, inter quæ erumpunt supini & repandi subindè cauliculi alias etiam fibrosas radices juxta genicula humi agentes, binis ex adverso vestiti foliis, & in ramos divisi, è foliorum alis exeuntes, quorum summa desinunt in capitula spicata, quàm in vulgari Brunellâ nonnihil breviora, sed satis similia. Flores dilutè sed latè è carneò rubent, è glutosis utriculis emergentes; subamari & astringentis saporis. Romæ juxta mœnia à Portâ Pincianâ ad Piani protensa umbrosis locis gaudet, & in viâ ad sublacum Oppidum, superatis montibus, sesqui milliari infrâ, ad nemoris oras obvia. Brunellæ vires vide in *Hist. Raii 552.*



240. Galeopsis purpurea, latifolia. Lamium purpureum, biflorum, Polonicum *Barr. Icon. 1220.*

241. Galeopsis angustifolia, flore variegato *Inst. R. Herb. 185.* Cannabis spuria, angustifolia, variegato flore, Polonica *Barr. Icon. 1158.* Utrumque Barreliero communicabat Eques Corvinus.

242. Galeopsis Hispanica, frutescens, Teucrii folio *Inst. R. Herb. 186.* Teucrium fruticans, amplo & albo flore, Italicum *Barr. Icon. 895.* Lamium fruticosum, non maculatum, Creticum *Zan. 112. Fig. xlvj Raii. Hist. 561.* In sepulchris antiquis, & in Hippodromi Romani ruinis viâ Appiâ, & ad ostia Tyberina reperitur, nec non circa Terracinam ad radices cujusdam Arcis antiquæ, ducentis ab urbe passibus.



243. Stachis alba, latifolia, major *Barr. Icon. 297.*

244. Stachis alba, latifolia, minor *Barr. Icon. 280.*

245. Stachis alba, angusto salviæ folio *Barr. Icon. 279.*

246. Stachis nigra *Barr. Icon. 298.* Hæc Stachides descriptas non invenio in scriptis Barrelieri.



247. Leonurus Canadensis, Origani folio *Inst. R. Herb. 187.* Origanum Canadense, fistuloso flore purpureo *Barr. Icon. 1221.* Origanum fistulosum, Canadense *Corn. 14. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



248. Pseudodictamnus actabulis Moluccæ *C. B. Pin. 222. Raii Hist. 558.* Dictamnus falsus, verticillatus, pericarpio choanoide, Creticus *Barr. Icon. 129.*

249. Pseudodictamnus Hispanicus, amplissimo folio candicante & villoso *Inst. R. Herb. 188.* Marrubium Hispanicum, rotundifolium, album, majus, seu latifolium *Barr. Icon. 767. & Bocc. Mus. part. 2. Tab. 123.* Marrubium subrotundo folio *Ejusd. Mus. part. 2. 167. Le faux Dictame d'Espagne à feuilles blanchâtres & velues.*

250. Pseudodictamnus Creticus, verticillatus, odoratus. Dictamnus Creticus, verticillatus, odoratus *Barr. Icon. 130.* Folia huic quàm in superioribus crassiora, tomentosa, nivei planè candoris, brevi adnata pediculo, bina ex adverso opposita, cordata, vix dodrantem uncia lata, nonnihil longiora, subrotunda, mollia, lævia, nullis venis aut nervis signata. Cauliculi incanâ lanugine pubescunt, quadrati, fragiles, ex quorum extremis verticillatæ exeunt denso ordine spicæ albentes, hispida, & lanugine adeò densâ tectæ, ut vix verticillorum divisio & utriculorum seu calycum numerus & situs dignoscantur, nisi propius ope microscopii inspiciantur. Calyces ut in Pseudodictamno per oras in quinque acumina radiati, denso bombyce hispidi, ex quibus flores emergunt labiati, albi, faucibus dilutè violaceis. Recens odoratus dicitur; Siccus tamen nihil sapit. E Cretâ Siccum ramulum accepit *Barr.*



251. Lycopus foliis in profundas lacinias divisus *Inst. R. Herb. 191.* Marrubium aquaticum, incanum, profundè incisis foliis *Barr. Icon. 154.*



252. Sideritis latifolia, repens, flore albo. Marrubium repens, flore albo, exoticum

exoticum *Barr. Icon. 768.* Fibrosâ è radice humi statim fundit folia, spargitque in gyrum varios ramos quadrangulos, hirsutos, in alios ramulos divisos, binos ex adverso è foliorum alis enascentes. Folia erumpunt per ramos opposita, Melissæ satis similia, sed minora & breviora, nonnihil obtusâ, obtusèque per oras crenata, propè pediculum sinuosa, quinque ut plurimum nervis, seu sulcis exarata, rugosa & scabra, pediculo nixa in imis foliis biunciali, in editioribus sensim breviora. Flores albi sunt in rictum hiantes labiatum, quorum superius labium bifidum est, contortum & retrò sursumque reflexum, à latere singularibus lineis purpureis brevibusque pictum; inferius verò integrum, planum & sursum nonnihil antrorsumque incurvum est, ac pallefcit. Fauces interiores atro purpureis maculis sunt variegatæ. E rictu florum quatuor stamina exeunt purpurea suis atro-purpureis onusta apicibus. Flores ut in vulgari Sideritidi spicatum & verticillatum ex foliorum alis nascuntur. Semen illi parvum, rotundum & nigrum. Vivam plantam communicabat Barreliero Eques Corvinus.

253. Sideritis hirsuta, brevi acutoque folio, albo flore *Barr. Icon. 1046.* Hujus & sequentis descriptionem non invenio.

254. Sideritis Cretica, tomentosa, candidissima, flore luteo *Cor. Inst. R. Herb. 12.* Stachis Lychnoides, incana, angustifolia, flore aureo, Italica *Barr. Icon. 1187.* *La Crapaudine de Candie à fleur jaune.*

255. Sideritis montana, Scordioides, tomentosa *Barr. Icon. 1160.* Sideritis foliis hirsutis, profundè crenatis. *C. B. Pin. 233. & Raii Hist. 553.*

256. Sideritis montana, Scordioides, glabra *Barr. Icon. 343.* A superiori distinguitur glabritie & lævi nitore quo virent folia, cauliculis quoque altioribus & magis ramosis erectioribusque.

257. Sideritis montana, trifido folio *Barr. Icon. 171.* Folia huic Hyssopo similia, sed in extremo singulari utrinque dente ferrata, seu tricuspidata, dodrantem unciae longa, lineam lata; Flores in spicam verticillatam congeruntur. Cætera ut in vulgari Sideritide.

258. Sideritis montana, Hyssopifolia, major *Barr. Icon. 329.* Distinguitur à Sideritide Alpina, Hyssopifolia Bauhini foliis integris; à sequenti foliis multò longioribus.

259. Sideritis montana, Hyssopifolia, minor *Barr. Icon. 172.* A lignosâ radice, è saxorum rimis erumpente lignosos ramososque edit furculos inæquales, nodosos, obliquos, & nonnihil supinos, in alios tenuiores ramulos divisos, incanos, quadratos, nodosos, erectos, quaternos & quinos, ex eodem ferè exortu emergentes, foliis vestitos Hyssopi planè formâ, arrectis, acutis, vix semunciam longioribus, angustisque sensim, juxta extremum minoribus, binis ex adverso oppositis & integris. Flores in spicam verticillatam congesti sunt, ex calycibus acutis & ferratis emergentes.

260. Sideritis montana, vermiculato folio *Barr. Icon. 344.* Sideritis Hispanica, foeditissima, glabra, flore purpurascens, & comâ canescente *Inst. R. Herb. 192.* A superioribus discrepat foliis minoribus, angustioribus, acutioribusque; eorum namque majora vix semunciam longa, medium lineæ, aut lineam lata, per oras æqualia, in caulibus dodrantalibus, aut semipalmariibus lignosis, quadratis, incanâ lanugine pubentibus, ramosis & geniculatis bina opposita & decussatim ordinata; è quorum alis minora germina densis magisque canescentibus foliis congesta sursum cum foliis sese erigunt. Extrema Surculorum, per internodia satis laxa, verticillati cingunt flores labiati, purpurascens, ex calycibus duris aculeatisque emergentes.

261. Sideritis Hispanica, erecta, folio angustiore *Inst. R. Herb. 191.* Hyssopus montana, verticillata major *Barr. Icon. 239. & Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 67.* Folia huic in erectis, gracilibus, angulosis incanisque furculis Lavandulæ similibus, rara & semuncialia per intervalla, bina & opposita, angusta, obtusè acuta, è viridi canescentia & semunciam longa. Extrema Sur-

culi desinunt in tres aut quatuor verticillos inter se discretos & latiusculos, è quorum calycibus flores purpurascèntes & labiati erumpunt.

262. Sideritis Hispanica, erecta, angustiore folio, minor. Hyssopus montana, verticillata, minor. *Barr. Icon. 240.* Surculi huic vix semipalmares, lignosi, tenuiores tamen & infirmiores, foliis vestiti parvis & incanis, formâ superiorem referentibus. Florum verticilli floresque minores sunt quàm in præcedenti. Has omnes Sideritidis species ex plantâ siccâ plerumque descripsit & depinxit Barr.



263. Marrubium album, sericeo parvo & rotundo folio *Barr. Icon. 685.* & *Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 69.* Marrubium album, Hispanicum, majus *Barr. Icon. 686.* Marrubium Hispanicum, supinum, foliis sericeis, argenteis *Inst. R. Herb. 192. Le Marrube d'Espagne a feuilles soyeuses & argentées.*



264. Melissa sylvestris, hirsuta, major, Italica *Barr. Icon. 1222.* & *Bocc. Mus. part. 2. 166. Tab. 117.* Melissa Italica, hirsuta *ejusd. Mus. part. 1. Tab. viij.* Melissa Romana, hirsutior *Mor. H. R. Bles. auct. 286.* Melissa sylvestris, hirsutior, minus odorata *Raii Hist. 571. La Melisse d'Italie velue & moins agreable.* A vulgari distinguitur foliis multò latioribus, hirsutioribus, & minus grætè olentibus. Porro altiùs surgit. In Hetruriâ propè Liburnum portum copiosa est. Melissæ vulgaris vires vide in *Hist. Raii 570.*



265. Calamintha montana, præstantior, flore purpureo *Barr. Icon. 398.* & *Bocc. Mus. part. 2. 45. Tab. 40.* Calamintha magno flore *C. B. Pin. 229.* & *Raii Hist. 569. Le Calament de Montagne à fleur purpurine.* Vide vires in *Hist. Raii l. c.*

266. Calamintha Pulegii odore, minor, Italis Mentuccia minore ò Neptella *Barr. Icon. 1166.* Hujus & sequentis descriptionem non invenio.

267. Calamintha parvo, oblongo obtusoque folio. Marum Hispanicum, parvo, oblongo, obtuso folio *Barr. Icon. 689.*

268. Calamintha incana, Ocimi foliis *C. B. Pin. 228. Raii Hist. 569.* Marum Thymifolium, incanum, spicatum, crenato folio, Pulegii odore, Hispanicum *Barr. Icon. 690.* & *Bocc. Mus. part. 2. 61. Tab. 50.*



269. Clinopodium Lusitanicum, spicatum & verticillatum *Inst. R. Herb. 195.* Prunella odorata, Lusitanica, flore violaceo *Barr. Icon. 561.* Bugula odorata, Lusitanica *Corn. 46. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



270. Thymus capitatus, qui Dioscoridis *C. B. Pin. 219.* & *Raii Hist. 519.* Thymum Creticum, incanum, capitatum *Barr. Icon. 897. Le Thim de Crete.*

271. Thymus capitatus, Hispanicus. Thymum cephalotum, Hispanicum *Barr. Icon. 302. Thim d'Espagne.* Pedalis est suffrutex lignosus & perennis, subincanus, à superiori discrepans foliis viridibus & capitulis multò minoribus. Flores edit purpurascèntes. Circa Hispalim Novembri mense collegit Barr.

272. Thymus capitatus, Hispanicus, congestis foliis. Satureia spicata, minor, tenui Laricis folio, Hispanica *Barr. Icon. 1251.* Surculi huic recti, quadrati, albicantes, rariores, in rectos oppositosque ut plurimùm ramos divisi, quos angusta & quadrantem uncia longa, Laricis more congesta folia, rara per intervalla vestiunt. Spicæ huic breves & minores quarum flores non vidi. Sapor illi acris & ad Thymbram montanam aliquantulum accedens.

273. Thymus Lusitanicus, cephalotos, squammis capitulorum amplioribus *Inst.*

Inst. R. Herb. 196. Tragoriganum Dictamni capite, Hispanicum *Barr. Icon. 788. & Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 43.* Suffrutex est elegans lignosus, dracunculalis, tortuosus, glaber, nodosus, rufescens, in ramos rotundos, tenues, binos, oppositos per singula internodia & erectos, foliis vestitos binis, oppositis, angustissimis, sed sensim latiusculis cum altius & ad caput floremque assurgunt; infra verò vix lineas duas lata, acuta incanaque & tenuia; superiora autem latiora multa & glabra spicam squammatam referunt, ex cujus squammis flores & semina emergunt. Camphoræ saporem & odorem planta sicca retinet. In Regno Valentino observabat Barr.

274. Thymus Lusitanicus, cephalotos, maritimus, glaber & lucidus *Inst. R. Herb. 196.* Thymum sylvestre, frondosum, oblongis foliis, Hispanicum *Barr. Icon. 787.* Caules huic lignosi, tortuosi, supini, nonnihil rubentes, vix semipalmares quibus hærent folia oblonga, acuta, rigida, glabra & ad rubrum vergentia, licet in exortu alba tenuique canescant lanugine, Laricis modò congesta, & opposita, ex singulis ramulorum germinantium ocellis erumpentia. Flores videre non contigit rigente tunc hyeme. Aridis & petrosis Regni Valentini locis gaudet.

275. Thymus cephalotos, minor, breviori folio. Thymum angusto brevique folio. *Barr. Icon. 780.* Crassioribus, lignosis, tortuosisque fruticat furculis rotundis, in alios ramulos incanos, tomentosos tenuioresque divisos, è quibus oriuntur folia confertim congesta, teretia, ex albo virentia, angustissima, vix sesquilineam longa. Florentem videre non contigit, acris est saporis & Mastichen referentis. In Regno Valentino occurrebat.

276. Thymus virens, odore Hirci, Italicus. Thymum hircinum Italicum *Barr. Icon. 887.* Thymi vulgaris modo fruticat, sed humilior & ramosus. Folia edit angusta, utrinque virentia, bina opposita, ex quorum alis alia denso ordine congeruntur. Cauliculi nonnihil rufescunt. Flores fert summis in cauliculis sex aut octo simul congestos, Thymi formâ, ex albo carneos & majusculos. Tota planta validi est odoris & ad camphoram, aut potius ad hircinum accedentis; saporis planè acris & mordicantis. Maio florebat in monte quodam propè castrum Terracinæ.

277. Thymus incanus, Hispanicus, odore Camphoræ. Thymum incanum, camphoratum *Barr. Icon. 778.* Huic surculi sunt recti, glabri, rufescentes, tenues; quibus hærent folia quàm in præcedentibus longiora, erecta, canescentia, minus crassa & carnosa, utrinque acuta & pediculo donata. Majores surculi in tenues, rectos, nudos & decussatim ordinatos ramulos desinunt, quorum in summo inæqualiter insident capitella globosa, ut ex superstite ramulo licuit conjicere. Ramulum appingo tantum ut magnitudinem ostendam. Acris est saporis, & odoris Camphorati. In Regno Valentini collibus saxosis Februario colligebat Barr.

278. Thymus viridi tenuique folio, Hispanicus. Thymum viridi tenuique folio *Barr. Icon. 779.* Vulgari Thymo folia edit nonnihil longiora, acutiora, & Serpillo ferè æqualia, glabris albicantibusque adnata cauliculis lignosis, inflexis ex parte superiore, mollioribus, ac in spicam angustam desinentibus. Flores hujus non vidi, utpote Februario mense decerpti. Acrioris est saporis & odoris Mastichen referentis. In Regno Valentino dum *Origuale* Carboneras peteret, paulò supra oppidum *Slerana* observabat Barr.



279. Thymbra legitima *Clus. Hist. 358. Raii Hist. 519.* Thymum Creticum Ponæ, venticillatum *Barr. Icon. 898. Pon. Bald. Ital. 104.*

280. Thymbra Hispanica, Coridis folio *Inst. R. Herb. 197.* Thymum angusto longiorique folio; An Serpillum Zygis Theophrast. *Barr. Icon. 777.* Serpillum sylvestre, Zygis Dioscoridis *Clus. Hist. 358. Raii Hist. 523.* Regni Valentini indigena est.

281. *Thymbra spicata*, verior, Hispanica *Barr. Icon. 1230*. *Hyssopum montanum*, Macedonicum, Valerandi Dourez *I. B. 3. part. 2. 276*. Surculosa est lignosa, sesquipalmaris, recta, quadrata, rubescens, læviter hirsuta, per intervalla nodosa, imâ sui parte ramulos edente teneros, oppositos, *Thymbrae* foliis vestitos triente uncia vix longioribus, quæ ciliaribus pilis per oras hispida obscurè virentes desinunt iidem in breves florum spicas verticillatas. In surculis majoribus folia majora, uncialia, duas lineas lata, ciliaribus pilis destituta, acuta, mollia, atrovirentia; minora verò quæ spicam glumosam constituunt fescunciâ longam & semunciâ crassam, ciliaribus pilis hircescunt & verticillatim disponuntur. Ex eorum alis flores purpurei emergunt. Acuti est odoris & acerrimi saporis.



282. *Lavandula multifido folio* *Barr. Icon. 798. Clus. Hist. 345. & Raii Hist. 513*. *Lavandula folio dissecto* *C. B. Pin. 216. La Lavande à feuille découpée*. In limitibus Regni Valentini paulò infra locum vulgò dictum *La Venta del Campillo*, supra *Origualam* reperiebat *Barr.*

283. *Lavandula folio serrato*. *Barr. Icon. 797*. *Lavandula foliis crenatis* *Inst. R. Herb. 198. Stachas folio serrato C. B. Pin. 216. & Raii Hist. 514*. In Piceni collibus frequens. *Lavandulae* vires vide in *Hist. Raii l. c.*



284. *Verbena Lamii folio* *Barr. Icon. 1146*. *Verbena Urticaefolia*, Canadensis *H. R. Par. Raii Hist. 536. Quauh Chian Hernand. 399. La Verveine de Canada à feuille d'Ortie*.

285. *Verbena nodiflora*, capite oblongo, seu *Verbenaca nodiflora* *Imperati Barr. Icon. 855. Imp. 673. Verbena nodiflora C. B. Pin. 269. Prodr. 125. & Raii Hist. 536*. Planta est sui generis. *Icon. Barr. ex Imp. l. c. In Regno Valentino Valentiam inter & mare, loco dicto là decà, crescit.*

286. *Verbena nodiflora*, Cretica, Julo longiore *Barr. Icon. 854*. Hæc à præcedenti distinguitur ramis firmioribus, Julisque longioribus & nutantibus. Ex Candiâ ramus depictus ad *Barrelierum* missus.

287. *Verbena Indica*, Myuros *Barr. Icon. 853. Verbena Indica Bont. Hist. 150. Raii Hist. 536. Icon. Barr. ex Bont. l. c. Verbenæ vires vide in Hist. Raii l. c.*



288. *Stachas Arabica*, caule folioso, flore albo, Hispanica *Barr. Icon. 301*. Varietas *Stachados purpureæ*.



289. *Cataria Hispanica*, *Betonicae folio angustiori, flore cæruleo* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha montana, purpurea, major, sparsâ spicâ Barr. Icon. 601. & Bocc. Mus. part. 2. 46. Tab. 36. Mentha Cataria, latifolia C. B. Pin. 228. & Raii Hist. 549. Cataire d'Espagne*. In monte *Seuse* supra *Vapincum* nobis occurrit.

290. *Cataria Hispanica*, supina, *Betonicae folio, tuberosâ radice* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha tuberosa, violacea, spicata, minor, Hispanica Barr. Icon. 602. Menthastrum iij, tuberosâ radice Clus. Hist. xxxiiij.*

291. *Cataria Lusitanica*, erecta, *Betonicae folio, tuberosâ radice* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha tuberosa, spicata, purpurea, Hispanica Barr. Icon. 1131. & Bocc. Mus. part. 2. 44. Tab. 36.*

292. *Cataria Lusitanica*, *Betonicae folio, minor, radice fibrosâ* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha saxatilis, cærulea, minima, Hispanica Barr. Icon. 736.*



& *Bocc. Mus. part. 2. 46. Tab. 36.* Pedalis est Planta è rupium fissuris erumpens, cujus prima folia sunt subrotunda, sinuata, in ambitu parum crenata, superiora oblonga, acutiora & magis sinuosa. Caulis quadratus, pallidè vi-rens, foliis binis ex adverso nascentibus vestitus, ramosus, ramis in spicam ex foliis & verticillis florum conflata definentibus. Flores sunt cærulei. Totà Planta odore gravi prædita est, & ad Moldavicam accedenti.

293. *Cataria minor, Alpina Inst. R. Herb. 202.* Nepetha angustifolia, minor, Hispanica *Barr. Icon. 735.* Nepetha angustifolia, minor, Hispanica & Italica *Bocc. Mus. part. 2. 75. Tab. 61.* Mentha *Cataria*, minor Alpina *C. B. Pin. 228.* & *Prodr. 110. La Cataire des Alpes.* In Monte Ventoso prope Avenionem frequens. *Cataria* vires vide in *Hist. Raii 549.*



294. *Betonica Alpina, incana, purpurea Barr. Icon. 340.* Vulgarem foliorum formâ repræsentat, nisi quòd illa latiora amplioraque sint, & densâ incanâque lanugine pubeant. Flores edit pariter purpureos, sed in spicam crassiore congestos. In monte *la Bouvine* dicto, supra Cœnobium majoris Carthusiæ observavit *Barr.*

295. *Betonica montana, lutea Barr. Icon. 339.* *Betonica montana, lutea, latifolia Bocc. Mus. part. 2. 82. Tab. 72.* Horminum Alpinum, luteum, *Betonica* spicâ *Raii Hist. 547.* Folia huic quàm vulgari latiora, magis subrotunda, villosa, incanâ densâque lanugine pubentia. Caules similiter pubescunt & sustinent spicam florum è luteo-pallidorum, quam in vulgari brevior, sed crassior. In Apenninis montibus invenit *Barr.* nos supra Cœnobium majoris Carthusiæ. *Betonica* vires vide in *Hist. Raii 551.*



296. *Ocimum majus, vulgare Barr. Icon. 1064.* *Ocimum Caryophyllatum, majus C. B. Pin. 226.* Basilica major *Trag. Hist. 31. Le Basilic ordinaire.* Pedale est ramosum, foliis vestitum utrinque acutis, oblongis, fescunciâ plus minusve latis, infrequenter ferratis, colore è viridi pallentibus. Flores albi, è spicis semipalmaribus satis remissis erumpentes. Variat colore viridi, interdum atrorubente. Porro aliàs glabrum, aliàs hirsutum. *Icon. Barr. ex Trag. l. c.* Vires vide in *Hist. Raii 541.*

297. *Ocimum majus Barr. Icon. 1071. & Cam. Epit. 308.* Folia edit oblonga, Amaranthi aut Citrii æmula, tres uncias circiter longa, duas lata, crassa, pinguis, humida, rugosa, sinuosa, lævia, pallidè virentia, splendida, leviter ferrata, statimque caulem in orbem ambientia denso exortu ac velut umbraculum imitantia, rariùs per caulem sparsa, sed potius in imo collecta & expansa. Caulis vix palmo altior, spicis ferè palmaribus, flagelli in modum dispositis, digitum crassis & hirsutis stipatus. Flos albidus, quandòque purpurascens. Odor totius plantæ ad Citreum accedit. Sæpiùs viret, rariùs purpurascit.

298. *Ocimum majus, bullatum Barr. Icon. 1702.* *Ocimum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225.* Superiori simile est, sed folia huic paulò longiora, latiora, bullata, rugis profundis sulcata, sursum convexa, infernè concava, ac veluti crispata, uncias tres lata, & septem longa. Caulis & odor qualis superiori. In hortis Romanis colebatur. *Barr.*

299. *Ocimum majus, Crispum, obtusè ferratum Barr. Icon. 1053.* *Ocimum maximum, latifolium, maculatum C. B. Pin. 225.* A superioribus distinguunt folia profundè ferrata, crispa & plerumque maculata; à sequenti folia rotundiora & minus profundè incisa; spicæ autem longiores sunt.

300. *Ocimum majus, crispum, laciniatum Barr. Icon. 1054.* *Ocimum foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus, maximum H. L. Bat. Le Basilic*

à feuilles de Chêne. Ex radice albâ, satis crassâ, fibris plurimis capillatâ asurgit caulis quadratus, pedalis, foliis onustus variè sparsis, duas tresve uncias latis, tres aut quatuor uncias longis, altiùs ferratis & incisiss, dentatis, oris secundùm longitudinem circumvolutis, Cymbæ in modum complicatis & excavatis, crispis, rugosis & quasi verrucosis, acutis & è viridi obscurè nitentibus. E foliorum alis & extremis ramis per genicula exeunt spicæ palmares rarioribus & laxioribus verticillorum ordinibus compositæ. Flores albi; semen ut in aliis.

301. Ocimum majus, crispum, profundè ferratum, maculatum, oblongâ spicâ *Barr. Icon. 1065.* Ocimum Indicum *Clus. Hist. 350.* A superiori discrepat foliis nec ita crispis, rugosis, & verrucosis, sed atropurpureâ maculâ conspersis. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.*

302. Ocimum majus, crispum profundè ferratum, verrucosum, brevi congestâque spicâ, subrubens *Barr. Icon. 1066. Mor. Hist. Oxon. part. 3. 406. Tab. 20. sect. 11.* Hujus duplex varietas observatur maculati & non maculati. Maculatum caules & spicas fert purpurascens; non maculatum verò virides. Utriusque caulis vix pedalis, ramosus, rarioribus vestitus foliis oblongis, obtusiùs acutis, omninò crispis, velut in globum vel bullam convolutis, in ambitu profundè incisiss, sursum deorsumque complicatis, longo infirmoque innixis pediculo. Spicæ breves & conglobatæ. Flos albus. Odor ejus aliis persimilis. Variat quandòque foliis brevioribus, & minus profundè incisiss & ferratis. Romæ ob elegantiam Fœminam dicunt.

303. Ocimum majus, crispum, leviter ferratum, verrucosum; brevi congestâque spicâ, viride *Barr. Icon. 1063. & Mor. Hist. Oxon. part. 3. 406.* Huic folia nonnihil longiora, læviùs ferrata, & virentia. Florum Calyces hirsuti, & quatuor veluti dentibus ferrati.

304. Ocimum medium, vulgare *Barr. Icon. 1065.* Ocimum vulgatius *C. B. Pin. 225.* Folia edit è viridi albertia, nitentia, crassiuscula, levius vel profundius ferrata. Magnitudinem eorum habes in Icone expressam. Flos albus, spica verò viridis.

305. Ocimum medium, rubrum *Barr. Icon. 1057.* Superiori consimile, sed majus & pedale. Folia nonnihil majora, magis ferrata, rugosa, inæqualia, unâ cum caule & spicis hispidis ex atro purpurascunt virentque. Flores rubent.

306. Ocimum medium, non ferratum *Barr. Icon. 1056.* Foliis tantùm non ferratis à præcedentibus discrepat. Modò viret, modò ex atro purpurascit.

307. Ocimum medium, folio breviori, ferrato *Barr. Icon. 1056.* Folia huic subrotunda, acuminata, sed breviora.

308. Ocimum medium, acuto & verrucoso folio *Barr. Icon. 1058.* Majora illi folia, subrotunda & in oblongum acumen desinentia, duas uncias longa, fescunciam lata, nonnihil crispantia, verrucosa & lætè virentia. Flores albi in brevibus spicis congesti. Dodrantalis est planta, cujus hic ramum damus. Variat quoque foliis, caule, spicis floribusque purpurascentibus.

309. Ocimum medium, crispo & verrucoso folio *Barr. Icon. 1058.* Foliis est rotundioribus, minus acutè acuminatis, leviter ferratis, magis crispis, verrucosis, rugosis, bullatis, quæ maculis variant atropurpureis, inæqualiter & sine ordine utrinque penetrantibus. Caules, spicæ & flores purpurascunt. Spicæ, quàm in superiori, longiores; rarioribus tamen verticillis conflata.

310. Ocimum medium, crispum, ferratum. *Barr. Icon. 1060.* Folia fert minora, crispa, oblonga, utrinque acuta, altiùs ferrata quàm in Icone exprimitur, quàm in superioribus mediis magis crispantia, magis convoluta & ita in se supernè complicata, ut cymbam eleganter effingant.

311. Ocimum minus, vulgare *Barr. Icon. 1069.* Ocimum parvum *Lugd. 681. Le petit Basilic.* Palmare & dodrantale est ramis foliisque densè luxurians parvis,

vis, vix tres lineas longis, & quatuor latis, utrinque acutis, crassis, pingui-
bus, planis, non ferratis & viridibus. Ramuli in exiles spicas abeunt, singu-
las, raris verticillis ac proinde floribus onustas. Flores albi, nec majores præ-
cedentibus.

312. Ocimum minus, ferratum *Barr. Icon. 1067*. Ocimum minimum *J. B. 3. 247. Le petit Basilic*. Folia huic ferrata, villosa; Caules pariter hirsuti. Variat quandoque foliis angustioribus.

313. Ocimum minus, rotundifolium, rubrum *Barr. Icon. 1068. Le petit Basilic violet*. Folio donatur rotundo, quatuor lineas lato, non ferrato, per oras fursum reflexo, crispo & concavo, è rubro virenti, per ramos crebriore. Flores & spicæ rubescunt.

314. Ocimum minus, crispum, ferratum *Barr. Icon. 1059*. Illi folia majora, semunciam ferè lata, paulò longiora, acuta, reflexa, crispa, in se convoluta, in modum calceoli aut scaphæ subrotundæ complicata, cava, retusa, profundè ferrata, saturius virentia, per ramos confertim nascentia, & oblongo adnata pediculo. Flores albi, parvi, hinc inde ex incerto raroque verticillorum ordine emergentes. Gravioris & nonnihil camphorati est odor.

315. Ocimum minimum, vulgare, folio acuto *Barr. Icon. 1077*. Ocimum minimum *C. B. Pin. 225*. Glomeratim frutescit ad dodrantis altitudinem, dilutèque viret, foliis vestitum per crebra ramulorum densissimorum genicula binis, oppositis, Serpilli vel Amaraci minoris formâ, sed acutioribus, planis, & carnosius, non ferratis.

316. Ocimum minimum, rotundifolium *Barr. Icon. 1075*. Circinnata hujus folia, nonnihil cava & crispa, minora tamen, tenuiora, per ramos magis congesta & virentia. Rami, caules & spicæ pallidè virent, quandoque at-
ro-
rubent.

317. Ocimum minimum, crispum, non ferratum *Barr. Icon. 1070*. Huic crispa sunt folia, concava, acetabuli vel cochlearis formâ, oris integris & nonnihil complicatis, subrotunda, variè circa ramos contorta, & pediculis crispantibus annexa. Tota planta viret, splendetque non pallido, sed obscuriori nitore. Flores albi. Odor ejus nonnihil gravis.

Ocimorum hæc varietates eleganter expressit *Barr.*



318. Chamædrys fruticosa, Cretica purpureo flore *Inst. R. Herb. 205*. Teucrium fruticans, incanum, Creticum, flore purpureo *Barr. Icon. 896*. Teucrium Creticum *Clus. Hist. 348*.

319. Chamædrys multifida, spinosa, odorata *V. Lusit. Scordium spinosum*, odoratum, annuum *Barr. Icon. 202*. Scordium spinosum, odoratum *Corn. 123. Icon. Barr. ex Corn. l. c.*



320. Polium montanum, luteum, supinum, capite oblongo *Barr. Icon. 1082*. Polium montanum *ij. Clus. Hist. 361*. Tota planta tomentosa est & incana; folia per oras ferrata, plana, & latiora quàm in aliis speciebus; coma florum oblonga, lutea. Flores pariter lutei. Varietas est Polii montani lutei *C. B. Pin. 220*. Vires vide in *Hist. Raii. 524*. In Regno Valentino reperiebat *Barr.*

321. Polium montanum, luteum, tomentosum, dasyphyllum, ferratum. *Barr. Icon. 1073*. Cespitosa est planta, supina, gnaphalodès seu tomentosa, ramosa, densâ circa radices lanugine è pallido albicans, ramosque subinde emittens quatuor uncias altos, densis crebrisque vestitos foliis longis, angustis, ferratis, densâ mollique lanugine hispidis, adeoque densis ut sibi cohærere folia videantur. Neque enim tantum summis caulium insident corymbi:

E Sed

Sed ex lateralibus furculorum internodiis & ex foliorum latiorum alis corymbi lutei emergunt quos pictor foliis merfit.

322. Polium montanum, luteum, ferratis, angustioribus, incanis foliis. *Barr. Icon. 1089.* Cauliculos edit incanos, firmos, lignosos, incanâ lanugine pubescentes, primùm procumbentes, subinde repandos humique radices agunt & foliis per intervalla satis laxa binis ex adverso nascentibus ab imo ad summum vestiuntur, incanis, angustis, ferratis seu crenatis, & angustioribus quàm in sequenti. In extremo comam ferunt luteam, rotundam & lanuginosam. In regno Valentino frequens est.

323. Polium montanum, luteum, ferratis Amaraci foliis, comâ subluteâ *Barr. Icon. 1088.* Polium Hispanicum, luteum, Majoranæ foliis *Inst. R. Herb. 207.* Cauliculis nititur firmioribus, luteâ lanugine pubentibus, quibus, latiora per intervalla, folia bina ex adverso posita & decussatim ordinata hærent subrotunda, & Amaraci aut Majoranæ formâ ac magnitudine, in summo caule majora triplò quàm in exortu, ubi vix Thymi magnitudinem attingunt, per oras crenata; plana, rugosa, venosa Chamædryos instar, incanâ pubentia lanugine & subvirentia. Summo ex cacumine quod frondosum est crassum & luteum, exeunt florum comæ pariter luteæ, quas proximè involvunt calycis modò folia lutescentia. Odor ejus gravis, non ingratus; sapor tamen ingratus & amarissimus. Circum *Alcaras* in montibus crescit.

324. Polium marinum, dasiphyllum, Gnaphalodes, flore albo *Barr. Icon. 1047.* Polium maritimum, erectum, Monspeliacum *C. B. Pin. 221.* Denso humilique est stipite, ramis erectis, albâ densâque lanugine pubentibus; foliis latioribus Polio montano albo vulgari. In maritimis Regni Valentini juxta Valentiam, in Galliâ Narbonensi ad radicem montis Ceti, & in littore quod Terracinâ ducit Circæum observavit *Barr.*

325. Polium montanum, album, ferratum, latifolium, erectum majus. *Barr. Icon. 1079.* Multiflorum est & ramosum; lateque per ramos sparsi comæ Corymbi, magis tamen conglobati, compacti minoresque quàm in sequentibus.

326. Polium montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, majus *Barr. Icon. 1074.* Supinum est, Corymbisque majoribus quàm in superiori. In Hispaniâ, Italiâ & Galliâ Narbonensi frequens.

327. Polium montanum, Hispanicum, non crenatum, flore albo *Barr. Icon. 1049.* Folia huic nonnihil angustiora, sed oris est integris & non ferratis.

328. Polium montanum, erectum, crenatum, angustifolium flore albo *Barr. Icon. 1050.* Foliis crenatis, comâ florum ampliore, & floribus majoribus à superiore distinguitur.

329. Polium montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, minus *Barr. Icon. 1078.* Cauliculis est supinis & radices humi agentibus. Folia angustiora, quàm in *montano*, *supino*, *majore*. Corymbi florum ampliores quàm in *latifolio erecto*, & per extrema ramorum sparsi.

330. Polium montanum, album, angustifolium, ferratum, supinum, minus *Barr. Icon. 1091.* Humi procumbit repandis furculis; folia fert parva, angusta, ferrata, vix quartam unciae partem longa, lineam unam aut alteram lata.

331. Polium Valentinum, fruticosum, angustifolium, flore albo *Barr. Icon. 1048.* Tenuissimis sed firmis, ramosis, erectis, incanis nititur cauliculis quos tenuia, angusta, albidâ lanugine pubentia, ferrata simulque congesta vestiunt folia. Extrema ramulorum & caulium desinunt in capitulum conglobatum, albicans, parvum, floribus decoratum parvis, & albis. Eleganter fruticat palmaris & sesquipalmaris, Planta surrecta tota. In Valentini Regni loco dicto *la deça* provenit.

332. Polium surrectum, majus, angustifolium, ferratum, incanum, tomentosum

tosum *Barr. Icon. 1096*. Lignosâ è radice in palmares, pedales, tomento canescentes assurgit cauliculos densis foliis Laricis vel Stoechados Arabicae in modum turmatim dispositis, angustis vix sextam unciae partem latis, brevibus pariter, utrinque crenatis & supernè convolutis ac candicantibus. Acerrimi est odoris.

333. Polium montanum, album, non ferratum, longis angustisque foliis canescentibus *Barr. Icon. 1080*. Polium Hispanicum, Linariae canescentibus foliis, flore albo *Inst. R. Herb. 207*. Praeangusta & semunciam longa huic folia, nec crenata, incanâ lanugine, unâ cum ramis erectis pubentia. Coma rotunda, ampla & alba.

334. Polium montanum, album, non ferratum, viride, longis angustisque foliis, caule incano *Barr. Icon. 1081*. Polium Hispanicum, Linariae foliis brevioribus, flore albo *Inst. R. Herb. 207*. Surrectis & firmis donatur furculis incanâ lanugine pubentibus; foliis angustis & Rorismarini, sed longè minoribus, quàm in superiori brevioribus, paulò latioribus, integris, virentibus, nec ferratis. Coma in summo corymbacea & globosa. Radix lignosa, fibris hinc inde propendentibus. In praecelsis montibus Carthusiae cui nomen à *Porta Caeli*, Boream versus, quatuor leucis ab urbe Valentia invenit *Barr.*

335. Polium montanum, majus, erectum, Rorismarini folio, flore rubro *Barr. Icon. 1090*. Polium Hispanicum, maritimum, frutescens, Rorismarini folio, flore rubro *Inst. R. Herb. 207*. Hoc sequentium maximum, è radice satis crassâ & lignosâ plures caules ramosi, firmi, lignosi, tomentosi & incani, recti assurgunt: densis, (Pictor rarioribus pinxit, ut operi parceret) Rorismarini foliis, sed brevioribus, angustioribus & magis incanis lanuginosisque, dodrantem unciae longis, lineam latis, Pinastris modo vestiuntur. Horum singula extrema in florum purpureorum globosè & densè congestorum Corymbum desinunt. Odore est gravi, gustu acri & amaro. Circa initia Januarii, mediâ viâ ab oppido *Montfort* ad oppidum *Elda*, in colle fabuloso ante descensum ad planitiem *florebo* dictam in Hispaniis occurrebat *Barr.*

336. Polium montanum, pumilum, rubrum, viride, Stoechados folio, caule tomentoso *Barr. Icon. 1092*. Polium Hispanicum, montanum, pumilum, Rorismarini folio, flore rubro *Inst. R. Herb. 207*. Elegantissima hæc species vix Icone major, è singulari radice lignosâ & nonnullis fibris à lateribus capillatâ in pumilum fruticem statim surgit ramosum, incano densoque bombice tumentem, firmum foliisque vestitum densis, compressis, arrectis, viridibus, Stoechados Arabicae formâ, supernè virentibus, infernè canescentibus, Pini in modum congestis. Cauliculi & ramuli in thyrsus subrotundum florum carneorum densè & glomeratim congestorum desinunt. Pictor supremos ramos in se nonnihil inflexos, caulesque bombace niveo tumentes, foliis densis rectos non satis expressit. Odore est præditum suaviore quàm *Polium vulgare luteum*.

337. Polium montanum, pumilum, angusto, viridique folio, caule incano *Barr. Icon. 1093*. Fruticulus est Thymi modo lignosus & cespitosus. E radice satis lignosâ, mediocriter crassâ & longâ, fibris capillatâ & subrufâ in pluresque alias divisâ furculi plures exoriuntur ramosi, tortuosi, tenui tomento albicantes, juxta radicem foliis minùs canescentibus, sordidioribus vestitis superioribus verò densis, binis & ex adverso oppositis ut in aliis, angustissimis, semunciam longis quæ longissima, non crenatis & supernè læto virore nitentibus. Singuli furculi in rotundam florum è dilutâ purpurâ jucundè rubentium comam desinunt, multâ lanugine hispida farctisque florum calycibus, & quandoque in papulas vermiculo foetas tumentibus. Odore grato & sapore amaricante præditum est. In montibus Carthusiae à *Porta Caeli* infra Valentiam provenit.

338. Polium montanum, Gnaphalodes, incanum, flore rubro, supinum

Barr. Icon. 1083. Polium montanum, 1. purpureo flore, V. *Clus. Hist. 362.* Supina est Plantula, cujus ramuli sunt repandi, vix duas uncias alti, tomento denso & holoserico tecti, folia *vulgari albo* similia, crenata, dense & confertim nascentia, incana, mollia & lanuginosa. Florum latè rubentium Corymbi ex foliorum alis secundum cauliculorum longitudinem & in extremis ramulorum enascuntur, quod huic peculiare est. Pictor macilentiores, glabrioresque fecit caules. Crescit in Castiliæ novæ provinciâ *la Mancha* dictâ, in deserto arido inter locum vocatum *el Pofico* & *Chinchillo* oppidum. Necnon in Regni Valentini montibus præsertim juxta Villam Divi Petri, Monasterii Ord. FF. Prædicatorum.

339. Polium saxatile, pumilum, ferratum, supinum, incanum, flore rubello *Barr. Icon. 1098.* E fissuris rupium cespitat, densis, supinis, tortuosis, lignosis, brevibus, imâ parte rufescentibus, supernâ incanis vestitum foliis, ramulis variè sibi complexis & in alios divisim capitat frutescens, vix tres uncias altum. Ramulis annectuntur folia satis crebra, majora alia latioraque, alia minora & angustiora, omnia tamen crenata, ferrata, & angustiora potius quàm latiora. Ramorum summitates paucos flores ferunt in brevem parvâque comam & purpurascentem collectos. Radix lignosa & tortuosa saxifque demersa. Suavissimo flagrat odore, sapore autem donatur amariusculo. E rupibus montium Regni Valentini, in deserto Murrhenfi erumpit.

340. Polium minus, erectum, angustis, crenatis brevibusque foliis, flore rubro *Barr. Icon. 1099.* Radix hujus lignosa, teres, paucis fibris capillata, subrufa, nonnihil tortuosa lignosaque, è cujus summo plures erecti, lignosi, incani surgunt ramuli vix fescunciales, quibus angustissima brevissimaque, & vix sesquilineâ longiora, densa satis & erecta hærent folia, crenata & incana. Flores in summo globosam in comam congesti & rubelli. Iisdem locis occurbat ac superius. Idem fermè sapor & odor.

341. Polium surrectum, minus, angustifolium, ferratum, è viridi canescens *Barr. Icon. 1097.* E rupium fissuris pariter erumpit, & è lignosâ radice plures emittit furculos densissimis foliis & crebris, crenatis, & quàm in superiori paulò longioribus, ferratis, oris convolutis vestitos. Huic folia caulesque non ita canescunt ut superiori, cui tamen congener & simile est. Folia majora ad rubrum nonnihil vergunt. Flores illi quoque rubelli.

342. Polium saxatile, purpureum, serrato Serpilli folio *Barr. Icon. 1061.* Hæc elegans species folia edit serrata, crassa, villosa, incana, & crenata; è rupium rimâ sparsis supinisque viticulis Serpilli more pendens, vel saxi incumbens. Viticulorum extremis capitella crassa pro plantæ magnitudine hærent. Flores latè & ex albo rubent. Folia supernè virent, infernè tomentosa, albida & serrata, quod non satis expressit Pictor. E Regno Valentino oriundum ut & sequentia.

343. Polium saxatile, purpureum, non Serrato serpilli folio, pressiori comâ *Barr. Icon. 1087.* Polium Hispanicum, Serpilli folio, flore purpurascentè *Inst. R. Herb. 270.* Folia huic Serpilli, nusquam crenata. Florum capitella parva angustiora, sursum arrecta & compressa. Flores minores, pauciores & similiter rubentes. Ortu, habitu, natalibus, &c. superiori convenit.

344. Polium saxatile, minimum, Thymi folio, carneo flore *Barr. Icon. 1062.* Polium Hispanicum, Thymi folio, purpurascente flore *Inst. R. Herb. 207.* Folia hujus minora, supernè virentia, infernè albicantia, brevioribus, supinis & subinde erectis viticulis lignosis, pediculo latiusculo alligata. Flores carnei in breve capitellum sunt congesti.

345. Polium saxatile, purpureum, Chamædryoides, amplâ comâ *Barr. Icon. 1086.* & *Bocc. Mus. part. 2. 75. Tab. 61.* Supina est planta è rupium commissuris, lignosâ prorumpens radice, saxa latè vestiens, albi, viridis & purpurei coloris varietate elegans. Viticulos tenues, lignosos edit folia pariter juxta exortum minora, & Thymo paria, sed serrata, sensim majora & latiora quò altiùs

altiùs surgunt, Chamædryos formâ, minora tamen & breviora, omnia supernè viridia, infernè albicantia. Corymbus florum magnus pro plantæ modo; Flores rubent.

346. Polium saxatile, Chamædryoides, rotundiori folio, supinum, rubrum *Barr. Icon. 1095. & Bocc. Mus. part. 2. 76. Tab. 62.* Polium Hispanicum, Chamædryos folio, purpurascens flore *Inst. R. Herb. 206.* E saxorum rimis pendet sarmentis tenuibus, ramosis & longis. Folia ejus majora quàm in præcedenti, profundius serrata, in exortu rotundiora, in progressu sensim oblongiora & obtusè acuminata, Chamædryos foliis non absimilia, sed rotundiora, densâ serie & alatum per ramos disposita, supernè virentia, infernè canescentia. Florum Corymbi minores laxioresque sunt, quàm in præcedenti. Flores obscuriùs purpurascunt. Sapor non tam amarus. Junio florebat in deserto Murrhenfi, & Montibus altissimis, non longè à Mari, & à Cœnobio Eremitarum Divi Hieronymi in Regno Valentino.

347. Polium saxatile, Chamædryoides, oblongo folio, rubro exiguo flore *Barr. Icon. 1094.* In longos, ramosos, flexuosos, supinos, incanâ lanugine hispido spargitur viticellos foliis vestitos, quàm in utroque præcedenti, longioribus, angustioribus, ad Chamædryos folia magis accedentibus, subtus incanis, supernè lætè virentibus, minus densè per caulem positis. Florum capitella brevia, minora & compressa, quæ pictor non expressit. Flores rubent. Color, odor & sapor idem qui aliis. Eodem loco ac superius occur-
rebat.

Has elegantes Poliorum species recensent Turnefortius in *Inst. R. Herb. l. c.* & Morissonus in *Hist. Oxoniens. par. 3. 355. & 356.*



348. Teucrium cæsius & amplo Rorismarini flore, Boeticum Clusio *Barr. Icon. 512.* Teucrium Boeticum *Clus. Hisp. 229. Hist. 348. & Raii Hist. 526.* In Italiâ juxta Terracinæ portum frequens.



349. Bugula *Dod. Pempt. 135.* Bugula media, flore cæruleo *Barr. Icon. 338. La Bugle.* Vires vide in *Hist. Raii 575.*

350. Bugula minima, glabra, flore cæruleo. Bugula minima, glabra, flore azureo *Barr. Icon. 337.* Hujus descriptionem non invenio in scriptis *Barr.*



Sequentes plantæ imperfectiores sunt quàm ut possint ad sua genera reduci. Ex plantâ siccâ floribusque destitutâ delineavit *Barr.*

351. Tragoriganum comosum, seu crispis & capillaribus foliis, Hispanicum *Barr. Icon. 772.* Tragoriganum brevi circinnato folio *Bocc. Mus. part. 2. 163. Tab. 124.*

352. Marum tenuifolium, Thymi facie, Hispanicum *Barr. Icon. 771.*

353. Marum Sampsuchi folio, Hispanicum *Barr. Icon. 1224.*

354. Marum Hispanicum, nigrum, flore purpureo, Piperella Hispanis *Barr. Icon. 694.* Marum Hispanicum, nigrum *Bocc. Mus. part. 2. 166. Tab. 117.* Piperellam vocant, quod diutiùs odorem suum gravem servet. In Regni Valentini aridis Valentiam inter & Aioram urbes Maio, Junio mensibus cum flore reperiebat *Barr.*

355. Marum nigrum, Hispanicum, flore purpureo, minor planta *Barr. Icon. 1223.*

356. Marum album, Hispanicum, minus, Dorychnii folio *Barr. Icon. 693.* Palmares edit furculos, foliis Thymi vel potius *Dorychnii Monspeliaci*, inca-

nis, mollique lanugine canescentibus vestitos. Flores verticillatim & spicatim summis in ramulis colliguntur. Saporis est acris, mordacis & Camphorati.



357. Rapistrum maximum, μονοσπερμόν, gemmâ luteâ flore niveo Barr. Icon. 387. Rapistrum maximum, rotundifolium, monospermon Corn. 147. Icon. Barr. ex Corn. l. c.



358. Myagrum supinum, album, Eruca foliis Barr. Icon. 1252. Myagro similis, flore albo I. B. 2. 895. Myagrum monospermum, minus C. B. Pin. 109. & Prodr. 52. In pratis ad Anienis confluentiam in Tyberim, viâ quâ itur ad Pontem Salarium provenit.



359. Thlaspi cordatum, minus, flore albo, insipidum Barr. Icon. 815. Thlaspi arvense, perfoliatum, majus C. B. Pin. 106. & Raii Hist. 832. Frequens per Galliam.

360. Thlaspi Alfine Teucroidis folio, cordato pericarpio. Barr. Icon. 1015. Varietatem hanc cum superiori Romæ observabat Barr.

361. Thlaspi supinum, minus, flore albicante Barr. Icon. 894. n. 11. Thlaspi Allium redolens Mor. Hist. Oxon. part. 2. 297. Scorodonthlaspi Ulissis Aldrovandi I. B. 2. 932. & Raii Hist. 834.

362. Thlaspi montanum pingui folio, carneo flore, planâ & cordatâ siliquâ Gualdi Barr. Icon. 845. Thlaspi parvum, saxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. Raii Hist. 833. In Monte Capouladon circa Monspelium, & circa Gratianopolim in deserto R. P. Augustianorum provenit.

363. Thlaspi flore albo, siliquâ triangulari, crenatâ Barr. Icon. 846. & Bocc. Mus. part. 2. 79. Tab. 70. Hujus descriptionem non invenio in scriptis Barr.

364. Thlaspi fruticosum, sempervirens, albo Cretici flore Barr. Icon. 734. Thlaspi Creticum, perenne, flore albo Barr. Icon. 214. n. 11. Thlaspi montanum, sempervirens C. B. Pin. 106. Humilis est frutex frequentibus ab ipsâ radice virgultis lignosis, ramosis, densum in cespitem se erigens, quem alterna raraque vestiunt folia oblonga, angusta, in extremo rotunda, glabra, carnosâ, medio nervo sulcata, nitide virentia. Extremos ramos comant umbellæ à multis floribus candidis congestis quales in Thlaspi Cretico, sed minores, compactæ, quæ sensim in spicam attolluntur. Singulis porro in umbellis flores supra viginti numerantur, tetrapetali, ad marginem majores, petalis tamen inæqualibus constantes, quorum duo majora seu exteriora, interiora duo sextuplo minora sunt. Floribus succedunt pericarpia ovata, mucronata, rarò maturantia. Semper viret: sub initia Februarii flores edit, qui ad finem Junii durant. Elegans hæc planta vix palmo altior latè procumbentibus viminibus stipatur.

365. Thlaspi montanum, serrato Cepeæ folio, flore purpurascente, umbellato Barr. Icon. 848. Thlaspi Alpinum, folio rotundiore, carnosâ, purpurascente flore Inst. R. Herb. 212. Radicem habet longam & crassiusculam ex quâ plures erumpunt furculi rotundi, carnosi, supini & postea repandi ac surrecti foliis vestiti alternis crassis, succulentis, crenatis & Cepeæ formâ. Flores purpurascens atque in umbellam dispositi summa cauliculorum obtinent; floribus succedunt pericarpia turbinata. Habes seorsim floris fructus & folii magnitudinem, & totius plantæ molem in Icone Barr. Maio florebat in deserto Carthusiæ Trisultinæ, & Montibus Appenninorum vicinis. Augusto mense nobis occurrit in Monte Ventoso, & in Montibus Vallis Barfilionensis.

366. Thlaspi Creticum, Iberidis folio, flore albo Barr. Icon. 893. n. 1. Thlaspi

Thlaspi Creticum quibusdam, flore albo *I. B. 2. 924.* Pictum communicabat Barreliero Eques Corvinus, floresque ejus staminibus apicibusque carere asserbat. Sequentes species imperfectæ sunt.

367. *Thlaspi montanum*, Bellidis folio, flore albo *Barr. Icon. 861.* E Carthusiæ Trisultinæ deserto duodecim ab urbe Ananiâ milliaribus distante, Maio florentem habuit. Si villosum exprimeretur, referret optimè *Thlaspi villosum*, capsulis hirsutis *C. B. Prodr. 47.*

368. *Thlaspi luteum*, σπασσασπυόν *Barr. Icon. 899. & Corn. 8. Icon. Bar. ex Corn. l. c.*

369. *Thlaspi Virginianum*, flore luteo *Barr. Icon. 843.* Ab Equite Corvino accepit cum sequenti.

370. *Thlaspi Creticum*, montanum, luteum, Leucoii flore *Barr. Icon. 214. n. 1.*

371. *Thlaspi fruticosum*, Leucoii marini minoris folio, flore albo *Barr. Icon. 1306. n. 11. I. B. 2. 931. & Lob. Obser. 109. Icon Barr. ex Lobel. l. c.*

372. *Thlaspi montanum*, album, siliquâ hastatâ, acuto Globulariæ folio *Barr. Icon. 847. & Bocc. Mus. part. 2. 36. Tab. 64.* In deserto Carthusiæ Trisultinæ provenit.

373. *Thlaspi linifolium*, erectum, flore albo, turbinato utriculo *Barr. Icon. 849. & Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 69.*



374. *Nasturtium sylvestre Dalechampii Lugd. 655.* *Thlaspi umbellatum*, Nasturtii folio, flore albo *Barr. Icon. 1306. n. 1.* *Thlaspi umbellatum*, Nasturtii folio, Monspeliacum *C. B. Pin. 106. & Raii Hist. 835. Barr. Icon ex Dalech. l. c.*



375. *Thlaspidium Monspelienſe*, Hieracii folio hirsuto *Inst. R. Herb. 214.* *Thlaspi biscutellatum*, Hieracii folio, pallido flore *Barr. Icon. 900.* *Thlaspi clypeatum Clus. Hist. cxxxiiij. Raii Hist. 836.* *Leucoium luteum*, minus, Hieracii folio *Barr. Icon. 1227.* Prior *Icon. Bar. ex Clus. l. c.*

376. *Thlaspidium montanum*, umbellatum. *Leucoium Alyssoides*, umbellatum, montanum Fabii Columnæ *Barr. Icon. 253. n. 11. Col. part. 1. 286. & Raii Hist. 836. Icon. Barr. ex Col. l. c.*

377. *Thlaspidium Apulum*, spicatum *Inst. R. Herb. 215.* Jondraba Apula, *Alyssoides spicata Barr. Icon. 253. n. 1. & Col. part. 1. 285. Barr. Icon ex Col. l. c.*

378. *Thlaspidium hirsutum*, calyce floris auriculato *Inst. R. Herb. 214.* Jondraba *Alyssoides*, spicata, lutea, major *Barr. Icon. 1219.* *Leucoium montanum*, flore pedato *Col. part. 2. 61.* Jondraba *Alyssoides*, lutea, angustifolia *Barr. Icon. 230.* Prior *Icon. Barr. ex Col. l. c.*

379. *Thlaspidium montanum*, angustifolium, glabrum *Inst. R. Herb. 215.* *Jonthlaspi Alyssoides*, angustifolium, luteum *Barr. Icon. 254.* Caules huic palmares & pedales, subrubescences, in summo ramosi, folia angusta oblonga, in extremo obtusa & latiora, scabra, leviterque pilis hispida. Flores non vidit Barr. In Montibus Umbriæ & Aprutii provenit.

380. *Thlaspidium Anchusæ folio Inst. R. Herb. 215.* *Thlaspi biscutellatum*, luteum, *Anchusæ folio Barr. Icon. 841. & Bocc. Mus. part. 2. 122. Tab. 167.* Foliis donatur *Anchusæ*, surrectis, tres uncias longis, sextam uncix partem vix latis, hispidis, subincanis, è mediocri radice erumpentibus. Ex eorum medio caulis surgit rectus, nudus, glaber, teres, tenuis, semipalmaris, florum luteorum thyrsus sustinens, quibus evanidis succedunt utriculi gemini, circulares, discosi, plani, semen compressum & discosum includentes. In Hispaniâ crescit.



381. *Cochlearia Aremorica Barr. Icon. 1305. n. 1. H. R. Par. Thlaspi hederaceum*

raceum. *I. B.* 2. 933. Cochleariæ vires vide in Hist. Raii 822. Icon. Barr. ex *I. Bauh.* l. c.



382. *Lepidium humile*, incanum, arvense *Inst. R. Herb.* 216. *Draba* seu *Arabis latifolia*, flore albo *Barr. Icon.* 213. n. 1. *Draba angustifolia*, *Babylonica*, flore albo *Barr. Icon.* 213. n. 2. *Draba multis*, flore albo *I. B.* 2. 939. & *Raii Hist.* 821.



383. *Bursa Pastoris montana*, *Globulariæ folio* *Inst. R. Herb.* 216. *Thlaspi subrotundo folio*, utriculo gruinale *Barr. Icon.* 1305. n. 11. *Thlaspi foliis Globulariæ* *I. B.* 2. 926.



384. *Alysson fruticosum*, incanum *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi incanum*, *Mechliniense Corvini*, flore albo *Barr. Icon.* 893. n. 11. *Thlaspi Mechliniense* *Lob. Icon.* 217.

385. *Alysson fruticosum*, aculeatum *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi spinosum*, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 808. *Thlaspi fruticosum*, spinosum *C. B. Pin.* 108. & *Raii Hist.* 824.

386. *Alysson Veronicæ folio* *Inst. R. Herb.* 217. *Myagroides subrotundis ferratisque foliis*, flore albo *Barr. Icon.* 816. *Draba minima* *Col. part.* 1. 272.

387. *Alysson segetum*, foliis auriculatis, acutis, fructu majori *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi Anglicum*, flore albido *Corvini* *Barr. Icon.* 894. n. 1. *Myagrum Turcicum* *I. B.* 2. 893.

388. *Alysson maritimum* *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi montanum*, perenne, flore albo *Barr. Icon.* 844. *Thlaspi leucoii sylvestris facie*, flore albo *Ejusd. Icon.* 907. n. 1. *Nasturtium vel Thlaspi maritimum* *I. B.* 2. 927. & *Raii Hist.* 829.

389. *Alysson incanum*, *Thymi folio*, flore albo, *Hispanicum*. *Thlaspi Thymi folio*, utriculo subrotundo, mucronato, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 807. & *Bocc. Mus. part.* 2. 75. *Tab.* 62. *Thlaspi Thymi folio*, rotundo utriculo, flore albo *Barr. Icon.* 907. n. 11. *Crassiusculâ radice*, lignosâ, scabrâ, nodosâ, compactâ, pallidâ, fibris capillatâ nonnullis & brevi; è quâ plures exeunt lignosi, tortuosi surculi, ramosi, qui in alterum annum perdurant, novosque ex se emittunt è lateribus surculos quos folia parva, oblonga, incana, pubescentia, vix Thymo majora ejusque formâ, præsertim quæ juxta radicem germinant, alterno situ vestiunt. Flores in summis cauliculis vix Icone majoribus spicatim assurgunt exigui, albi, quadrifolii; his succedunt pericarpia rotunda, mucronata, compressa, & bivalvia, quæ septo intermedio in duo loculamenta dividuntur, semine plano, rufo & rotundo referta. Tota planta canescit pusilla, lignosa & perennis. Hujus plantæ duas damus figuras, primam elatiorem cum pericarpis, alteram minorem vix florentem. Habet ortum in Hispaniâ. Valentia Madritum eunti, *Pajoso* inter & urbem *Rechen* occurrit.

390. *Alysson incanum*, fruticosum, erectum, *Hispanicum*. *Thlaspi fruticans*, erectum, angustifolium, utriculis subrotundis, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 810. & *Bocc. Mus. part.* 2. 78. *Tab.* 67. Foliis superiori hoc simillimum, sed nonnihil longiusculis, quæ in cauliculis surrectis firmisque rara & alterna incanâque pubent lanugine. Cauliculi virides, glabri, in spicam florum & seminum desinunt. Flores albi, tetrapetali, quibus succedunt utriculi mucronati superius concavi, inferius convexi, in duo loculamenta septo intermedio divisi, semina ut in superiori. Tota fruticat planta incanis

canis foliis, lignosis & subvirentibus cauliculis, radice crassiusculâ, lignosâ & subfuscâ; è quâ, cauliculis imis in parte superiore, hyemis frigore corruptis, nova sequenti anno germina exeunt. In Hispaniâ nascitur.

391. Alysson incanum, supinum, brevioribus foliis. Thlaspi supinum, minoribus foliis, congener Hispanico *Barr. Icon. 809*. Superiore congener & simillimum, at non fruticat, supinis repandis surrectisque subinde cauliculis lutescentibus seu rufis, foliisque paulò brevioribus, tomentosis & nivei candoris discrepat. Radix huic longa, tenuis, rufescens, ramosa, perennis, nec suis cauliculis brevior. Cauliculi paulò habitiores, crassiores, sparsim & inæqualiter nivei & tomento ita pubentes, ut glabri & rufescentes minus appareant.

392. Alysson incanum, luteum, serpilli folio, minus *Inst. R. Herb. 217*. Thlaspi Alysson incanum, luteum, lunato utriculo *Barr. Icon. 908. n. 11. & 912. n. 11*. Thlaspi Alysson dictum, campestre, minus *C. B. Pin. 107. & Rati Hist. 829*.

393. Alysson incanum, Polygoni folio. Thlaspi minus, incanum, flore albo, subrotundo utriculo *Barr. Icon. 912. n. 1*. Radice pollet mediocri, lignosâ, subflavâ, è quâ multi surgunt erecti, firmi & lignosi cauliculi palmi dodrantem alti, ab imo foliis Lini, sed longè minoribus vestiti, iisque incanis, tomentosis, vix dodrantem uncie longis, præangustis, acutis; quorum adulatorum ima florescunt. Cauliculi in longam spicam abeunt. Flores albi, exigui, tetrapetali quibus succedunt pericarpia subrotunda seu ovata & mucronata, in duo loculamenta divisa, maturo semine facilè decidentia. Tota planta vix quatuor uncias alta dum flores edit, post exanthemum ad sex uncias crescit. Sapor illi subacris. Ab Alyssò maritimo non multum distat, si non idem.

394. Alysson cineritium, flore albo. Thlaspi linifolium, minus, cineritium, flore albo *Barr. Icon. 908. n. 1*. In cespitis formam humi se spargit cauliculis multis luxurians supinis villosis, ramosis, subinde in se collectis & erectis, quos vestiunt folia Lini acuta, alterna, glabra, virentia, carnosâ, unciam vix longiora, & quintam uncie partem lata. Cauliculorum ramorumque summa Thyrsi florum alborum ornantur, qui subinde longam in spicam pericarpiorum acutorum protenduntur, ubi defloruerunt. Perennis est planta, cujus radix alba, tenuis & multifida. Semen rufum, ovatum & saporis subacris. Maio flores fructusque ferebat Terracinæ viâ quâ itur Piperinum, colles inter & paludem.

395. Alysson Lini folio, flore albo, virescens. Thlaspi Linifolium, minus, flore albo, virescens *Barr. Icon. 911. n. 1*. Radicem habet subgilvam, mediocriter crassam, paucis fibris capillatam, plures furculos emittentem virentes quibus hærent folia Lini angusta, alterna, acuta, unciam quandoque longa, vix octavam uncie partem lata, subvillosa, nonnihil canescentia, tenera & mollia. Flores exigui, albi in comam congesti, quibus succedunt pericarpia, plana, semine plano, rufescente, exiguo referta. In plantâ siccâ nullus manifestus sapor. In Hispaniâ collegit *Barr.*



396. Alyssoides Creticum, incanum. Alyssum Creticum, incanum, orbiculatis siliquis *Barr. Icon. 862*. Alyssum incanum, erectum, siliquâ utriculatâ *Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 66*. Ex Insulâ Cerigo ramus siccus ad Barrelierum missus est, in quo tamen nec floris seminisve formam observare potuit.

397. Alyssoides subrotundo folio & serrato. Thlaspi aureo leucii flore, sylvestre, rotundifolium, majus *Barr. Icon 883*. Hujus & sequentis descriptionem non invenio.

398. Alyssoides subrotundo folio, Leucii flore. Thlaspi luteo Leucii flore

F

Barr.

Barr. Icon. 842. & Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 68. Boccone nomen hujus ad sequentem transtulit.

399. Alyssoides montanum, luteum, subrotundo Thlaspi utriculo. Jonthlaspi seu Leucoium montanum, luteum, subrotundo Thlaspi utriculo *Barr. Icon. 850. & Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 67.* *Leucoii vulgaris lutei* radicem & surculos habet ramosos, quorum qui annotini, plures emittunt ramos tortuosos foliis alternis vestitos oblongis, acutis, semuncia angustioribus, duas uncias & amplius longis, in exortu præangustis, è cæsis virentibus; glabris, lævibus quoque, in summo frondosam laramque in umbellam se explicant. Ex hac foliorum umbellâ primo vere novitii emergunt caules qui aliis foliis, sed brevioribus & ad basim latioribus, rarioribus, arrectis, laxa per intervalla induti desinunt in comam florum luteorum & *Leucoii vulgaris* formâ, quibus succedunt pericarpia adeò adhuc tenera ut formam semenque exactè observare non potuerim. Plantæ sapor glutinosus & subacris. Sub finem Maii florebat in monte Gualdo in Umbriâ.



400. Lunaria Leucoii folio, flore albo, Italica. Thlaspi album, Leucoii flore & folio, Italicum *Barr. Icon. 911. n. 11.* Surculosa & ramosa est ad pedis cubitque altitudinem caules attollens, sæpius tamen infirmos & in terram inclinatos. Folia ejus *Leucoii hortensis*, sed minora longè & vix tres uncias longa, quadrantem uncia lata, tenuia, mollia, è viridi subincana, mollique pube ut & cauliculi, lanuginosa. Flores summis in caulibus in subrotundam umbellam congesti, albi sunt & formâ *Leucoii albi hortensis*, sed duplo minores, & calyce virenti comprehensi. Floribus succedunt oblongi lanceolati, mucronati utriculi plani & compressi, semunciam ferè longi, cum matura sunt semina, sextâ uncia parte latiores, sæpè tumidis lateribus. Semina in singulis utriculis fena duplici serie disposita, eaque exigua, rotunda, plana & rufescentia. In Campaniâ Romanâ locis incultis provenit.



401. Leucoium montanum, angustifolium, pallido flore *Barr. Icon. 884.* Leucoium angustifolium, Alpinum, flore sulfureo *H. R. Par. A* *Leucoia luteo vulgari* discrepat foliis multò longioribus & angustioribus; tum etiam flore sulfureo & pallido. Circa Gratianopolim reperitur in montibus. Pictor flores pessimè, & ad libinem pinxit.

402. Leucoium luteum, minus, fruticans *Barr. Icon. 1228.*

403. Leucoium Hesperidis folio *Inst. R. Herb. 221.* Brassica sylvestris, albedo flore, nutante filiquâ *Barr. Icon. 353.* Turrita major Plateau *Clus. Hist. cxxvj.*

404. Leucoium minus, marinum, subrotundo folio, purpureum *Barr. Icon. 1020.* Hujus descriptionem non invenio. Leucoii vires vide in *Hist. Raii 782.*



405. Hesperis sylvestris, inodora *C. B. Pin. 202.* Cacalia verior, Urticæ folio, purpurascente Leucoii flore *Barr. Icon. 357.* *La Juliane qui n'a point d'odeur.* *Cacalia* congener est; sed folia ejus glabra, oblonga, Urticæ formâ, longiusculo donata pediculo juxta quem sinuosa sunt, in extremo acuta, per oras serrata, multis rotundis & implexis venis exarata, tenuissimæ texturæ, in plantâ siccâ pellucida, quò altius surgunt & umbellam versùs ascendunt angustiora. Summus caulis rubescit, leviter pubescens, in umbellam florum desinens dilutè purpureorum, quibus succedunt filiquæ rectæ, purpureæ, fusiformes, oblongæ, utrinque tenues, in medio nonnihil ventricosæ, exiguo onustæ capitello & tenui semine foetæ. Radix ejus ut aliis congeneribus, crassiuscula

crassiuscula & fibris dense capillata. In montibus Apenninis collegit Barr.

406. *Hesperis maritima*, supina, exigua *Inst. R. Herb.* 223. *Leucoium minus*, flore violaceo *Barr. Icon.* 1127. *Leucoium maritimum*, parvum, folio virente crassiusculo *I. B.* 2. 877.

407. *Hesperis Sicula*, frutescens, filiquâ tricuspidi *Inst. R. Herb.* 223. *Leucoium minus*, fruticans, purpureum, *Alyssi foliis* *Barr. Icon.* 804. *Leucoium minus*, fruticans, purpureum, montanum, crucigerum *Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. III.* Fruticosa est cujus radix perennis, cauliculi lignosi, plures ab eâdem exorti radice, recti, firmi, crassi, teretes, rotundi, albâ lanugine puberuli, dodrantes, crebris foliis vestiti, Lini formâ seu potius *Alyssi marini Clusii*, semunciam longis, angustis, in extremo rotundis, alternis, nullo pediculo adnatis, niveo pariter tomento pubescentibus, arrectis, crassiusculis, nullisque nervis, nisi mediâ lineâ eâque vix eminente striatis & sulcatis. Caulium ramorumque extrema plures umbellatim congesti ornant flores tetrapetalo purpurei, oblongo calyce & brevi pediculo fulti.

408. *Hesperis Lavandulæ folio*, obsoleto flore. *Leucoium minus*, *Lavandulæ folio*, obsoleto flore, angustifolium *Barr. Icon.* 803. & *Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. III.* Dodrantis pariter & tenera, cinereâ lanugine obducitur. Folia ejus angusta, acuta, longa, integra, *Lavandulæ* figurâ, sed duplo angustiora & tenuiora, unciam vix longa & alterna. Flores obsoletè rubent, petalisque constant angustis. In montibus supra *Orgon* oppidum in Galloprovinciâ occurrit.

409. *Hesperis purpureo flore*, hamatis foliis. *Leucoium minus*, purpureum, hamatis foliis *Barr. Icon.* 1019. A superiori distinguitur foliis utrinque uncinatis & flore purpureo. Varietas sequentis.

410. *Hesperis Sicula*, *Coronopi folio*, filiquâ tricuspidi *Inst. R. Herb.* 223. *Leucoium minus*, purpureum, angustifolium, longiori folio *Barr. Icon.* 999. n. 1. *Leucoium montanum*, crucigerum, *Coronopi folio* *Bocc. Mus. part. 2. 147. Tab. III.* Folia huic longiora, latiora & tribus aut quatuor dentibus sinuosa, instar *Cyani* aut *Leucoii maritimi majoris*.

411. *Hesperis altera Coronopi folio* brevior. *Leucoium minus*, breviori folio, obsoleto flore *Barr. Icon.* 999. n. 11. Superioris varietas. Folia breviora, angustiora & paucioribus dentibus serrata. Flores obsoletè purpurascunt.

412. *Hesperis Hispanica*, angustifolia, luteo flore. *Leucoium minus*, angustifolium, luteum, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 1000. & *Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. III.* Tenui & albicante ex radice decem aut duodecim edit folia ferè capillacea, unciam aut fescunciam longa, tenuia, glabra, & virentia; è quorum medio surgit cauliculus rectus, striatus, glaber, semipalmaris, raris foliis alternis situ vestitus. Flores in summo fert umbellæ in modum, complures, congestos, leucoideos, quibus succedunt filiquæ quarum semen non vidi.



413. *Turritis vulgaris*, ramosa *Inst. R. Herb.* 224. *Draba angustifolia*, major *Barr. Icon.* 270. *Draba angustifolia*, media & minima *ejusdem Icon.* 269. n. 1. & 11. *Bursa pastoris*, sive *Pilosella filiquosa* *I. B.* 870. & *Raii Hist.* 800.

414. *Turritis annua*, verna, flore purpurascente *Inst. R. Herb.* 224. *Leucoium minus*, rotundifolium, flore purpureo; *Chamaeleucoium rotundifolium*, minus, flore purpureo *Barr. Icon.* 876. *Leucoium maritimum*, latifolium, flore caruleo purpurante *I. B.* 2. 880. & *Raii Hist.* 781.

415. *Turritis annua*, *Bellidis folio* flore purpurascente. *Leucoium purpureum*, *Bellidis folio*, majus *Barr. Icon.* 875.



416. *Cardamine annua*, exiguo flore *Inst. R. Herb.* 224. *Sisymbrium montanum*,
F ij

tanum, tenuifolium, flore muscoso purpurascens *Barr. Icon. 155*. Sifymbrii Cardamine species quædam insipida *I. B. 2. 886*. & *Raii Hist. 815*. Umbrosis humidisque locis montium Apenninorum & Trifulti in Umbriâ gaudet.

417. Cardamine glabra, Chelidonii folio *Inst. R. Herb. 225*. Sifymbrium montanum, latifolium, flore purpureo *Barr. Icon. 156*.

418. Cardamine sylvestris, minor, Italica *Barr. Icon. 455*. Cardamine iv. Dalechampii *Lugd. 659*. Nasturtium aquaticum, minus *C. B. Pin. 104*. & *Raii Hist. 815*.

419. Cardamine aquatica, Cotyledonoides flore albo *Barr. Icon. 1163*. Cardamine montana, Afari folio *Inst. R. Herb. 225*. Nasturtium montanum, Afari foliis *Par. Bat.* In Pomptinis paludibus Latii non longè à *sermonetta* ad radices collis in aquis limpidis frequens est, necnon juxta Pontem Terracinæ. Nos in Alpibus & in valle Barfilionensi vidimus.



420. Eruca cærulea, in arenosis crescens *C. B. Prodr. 40*. Erysimum tertium, præcox, flore carneo *Barr. Icon. 196*.

421. Eruca viminea, Iberidis folio, luteo flore *Barr. Icon. 131*. Eruca minimo flore, Monspelienfis *I. B. 2. 862*. Juxta Tyberis margines eundo à ponte Milvio ad portam à *Populo* dictam Romæ provenit, necnon supra muros circa Parisios.

422. Eruca sylvestris, minor, lutea, Burfæ pastoris folio, Italica *Barr. Icon. 1016*. *La Roquette sauvage, à feuilles du Tabouret*. Descriptionem non reperi.

Sequentes imperfectæ sunt & difficilè ad sua genera referri possunt, quia tamen Erucae nomine indigitantur, ad calcem Erucarum posuimus.



423. Eruca minima, hirsuta, floribus albis. Erucula hirsuta, floribus albis *Barr. Icon. 195. n. 1*. & *Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 80*. Ex radice crassiusculâ, lignosâ, melinâ & in capita divisâ folia oriuntur tenuiter & profundè incisâ, Echii modò hispida, numerosa, vix biuncialia; cauliculus è foliorum medio surgit glaber, rotundus, vix major quàm in figurâ, flores sustinens albos. Pictor perperam fecit caulem hirsutum. Inter *Chinchilla* & *Aiora* oppidum in confiniis Regni Valentini crescit.

424. Eruca minima, flore rubello. Eruca flore rubello, Hispanica *Barr. Icon. 195. n. 2*. & *Bocc. Mus. part. 2. 85. Tab. 80*. Radix illi tenuis, longa & fibrosa quæ promit folia pingua, vix uncialia, & sextâ uncie parte latiora, per oras leviter dentata & nonnihil sinuosa. Ex eorum medio cauliculus surgit tenuis, vix uncialis, quandoque folio uno aut altero vestitus & qui fert florem singularem, parvum & purpureum. In amplâ & maritimâ planitie *la deçà* dictâ Valentiam inter & mare reperiebat *Barr.*

425. Eruca maxima, Canadensis, lutea *Barr. Icon. 706*. & *Corn. 15. Icon. Barr. ex Corn. l. c.*

426. Eruca minor, Bulbi Napique radice, filiquâ rotundâ *Barr. Icon. 1198. n. 1. quid?*

427. Eruca minima, oblongâ & hastatâ filiquâ *Barr. Icon. 1198. n. 11. quid?* Erucae vires vide in *Hist. Raii 806*.



428. Sinapi Hispanicum, pumilum, album *Inst. R. Herb. 227*. Eruca sylvestris, flore albo, Italica *Barr. Icon. 132*. Annua est planta, cujus radix lignosa, albicans & contorta; Folia *Erucae hortensis*, sed nonnihil hispida & scabra, in profundiores acutioresque lacinias incisâ. Caules erecti, ramosi, minoribus foliis vestiti, hirsuti. Flores promit albos, rariùs rubentes, qui expansi semunciam ferè ampli, quibus succedunt filiquæ longæ, teretes, in summo

mo tenui capitello ornata. Sapore prædita est acriusculo & ad Erucam accedente. Floret Martio & Aprili in vineis Campaniæ Romanæ & per vias frequens. Sinapi vires vide in Hist. Raii 803.



429. Hypecoon tenuiore folio *Inst. R. Herb.* 230. Hypecoum Clusii, tenuifolium, flore pallido *Barr. Icon.* 352. Hypecoi altera species *C. B. Pin.* 172. & *Raii. Hist.* 1328. In agro Aquilexientiensi provenit.



430. Sinapistrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo minus, non spinosum *H. L. Bat.* Lupinus Arabicus Ponæ, Mozambez di Angola Herbariorum *Barr. Icon.* 1235. *Pon. Bald. Ital.* 102. & *Raii Hist.* 859.

431. Sinapistrum Lusitanicum, triphyllum, flore rubro, filiquis corniculatis *Inst. R. Herb.* 232. Trifolium filiquosum, flore violaceo, Lusitanicum *Barr. Icon.* 866. *Raii Hist.* 860.

432. Sinapistrum peregrinum, triphyllum, flore luteo. Trifolium peregrinum, alterum, flore luteo *Barr. Icon.* 865.

433. Sinapistrum Canadense, triphyllum, filiquâ crassiore. Trifolium Asphaltites, Canadense, filiquosum *Barr. Icon.* 914. Trifolium Asphaltion, Canadense *Corn.* 131. Lotus sylvestris ex Codice Cæsareo *Dod. Pempt.* 572. *Icon. Barr. ex Corn.* l. c.



434. Herba Paris Canadensis, bulbosa, triphylla. Solanum triphyllum, bulbosum Canadense *Barr. Icon.* 259. & *Corn.* 167. *Icon. Barr. ex Corn.* l. c.



435. Amaranthus major, purpureus, crispis paniculis, semine rufo *Barr. Icon.* 658. *Amarante.*

436. Amaranthus major, incurvâ & obsoletè rubrâ paniculâ, semine albo *Barr. Icon.* 657.

437. Amaranthus major, coccineus, sparsis & longioribus thyrsi flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 642.

438. Amaranthus purpureus, crassioribus setis, nutante crispâ Jubâ, semine nigro *Barr. Icon.* 641.

439. Amaranthus æstivus, majoribus, coccineis nutantibusque flagellis, semine pallido *Barr. Icon.* 659.

440. Amaranthus major, purpuro-violaceus, erectis congestisque spicæ flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 649.

441. Amaranthus major, purpuro-violaceus, tenuibus, transversis spicarum flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 650.

442. Amaranthus major, virentibus spicarum paniculis, semine nigro *Barr. Icon.* 648.

443. Amaranthus tricolore folio, è viridi pallidis flosculis *Barr. Icon.* 647. *Amaranthus tricolor Lob. Icon.* 252.

444. Amaranthus purpuro-violaceus, tenuibus setis, nutante & crispâ jubâ, semine nigro *Barr. Icon.* 645.

445. Amaranthus coccineus, thyrsoides, semine nigro *Barr. Icon.* 646.

446. Amaranthus ferotinus, major, purpuro-violaceus, tenuioribus spicis & flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 640.

447. Amaranthus ferotinus, major, purpureus, oblongâ sparsâque spicâ, semine nigro *Barr. Icon.* 639.

448. Amaranthus major, præcox, nutantibus, roseis flagellis, semine carneo *Barr. Icon.* 664.

449. *Amaranthus major*, serotinus, arborefcens, nutantibus, rofeis flagellis, femine carneo *Barr. Icon. 663.*
450. *Amaranthus major*, præcox, crafsâ congestâ & coccineâ spicâ, femine albo *Barr. Icon. 662.*
451. *Amaranthus serotinus*, medius; purpureâ, crafsâ, congestâque spicâ, femine pallido *Barr. Icon. 661.*
452. *Amaranthus major*, purpureus, rarioribus thyrsorum flagellis, femine nigro *Barr. Icon. 677.*
453. *Amaranthus præcox*, incurvis, crassioribus, coccineisque flagellis, femine albo *Barr. Icon. 660.*
454. *Amaranthus præcox*, minor, coccineis, erectis flagellis, femine albo *Barr. Icon. 678.*
455. *Amaranthus minor*, coccineus, paniculâ tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ *Barr. Icon. 506.*
456. *Amaranthus minor*, pallidus, paniculâ tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ *Barr. Icon. 505.*
457. *Amaranthus minor*, aureus, pyramidalis, flagellis hispidis, crispis & cristatis *Barr. Icon. 476.*
458. *Amaranthus minor*, luteo-paleaceus, pyramidalis, flagellis erectioribus, cristatis *Barr. Icon. 475.*
459. *Amaranthus minor*, aureus, latâ & cristatâ paniculâ *Barr. Icon. 507.*
460. *Amaranthus minor*, coccineo-purpureus, latâ cristatâque in globum paniculâ *Barr. Icon. 508.*
461. *Amaranthus minor*, purpuro-violaceus, amplâ, latâ, globosâ, crispâ & cristatâ paniculâ *Barr. Icon. 478.*
462. *Amaranthus minor*, luteo-purpureus, pyramidalis, longis, sparsis & cristatis flagellis *Barr. Icon. 477.*
463. *Amaranthus minor*, simplici paniculâ, femine nigro *Barr. Icon. 643.*
464. *Amaranthus minor*, coccineus, simplici & nutante paniculâ, femine albo *Barr. Icon. 644.*
465. *Amaranthus minor*, serotinus, obsoletè rubente spicâ, femine nigro *Barr. Icon. 671.*
466. *Amaranthus minor*, atro purpureus, cristatis spicis *Barr. Icon. 672.*
467. *Amaranthus minor*, coccineus, sparsis thyrsi flagellis, femine rufo *Barr. Icon. 653.*
468. *Amaranthus minor*, serotinus, purpuro-violaceus, crassioribus & rarioribus spicæ flagellis, femine nigro *Barr. Icon. 654.*
469. *Amaranthus minor*, violaceo-purpureus, brevi, congestâ acutâ spicâ *Barr. Icon. 679.*
470. *Amaranthus viridi* spicâ, Indicus, minor *Barr. Icon. 680.*
471. *Amaranthus minor*, spicâ singulari, albo-purpureâ luteâque, lunatis circum caulem foliis *Barr. Icon. 1195. & Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 66.*
- Horum denominatio, qualem dedit Barr. non visa est egere longiori descriptione, quippequi in Icone satis eleganter distincti sint. Præterea genus istud ita formis variat, ut singuli vix possint ad species ab authoribus enumeratas referri.



472. *Polygoni* vel *Linifolia* per terram sparsa, flore scorpioidis *I. B. 3. 379. Turnef. Hist. Plant. circa Paris. Nascent. 127. Anthyllis Linifolia*, flore albo, *Polygonoides Barr. Icon. 532. Circa Parisios frequens.*



473. *Papaver Rheas*, flore carneo pleno *Barr. Icon. 763. Cocquelicoc à fleur double & couleur de chair. Papaveris Rhœados vires vide in Hist. Raii 855.*

474. Papaver Rheas, integro folio, Hispanicum *Barr. Icon. 1191. & Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 65.* Papaver ertaticum, foliis non dissectis. *Inst. R. Herb. 239.*

475. Papaver Alpinum, saxatile, Coriandri folio *Inst. R. Herb. 239.* Argemone lutea Ponæ *Barr. Icon. 764. & Pon. Bald. Ital. 100.* Icon. *Barr. ex Pon. l. c.* In Monte Ventoso vulgò *le Mont Ventou*, in ascensu ad facellum crescit.



476. Argemone Mexicana *Inst. R. Herb. 239.* Papaver spinosum, flore luteo *Barr. Icon. 1141.* Papaver spinosum *C. B. Prodr. 92. Le Pavot épineux.*



477. Granadilla Hispanis, Flos passionis Italis *Col. in Rech. 889.* Clematis trifolia, flore Melauthii clavato, Granadilla Monardi, Maracot Peruvianis *Barr. Icon. 1243. La fleur de la Passion.*



478. Alsine lotoides Sicala *Bocc. Rar. Plant. 21.* Portulaca Boetica, luteo flore, spuria, aquatica *Barr. Icon. 336.* Totâ Æstate & Autumno floret ad ripas *Quadalquivir* circa Hispalim.

479. Alsine Verna, glabra *Bot. Monsp.* Chamelinum gramineo seu acuto folio *Barr. Icon. 1165. n. 11.* Pusilla est planta Iconi ferè par. Flos ejus candidus, tetrapetalos, calyce ex albovirescente comprehensus; flori succedit utriculus ovatus, semine tenui ruffo & subrotundo foetus. In Italiâ occurrit Monspelii, Lugduni & circa Parisios provenit.

480. Alsine perennis, tenuifolia. Anthyllis Lychnoides, perenni radice *τεικοφυλλός* seu minor *Barr. Icon. 531.* Radicem habet perennem, lignosam, & fragilem, ex quâ septem aut octo surgunt cauliculi tenuissimi, erecti, glabri & nodosi, quorum singulis internodiis opposita, graminea, tenuissima & acuta insident folia. Summi cauliculi in ramos divisi sustinent flores albos, pentapetalos, calyce pariter pentapetalo & virescente comprehensos. Floribus succedunt utriculi plano & oblongo semine turgidi. A sinistris habes calycem cum flore depictum qualis microscopio conspicitur.

481. Alsine tenuifolia, flore albo, inverso, Hispanica. Anthyllis recta, trichophyllos, inverso flore albo, Hispanica *Barr. Icon. 533.* A superiori cauliculis albicantibus & tenui pube obsitis discrepat, tum etiam floribus pentapetalis, albis; deorsum sursumque reflexis: stamina quinque aurea suis apicibus onusta fundum floris occupant. Evanido flore calycis petala dimittuntur, ut utriculum semine foetum complectantur.

482. Alsine tenuifolia, minima, flore albo. Anthyllis trichophyllos, lychnites, minima, flore albo *Barr. Icon. 530.* Vix triuncialis est planta exili, albidâ, brevi & annuâ radice, è quâ plures assurgunt cauliculi tenuissimi, geniculati, nodosi, binis ex adverso nascentibus foliis ad singula internodia instructi, in summo comosi, floresque exiguos, albos edunt calyce comprehensos pentapetalo. Floribus decussis supersunt pericarpia subrotunda, pulverulento & exili semine turgida. Calycis & floris habes delineationem qualis ope microscopii videtur.

483. Alsine annua, seu minor, angustifolia, flore albo. Anthyllis lychnites, annua, seu minor, angustifolia, flore albo *Barr. Icon. 580.* Ex radice tenui, annuâ, albidâ & in multas fibras juxta partem inferiorem capillatâ cauliculos edit duodenos, aliquando plures, geniculatos, tenues, glabros, repandos & in summo ramosos, foliis instructos binis ex adverso nascentibus, capillaribus, latè virentibus, è quorum alis & extremis ramis flores singulares emergunt semunciali & capillari pediculo adnati, perexigui, pentapetali,

tali, albi, quibus tandem succedunt utriculi semine turgidi. Excisus à dextris ramulus calycis & fructus formam accuratorem ad microscopium delineatam ostendit, à sinistris verò ramulus excisus nativæ est magnitudinis.

484. *Alfine* *Spergulae* facie, media *C. B. Pin. 251. Anthyllis Polygonoides, angustifolia Barr. Icon. 579.*

485. *Alfine* *maritima*, incana, minima. *Anthyllis Alfinefolia*, incana, marina, minima *Barr. Icon. 529.* Cauliculos hæc edit erectos, ad quatuor uncias, aut procumbentes, humifusos & serpentes, *Alfines* vel potius *Thymifoliis* binis ex adverso oppositis, utrinque acutis & brevi tenuique pediculo nixis vestitos. Flores albi, parvi, calycibus suis comprehensi, per caulium alas aut extrema sparguntur, quos pericarpia sequuntur exigua, oblonga, semine pulverulento & nigro turgida. Ad sinistram habes naturalem rami magnitudinem, cujus pars à dextris depingitur qualis videtur ope microscopii. Folia quandoque nonnihil majora sunt quam in *Icone* depinguntur, & obscurè virent; albida villosa & lychnidea apparent.

486. *Alfine* *maritima*, minima, *Thymi folio*. *Polygonum maritimum*, minimum, *Thymifolio Barr. Icon. 559.* Longâ crassiusculâ, subfusâ divaricatâque potitur radice, ex quâ furculi plurimi oriuntur, humi sparsi in circum, geniculati, tenues, crebris alternisque *Thymi foliis* ad singula internodia instructi; è quorum alis singulis singulares erumpunt flores adeò parvi ut visum fugiant, suo pedicello & calyce donati, albi, interdum etiam carnei, pentapetali, quorum petala integra sunt & subrotunda. Folia floresque magis congeruntur versus extremitates furculorum. Habes in *Icone* plantæ formam & magnitudinem naturalem. Ad latera juxta asteriscum folium & florem ut microscopio apparebant, appingi curavi. Infra *Ostia Tyberina* ad litus maris solo firmiore provenit.



487. *Ros* *solis minor*, seu *rotundifolius Barr. Icon. 251. n. 1. Ros* *solis folio subrotundo C. B. Pin. 354.*

488. *Ros* *solis major*, seu *longifolius Barr. Icon. 251. n. 11. Ros* *solis folio oblongo C. B. Pin. 357. Vires vide in Hist. Raii 1100.*



489. *Juncus* *cacumine reflexo*, major, paniculâ minore *Barr. Icon. 204. n. 11. Le Jonc.*

490. *Juncus* *cacumine reflexo*, minor, paniculâ majore *Barr. Icon. 204. n. 1.*

491. *Juncus* *repens*, ἀρροχάρον, minor, botrioides *Barr. Icon. 114. n. 1. Juncus* *parvus*, cum pericarpis rotundis *I. B. quoad Iconem 2. 522.* Radice potitur *Scirpi* serpente, tenui, nigricante & multis fibris capillatâ, quæ tenues; in imo atrorubentes caules seorsim non simul congestos emittit sesquipedales, enodes, ad basim foliis junceis angustis, pedalibus, acutis, infirmâ tamen acie, è cœsio virentibus, eâ parte quâ caulem aspiciunt non nihil concavis & canaliculatis convolutis, in longam paniculam desinentes nutantem, racemosam, tenuibus, & rotundis pericarpis fusco phœniceis, vix *Brassicæ* semine majoribus gravem, nullo tamen folio paniculam superante. In pratis supra pontem *Milvium* ad dextram *Tyberis* collegit *Barr.*

492. *Juncus* *Sorghii capitulis*. Gramen junceum, *Sorghii capitulis. Barr. Icon. 747. n. 1.*

493. *Juncus* *Milii paniculâ*. Gramen junceum, *Milii paniculâ Barr. Icon. 747. n. 11.*

494. *Juncus* *maritimus*, *Sorghii paniculâ utriculatâ Barr. Icon. 203. n. 11. Juncus* *acutus capitulis Sorghii C. B. Pin. 11. Raii Hist. 1302. Hujus capita exprimi*

exprimi curavimus, quoniam utriculi semine minuto & anguloso, ac flavescente turgent. Inter Caricta littoris Ostiensis provenit.

495. Juncus palustris, humilior, erectus *Inst. R. Herb. 246.* Gramen Bufonium, erectum, latifolium *Barr. Icon. 263. n. 1.* Gramen Bufonium, erectum, angustifolium, majus *ejusdem Icon. 264.* Gramen Bufonium, erectum, angustifolium, minus *ejusdem Icon. 263. n. 11.* Holosteum Mathioli *Lob. Icon. 18.* Gramen nemorosum, caliculis paleaceis *C. B. Pin. 7. Raii Hist. 1309.* Plurimum ludit hic Juncus ratione loci, undè supinus, erectus, latifolius vel angustifolius crescit; quas variationes exprimit Barr.

496. Juncus palustris, humilior, repens *Inst. R. Herb. 246.* Gramen Bufonium, supinum, mollius seu umbellatum *Barr. Icon. 93.*

497. Juncus palustris, humilior, capsulis triangulis & glomeratis. Gramen Bufonium, glomeratis utriculis *Barr. Icon. 94.* Gramen Junceum, capsulis triangulis, minimum *Raii Hist. 1307.* Superioribus est congener, radices habet fibrosas, albidas, paulòque crassiores & longiores, ex quibus surgunt culmi nonnihil inclinati & supini, foliaque emergunt juncea, firma, angusta, acuta & in extremo nonnihil arcuata. Culmi binis aut tribus foliis uncialibus vestiti abeunt in umbellam trium aut quatuor radiorum inæqualis longitudinis. Ramos fulciunt folia supposita, quorum in alis & ad extrema ramulorum utriculi multi, atrorubentes in echinatum caput, Pisi magnitudine, glomerantur, mucronati, læves, & splendidi. In paludosis Tyberis, viâ Ostiensi, tertio ab urbe lapide, & circa pontem Milvium observavit Barr. Circa Parisios quoque crescit.

498. Juncus nemorosus, latifolius, major *Inst. R. Herb. 246.* Gramen hirsutum, angustifolium, perenne, Lini utriculis *Barr. Icon. 748. n. 11.* Gramen nemorum Dalechampii *Lugd. 429.* Holosteum *Math. edit. Valgrif. Ital. in fol. 1018. Lugd. 1188.* Radice nititur cespitosâ, perenni, fuscâ, fibrosâ & tenui, quæ folia promit angusta, sesquipalmum longa, pilis lanuginosis, oblongis, crispis & mollibus villosa, nec culmis breviora. Culmi sesquipalmes, rotundi, glabri desinunt in paniculam latè sparsam, cujus flores petalis sex stellatim ordinatis constant, utriculo rotundo, rufo semine turgido medium eorum occupante. Maturo semine decidunt petala hæc floris seu glumæ, & in tres lobos scinditur utriculus.

499. Juncus Graminis Cyperoidis radice, tenuifolius, elatior *Barr. Icon. 118. n. 1.*

500. Juncus Gramineus, Cyperi radice, rufâ & hirsutâ spicâ *Barr. Icon. 255. n. 11.* Utriusque descriptiones desunt.



501. Kali geniculatum, aphyllantes, gilvis paleaceisque flosculis, Hispanicum *Barr. Icon. 215.* Kali fruticosum, Hispanicum, Tamarisci folio *Inst. R. Herb. 247.* Hujus & sequentium descriptiones non invenio.

502. Kali vermiculatum, fruticans, minori folio, Hispanicum *Barr. Icon. 216.* Kali fruticosum, Hispanicum, Capillaceo folio villosa *Inst. R. Herb. 247. La Soude d'Espagne velue.*

503. Kali vermiculatum, Hispanicum, viride, fruticans *Barr. Icon. 206.*

504. Kali vermiculatum, Hispanicum, incanum, fruticans *Barr. Icon. 205.*

505. Kali Polygonoides, frutex polyspermon *Barr. Icon. 191. & Bocc. Mus. part. 2. 83. Tab. 73.*

506. Kali minus, tenuifolium, incanum, fruticosum, Siculum *Barr. Icon. 79.* Kali Siculum, lignosum, floribus membranaceis *Bocc. Rar. Plant. 59.* Polygonum fruticans, roseum, Thymi folio, Siculum *Barr. Icon. 1034. n. vj.* Ramos hosce duos accepit à P. Boccone. Priorem sine flore, posteriorem cum floribus.

507. Kali vermiculatum, albo & amplo Sedi rosei flore Barr. Icon. 888.
 Kali floridum, repens, Aizoides, Neapolitanum Col. part. 2. 72.
 508. Kali Molluginis folio, umbellatum Barr. Icon. 120. & Bocc. Mus. part. 2. 167. Caules edit palmares & pedales, lignosos, albidos & villosos, æqualiter in ramos oppositos dividuntur, densis vestiti foliis Molluginis, virentibus, nec semunciâ longioribus, crebro sed alterno situ verticillatim cauliculos ambientibus. Extrema caulium in umbellam desinunt, sed flores fluctusque jam deciderant, cum occurrit. Sapor ejus virosus est. In Hispaniâ invenit.



509. Helianthemum Alpinum, folio Pilosellæ minoris Fuchsi I. B. 2. 18. Cistus Oleæ folio, villosus, flore aureo, Italicus Barr. Icon. 365. Thymi in modum fruticat humilis & sesquipalmaris planta, radicibus & caudicibus lignosis, tortuosis, atrofusis & ramosis, foliis luxurians crebris, congestis, Oleæ formâ, oppositis, longis, angustis, utrinque acutis, supernè è viridi cinereis, infernè incanis, villosis, & albidâ pube hispidis, uncialibus, tres lineas latis, sed in caule minoribus. Cauliculorum summa quinque aut sex flores aurei, pentapetali, quorum petala cordata sunt, comant, & quibus succedunt fructus tricapsulares. Tota planta longiusculâ canescit pube.
 510. Helianthemum Serpilli folio villosus, flore pallido, Italicus Barr. Icon. 366. Folia huic minora, breviora, minus hirsuta; flores minores, pallidi & per cauliculos inordinatè sparsi. Tota planta lignosa est & fruticosa, vixque quatuor aut quinque uncis altior.
 511. Helianthemum angusto Serpilli folio, villosus, flore aureo, Italicus Cistus angusto Serpilli folio, villosus, flore aureo, Italicus Barr. Icon. 488. Lignosum fruticosumque istud cauliculos edit vix quinquunciales, tortuosos, foliis instructos Serpilli, sed angustioribus, per intervalla binis, & utrinque è cinereo virentibus, supernè tamen obscurioribus, & in summo quinque aut sex floribus glomeratis aureisque comosos. Tota planta villosa & hispida est nec minus, quàm prima species, licet obscurius virescat.
 512. Helianthemum folio Thymi incano I. B. 2. 19. Raii Hist. 1016. Chamæcistus incanus, Tragorigani folio, Hispanicus Barr. Icon. 415. Perennis est planta, vix suâ figurâ major, lignosa, furculosa, totaque canescens, Thymi modo & magnitudine implexa, ramis humifusis, repandis & sursum reflexis, quibus bina ex adverso, alternatim & geniculatim hærent folia Tragorigani angustifolii, hoc est quadrantem uncie longa, & vix lineam lata; In singulorum ramulorum extremis tres aut quatuor ad summum in comam congesti panduntur flores, quibus succedunt pericarpia globosa, trifida, maturo semine in tres dehiscentia cellulas.
 513. Helianthemum Thymi folio glabro Inst. R. Herb. 249. Chamæcistus angusto Thymi folio, Hispanicus Barr. Icon. 416. A superiori discrepat foliis glabris, læto virore nitentibus, brevioribus & Thymo longè angustioribus.
 514. Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum sparsum I. B. 2. 18. Chamæcistus brevi vermiculatoque folio, minor Hispanicus Barr. Icon. 446. Cistus minor, &c. ejusd. Icon. 286. Humifusa est planta & glabra, Hispaniæ, Italiæ Galliæque Narbonensis indigena. Icon. Barr. bis repetita.
 515. Helianthemum tenuifolium, glabrum, erectum, flore luteo I. B. 2. 18. Raii Hist. 1015. Chamæcistus luteus, vermiculato folio, major Barr. Icon. 445. Fruticosum est, furculique ejus erecti, ramosi, lignosi & teretes, quos alterna vestiunt folia virentia, vermiculata, crassiuscula, plana tamen, modò brevia, modò oblonga; Flores fert luteos, paucos, quorum fructus ut in aliis tricapsulares. Tota planta glabra est & perennis. Circa Eremum R. P. Augustin. propè Gratianopolim crescit, nec non in Italiâ & in Galliâ Narbonensi.

516. *Helianthemum Massiliense*, Coridis folio *Inst. R. Herb. 250*. Cistus Thymi folio, saxatilis, Italicus *Barr. Icon. 290*. Radix huic longa, lignosa, fusca & perennis: folia Thymo longiora, inodora, subcinerea, & præangusta. Flores aurei, terni aut quaterni summis ramulis innascentes, calycibus virentibus & subhispidis comprehensi. Fructus subrotundi & mucronati semine tenui turgebant. Tota planta Thymo ferè similis. Junio florebat in maritimis Arcis Ostiensis, locis saxosis & arenosis. Massiliæ ad radices montis *Redon* provenit.

517. *Helianthemum Thymi folio*, luteum, majus. *Chamæcistus luteus*, Thymi folio, *Polyanthos*, seu major *Barr. Icon. 443*. Crebra fert folia, quorum alia majora, longiora, quadrantem unciae ut plurimum longa, Thymo tenuiora & pubescentia; surculi erecti ramosi, lignosi & brevi lanugine tecti flores ferunt in summo luteos, pediculo oblongo insidentes, plures & laxo satis ordine sparsos. Fructus tricapsulares: semen subrufum & Milio minus ac tenuius. Radicem habet lignosam & tortuosam.

518. *Helianthemum Thymi folio*, luteum, minus. *Chamæcistus luteus*, Thymi folio *ὀλίπανθος* seu minor *Barr. Icon. 444*. Omnibus suis partibus superiori minus est. Folia duplò minora & breviora; flores modò singulares, modò bini aut terni. Pumila est planta, radices tamen crassas lignosas & tortuosas habens.

519. *Helianthemum Thymifolium*, flore rubello, Hispanicum. *Chamæcistus mas*, flore rubello, Thymi foliis *Barr. Icon. 328*. Surculos edit erectos, ramosos, lignosos, breves, vix palmi quadrante altiores, incanos, densis & alternis vestitos foliis Thymi; id est quadrantem unciae longis, qui in summo flores tres aut quatuor rubellos sustinent. Hæc planta Hispaniæ indigena est.

520. *Helianthemum luteum*, rugosis foliis, Hispanicum. *Chamæcistus luteus*, toroso folio, Hispanicus *Barr. Icon. 439*. *Bocc. Mus. part. 2. Tab. 74*. Lignosum & humile est, ramosum, crebris foliis oblongis, angustis, acutis, supernè ad nervum usque convolutis oris, quasi vermicularis, & contortis funium toris constarent. Flores & fructus ut in aliis.

521. *Helianthemum luteum*, Thymi durioris folio. *Chamæcistus luteus*, Thymi durioris folio *Barr. Icon. 441*. Figurâ non est major, fruticans cujus surculi in tenues lignososque ramos dividuntur *Thymique durioris* foliis oppositis binis rarisque vestiantur. Flores lutei, numerosi latè se spargunt.

522. *Helianthemum luteum*, imis foliis Serpilli. *Chamæcistus luteus*, imis Serpilli foliis *Barr. Icon. 440*. Cauliculi hujus recti, teretes, tenui albescunt lanugine. Ima folia Serpilli, latiuscula, nonnihil longiora, acuta, supernè nigricantia, infernè incana; superiora verò longiora, unciam vix longa, & lineam lata, *Rorismarini* foliis æmula ex quorum alis alia minora angustissima acutaque prorumpunt. Flores fert in summo cauliculorum luteos, quibus succedunt pericarpia tricapsularia seminibus minutis foeta.

523. *Helianthemum luteum*, imis Thymi foliis. *Chamæcistus luteus*, imis Thymi foliis *Barr. Icon. 442*. Superiори consimile, sed incanâ magis albescit lanugine. Folia verò ima Thymo vulgari angustiora, nonnihil longiora, superiora verò præcedentis foliis paria, *Lavandulæ* aut *Rorismarini* formâ, minora tamen & angustiora. Flores & fructus ut in superiori.

524. *Helianthemum Thymi folio*, flore ferrugineo. Cistus minor, Thymi folio, flore ferrugineo *Barr. Icon. 285*. Supina edit virgulta quæ sursum se reflectunt, pluribusque divisa ramulis lignosis, quibus viridia, glabra, alterna, *Thymique* folia alligantur, & in extremis enascuntur flores vinosi planè & & eleganter rubentes. In colle sabuloso prope pontem *Milvium* observavit *Barr.* Nos in Comitatu *Niciensi* circa oppidulum vulgò *la Tour*.

525. *Helianthemum Hispanicum*, *Halimi* folio amplissimo, incano & nervoso *Inst. R. Herb. 250*. Cistus *Halimi* folio, flore luteo, amplo, maximus,

Hispanicus *Barr. Icon. 292*. Frutex est sex cubitos & amplius altus, lignosus, per ramos binis & oppositis foliis vestitus, quàm in majore Halimo majoribus, longioribus, molli brevique lanugine incanis, semunciam longis, drantem uncia latis, imâ parte & juxta exortum rotundis, in processu longioribus, & in acumen desinentibus, nullo ferè pediculo adnatis, venis secundum longitudinem, maximè circum oras ductis, striatis. Flores in extremis ramis plures, uncia ampliores, lutei, molles & delicates enascuntur, qui citò evanescunt. Maio mense florebat in montibus dictis *Serra Morrena*, qui Boeticam à Castiliâ disjungunt. Ibique variae Cisti & Helianthemi species proveniunt.

526. Helianthemum Halimi folio, flore luteo, majore, Italicum. Cistus Halimi folio, flore luteo majore, Italicus *Barr. Icon. 291*. Superiori *Hispanico* frutex est minor, trës aut quatuor cubitos tantum altus. Folia ejus utrinque acuta & minora quàm in *Hispanico*, ut & flores. In littore maris juxta Terracinam, viâ quâ itur ad Divum Felicem densè ramosum hunc fruticem observabat Barr.

527. Helianthemum, Halimi minoris folio. Cistus Halimi minoris folio *Barr. Icon. 287*.

528. Helianthemum Halimi minoris folio, Hispanicum. Cistus Halimi minoris folio, Hispanicus *Barr. Icon. 1316*.

529. Helianthemum Halimi minoris folio, minus. Cistus Halimi minoris folio, minor *Barr. Icon. 289*.

530. Helianthemum Halimi minoris foliis in verticillos compactis. Cistus humilis, compactis in verticillos minoris Halimi foliis *Barr. Icon. 327*. & *Bocc. Mus. part. 2. 76. Tab. 64*.

531. Helianthemum frutescens, folio Majoranæ incano *Inst. R. Herb. 249*. Cistus incanus, Majoranæ folio, Hispanicus *Barr. Icon. 313*.

532. Helianthemum Lavandulæ folio *Inst. R. Herb. 249*. Cistus Lavandulæ latifoliæ folio *Barr. Icon. 288*.

533. Helianthemum Lavandulæ folio angustiori. Cistus lavandulæ folio, thyrsoides *Barr. Icon. 293*.

534. Helianthemum angusto Rorismarini folio. Cistus angusto Libanotis folio, flore singulari *Barr. Icon. 294*.

535. Helianthemum supinum, Hyssopi foliis villosis. Chamæcistus supinus, Hyssopi foliis villosis *Barr. Icon. 818*. & *Bocc. Mus. part. 2. Tab. 10*. Vires Helianthemi vide in Hist. Rai 1014.

Has elegantes Helianthemi species in Hispaniâ præsertim collegit Barr. Nulla enim regio harum tam ferax est.



536. Saxifraga Sedi folio longiore & angustiore ferrato. Sedum montanum, ferratum, roseum, flore purpureo *Barr. Icon. 373*. Varietas sequentis.

537. Saxifraga Sedi folio angustiore, ferrato *Inst. R. Herb. 252*. Sedum montanum, roseum, ferratum flore guttato *Barr. Icon. 1311. n. 1*. Umbilicus veneris minor 1. & 2. *Tabern. Icon. 847*. Variat hæc planta foliis modò brevioribus, modò longioribus, quæ variationes exprimuntur in tabulis Barrelieri 1. 2. & 3. id est *Icon. 1311. 1309. & 1312*.

538. Saxifraga foliis subrotundis, ferratis *Inst. R. Herb. 252*. Sedum montanum, roseum, ferratum, foliis subrotundis *Barr. Icon. 1310*.



539. Salicaria Corvini, thyrsoides, flore purpuro-violaceo, Virgæ aureæ folio *Barr. Icon. 1205*. Ab Equite Corvino habuit Barr.

540. Salicaria Hyssopi folio latiore *Inst. R. Herb. 253*. Polygonum aquaticum, majus *Barr. Icon. 773. n. 1*. Hyssopifolia aquatica *I. B. 3. 792*. Pumila

mila est planta humi procumbens, longis & flexuosis cauliculis latè se spargens, cujus radix alba, tenera, in internodiis fibrosa & capillata. Folia uncialia ut plurimum quæ majora sunt, Liniformia, lætiùs virentia, medioque nervo striata. Flores ex foliorum alis emergunt pentapetali, purpurei, unguibus petalorum albidis, tribus saturatæ purpuræ lineis & juxta fauces quinque staminibus purpurascens, cum apicibus aureis, decorati. Flos longè major sequenti, & sapor hebetior. Juxta serpentes aquarum rivulos, humidis etiam locis Romæ & in Campaniâ Romanâ provenit.

541. Salicaria minima, tenuifolia *Inst. R. Herb.* 254. Polygonum aquaticum, minus *Barr. Icon.* 773. n. 11. Hyssopifolia minor, vel potius Thimifolia, maritima *J. B.* 3. 792. Annua est plantula surrecta, quæ radice potitur tenui, albo-sordidâ in varios ramos fibrillasque divisâ, è quâ cauliculus striatus & quasi alatus rectusque surgit in varios ramos decussatim divisus, quibus folia angusta vix semuncialia, obtusè rotunda, è viridi nonnihil albida & subcinerea alternatim adhærent. Ex eorum alis flores parvi purpurascens, Gallii floribus vix majores, sursum erecti, brevi pediculo oblongoque calyce impositi erumpunt singulares, quibus evanidis nonnihil intumescunt calyces ad latera striati, quatuor aut quinque dentibus extuberantibus coronati. Junio florebat in uliginosis pratis viâ Lauretanâ, primo à ponte Milvio milliari.



542. Hypericum saxatile, Ericoides, glauco folio. Coris lutea, Ericoides, fruticans, Hispanica *Barr. Icon.* 351. & *Bocc. Mus. part. 2. Tab.* 74. Nec hujus, nec sequentis descriptionem invenio.

543. Hypericum montanum, folio lato, ramosum. Androsæmum montanum, minus *Barr. Icon.* 490. & *Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab.* 144. Hyperici vires vide in *Hist. Raii* 1018.



544. Pyrola longo folio, flore albo singulari, Polonica *Barr. Icon.* 1156. n. 11. Pyrola Alfines flore, Europæa *C. B. Prodr.* 100. Alfinanthemon *Thal. Sylv. Harc. & Olhaf. Elench. Plant. Dant.* A Corvino habuit *Barr.*



545. Ruta sylvestris, Linifolia, Hispanica *Barr. Icon.* 1186. & *Bocc. Mus. part. 2. 82. Tab.* 73. Descriptam non invenio in scriptis Barrelieri. Vires Rutæ vide in *Hist. Raii* 875.



546. Garidella foliis tenuissimè divisis *Inst. R. Herb. app.* 565. Oenanthe Indica, semine cordato *Barr. Icon.* 1240. Nigellastrum raris & Fœniculaceis foliis *H. R. Monsp.* Pictam communicabat Eques Corvinus. Ramus tantum medius optimè delineatus, laterales malè.



547. Cistus latifolius, magno flore *Barr. Icon.* 1315. Nec hujus, nec sequentium descriptiones invenio.

548. Cistus Ledum, salviæ folio, Hispanicus *Barr. Icon.* 314.

549. Cistus Ledon, Majoranæ foliis. Ledum folio Sampsuchi *Barr. Icon.* 817. Hypocistidis, Ladanique vires, usus, & colligendi modum vide in *Hist. Raii* 1008.



550. Sedum majus, non denticulatum, flore purpureo montanum *Barr. Icon.* 394. Sedum majus, montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus *C. B. Pin.* 283. *Raii Hist.* 688. La grande Joubarbe des montagnes. Montibus Apenninis gaudet, necnon in valle Barfilionensi. Vires Sedi vide in *Hist. Raii* 687.

551. *Sedum montanum*, roseum, minus, reticulatum *Barr. Icon.* 391. n. 2.
 552. *Sedum montanum*, tomentosum, minus *Inst. R. Herb.* 262. Sempervivum rubrum, montanum, *Gnaphalodes Col. part. 1.* 291. Hujus elegantis plantæ primus mentionem fecit Fabius Columna l. c. sed quia, inquit Barr. non satis distincta Columnæ Icon, aliam exhibere volui. Frequentem inveniebat in supercilio collium qui juxta lacum ad radicem summi montis Neursini positum, in latâ planitie obversâ pago quem *Castelluco* vocant, ad meridiem inter scopulorum rimas. Nos in editioribus montibus supra Vapincum & vallis Barfilionensis copiosum vidimus.

552. *Sedum majus*, non reticulatum, flore purpureo, montanum, angustifolium *Barr. Icon.* 391. n. 11. *Sedum Alpinum*, subhirsutum, folio longiore *H. R. Par.* Folia huic angustiora, vix semunciam longa & sesquilineâ latiora, tenui pubentia lanugine, pingua, acuta, numerosâ serie & imbricatim in singulis ocellis imposita. Ex Aprutii montibus habuit Barr.

553. *Sedum montanum*, umbilicatum, incanum, minus, flore saturatè purpureo. *Barr. Icon.* 374. Minores huic quàm superioribus ocelli in globum clauduntur foliis in se coeuntibus, incanâque prorsus lanugine conteguntur. Ut in caulem assurgit vix Icone majorem, rara secundum ejus longitudinem sparguntur folia. Flores in summo caulis in umbellam se explicant superiorum formâ, stellati, sed minores, ad oras ciliaribus pubentes villis, petalis mediâ lineâ saturè violaceâ secundum longitudinem striatis: stamina in umbilico plurima surrecta, purpurea, suis onusta apicibus. Crescit in jugis Amatricensium in Aprutio.

554. *Sedum montanum*, Cephææ folio, flore albido. Cephææ montana minor albido flore *Barr. Icon.* 1170. Albenti fragilique è radiculâ plures humi fundit, teretes, carnosos repandosque cauliculos foliis plurimis, carnosis, oblongis & Cephææ vel Rosæ in modum collectis coronatos. Flores per caules triunciales dispersi albescunt, iisque succedunt pericarpia ex quinque vaginulis seu corniculis compacta, semine minuto & nigricante facta. Florebat Junio in montibus Eremitæ D. Bartholomæi Romam inter & oppidum Ananiam.

555. *Sedum roseum*, ferratum, i, longiùs radicans *Barr. Icon.* 392. Nec hujus, nec sequentium descriptiones invenio in scriptis Barrelieri. Videntur prima esse germina Sedi aut *saxifragæ folio serrato*, nec possunt ad sua genera rectè reduci, cum floribus careant, ac proinde notis characteristicis destituantur.

556. *Sedum roseum*, ferratum, ii, acuto folio *Barr. Icon.* 392.

557. *Sedum roseum*, ferratum, iii, curvo folio *Barr. Icon.* 392.

558. *Sedum roseum*, ferratum, iv, obtuso folio *Barr. Icon.* 392. *Palmaria Tabern. Icon.* 842.

559. *Sedum roseum*, ferratum, v, majus *Barr. Icon.* 392.



560. *Anacampteros minor*, purpurea *I. B.* 3. 682. *Telephium angustifolium*, minus, ferratum, purpureum *Barr. Icon.* 837. *Telephium purpureum*, minus *C. B. Prodr.* 133. *L'Orpin ou Reprise à fleur purpurine.*

561. *Anacampteros Lusitanica*, hæmatodes, maxima, flore albido *Inst. R. Herb.* 264. *Telephium majus*, subrotundo folio, floribus albicantibus *Barr. Icon.* 838. *L'Orpin ou Reprise de Portugal à fleur blanchâtre.* Vires vide in Hist. Rai 690. Lusitanica adhibetur *Anacampteros* in hæmoptisi, unde nomen inditum hæmatodes.



562. *Tribulus terrestris*, minor, incanus, Hispanicus *Barr. Icon.* 558. *A Tribulo terrestri vulgari*, qui frequens est in Italiâ, Campaniâ Romanâ, Romæque juxta vias & muros horti Matthæorum viâ Appiâ, foliis distinguitur densius

densius compressis, obtusioribus, villis porrò & canitie quibus tota planta obducitur: In vulgari enim glabra & atrovirentia sunt folia. In agro Madritensi Castiliæ novæ tantummodo observabat Barr. Vulgaris tamen Monspeli, dum erumpit, incanus videtur, hinc Hispanicum à vulgari non distinguendum censerem.



563. Juncago maritima. Juncus bulbosus, maritimus, floridus, filiquosus Barr. Icon. 271. Hyacinthi parvi facie, Gramen triglochin I. B. 2. 508. Raii Hist. 1308. Tota planta glabra est, ex radice bulbosâ Allii modo & fibrosâ sena aut octona emittit folia juncea, cylindracea, nonnihil tamen compressa & carinata, erecta acutaeque, ex quorum medio exurgit cauliculus seu culmus rotundus, teres, nudus, rufescens, in laxiorem desinens spicam florum tetrapetalorum, tumentium & globosorum, ex albo viridique rubescentium, quorum medium occupat pistillum quod abit in fructum trigonum, trifariam dehiscens. In maritimis ad Ostia Tyberina Aprili florentem reperiēbat Barr. Nos in maritimis Galliæ Narbonensis & Monspeliensis agri. A Juncagine palustri perennibus distinguitur radicibus.



564. Geranium minus, Saniculæ folio, albo flore Barr. Icon. 87. Foliis pollet Saniculæ feminae, id est, Astrantie, glabris, lucidis, dilutius tamen virentibus & minoribus, sed similiter per oras serratis, in quinos æquales lobos altius divisus & semunciali pediculo hærentibus. Caules illi ramosi quos folia alterna vestiunt appendicibus angustis & acutis stipata quæ caulium genicula complectuntur. Flores quinque petalis sinuosis seu cordatis constant calyce virenti comprehensi. Stamina decem suis onusta apicibus luteis pistillum ambiunt quod abit in fructum quinis seminibus compositum acu suâ munitis, & quæ maturo semine in spiram torquetur. Ex agro Urbevetano missum fuit.

565. Geranium Batrachioides, flore purpureo, reflexo, Italicum. Barr. Icon. 39.

566. Geranium hæmatodes, purpureum, parvo flore, Italicum Barr. Icon. 67. Varietas videtur Geranii hæmathodis, sive flore sanguineo, flores duplo minores, foliaque ejus majora vix uncialia. In sylvis cædus Aprutii reperit Barr.

567. Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo majori Barr. Icon. 40. & Bocc. Mus. part. 2. 82. Tab. 72. Radice nititur perenni, digito crassiori & in plures alias divisâ, è luteo rubescente, multaque in capita se spargente, ex quibus plurima erumpunt folia humifusa, uncialia, subhirsuta & minora quàm in Geranio Columbino vulgari; ex eorum medio plures eriguntur cauliculi pediculis foliorum vix crassiores, villosi, foliis nudi & in summo ramosi, vix tres uncias alti, quibus insident flores vulgari Columbino triplo majores, è purpurâ dilutâ rubentes. Magnitudinem naturalem habes è ramo exciso. Florebat Junio in pratis Neursinorum montium. Planta vix Icone major: at in horto translata longè ampliora folia, caulesque proferebat, & Junio, Julio, Augustoque flores dabat. Nos in monte Ventoso propè Avenionem reperimus.

568. Geranium Myrrhinum, tenuifolium, amplo flore purpureo Barr. Icon. 1245. A Geranio Cicutæ folio minori & supino C. B. Pin. 319 discrepat radice crassiusculâ, perenni, longâ, crassâ & divisâ quæ multa edit folia humifusa, Myrrhidis æmula, tenuia, ad nervum incisa, semipalmum longa, foliolis quasi composita semuncialibus. Ex eorum medio surgunt cauliculi supini modò, modò erecti, nudi, qui tres quatuorve flores sustinent semuncialis diametri, purpurâ accensâ rubescentes, & longè ampliores quàm in minori Geranio Cicutæ folio, petalis in extremo rotundis. Acus unciales floribus succedunt.

cedunt. Romæ per vias & agrorum margines frequens; Floretque Martio, nec odoris saporisve est ingrati.

569. Geranium Creticum, minus, five alterum, villosum *Barr. Icon. 492.* Geranium Chrysanthemi Cretici folio, Neapolitanum *Bocc. Mus. part. 2. 93. Tab. 83.* Folia promit *Ranunculi vulgaris* formâ, in tres lobos ad pediculum & nervum usque planè scissa, subrotundos, per oras ferratos, aliquandò altius incisos & sinuosos, sèna aut quaterna, humifusa, pediculis triuncialibus hærentia, & è radice longâ tenui & in fibras desinente erumpentia. Ex eorum medio caulis assurgit geniculatus, crassior & palmaris, cujus singula internodia binis & oppositis instruuntur foliis sensim minoribus & tenuioribus (ut in Icone Boccone exprimitur) & in extremo ex foliorum alis prodeunt flores singulares aut bini, pediculis fulti, purpuro-violacei & paulò minores quàm in *Geranio fusco* aut *Gratia Dei*. Fructus rostrum Gruinum repræsentat; acusque fructu maturo in spiram contorquentur.

570. Geranium Creticum, maximum Corvini *Barr. Icon. 1167.* Geranium latifolium, acu longissimâ *C. B. Pin. 319. Raii Hist. 1056.*

571. Geranium noctu odorum, Indicum *Barr. Icon. 68.* Geranium triste *Corn. 110.*



572. Thalictrum Batrachoides, minus, flore albo, Italicum *Barr. Icon. 480. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 79.* Thalictrum montanum, præcox *Inst. R. Herb. 271.* Ranunculus præcox, iij, Thalictri folio *Clus. Hist. 233.* In sylvâ Blæsensi in Galliâ provenit, necnon in Delphinatu non procul Gratianopoli in Querceto viâ quâ itur ad Herbiscum rurale palatium Episcopi Gratianopolitani, & in sylvâ montis Arverni Etruriæ in declivi ad ortum juxta viam. In Icone damus floris & siliculæ formam & justam magnitudinem, inquit Barrelierus. Florebat Romæ Martii initio in horto sancti Xyfti, semen initio Maji maturefcebat, quod in binis aut ternis ad summum siliculis loculatis, compressis, planis, falcatis, latiusculis; flori succedentibus continebatur rotundum, & rufum ut annotavit Clusius l. c. Siliculæ nimium ampliata mihi videntur, fortè pictoris negligentia.



573. Helleborus niger, trifolius *Ald. Hort. Farnes. 92. Raii Hist. 698.* Elleboraster Indicus, trifolius *Barr. Icon. 1143.* Vires Hellebori vide *Hist. Raii 697.*



574. Anemone latifolia, flava 1. Clusii *Barr. Icon. 792. Clus. Hist. 248.* Anemone Cyclaminis seu Malvæ folio, lutea. *C. B. Pin. 173. L'Anemone a fleur jaune.*



575. Ranunculus Tripolitanus, grumosâ radice, flore phœniceo Imperati *Barr. Icon. 582. & Imper. 673. La Renoncule du Levant à fleur simple. Icon. Barr. ex Imper. l. c.*

576. Ranunculus Alpinus, Coriandri folio, flore albo purpurascens *Barr. Icon. 456.* Ranunculus Alpinus, folio Coriandri *Pon. Bald. Ital. 197.* Ranunculus Rutaceo folio, flore suavè rubente *C. B. Pin. 181. Icon. Barr. ex Pon. l. c.* In Alpibus Delphinatûs ad radices cristæ editæ montis *de Lens*, oppido *Bourgdoysan* imminentis provenit.

577. Ranunculus tenuifolius, luteus, grumosâ radice, Soractensis, seu Italicus *Barr. Icon. 581.* Ranunculus Chærophyllos, Asphodeli radice *C. B. Pin. 181.*

578. *Ranunculus minor*, Rutæ folio, flore simplici, grumosâ radice, *Italicus Barr. Icon. 1153. n. 11.*

579. *Ranunculus minimus*, *Apulus Columnæ*, luteus *Barr. Icon. 791. Col. part. 1. 316.* *Ranunculus arvensis*, parvus, folio trifido *C. B. Pin. 179.*

580. *Ranunculus Ceratophyllos*, seminibus falcatis in spicam adactis *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 440.* *Cratæogonum pumilum*, luteum, Absinthii foliis, *Hispanicum Barr. Icon. 375.* *Cratæogonum Hispanicum Ejusd. Icon. 376. n. 11.* *Melampyrum luteum*, perpussillum *Lob. Adv. 10. & Raii Hist. 583.* *Monspeli eundo ad Boutonetum*, & in Hispaniâ inter segetes Castiliæ veteris verè floret, brevique perit.

581. *Ranunculus albus*, *Apenninus*, *Saniculæ majoris folio Barr. Icon. 88.* *Ranunculus flore albo*, *Alpinus*, major *I. B. 3. App. 860.* Sæpius nobis fuit obvius in Alpibus, in valle Barfilionensi, in monte Pilati supra Lugdunum, & apud Sebennas in monte Calcaris, vulgò *l'Esperon.*

582. *Ranunculus montanus*, hirsutus, humilior, *Narcissi flore C. B. Pin. 182.* *Pulsatilla trianthos*, sulfurea, semine non papposo *Barr. Icon. 494.* *Ranunculi montani ij. species altera Clus. Hist. 235. & Raii Hist. 590.* In Herbidis pratis summorum jugorum Apennini montis in Aprutio apud Amatricenses reperiebat Barr. Nos in Editioribus pratis humidis vallis Barfilionensis, præsertim circa oppidum *l'Arche* copiosum vidimus. Flos albus est qui exsiccatu sulfureus evadit. Folia & semina in Icone Barr. optimè, flos verò malè expressus.

583. *Ranunculus Fœniculaceis foliis*, *Hellebori nigri radice H. R. Monsp.* *Elleborus Ferulaceus Lobelii*, *Buphtalmum Dodonæi*, fortè *Pulsatilla lutea Corvini Barr. Icon. 1178.* *Helleborus niger*, tenuifolius, *Buphtalmi flore C. B. Pin. 186.*

584. *Ranunculus aquaticus*, albus, lato & *Fœniculi folio*, *Italicus Barr. Icon. 565.* *Ranunculus aquaticus*, folio rotundo & capillaceo *C. B. Pin. 180.* *Raii. Hist. 586.* Frequens per Galliam & Italiam in fossis pratorum, lacubus, & rivulis.

585. *Ranunculus aquaticus albus*, *Fœniculi folio Barr. Icon. 566.* *Ranunculus aquatilis omninò I. B. 3. 781. & Raii Hist. 586.* In Palustribus *Pompianis viâ Appiâ*, circa oppidum *Sermonetta*, observabat Barr. Nec minùs frequenter per Galliam occurrit.

586. *Ranunculus aquaticus*, *Plantaginis folio angustiore Inst. R. Herb. 293.* *Plantago aquatica*, angustifolia, *Polonica Corvini Barr. Icon. 1157.* A Corvino habuit.



587. *Clematidis cærulea*, erecta *C. B. Pin. 300.* *Clematis cærulea*, *Pannonica Barr. Icon. 397. & Clus. Hist. 123.*



588. *Caryophyllata Alpina*, minima, flore aureo *Barr. Icon. 399.* *Caryophyllata Alpina*, minima, 1. *Pon. Bald. Ital. 203.* *Caryophyllata Alpina*, minor *C. B. Pin. 322.* *La Benoite des Alpes.* In summis Alpium pratis, præsertim in deserto majoris *Carthusiæ* supra *Gratianopolim* in *Delphinatu* obvia est.

589. *Caryophyllata Alpina*, tenuifolia, incana, flore luteo, longiùs radicata *Barr. Icon. 400. & Bocc. Mus. part. 2. 160. Tab. 128.* *Caryophyllata Alpina*, minima. 2. *Pon. Bald. Ital. 205.* *Caryophyllata Alpina*, *Aprii folio C. B. Pin. 322.* *Icon. Barr. ex Pon. Bald. l. c.* In monte *de Lens* supra oppidum *Bourgdoysan* in *Delphinatu* eruebat Barr. Nos inter saxa montis *Touyon* in valle Barfilionensi collegimus. *Caryophyllatæ vires* vide in *Hist. Raii 607.*



590. *Fragaria* flore pleno, fructu rubello *Barr. Icon. 89.* *Fragaria* fructu rotundo, suavissimo, flore duplici *H. R. Par. Le Fraiser à fleur double.* A vulgari distinguunt flores pleni & numerosis petalis foeti. Fructus ejus nonnihil vulgari majores, grumosiore, rotundiores, optimi saporis & suavè rubentes; eodem tempore maturescunt.

591. *Fragaria* spinoso fructu *Barr. Icon. 90.* *Fragaria* fructu hispido *Ger. Emac. 998. & Raii Hist. 609.* Fructus hujus spinulis undique horrent & Echini modo, duris, incurvis, è fusco viridibus, brevibus & inter acinos fructuum enascentibus facilèque delabentibus; adeò ut nisi mudentur à spinis, deglutiri non possint, sed demptis spinulis suaviter comedantur. Vespasiano Robino debetur.

592. *Fragaria* sterilis, sylvestris, sericea seu incana *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 187.* *Trifolium montanum*, luteo *Tormentillæ* flore, cineraceum *Barr. Icon. 710.* *Fragariæ* affinis, sericea, incana *C. B. Prodr. 139.* In montibus Gallo-provinciæ nobis fuit sæpiùs obvia, necnon propè Valentiam urbem Delphinatùs juxta vias. *Fragariæ* vires vide in *Hist. Raii 610.*



593. *Quinquefolium minus*, cineraceum, luteo flore. *Pentaphyllum montanum*, minus, luteo *Tormentillæ* flore, cineraceum *Barr. Icon. 709.* Nec hujus, nec sequentis descriptionem invenio.

594. *Quinquefolium minus*, luteum, Hispanicum. *Pentaphyllum minus*, luteum, *Alchimillæ* facie, Hispanicum *Barr. Icon. 727.* *Quinquefolii* vires vide in *Hist. Raii 611.*



595. *Phytolacca Americana* majori & minori fructu *Inst. R. Herb. 299.* *Solanum majus*, ramosum *Barr. Icon. 150.* *Solanum racemosum*, Americanum *Raii Hist. 662.* *Mechoacanæ* loco radices hujusce plantæ in potionibus purgantibus & Electuariis solutivis usurpant Chirurghi Acadenses & Canadenses.



596. *Aralia Canadensis* *Inst. R. Herb. 300.* *Panax xg. p. 1105*, racemosa, Canadensis *Barr. Icon. 705. & Corn. 75.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



597. *Smilax unifolia*, humillima *Inst. R. Herb. app. 564.* *Lilium convallium minus* Bauhini, *Unifolium Dodonæi*, *Gramen Parnassi Mathioli* *Barr. Icon. 1212.* *Unifolium Dod. Pempt. 205.*

598. *Smilax spicata*, *Polygonati folio* *Inst. R. Herb. app. 564.* *Polygonatum latifolium*, spicatum, majus, flore albo, Canadense *Barr. Icon. 712.* *Polygonatum spicatum*, fertile *Corn. 34.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*

599. *Smilax* quæ *Polygonatum spicatum*, sterile *Corn. 32.* *Polygonatum latifolium*, spicatum, flore albo, Virginianum *Barr. Icon. 711. n. 11.* *Icon. Barr. Ex Corn. Hist. l. c.* Fructum rotundum, superiori dissimilem & minorem ei tribuit *Barr.*

600. *Smilax racemosa*, *Polygonati folio* *Inst. R. Herb. app. 564.* *Polygonatum racemosum*, flore albo, Canadense *Barr. Icon. 724.* *Polygonatum racemosum* *Corn. 36.* *Icon. Barr. ex Corn. l. c.*

601. *Smilax perfoliata*, ramosa, flore albo. *Polygonatum latifolium*, ramosum, flore albo, minus, Germanicum *Barr. Icon. 720.* *Polygonatum ramosum* *Dod. Pempt. 346.* *Icon. Barr. ex Dod. l. c.* In Delphinatùs montibus reperit *Barr.*

602. *Smilax Alpina perfoliata & ramosa*, flore luteo. *Polygonatum ramosum*, perfoliatum, luteum, *Alpinum* *Barr. Icon. 719*. A *Polygonato* ramoso sequenti distinguitur fructus formâ, modò legitima sit *Icon. Barr.* In monte *Divi Hugonis*, deserto majoris *Carthusiæ* necnon circa oppidum *Bourgdoysan* in tractu *Alvariensi* collegisse asserit.



603. *Polygonatum ramosum*, flore luteo, majus seu latifolium & angustifolium flore pallido, *Canadense* *Barr. Icon. 723*. *Polygonatum ramosum*, flore luteo, majus *Corn. 39*. *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.* Planta est sui generis nullique proprio adhuc adscripta. Utrumque *Polygonatum* latifolium scilicet & angustifolium in *Horto Regio* possidemus, suntque distinctæ species, ut monet *Cornutus*.



604. *Agrimonia odorata* *Camer. Hort. Agrimonium odoratum* *Barr. Icon. 611*. *Eupatorium odoratum* *C. B. Pin. 321. Raii Hist. 400. L' Aigremoine odorifera*. Gaudet montibus *Latii & Sabinarum*, ac sylvis editioribus *Italiæ*, necnon collibus *Tiburtinis* secundum *Albulam*. Vires vide in *Hist. Raii l. c.*



605. *Agrimonoides semine glabro* *Barr. Icon. 612. Agrimonoides* *Col. part. 1. 145. & Raii Hist. 400.*



606. *Onagra latifolia*, floribus amplis *Inst. R. Herb. 302. Lysimachia lutea*, corniculata, latifolia, *Lusitanica* *Barr. Icon. 1232*.

607. *Onagra angustifolia* *Inst. R. Herb. 302. Lysimachia latifolia*, spicata, lutea, *Lusitanica* *Barr. Icon. 989*.

608. *Onagra angustifolia*, caule rubro, flore minore *Inst. R. Herb. 302. Lysimachia angustifolia*, spicata, lutea, *Lusitanica* *Barr. Icon. 990*.



609. *Leontopetalon foliis costæ ramosæ innascentibus* *Cor. Inst. R. Herb. 49. Leontopetalum vulgare* *Barr. Icon. 1030. Leontopetalum ramosum*, *Polyanthos. Ejusd. Icon. 1023. Leontopetalon* *Dod. Pempt. 69*.

610. *Leontopetalon foliis costæ simplici innascentibus* *Cor. Inst. R. Herb. 49. Oxalis tuberosa*, *Syriaca Aldini*, flore luteo, reticulato, foliis maculatis *Corvini* *Barr. Icon. 1113. Chrysogonum Dioscoridis* *Lugd. app. 28. A Corvino* plantam hanc vivis coloribus pictam habuit *Barr.* sed malè quidem delineatam.



611. *Apium Lusitanicum*, rotundifolium *Inst. R. Herb. 305. Oreoselinum rotundifolium*, *Hispanicum* *Barr. Icon. 350*.



612. *Cicuta montana*, tenuifolia *Barr. Icon. 1161. La Cigue de montagne*. Caule, foliis, floribus, umbellis & semine vulgari similis est, sed huic folia longè tenuiora, lucida, atrovirentia & foetida sunt. Semen in umbellis globosum, subacutum, & striatum. Flores albicant. Julio florebat, semen Augusto maturescebat. Vires *Cicutæ* vide in *Hist. Rai 450*.



613. Bulbocastanum alterum, caule firmiore *Barr. Icon. 244*. Bulbocastanum majus, Apii folio *C. B. Pin. 162*. & *Raii Hist. 440*. *La Terre noix*. Usus vide in *Hist. Raii l. c.*



614. Sium aromaticum, Sison Officinarum *Inst. R. Herb. 308*. Ammi Sii vel Laveris folio, flore albo, semine nigro *Barr. Icon. 1190*. Sison sive officinarum Amomum *J. B. 3. part. 2. 107*.



615. Tragoselinum majus, umbellâ candidâ *Inst. R. Herb. 309*. Saxifraga major, Germanica, foliis altius incisus *Barr. Icon. 243*. Saxifraga hircina, major *J. B. 3. part. 2. 109*. *Le Boucage*.

616. Tragoselinum majus, alterum *Inst. R. Herb. 309*. Daucus 3. Lugdunensis Historiæ *Barr. Icon. 1199*. & *Lugd. 717*.

617. Tragoselinum majus, foliis dissectis. Pimpinella saxifraga, hircina, major, foliis altè incisus, montana, Italica *Barr. Icon. 737*.

618. Tragoselinum minus *Inst. R. Herb. 309*. Pimpinella saxifraga, hircina, minor, montana, foliis altè incisus *Barr. Icon. 738*.

619. Tragoselinum annuum, rotundifolium, Italicum. Saxifraga rotundifolia, flore albo, annua, Italica *Barr. Icon. 242*. & *Bocc. Mus. part. 2. 85*. *Tab. 80*. Apium peregrinum, foliis subrotundis *C. B. Prodr. 81*.

620. Tragoselinum Italicum, minus, umbellis nutantibus. Saxifraga viminea, albis nutantibus umbellulis, Italica *Barr. Icon. 1184*. Vires & usus Pimpinellæ saxifragæ vide in *Hist. I. Bauh. l. c.* & in *Hist. Raii 445*.



621. Buplevrum perfoliatum, longifolium, annuum *Inst. R. Herb. 310*. Perfoliata minor, folio acuto *Barr. Icon. 1128*. Perfoliata humilis, Alpina *Bocc. Mus. part. 2. 76*. *Tab. 63*. *La Perce-feuille annuelle*.

622. Buplevrum 3. minimum Fabii columnæ *Barr. Icon. 1248*. & *Col. part. 1. 85*. & *247*. Buplevrum angustissimo folio *C. B. Pin. 278*.

623. Buplevrum fruticosum, angustifolium, Hispanicum *Barr. Icon. 1255*. Buplevrum Hispanicum, arborecens, gramineo folio *Inst. R. Herb. 310*. Caulem edit cubitalem, erectum, ramosum, crassiusculum, firmum, abs radice crassâ, Fœniculaceâ perennique emergentem, quot annis pereuntem, ita ut novus enascatur, tortuosus, geniculatus, angustis & fescunciam quandoque longis, acutis, longumque in mucronem desinentibus, firmis, striatis, glabris, amplexicaulibus, pallidè virentibus foliis alternis instructus, in ramos plures surrectos divisus, cujus extrema comantur umbellâ florum luteorum seu herbaceorum & *Buplevri*, sed parvorum, vixque apparentium; quibus succedunt semina tenuia & oblonga. Sapore acri & valido præditum & odore Panacis. In Regni Valentini aridioribus incultis glareosisque locis viget. Vires & usus Perfoliatæ vide apud Schroderum, Camerarium & Simonem Pauli.



624. Chærophyllum sylvestre, alterum, geniculis tumentibus *H. R. Par. Daucus Selinoides*, tuberosis geniculis, Illyridis semine *Barr. Icon. 1177*. Myrrhis sylvestris, Cretica, nodosa, seminibus asperis *Raii Hist. 432*. Versaliis observavit D. Vaillant Plantarum Prodemonstrator.



625. Myrrhys Cicutaria, minor, perennis, *πολυρριζὸς* *Barr. Icon. 555*. Cicutaria bulbosa, esculenta *Bocc. Mus. part. 2. 171*. *Tab. 123*.

626. Myrrhis Pastinacæ foliis latè virentibus *Cor. Inst. R. Herb.* 22. Sefeli subrotundo Selini folio, flore luteo, Italicum *Barr. Icon.* 241. Daucus Siculus, Pastinacæ foliis *Zan. Hist.* 78. *Tab.* 30. & *Raii Hist.* 444.



627. Imperatoria atro-purpurea, Canadensis. Angelica atro-purpurea, Canadensis *Barr. Icon.* 1319. & *Corn.* 199. *L'Angelique à tige rouge.* *Icon Barr.* ex *Corn.* l. c.

628. Imperatoria lucida, Canadensis *Inst. R. Herb.* 317. Angelica lucida, Canadensis *Barr. Icon.* 1320. & *Corn.* 197. *Icon Barr.* ex *Corn.* l. c.



629. Peucedanum Italicum, longioribus foliis, seu majus *Barr. Icon.* 78. Peucedanum majus, Italicum *C. B. Pin.* 149. *I. B.* 3. *part.* 2. 36. & *Raii Hist.* 416. *La Queue de Pourceau.*



630. Sphondylium vulgare, flore albo *Barr. Icon.* 371. Sphondylium quibusdam, sive Branca Ursina Germanica *I. B.* 3. *part.* 2. 160. & *Raii Hist.* 408. *La Berce.*

631. Sphondylium vulgare, foliis acutè incisfis *Barr. Icon.* 56. Sphondylium hirsutum, foliis angustioribus *C. B. Pin.* 157. & *Prodr.* 83.

632. Sphondylium sive Panax Heracleum, tenuius incisfis foliis, Italicum. Panax Heracleum altè, acutè, & tenuius incisfis foliis Italicum, *Barr. Icon.* 707. & *Bocc. Mus. part.* 2. *Tab.* 99. Folia promit aspera, hispida, longo adnata pediculo, in tenuissimas acutafque lacinias divisa & per oras acutè ferrata. Caulis altus, rectus, striatus, hirsutus, subrubens, rara & alterna per intervalla foliis minoribus instructus, in summo brachiatus & divisus umbellas albas sustinet. Semen acre, odorum & mordax. Radix & cætera ut aliis Sphondyliis. In præaltis montibus deserti Camaldulensis in Etruriâ, humidis & umbrosis locis provenit.

633. Sphondylium seu Panax Heracleum, alterum, foliis tenuissimè incisfis. Panax Heracleum, albo flore, altiùs incisfis, acutioribusque foliis *Barr. Icon.* 372. Varietas est superioris ratione culturæ.¹

634. Sphondylium glabrum, montanum, albo flore *Barr. Icon.* 55. Sphondylium Alpinum, glabrum *C. B. Prodr.* 83.

635. Sphondylium rotundioribus & minoribus foliorum lobis. Panax Heracleum, minoribus & rotundioribus foliis; an Laserpitium Penæ & Lobelii? *Barr. Icon.* 708. Laserpitium *Lob Adv.* 313. *quoad Iconem.* In montibus Æquicolorum observavit *Barr.*



636. Tordylium maximum *Inst. R. Herb.* 320. Sphondylium minus, Syriacum *Barr. Icon.* 349. Caucalis major *Clus. Hist.* ccj.



637. Ferula minor, ad singulos nodos umbellifera *Inst. R. Herb.* 321. Libanotis tenuifolia, altera, Ferulæ folio & semine, Italica *Barr. Icon.* 835. Libanotis Ferulæ folio & semine, Italica *Bocc. Mus. part.* 2. 171. *Tab.* 123.

638. Ferula durior, seu rigidis & brevissimis foliis *Barr. Icon.* 77. & *Bocc. Mus. part.* 2. 84. *Tab.* 76.



639. Thapsia tenuifolia, lucido rigidoque folio, Hispanica *Barr. Icon.* 556. Thapsia Apii folio, Lusitanica, foetidissima, flore albo *Inst. R. Herb.* 322.



640. *Ligusticum Italicum*, *Ferula* folio brevior. *Libanotis tenuifolia*, *Fœniculi semine*, *Italica* *Barr. Icon. 836.* & *Bocc. Mus. part. 2. 171. Tab. 123.* Ex radice longâ, tereti, annulosâ, fuscâ, intus albâ, acris saporis & odoris, digitum crassâ, folia erumpunt tenuia, longa, *Ferulacea* aut *Cachryos* formâ, sed exilioribus costis & nervis quibus hærent turmatim congestæ foliorum lacinia, pedalia, ac in caule sensim minora. Caulis tenuis, nec parvo digito crassior, sesquicubitalis, erectus, angulosus, striatus alternisque foliis veluti floccis basi suâ caulem amplexantibus instruitur, & desinit in umbellam luteam duplicis ordinis, quam fulciunt membranacea quædam & fusca folia. Semina oblonga per latera æqualia, in summo nonnullis apicibus minutis coronata, sapore suavi & aromatico prædita sunt. In Moroni montis ascensu, quâ parte dumis regitur, & itur ad jugi supercilium saxosum quod vulgò *Saltus Urfi* dicitur, invenit *Barr.*



641. *Daucus Mathioli*, minor, *tenuifolius* *Barr. Icon. 1241.* quid?



642. *Eryngium planum*, cæruleum, campestre, *Polonicum Corvini* *Barr. Icon. 1174.* *Eryngium latifolium*, planum *C. B. Pin. 386.* & *Raii Hist. 384.*

643. *Eryngium minimum*, trifidum, *Hispanicum* *Barr. Icon. 36.* *Bocc. Mus. part. 2. 81.* & *Tab. 71.*

644. *Eryngium pumilum*, amethystinum *Barr. Icon. 376. n. 111.*

645. *Eryngium pumilum*, polyrrhizon *Barr. Icon. 1247.* *Eryngium planum minus* *C. B. Pin. 386.* *Eryngium pusillum*, planum *Moutoni Clus. Hist. clviij.*

646. *Eryngium umbellatum*, *Hispanicum* *Barr. Icon. 35.* quid?



647. *Caryophyllus minor*, fœtidus, purpuro-violaceus *Barr. Icon. 495.*

648. *Caryophyllus montanus*, umbellatus, floribus variis, luteis ferrugineis, *Italicus* *Barr. Icon. 497.* Radice nititur rufescente, tortuosâ, ex quâ cauliculi foliaque enascuntur *Caryophyllo hortensi* paria. Flores in umbellam congeruntur *Armerio Clusii* magnitudine & formâ, petalis quinque constantes in extremo ferratis, aliis è luteo venustè pallentibus, paleaceis aliis, aut obsoletis & nonnihil è ferrugineo rubentibus. Florebat Julio in jugis Moroni montis in Aprutio propè Sulmonem.

649. *Caryophyllus saxatilis*, *Ericæfolius*, umbellatis corymbis *C. B. Prodr. 105.* & *Bot. Monsp.* *Rubeola montana* *Barr. Icon. 595.* & *Bocc. Mus. part. 2. 60. Tab. 47.* Aridis montibus *Alcaras* & *Monspeli* in monte *Capouladon* observavit *Barr.* sed quia nondum floruerat, *Rubeolam* fore existimavit.



650. *Lychnis coronata*, alba, umbilico carneo *Barr. Icon. 1006.* *Lychnis coronaria* vulgò *I. B. 3. 340.*

651. *Lychnis corollaria*, umbellifera, Alpina, flore purpureo *Barr. Icon. 1005.* & *Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab. 42.* *Lychnis umbellifera*, montana, *Helvetica Zan. 128.* & *Raii Hist. 993.* In montibus editioribus vallis *Barfilionensis* agrique *Vapensis* provenit.

652. *Lychnis sylvestris*, hirsuta, purpurea, striato flore *Barr. Icon. 381.* *Lychnis sylvestris*, lanuginosa, major *C. B. Pin. 206.* & *Raii Hist. 995.* Bipedalis erat & florebat Junio in collibus incultis & glareosis vicinis ad aquam *Traversam*, Septentrionem versus viâ quæ Româ *Viterbum* ducit.

653. *Lychnis sylvestris*, hirsuta II. *Clusii*, angustifolia *Barr. Icon. 1027. n. 11.*

n. 11. Clus. Hist. 288. *Lychnis sylvestris*, angustifolia, caliculis turgidis, striatis *C. B. Pin. 205.*

654. *Lychnis sylvestris*, hirsuta, elatior, spicata, Lini colore *Barr. Icon. 1027. n. 1.* *Lychnis sylvestris*, alba, spicâ reflexâ *Bot. Monsp.*

655. *Lychnis supina*, hirsuta, spicatâ & nutante comâ, flore carneo *Barr. Icon. 1025.* Icone non est major, imò quandoque minor. Hanc ex aggere saxeo Lacûs Pontani, viâ quæ Româ Gallicanum ducit, eruebat *Barr.*

656. *Lychnis sylvestris*, villosa, minor, purpurascens, latifolia *Barr. Icon. 1028. n. 111.* *Lychnis sylvestris*, hirsuta, annua, flore minore, carneo *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 541.* Annua est, cujus radix crassiuscula, alba & contorta, & caulis sesquipalmaris quandoque, geniculatus, crassiusculus, villosus, rubescens, foliis vestitus per singula internodia binis & decussatim positus, hirsutis, & mollibus, quorum inferiora per extrema obtusè rotunda sunt, superiora sensim acutiora fiunt & strictiora. Flores in summo caule in spicam adacti, uno versu nutantes ferè è foliorum alis erumpunt purpurei, aliquandò ex purpurâ albescentes, parvi, petalis per extrema rotundis, inordinatè explicatis, & calyce nervoso, striato, ex atro obsoleto rubescente, villisque rubentibus hispidus & oblongo comprehensi.

657. *Lychnis sylvestris*, villosa, purpurea, minima, angustifolia *Barr. Icon. 1028. n. vj.* Ex radice albâ, oblongâ, tenui, duriusculâ, contortâ, raris fibris capillatâ enascuntur tres aut quatuor cauliculi humi sparsi, vix palmares, comam sursum arrigentes ex ternis aut quaternis conflatam floribus, singulis suo foliolo angusto & acuto fultis, unâ duntaxat serie nutantibus & dispositis. Flores pentapetali, purpurascens, unguibus niveis. Pistillum ab initio cum calyce in fructum tumidum, cortice duro, membranâ laxiore, rubescente, hispidâ, lineis rubris striatâ vestito. Folia angustiora & longè minora sunt quàm in superiori. In Campaniâ Romanâ circa urbem locisque incultis inter Gramina frequens.

658. *Lychnis marina*, hirsuta, purpurea, Leucoii folio *Barr. Icon. 1010.* Lignosâ, longâ, tereti in paucas fibras easque longas divisâ, albâ, glabrâ annuâque est radice, ex cujus capite multa, longa, basi angustâ, in extremo latiora, obtusa, subrotunda folia hirsuta, vix fescunciam longa erumpunt, in caule verò majora. Caulis crassus, vix dodrante longior, nodosus, multâ & incanâ lanugine hispidus, quem uncialia folia bina ex adverso opposita complectuntur, minora dum ad spicam accedunt, ex quorum alis flores enascuntur *Lychnidis*, purpureis petalis cordatis, quinque, staminibusque pari numero & purpureis compositi, ac calyce comprehensi villosi, striati, nervoso qui post exanthemum intumescit, durum oblongum capitulum semine turgidum exhibens. Juxta maris littora arenosa Valentia Junio florebat.

659. *Lychnis lutea*, montana, Globulariæ capite & facie *Barr. Icon. 498.* *Lychnis lutea*, Globulariæ capitulo *Bocc. Mus. part. 2. 75.* *Lychnis lutea*, montana, Globulariæ capite & facie *Ejusd. Tab. 62.* Globularia lutea, montana *Col. part. 1. 153.* Icon. *Barr.* ex *Col. l. c.* Folia tamen depinxit sinuosa. Boccone rubram pro luteâ posuit.

660. *Lychnis prælongis* foliis & calyce *Barr. Icon. 382.* Radice potitur albicante, crassiusculâ & brachiatâ, fibris aliquot capillatâ & perenni, è cujus capite sursum surgunt folia tres uncias longa, vix quintam uncia partem lata, acuta, glabra, in caule longè minora, breviora, angustiora, & ut ad summum attingunt caulem ferè capillaria, vixque semunciam longa. Flores in summo quini aut seni, petalis quinque sinuosis constantes, purpurascens, prælongo calyce comprehenduntur. Semen nondum ediderat. Aridis saxosisque Thuscia locis gaudet.

661. *Lychnis fruticosa*, angustifolia, minima, flore albo, Hispanica *Barr. Icon. 997.*

662. *Lychnis Linifolia*, torosis & laxioribus capitulis *Barr. Icon. 1009*. Pedales & sesquipedales edit cauliculos teretes, rotundos, glabros, rectos, firmos quos in internodiis folia vestiunt bina opposita, angusta, longa, acuta & *linariæ* formâ. Flores non vidi, capita tunc supererant *Lychnidea*, dura, cartilaginea, in plures toros seu nervos rufescentes secundum longitudinem distincta, ex albo gilva, per oras acutè serrata, è basi angustâ sensim se explicantia in Calathi aut Campanæ formam.

663. *Lychnis Hispanica*, Kali folio, multiflora *Inst. R. Herb. 338*. Kali vermiculatum, albo globoso flore *Barr. Icon. 119. & Bocc. Mus. part 2. Tab. 122*. Multos profert cauliculos cubitales, rectos, lignosos, geniculatos, subincanos, glabros, nitentes & ramosos. Folia in singulis geniculis bina, vermiculata, unciam longa, acuminata, surrecta, quaterna quandoquè & quina ex adverso opposita, & albo-pallida. Flores albi in globum congesti, pentapetali & parvi, petalis constant rotundis, quinis brevibus staminibus cum aureis seu phœniceis apicibus & pistillo exili. Calyx floris quinquefidus, subincanus, lineis virentibus striatus. Habes in Icone flores duos depictos quales ex microscopio inspiciuntur, globum quoquè floris naturalis magnitudinis. Amari est saporis, & linguam vellicantis. Delectatur saxosis & glareosis torrentum alveis exsiccatis in Hispaniâ.

664. *Lychnis corniculata*, major, seu latifolia *Barr. Icon. 1017*. Varietas est sequentis ratione foli pinguioris vel culturæ.

665. *Lychnis corniculata*, minor, seu angustifolia *Barr. Icon. 1018*. *Lychnis corniculata*, minor, seu angustifolia, saxatilis *Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 43*. *Lychnis minima*, rigida *Cherleri I. B. 3. 352. & Raii Hist. 997*. Circa Monspelium, in Galloprovinciâ & Etruriâ occurrit. Aridis locis pusilla est, quæ major in solo pinguiori.

666. *Lychnis Ocymoides*, muscosa, latifolia *Barr. Icon. 380. Pon. Bald. Ital. 199*. *Lychnis Alpina*, pumila, folio gramineo, sive *Muscus Alpinus*, *Lychnidis* flore *C. B. Pin. 206*. *Lychnis Alpina*, minima *Raii Hist. 1004*. *Icon. Barr. ex Pon. l. c.*

667. *Lychnis Ocymoides*, muscosa, striatiore folio *Barr. Icon. 379*. Inter saxa jugorum editiorum vallis Barsilionensis, juxta oppidum vulgò *l'Arche*, cespitem viridem ac elegantem exhibet.

668. *Lychnis pumila*, Caryophyllata, flore rubello, Italis hæmorrhoidalis Aldrovandi *Barr. Icon. 998*. Polygono angustissimo folio, affinis *C. B. Pin. 281*. Prælongâ, palmari, quandoquè majori est radice & sæpè multiplici, crassiusculâ, paucis fibris capillatâ, albicante seu gilvâ, lentâ & nervosâ. Ab ejus capite ampliusculum & in multos furculos diviso densum promit cespitem lætè virentem multis tenuibus foliis, angustissimis, venâ mediâ sulcatis & striatis, obtusè acutis, glabris & nitentibus, unciam ut plurimum longis ac mediâ lineâ vix latioribus. Multis luxuriat cauliculis quandoquè palmariibus, ramosis, geniculatis, glabris, nitidis, ad quorum singula genicula bina oriuntur foliola opposita & minora. Flores *Lychnidei* è calyce minori viridi & in quinque radios acutos stellato emergunt, petalisque constant quinis sinuosis, recurvis, albis, interdum carneis venis radiatim striatis *Malvarum* modo, staminibus pariter quinis cum suis apicibus luteis. Evanido flore succedit utriculus cartilagineus, in summo mucronatus & maturo semine in quinque radios se explicans: semen verò minutum, subruffum, ovatum, *Papaverino* minus, ternum aut quaternum exponit. Totâ æstate, autumnoque floret denso cespite semper lætè virens, unctuosâ viscidaque. Sapore subamaro, & nonnihil ad Napum crudum accedente. Hæmorrhoidibus sanandis miræ esse efficacis fertur.

669. *Lychnis* quæ *Saponaria concava*. *Gentiana concava*, Anglica *Gerardi Barr. Icon. 92. Ger. Emac. 435*. *Saponaria concava*, Anglica *C. B. Prodr. 103. & Raii Hist. 999*. Lusu *Saponariæ vulgaris*.



670. *Linum sylvestre*, latifolium, flore albicante *Barr. Icon. 1002. Le Lin à feuilles larges, & à fleur blanchâtre.*

671. *Linum sylvestre*, latis, acutis foliis, flore amplo *Barr. Icon. 1009. Linum sylvestre, cæruleum, folio acuto C. B. Pin. 107.*

672. *Linum sylvestre*, latifolium, vinoso amplo flore, *Italicum Barr. Icon. 1013.*

673. *Linum sylvestre*, montanum, acuto folio, flore albo *Barr. Icon. 1001.*

674. *Linum Hispanicum*, acutis foliis, amplo flore *Barr. Icon. 1014.*

675. *Linum fruticans*, leptophyllum, *Hispanicum Barr. Icon. 819.*

676. *Linum sylvestre*, acutis foliis, fruticans *Barr. Icon. 1008.*

677. *Linum fruticans*, oxyphyllum, *Hispanicum Barr. Icon. 330.*

678. *Linum fruticans*, angustis acutisque foliis *Barr. Icon. 1231.*

679. *Linum sylvestre*, fruticosum, crispum, *Hispanicum*, parvo flore albo *Barr. Icon. 795.*

680. *Linum sylvestre*, fruticans, trichodes, *Thymi folio*, polyanthos *Barr. Icon. 1003.*

681. *Linum sylvestre*, fruticosum, angustifolium *Barr. Icon. 1004.*

682. *Linum sylvestre*, album, oxyphyllum *Barr. Icon. 796.*

683. *Linum montanum*, luteum, *Italicum Barr. Icon. 820. Linum sylvestre, luteum, foliis subrotundis C. B. Pin. 214.*

684. *Linum pratense*, floribus exiguis *C. B. Pin. 214. Raii Hist. 1076. Chamælinum subrotundo folio Barr. Icon. 1165. n. 1. Linum sylvestre, catharticum Ger. Emac. 560. Lini vires vide in Hist. Raii 1702.*

685. *Linum sylvestre*, minus, flore cæcio, foliis verticillatis *Barr. Icon. 1226. & Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab. 42. Palmaris annuaque est planta, cujus radix tenuis, longiuscula, contorta, dura, albida, rarisque fibris capillata. Cauliculi rotundi, ramosi, modò raris, modò frequentibus & verticillatim nascentibus, acutis, vix unciam longis, erectis vestiuntur foliis. Summis cauliculorum ramis insident flores è cæruleo violacei, imò cæcii, pentapetali, vix se explicantes, & calyce quinquefido comprehensi. Floribus succedit fructus tumidus, durus, rotundus, striatus, in summo mucronatus, seminibus foetus decem exiguis, oblongis, tumidis, Milio longioribus, sed compressioribus, lævibus, lucidis, coloris olivæ, seu viridi obsoletis, quæ singula singulis delitescunt loculis. Viam Lateranensem inter & Appiam circa fontem Aquæ sanctæ, non longè à vineis, in arvis incultis provenit.*



686. *Limonium medium*, *Globulariæ folio*, majus *Barr. Icon. 793. Palmaris est planta, cujus caules aliorum more flores purpurascentes ferunt. Foliis magnitudinem naturalem habes in Icone expressam. Valentia ad littora maris cum sequenti occurrit.*

687. *Limonium medium*, *Globulariæ folio*, minus *Barr. Icon. 794. Tenuiori licèt crassiusculâ nititur radice & fibrosâ, è quâ folia enascuntur minora & breviora; caules huic longiores, pedales, tortuosi & multum ramosi. Flores non vidi.*

688. *Limonium minus*, *Oleæ folio supino*, alterum *Barr. Icon. 789. Hujus radix modicè tortuosa, è cujus capite quindecim aut sexdecim parva, acuta Oleæ folia terræ incumbencia, vix uncia longiora erumpunt, ac ex eorum medio caulis surgit vimineus, erectus, ramosus, flores sustinens ut in aliis. In Valentini littoris planitiè, quæ vulgò Là-deçà dicitur provenit.*

689. *Limonium minus*, *Oleæ folio*, *πολύκλαζον Barr. Icon. 790. Istud foliis donatur paulò minoribus, rigidioribus, firmioribus, minusque mucronatis; radice multiplici, cespitosâ, lignosâ, subrusâ, tortuosâ, crassâ; caule*
I pedali,

pedali, crassiori, majori, in varios ac plurimos ramos latè sparsos diviso, fragili, vimineo, paniculatimque flores edenti cæsius & aliorum formâ. In Castiliæ novæ amplâ fabulosâque valle, quâ Valentia Madritum itur propè oppidum *Tarancon* dictum Septembri florebat.

690. *Limonium minus*, obtuso folio; viminibus foliosis *Barr. Icon. 806*. Ex radice crassiusculâ, fibrosâ, nigrâ, tortuosâ, vix duas uncias longâ parva exeunt octo vel novem folia nec unciâ longiora, in extremo rotunda, humi & in orbem fusa, ac crassiuscula. Cauliculi viminei, ramosi, dodrantes foliis acutis per intervalla vestiuntur. Flores nondum ediderat, cùm occurrit in littore Valentino.

691. *Limonium minimum*, cordatum seu folio retuso *Barr. Icon. 805*. *Limonium maritimum*, minus, folio cordato *C. B. Pin. 192. Prodr. 99*. Ad radices altæ præruptæque rupis quæ portum Oppidi *la Cîutat* dicti, Massiliam inter & Tolonam respicit, viget.

692. *Limonium incisum* folio, Buglossi flore *Barr. Icon. 1124*. *Limonium peregrinum*, foliis *Asplenii* *C. B. Pin. 192*.



693. *Hyacinthus Orientalis*, parvo flore, polyanthos, serotinus, cæruleus *Barr. Icon. 175. La Jacinte à fleur simple*.

694. *Hyacinthus cæruleo-violaceus*, caule folioso *Barr. Icon. 176*. *Hyacinthus Orientalis*, caule folioso *C. B. Pin. 45*.

695. *Hyacinthus purpureo-violaceus*, serotinus, semiduplex, *φύλλοποιος*, Italis comosus *Barr. Icon. 173. Jacinte à fleur double*. Floret Februario & initio Martii.

696. *Hyacinthus roseus*, cæruleus, flore duplici *Barr. Icon. 174*. Exquisiti est odoris, & floret circa æquinoctium vernum.

697. *Hyacinthus flore pleno*, è cæruleo & violaceo rubente. Hy. Januario *Barr. Icon. 987*.

698. *Hyacinthus flore pleno*, è cinereo violaceo & rubro variegato. Hy. Passa Januario *Barr. Icon. 988*. Tardiùs floret quàm superior.

699. *Hyacinthus flore pleno*, majore, obscurè violaceo cinereo. Hy. Italis Pellucino *Barr. Icon. 982*.

700. *Hyacinthus flore pleno*, oblongo & cæruleo-violaceo. Hy. Medicus, Capucino affinis *Barr. Icon. 985*. A superioribus distinguitur tubo florum longiore.

701. *Hyacinthus flore pleno*, oblongo, abortivo & cinereo violaceo. Hy. Rusticus *Barr. Icon. 986*. Flores hujus difficilè se explicant, viridique colore maculantur.

702. *Hyacinthus flore pleno*, oblongo, obscurè violaceo. Hy. Italis sancto Bernardo *Barr. Icon. 981*. Majori quàm superior foliorum foeturâ flores tumescunt.

703. *Hyacinthus flore pleno*, cæruleus, præcox, Italis Fiorentino *Barr. Icon. 169*. Floret Februario.

704. *Hyacinthus cæruleus*, plenissimo flore, serotinus, Italis Stradoppio *Barr. Icon. 170*. Multiplici foliorum foeturâ flores ejus rosam exhibent, sed præ pondere ad maturitatem non perveniunt. Circa æquinoctium Martium floret.

705. *Hyacinthus tuberosus*, albus, odoratissimus, autumnalis *Barr. Icon. 1213*. *Hyacinthus Indicus*, tuberosus, flore *Hyacinthi Orientalis* *C. B. Pin. 47. & Raii Hist. 1164. La Tubereuse*.



706. *Colchicum autumnale*, angustifolium, album: an *Hermodactylus verus*? *Barr. Icon. 304*. *Colchicum candido flore*, Anglicum *Lob. Icon. 143. Le Colchique à fleur blanche*.

707. Colchicum autumnale, luteum, minimum. Narcissus autumnalis, luteus, minimus *Barr. Icon. 984.* Narcissus autumnalis, minor *Clus. Hist. 164.*



708. Crocus vernus, latifolius, flore violaceo, diluto, Italicus, maximus *Barr. Icon. 384.* *Le Saffran d'Italie à feuilles larges.* Bulbum non vidi ex quo characterismus deprehenditur. Flos illius Croci expansus diametro suo uncias quatuor assequitur, quinquefidus, subcæruleus seu potius coloris Lini, tenuibus striis versus oras reflexis virgatus, unguibus luteis, quinque staminibus cum apicibus stiloque stipatus præter filamenta quædam Croci. Pedalia edit folia Colchici, arcuata, carinata, amplexicaulia, in imo duas uncias lata, sensimque ad extremum usque in acumen desinentia. E Thufciâ accepit.

709. Crocus autumnalis, flore albo, verus *Barr. Icon. 303.* Crocus autumnalis, montanus, angustifolius, flore argenteo *H. R. Par.*

710. Crocus vernus, minor, violaceus, medio purpureo flore, Italicus *Barr. Icon. 383.* Crocus vernus, angustifolius magno flore *C. B. Pin. 67.* Crocus vernus, angustifolius, *1. Clus. Hist. 207.* Viâ ad Ostia Tyberina, juxta semitas in herbidis reperitur.



711. Narcissus totus albus, maximus, calyce mediocri, serotinus *Barr. Icon. 948.* *La Narcisse blanche, ou totus albus.*

712. Narcissus albus, sulfureus, maximus, mediocri calyce, serotinus *Barr. Icon. 947.*

713. Narcissus albo-sulfureus, calyce aureo, major, serotinus *Barr. Icon. 965.*

714. Narcissus albo-sulfureus, calyce luteo oblongo *Barr. Icon. 966.* *La Narcisse jaune pâle.*

715. Narcissus albicans, calyce aureo, amplo, major *Barr. Icon. 932.*

716. Narcissus albicans, calyce aureo, amplo, minor *Barr. Icon. 931.*

717. Narcissus albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, major *Barr. Icon. 928.*

718. Narcissus albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, minor *Barr. Icon. 927.*

719. Narcissus sylvestris, pallidus, tubâ aureâ, major *Barr. Icon. 930.*

720. Narcissus sylvestris, pallidus, tubâ luteâ, minor, vulgaris *Barr. Icon. 929.*

721. Narcissus pallidus, calyce aureo, labiis inversis *Barr. Icon. 979.*

722. Narcissus albicans, calyce aureo, labiis inversis *Barr. Icon. 980.*

723. Narcissus sylvestris, albicans, oris tubæ luteis, minor *Barr. Icon. 924.*

724. Narcissus sylvestris, pallidus, tubâ aureâ, minimus *Barr. Icon. 976.*

725. Narcissus sylvestris, totus albicans, minor *Barr. Icon. 923.*

726. Narcissus sylvestris, totus luteus, minor *Barr. Icon. 975.*

727. Narcissus totus sulfureus, Anglici facie, flore singulari, Caietanus *Barr. Icon. 967.*

728. Narcissus sylvestris, totus albus, luteis tubæ fimbriis, alter *Barr. Icon. 968.*

729. Narcissus totus albus, nutans, amplâ tubâ *Barr. Icon. 953.*

730. Narcissus totus albus, amplo nutante flore *Barr. Icon. 954.*

731. Narcissus totus albus, nutante flore, longâ & angustâ tubâ *Barr. Icon. 945.* Narcissus oblongo calyce *C. B. Pin. 53.*

732. Narcissus albus, nutante flore, oblongâ & angustâ pallidâ tubâ, minor *Barr. Icon. 946.*

733. Narcissus sylvestris, albicans, nutante flore, minor *Barr. Icon. 921.*

734. *Narcissus sylvestris*, pallidus, tubâ aureâ, minor, ferotinus *Barr. Icon. 922.*
735. *Narcissus pallidus*, calyce aureo, flore pleno, maximus *Barr. Icon. 977.*
736. *Narcissus maximus Tradescanti*, flore pleno, calyce luteo, foliis sulfureis *Barr. Icon. 978.*
737. *Narcissus maximus Tradescanti*, totus luteus, flore pleno *Barr. Icon. 970.*
738. *Narcissus luteo-sulfureo* flore pleno, minor, ferotinus *Barr. Icon. 969.*
739. *Narcissus albicans*, medio-pallidus, major, amplo flore *Barr. Icon. 959.*
740. *Narcissus albus*, calyce aureo, amplo, biflorus, major *Barr. Icon. 949.*
741. *Narcissus albus*, calyce aureo, amplo, biflorus, minor *Barr. Icon. 950.*
742. *Narcissus latifolius*, albicans, medio-croceus, amplo, brevi calyce *Barr. Icon. 918.*
743. *Narcissus latifolius*, albus, medio-croceus, ferotinus, amplo calyce, major; Vannec vulgò *Barr. Icon. 955.*
744. *Narcissus latifolius*, albus, medio-croceus, pleno flore *Barr. Icon. 917.*
745. *Narcissus albus*, calyce, luteo, parvo, ferotinus minor; Vannec minor vulgò *Barr. Icon. 956.*
746. *Narcissus latifolius*, albus, medio-croceus, calyce mediocri, præcox *Barr. Icon. 919.*
747. *Narcissus albicans*, medio-pallidus, medius, angustis florum foliis *Barr. Icon. 964.*
748. *Narcissus latifolius*, sulfureus, maximus *Barr. Icon. 920.*
749. *Narcissus albo-sulfureus*, calyce aureo, minori, maximus, ferotinus *Barr. Icon. 960.*
750. *Narcissus albo-pallidus*, calyce aureo, amplo, major, Waldenec *Barr. Icon. 952.*
751. *Narcissus pallidus*, calyce aureo, mediocri, ferotinus, Waldenec medius *Barr. Icon. 951.*
752. *Narcissus albo-pallidus*, calyce aureo, plano, roseus, Waldenec *Barr. Icon. 933.*
753. *Narcissus albo-pallidus*, calyce luteo, plano, stellatus, Waldenec *Barr. Icon. 934.*
754. *Narcissus albicans*, medio-pallidus, minor *Barr. Icon. 963.*
755. *Narcissus niveus*, medio-croceus, maximus, roseus, ferotinus *Barr. Icon. 972.*
756. *Narcissus niveus*, medio-croceus, minor, roseus, ferotinus *Barr. Icon. 971.*
757. *Narcissus niveus*, medio-croceus, stellatus, major, calyce crispo & diviso, ferotinus *Barr. Icon. 974.*
758. *Narcissus niveus*, medio-croceus, stellatus, minor, ferotinus *Barr. Icon. 973.*
759. *Narcissus latifolius*, albo-pallidus, medio luteus, præcox *Barr. Icon. 925.*
- Narcissus medio-luteus*, copioso flore, odore gravi *C. B. Pin. 50.*
760. *Narcissus præcoccissimus*, lacteus, calyce aureo *Barr. Icon. 943.* Romæ florebat sub initio Novembris.
761. *Narcissus albicans*, calyce sulfureo *Barr. Icon. 940.* Præcox est, & nonis Januarii florebat Romæ.

762. Narcissus latifolius, sulfureus, præcox, minor *Barr. Icon. 926.*
 763. Narcissus luteo-pallidus, calyce intense aureo *Barr. Icon. 944.*
 764. Narcissus polyanthemos, præcox, sulfureus, maximus, calyce croceo, oris pallidis & fimbriatis *Barr. Icon. 936.*
 765. Narcissus polyanthemos, præcox, sulfureus, medius, stellatus, calyce croceo *Barr. Icon. 935.*
 766. Narcissus præcox, totus luteus, maximus, calyce aureo *Barr. Icon. 941.*
 767. Narcissus præcox, totus luteus, medius, stellatus, calyce aureo *Barr. Icon. 942.*
 768. Narcissus præcox, totus luteus, elatior, calyce aureo *Barr. Icon. 939.*
 769. Narcissus præcox, totus albus, major *Barr. Icon. 937.* Narcissus totus albus, major *C. B. Pin. 49.*
 770. Narcissus præcox, totus albus, medius *Barr. Icon. 938.* Narcissus totus albus, minor *C. B. Pin. 49.*
 771. Narcissus præcox, totus albus, minor, roseus *Barr. Icon. 915.*
 772. Narcissus albus, medio-croceus, stellatus, majori calyce, serotinus, Romanus *Barr. Icon. 958.*
 773. Narcissus albus, medio-croceus, medius, stellatus, serotinus, Romanus *Barr. Icon. 962.*
 774. Narcissus albo-sulfureus, medio-croceus, stellatus, minor, serotinus, Romanus *Barr. Icon. 961.*
 775. Narcissus albus, medio-croceus, stellatus, parvo calyce serotinus, Romanus *Barr. Icon. 957.*
 776. Narcissus totus albus, minor, stellatus *Barr. Icon. 916.*
 Sit denominatio pro descriptione. Magis variat hoc plantæ genus quàm ut ad species ab Authoribus seu perperam, seu brevius depictas referri queant.
 777. Narcissus autumnalis, albus, latifolius *Barr. Icon. 993.*



778. Lilium angustifolium, flore flavo maculis nigris distincto *C. B. Pin. 79.*
 Lilio-Martagon, Canadense, luteum, maculis purpureis *Barr. Icon. 125.* *Le Lis Martagon de Canada.*



779. Ornithogalum luteo-virens, Indicum *Barr. Icon. 1118.* & *Corn. 160.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*
 780. Ornithogalum cæruleo-purpurascens, majus *Inst. R. Herb. 381.* Hyacinthus stellatus, cæruleo-violaceus, campanulatus *Barr. Icon. 183.* Hyacinthus stellatus, æstivus *Clus. app. 2. & I. B. 2. 583.*
 781. Ornithogalum Byzantinum, Borraginis flore *Inst. R. Herb. 380.* Hyacinthus cæruleus, Borraginis flore *Barr. Icon. 184.* Hyacinthus stellaris, Byzantinus, Borraginis flore *H. R. Par.*



782. Allium saxatile, Acori radice, flore purpureo *Barr. Icon. 1022.* & *Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 79.* Allium petraeum, umbelliferum *I. B. 2. 564.*



783. Lilio-Narcissus vernus, angustifolius, flore purpurascente *Barr. Icon. 994.*
 784. Lilio-Narcissus Jacobæus, phœniceus, Indicus, polyanthos *Barr. Icon. 1036.* Lilio-Narcissus rubeus, Indicus *Ald. H. Farnes. 83.* *Icon. Barr. ex Ald. l. c.*
 785. Lilio-Narcissus Indicus, rubeus, *μυροειδης*, Jacobæus Clusii, Robini

bini *Barr. Icon. 1035*. *Narcissus latifolius*, Indicus, rubro flore *Clus. Hist. 157*.
La Belladone. Icon. Barr. ex Clus. l. c.

786. *Lilio-Narcissus Indicus*, saturatè purpurascens, polyanthos, Belladonnaformos, Italicus *Barr. Icon. 1039*. *Narcissus Indicus*, Liliaceus, saturo colore purpurascens *Ferr. Flor. 119*. *Lilio-Narcissus Indicus*, saturo colore purpurascens, *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 367*. *Icon. Barr. ex Ferr. l. c.*

787. *Lilio-Narcissus Indicus*, dilutè purpurascens, Belladonna Italorum vulgatio *Barr. Icon. 1040*. *Narcissus Indicus*, Liliaceus, diluto colore purpurascens *Ferr. Flor. 121*.

788. *Lilio-Narcissus Indicus*, polyanthes, coccineus, minor *Barr. Icon. 126*. *Narcissus Japonicus*, rutilo flore *Corn. 158*.

789. *Lilio-Narcissus Indicus*, phœniceus, sphæriceus, vulgò polyanthos *Barr. Icon. 1037. 1039*. *Narcissus Indicus*, flore Liliaceo, sphæricus *Ferr. Flor. 129*. Ambæ Icones *Barr. ex Ferrario l. c.*

790. *Lilio-Narcissus luteus vernus* *Inst. R. Herb. 386*. *Narcissus Persicus*, luteus, vernus *Corvini Barr. Icon. 983*. *Colchicum luteum*, vernum *C. B. Pin. 69*.



791. *Bermudiana Cyclaminis radice*, pullo flore. *Iris stellata*, *Cyclaminis radice*, pullo flore *Barr. Icon. 1216*. Flos Indicus, è violaceo fuscus, radice tuberosa *Ferr. Flor. 171*. *Icon. Barr. ex Ferr. l. c.*



792. *Hæmanthus Africanus* *H. L. Bat.* *Lilio-Narcissus Indicus*, cruentus, πολυμήμιον, seu stamineus, squalioso Italis *Barr. Icon. 1041*. *Narcissus Indicus*, puniceus, gemino latiori folio *Ferr. Flor. 137*. *Narcissus Suvertii*, vulgò Scaglioso, flore cruento, πολυμήμιον, stamineus *Corvini Barr. Icon. 1042*. *La Tulipe du Cap de Bonne Esperance*. Prior *Icon. Barr. ex Ferr. l. c.*



793. *Yuca Indica*, foliis Aloes, flore albo *Barr. Icon. 1194*. *Yuca foliis Aloes* *C. B. Pin. 91*. *Hyuca Canadensis* *Ald. H. Farnes. 33*.



794. *Moly Lilium Indicum*, rubrum *Barr. Icon. 1119*. *Lilium Indicum* *Bont. Hist. 142*. *Icon. Barr. ex Bontii Hist. l. c.*



795. *Lens Brasiliensis*, minor, flore subcæruleo *Barr. Icon. 194*. *La Lentille du Bresil*.



796. *Vulneraria rustica* *I. B. 2. 362*. *Anthyllis leguminosa*, lutea, Italica *Barr. Icon. 575*. *La Vulneraire*.

797. *Vulneraria* flore purpurascens *Inst. R. Herb. 391*. *Anthyllis leguminosa*, montana, cæruleo flore *Barr. Icon. 553*. Hæc inter chartas reposita colorem mutavit, quod Barrelierum decepisse mihi videtur. In Montibus Amatricensium ac aliis Apenninorum jugis collegit *Barr.*

798. *Vulneraria pentaphyllos* *Inst. R. Herb. 391*. *Anthyllis leguminosa*, vesicaria, lutea *Barr. Icon. 554*. *Trifolium halicacabum* *Camer. Hort. Tab. xlvij*. Romæ in Monte Mario crescit, ut & Monspelii.



799. *Faba minor* *Barr. Icon. 193*. *La petite Fève*. Ex semine in ventriculo Columbæ reperto & ab Equite Corvino mutuato crevit, caulemque edidit

edidit singulatam, tenuem, angulosum, striatum & quadratum, vixque culmo Hordei crassior; Folia floresque ut in vulgari, sed multò breviora. Fabæ usus & vires vide in Hist. Raii 909.



800. Lupinus luteus, Italicus *Barr. Icon. 1032.* Lupinus sylvestris, flore luteo *C. B. Pin. 348. Dod. Pempt. 530. & Raii Hist. 908. Le Lupin à fleur jaune.* Lupini vires vide in Hist. Raii 907.



801. Hedysarum trifolium, purpureum, Canadense *Barr. Icon. 1140.* Hedysarum triphyllum, Canadense *Corn. 44. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*

802. Hedysarum clypeatum, minus, suave rubens *Barr. Icon. 1180.* Hedysarum clypeatum, minus, flore purpureo *Raii Hist. 929.* Onobrychis clypeata, aspera, minor *C. B. Prodr. 149.*



803. Lotus hæmorrhoidalis flore albo & subrubesciente *Barr. Icon 1033.* Lotus pentaphyllos, filiquosus, villosus *C. B. Pin. 332. Le Lotier hæmorrhoidal.* A filiquarum formâ hæmorrhoidalis dictus. In Italiâ & Campaniâ Romanâ, necnon in Galliâ Narbonensi frequens.

804. Lotus coronatus, latifolius, filiquis nigris *Barr. Icon. 544.* Lotus villosus, altissimus, flore glomerato *Inst. R. Herb. 403.* Lotus Lybica Dalechampii *Lugd. 509.*

805. Lotus pratensis, luteus, filiquosus, hirsutus *Barr. Icon. 1023.* Lotus pentaphyllos, major, hirsutie candicans *C. B. Pin. 332.* Tota planta villis hispida & cinerea; flores crocei è calyce villosus & canescente prodeuntes; filiquæ angustæ erant, & semine tenui fœtæ. In Montibus Amatricensium observavit Barr.

806. Lotus fruticosa, lutea, incana. Dorychnium luteum, minus incanum *Barr. Icon. 1179.* Dorychnio congener planta *Clus. Hist. 100.*

807. Lotus filiquosa, maritima, lutea, Cytisi facie *Barr. Icon. 1031.* Descriptionem non invenio in scriptis Barr. Discrepat à Loto maritimâ, folio pingui & Crasso Bot. Monsp. floribus ternis & quaternis uno pediculo adnatis; necnon foliis acutioribus.

808. Lotus angustifolia, lutea, major *Barr. Icon. 879. n. 1.* Perennis est planta, cujus fructus & semina non vidi; ex radice vivaci, longâ, pallescente, altius demersâ & descendente multos proferebat caules cubitales, rotundos, è viridi albescentes, tenuissimâ lanugine subpubescentes, foliis ternis, incanis, pediculo donatis ad basim duabus auriculatis appendicibus stipato, alternatim vestiti; Flores in brevem spicam congesti, pediculo oblongo fulti, è luteo rubescentes, è foliorum alis erumpebant. In sylvâ Ostiensi Junio florebat cum sequenti.

809. Lotus angustifolia, incana, pallida, minor *Barr. Icon. 880.* Superiori congener, sed minor, vixque palmo altior, densè ramosa, incana, ramos suos in latum extendens. Radix ejus mediocris, è pallido albescentis, nec puto perennem, quia non satis reptilis. Caules lignosi, geniculati, duri & ramosi, quot annis pereuntes. Folia incana pariter, sed frequentiora & minora. Flores ut in superiori, pauciores, minores & è luteo pallidi.

810. Lotus angustifolia, incana, spicata *Barr. Icon. 879. n. 11.* Floribus in spicam congestis à præcedenti distinguitur.

811. Lotus Indicus, cæruleus, radice perenni *Barr. Icon. 1236.* quid?



812. Trifolium montanum, lupulinum *C. B. Pin. 328. & Prodr. 140.* Lotus

tus montanus, aureus, amplo Lupuli capite, annuus *Barr. Icon. 1024*. In pratis Amatricensium in Aprutio reperiēbat *Barr.* Nos in Monte Pilati supra Lugdunum.

813. *Trifolium stellatum* C. B. *Pin. 329. Prodr. 143*. *Lagopus minor*, erectus, capite globoso, stellato, flore purpureo *Barr. Icon. 860*. Frequens in agro Romano & Monspeliensi.

814. *Trifolium alopecurum*, majus, flore purpureo, stellato capite *Barr. Icon. 755*. Ad equorum pabulum seminatur in Italiā & Hispaniā, Regnoque Valentino, ter quot annis cædum. Folia ejus terna, subvillosa; caules erecti & pariter subhirsuti. Flores colore variant, modò enim è purpurâ minùs vel magis accenduntur, modò dilutiùs rubent, vel è carneo pallescunt, & dum est sylvestris planta & per vias incultave occurrit, in acutiorem spicam definiunt; dum verò feritur, saturatiùs purpurascunt & rubent, breviorque & crassior fit eorum spica. Floribus succedunt stellata pericarpiola villosa, semine parvo, lævi, nitido, fusco & unico tumida.

815. *Trifolium alopecurum*, latifolium, spicâ longâ *Barr. Icon. 697*. *Trifolium albo-incarnatum*, spicatum sive *Lagopus maximus* I. B. 2. 376.

816. *Trifolium alopecurum*, angustifolium, elatius *Barr. Icon. 698*. *Trifolium montanum*, angustissimum, spicatum C. B. *Pin. 328*.

817. *Trifolium alopecurum*, spicâ globosâ *Barr. Icon. 1188*.

818. *Trifolium arvense*, humile, spicatum, sive *Lagopus* C. B. *Pin. 328*. *Raii Hist. 948*. *Lagopus angustifolia*, minor, erectior *Barr. Icon. 901*.

819. *Trifolium arvense*, humile, spicatum, sive *Lagopus* spicis rotundioribus C. B. *Pin. variet. 328*. *Lagopus altera*, angustifolia, minor & verior, capite brevior *Barr. Icon. 902*. A superiori discrepat foliis majoribus paulò & erectioribus. Tota planta villosior & mollior. Capitula ejus breviora, compressa & globosa, mollitie, hirsutie & rotunditate pedem leporinum imitantia. Utraque species in agris incultis & novalibus Campaniæ Romanæ occurrit.

820. *Trifolium glomerulis Personatæ Cherleri* I. B. 2. 377. *Lagopus minor*, supinus, molli & compresso capite, flore albo *Barr. Icon. 859*.

821. *Trifolium nemorosum*, capite ovato, villoso, rubente *Barr. Icon. 871*. *Trifolium capitulo glomerato*, rigido I. B. 2. 378. E brevi crassiusculâ, annuâ, transversâque ferè & distortâ gilvâque radice quinque aut sex rectos emittit cauliculos vix pedales, glabros ferè, rotundos, ramosos, raris vestitos foliis ternis, subrotundis & subhirsutis. Flores non vidi jamque deciderant, abierantque in globosum caput virens, oblongum, echinatum, è calycibus pilosis, duriusculis non tamen pungentibus, stellatis compositum. Semen subrotundum erat parvum, compressum, & sapore Pisorum crudorum recentium.

822. *Trifolium minus*, capite subrotundo, parvo albo & echinato *Barr. Icon. 870*. Radice nititur tenui, longiusculâ, albo-pallidâ, è quâ plures prodeunt cauliculi humifusi, subrubentes, tenues, firmi, leviter hirsuti, geniculati, quos in singulis geniculis alterna & rara vestiunt folia terna uno pediculo, cujus basim gemina fulcit appendix; parva, acuta, supernè latiùs, infernè dilutiùs virentia levissimâque pubentia canitie & tenuissimè per oras serrata. Ex eorum alis extremisque ramis subrotundum aut ovatum exurgit capitellum, echinatum, nullo pediculo nixum, è tenuibus, & albovirentibus pericarpiis hispidis quinquefidis & duriusculis constans. Flores ejus leguminosi sunt, parvi, albidi & sublutescentes, dum maturescunt. Tota planta subincana est, tenui pubens lanugine, vixque quatuor uncias alta. Variat; in sicciore solo erigitur, sed pumila est planta; in humidiori longiusculos quandoquè palmares & humifusos edit cauliculos. Maio & Junio florebat in apricis & sterilibus agri Romani, præsertim supra muros Hyppodromi Romani, non procul à D. Sebastiani Templo.

823. *Trifolium minus*, Villosum, purpureum, capite parvo, echinato *Barr. Icon.*

Icon. 869. Trifolium cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferrunt. *I. B. 2. 378.*

824. Trifolium pratense, folliculatum, flore inverso. Trifolium pratense, minus, purpureum, Bellidis flore, capite globoso *Barr. Icon. 872.* Ex tenui, fibris multis capillatâ & albente radice plures humi spargit supinos cauciculos ramosos, subrubentes, foliis glabris, latè virentibus, vixque majoribus quàm in Icone exprimuntur, vestitos. Extremis cauciculis & ramis, & è foliorum alis multa erumpunt capitella globosa, compressa, *Trifolio pratensi, Salmaticensi* ferè similia, sed minora, floribus decorata exiguis, purpureis elegantissimis, quorum vexillum obversum & supinum est. Post exanthemum capitella egregias evadunt in sphæulas vesiculis foris acutis, sed mollibus tumidas & echinatas. In Campaniæ Romanæ pratis & agrorum viarumque marginibus toto anno floret elegantissima hæc planta tota glabra. In Horto Regio Paris. ab aliquot annis colimus.

825. Trifolium Fragiferum, nostras, purpureum, folio oblongo *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 144.* Trifolium Fragiferum, majus, repens, minori & rotundiore capite *Barr. Icon. 852.* Trifolium Fragiferum, minus, oblongo capite, *Italicum ejusd. Icon. 851.* Multum ludit hæc planta foliis, cauciculis & capitibus, tum ratione loci, tum etiam ætatis. Undè geminas species in Iconibus *Barr.* expressas ad unam reducimus.

826. Trifolium luteum, capite rotundo, folliculoso, *Italicum Barr. Icon. 864.* Trifolium capitulo spumoso, lævi *C. B. Prodr. 143.*

827. Trifolium pratense, supinum, $\alpha\gamma\alpha\lambda\epsilon\psi$, seu capite humi merso *Barr. Icon. 881.* Trifolium semen sub terram condens *H. R. Par.* Trifolium subterraneum, seu folliculos sub terram condens *Bot. Monsp.* Circa Monspelium, in agro Lugdunensi, tum etiam in Parisiensi provenit.

828. Trifolium arvense, supinum, verticillatum *Barr. Icon. 882.* Trifolium cum glomerulis ad caulium nodos rotundis *Raii Synops. 194. & Hist. 948.* Perpusilla & annua hæc species humifusa, & polyschides ramulis donatur in gyrum sparsis & nascentibus è radice tenui, albogilvâ, rarisque fibrillis à lateribus capillatâ. Ramuli vix tres uncias ut plurimum assequuntur, quandoque longiores, qui interdum in latiusculum cespitem pro soli bonitate se explicant humifusi, verticillis è viridi pallidis, dein griseis *Marrubii* instar coronati, quæ, ut terræ hærent, terrâ & pulvere farcta sunt & sordida, componuntur è denis vel novenis, tenuibus, stellatis, villosis, crispis simulque congestis pericarpis semine rotundo, lævi, glabro & citrino post exanthemum tumidis. Folia semunciali innixa pediculo, terna, oblonga, per latera angusta & rectilinea, in extremo latiora, obtusa & leviter serrata, nec ferè verticillis plura. E foliorum alis ab imo ad summum cauciculum terna aut quaterna in singulis cauciculis enascuntur verticilla toti plantæ supereminentia; illud verò, quod cauciculorum in orbem sparforum umbilicum occupat, cæteris sæpè majus & crassius evadit. Flores ejus pallidè purpurei. Sapor ferè nullus. Juxta elatiorem marginem viæ quæ ab aquâ Farellâ ad hyppodromum ducit, à sinistris Maio florebat.



829. Melilotus major, seu Cilicia filiquosa, inodora, luteo, amplo flore *Barr. Icon. 543.* A Meliloto vulgari discrepat foliis latioribus, acutioribus & magis ferratis; floribus quoque amplioribus, aureo fulgore nitentibus, nutantibus; filiculis longis & falcatis. Porro tota planta inodora est. Junio florebat inter segetes non longè à stagno sulfureo quod Romam Tiburtumque interjacet, quinque circiter à Tiburto miliaribus. Meliloti vires vid. in *Hist. Raii 951.*



830. Anonis non spinosa, flore Thyrsoides, carneo, Polonica *Barr. Icon. 1214.*

K Anonis

Anonis montana, præcox, purpurea, frutescens *Mor. H. R. Bles.* A Corvino depictam habuit Barr.

831. Anonis non spinosa, purpurascens, minor, Italica *Barr. Icon. 394.* Annua est, pumila & glabra vixque Icone major. Neque solum in Italiâ, sed in Delphinatûs aridis locis viâ quâ iter est Brianconium transacto monte dicto *le Col de la Roue*, D. Virginis Kermenfis fano ad ortum imminente, in Tarentasiâ finibus.

832. Anonis purpurea, non spinosa, minor *Barr. Icon. 1106.* Folia huic minora, rotundiora, vix aut saltem leviter in ambitu serrata, & ad basim pediculorum suorum acutis longisque appendicibus stipata.

833. Anonis luteo-purpurea, minima, angustifolia, Hispanica *Barr. Icon. 1104.* Anonis maritima, Gadensis, non spinosa, floribus in foliorum alis *Inst. R. Herb. 408.* Ista folia edit longiora & angustiora, minusque rotunda quam superior, illi cæteroqui valde similis, sed flores fert è luteo & purpureo variegatos, & è foliorum alis emergentes, singulares brevi calyce brevibusque radiis laciniato comprehensi ac pediculo tenui semuncialique innixi.

834. Anonis non spinosa, trifolia, glabra, luteo-purpurascens, saxatilis. *Barr. Icon. 762.* Elegans, supina; cauliculis repandis latèque sparsis luxurians è faxis nascitur undique foliis & floribus comosa. Folia promit angusta, longiuscula, semunciam ferè longa quæ longiora, per oras serrata, in acutum desinentia, & à Meliloti foliis formâ suâ non absimilia, lætè, imò subobscurè virentia, in uno brevique pediculo terna, surrecta juxta caulem & florum comam quam involvunt, eique jucundè permiscentur. Flores è luteo rubent calycibus comprehensi brevibus, sed in prælongas, quinas, angustas tenuesque lacinias profundè divisas paleaceis pallidisque, unde è viridi, croceo, rubente, & pallido variegata est ab imo ad summum usque floribus immiscens frondes mirâ sanè venustate, quam colorum gratiam etiam siccata in multos annos tuetur.

835. Anonis non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, Hispanica *Barr. Icon. 258.* & *Bocc. Mus. part. 2. 60. Tab. 48.* Villosa viscosaque est planta, cujus caulis striatus, rectus, crassiusculus, vix Icone major, hispidus & glutinosus; Folia terna tenui articulata pediculo, planè rotunda & tenuissimè in ambitu serrata. Flores magni, rubentes, patuli & in longam spicam eleganter congesti, quos complectuntur calyces breves, virides brevibusque radiis barbati, quod apparet, cum flos planè à calyce est exolutus. Juxta Cordubam in Boetiâ trans fluvium locis incultis reperiēbat Barr. necnon secus fluvium. Florem malè delineavit pictor; flos enim personatus vel labiatus exprimitur papilionacei loco.

836. Anonis lutea, viscosa, minor, marina, latifolia, Hispanica *Barr. Icon. 1105.* Anonis non spinosa, flore luteo variegato, angustifolia, maritima *Inst. R. Herb. 409.* Barcinonæ non longè à portu, ipsoque in littore reperitur hæc species *Natrix Plinii* persimilis, sed floribus minoribus, foliisque virentibus, minoribus, villosis & viscosis potitur. Tota planta assurgit, luxuriatque numerosis furculis semipedalibus & palmaribus, virentibus, villosis & viscosis. Foliorum formam & magnitudinem habes in Icone seorsim expressam. Folia sæpiùs complicantur, undè angustiora diceres. In maritimis agri Monspeliensis, & circa Massiliam sæpiùs nobis fuit obvia.

837. Anonis non spinosa, villosa & viscosa, Hispanica *Barr. Icon. 775.* Palmares rectos firmosque emittit furculos foliis densis, minutissimis, oblongis, angustis, uno pediculo ternis, per oras & extrema tenuissimè serratis & alternis instructos, villosis ac viscosis, ut & tota planta. Flores non vidi neque filiculas.

838. Anonis trifolia, pallidis nutantibusque flosculis, maritima *Barr. Icon. 761.* Tenui, albo-sordidâ fibrisque capillatâ abs radice quatuor aut quinque surgunt cauliculi rari foliis vestiti longiusculo articulatis pediculo, ternis, angustis, in extremo serratis, ad latera integris, geminâ, auritâ, membranaceâ

naceâ brevi & acutâ appendice exortum pediculi foliorum fulciente. Flores in summis ramis è foliorum alis enascuntur, semuncialibus, tenuissimisque donati pediculis, nutantes, pallidi, exigui, in calyce breviori, virenti, & multifido ferè immerfi, quibus succedunt filiquæ oblongæ. Italiæ Latiique indigena est.

839. *Anonis lutea*, *Trixaginis folio*, *maritima* *Barr. Icon. 776*. Surculos plures, supinos & repandos spargit humi multis nodis geniculatos, ramosos ortosque è tenui, filamentosâ radice arenis altè se immittente. Singulos nodos vestiunt & complectuntur appendices seu potiùs foliola è latâ & amplexicauli basi in acumen deorsum inflexum, & extrorsum incurvum desinentia, per oras serrata, *Teucrioidea* seu *Trixaginis Apulæ Col.* foliis simillima, sed longè minora, singularia, nec terna ut in superioribus, nulloque innixa pediculo, è quorum alis rami & per ramorum cauliculorumque latera, & extrema flores aurei nascuntur, quorum calyx virescit, stellatus & brevi nulloque ferè potitur pediculo: Quibus porrò succedunt filiquæ breves, ovatæ, tumidæ, cartilagineæ, mediâ lineâ secundùm longitudinem divisæ, in quibus terna aut quaterna semina reniformia, nec Milio majora delitescent. In Arenosis maritimisque Ostii Tyberini collegit *Barr.*

840. *Anonis lutea*, viscosâ, latifolia, minor, flore pallido *Barr. Icon. 1239*. *Anonis viscosa*, spinis carens, lutea, latifolia, annua *Bot. Monsp.*

841. *Anonis lutea*, montana, non spinosa, minima *Barr. Icon. 1107*. *Anonis pusilla*, glabra, fruticans, trifoliis affinis *Cherleri I. B. 2. 394*.

842. *Anonis frutescens*, incana, angustifolia, flore purpureo. *Cicer Montanum*, fruticans, incanum, angustifolium, ferratum, minus *Barr. Icon. 419*. Ex radice crassâ lignosâque caulem edit fruticantem, ramosum, densis vestitum foliis ternis, Meliloti formâ, sed crassioribus, firmioribus, incanis, lanuginosis, minoribus tenuissimoque articulatis pediculo emergenti è squammosis acutis geminisque appendicibus toto ferè cauli frequenter & imbricatim ex adverso positis; Flores pariter brevibus insidentes pediculis ex geminâ illâ appendice ortum suum ducunt, latè purpurei & calycibus comprehensi incanis atque quinquefidis. Siliquas fert semunciam longas, tumidas, octavam unciae partem latas, mucronatas, semina exigua, oblonga & reniformia includentes. In Castiliâ novâ locis siccis aridis & campestribus, dum Valentia Madritum redibat, inter *Oppidula* vulgò *Vellar de Canée*, & *Saclices*, cum sequenti occurrit.

843. *Anonis frutescens*, incana, latifolia, flore purpureo. *Cicer Montanum*, fruticans, incanum, latifolium, caule tortuoso & tomentoso, flore purpureo, *Hispanicum* *Barr. Icon. 420*. Hæc crassioribus stolonibus undosis & tortuosis distinguitur, quod tamen pictor non satis expressit, ut par erat. Totus præterea frutex ejusque rami & folia densâ canescunt lanugine. Folia ejus rotunda, serrata, crassiuscula, sed quæ facilè defluvium patiuntur. Flores pariter purpureos edit è foliorum alis emergentes, simulque cum foliis, vel ab extremis ramis ut in superiore. Appendices foliorum acutæ sunt, sed non pungunt.

844. *Anonis fruticans*, incana, angustifolia, ferrata, flore purpureo. *Cicer sylvestre*, fruticans, incanum, angustifolium, ferratum, flore purpureo, *Hispanicum* *Barr. Icon. 299*. Elatius frutescit quàm superiores, furculique & rami recti & surrecti; folia semunciam longa, sed vix duodecimâ unciae parte latiora, obtusa, in ambitu serrata, uno pediculo terna. Flores purpurei aliis similes. Porrò appendices in exortu foliorum latiusculæ sunt & serratæ. Tota planta lanuginosa est & incana. In Arragone propè locum *Burjalajo* dictum, in viâ quæ ducit à Cæsare Augustâ Fagaram, in finibus Catalauniæ, viget.

845. *Anonis frutescens*, angustifolia, non ferrata, flore purpureo. *Cicer sylvestre*, fruticans, angustifolium, non ferratum, *Hispanicum* *Barr. Icon. 300*. Foliis stipatur oblongis & præangustis, non ferratis, sed teretibus & facie *Crithmi*

Chrysanthemi maritimi, dodrantem unciae longis, aliis minoribus ex eorum alis ad exortum congestis, multos ad latera & in cacumine caulium, & ramorum flores edit purpureos exiguos, quibus succedunt siliquæ semunciam longæ, tumidæ & incurvo mucrone aculeatæ. Anonidis vires vide in Hist. Raii 957.



846. Fœnum-Græcum sylvestre, alterum, polyceration C. B. Pin. 348. Hedysarum minimum, trifolium, torosâ siliquâ Barr. Icon. 257. Hedysarum minimum Dalechampii Lugd. 446. Fœnu-Græci vires vide in Hist. Raii 954.



847. Medica folliculo spinoso Lob. Observ. 498. & Icon. 37. Trifolium luteum, cochleatum, echinatum, minus Barr. Icon. 863. n. 1. Tenuem habet radicem, ex quâ plures cauliculi supini vel erecti, foliaque rotunda & terna, dodrantem unciae longo pediculo nixa, subvillosa, per oras leviter ferrata. Flores lutei, quaterni aut seni racematim congesti, pusilli, quibus succedunt totidem ferè globuli in spiram convoluti, molliusculis spinulis echinati; sed nondum maturi, cum occurrebat.



848. Medicago Vulnerariæ facie, Hispanica Inst. R. Herb. 412. Anthyllis lunaria, flore luteo, Italica Barr. Icon. 576. Auricula muris Camer. Hort. Tab. viij. 1. B. 2. 387. Maio & Junio florebat in collibus siccis Romæ, præsertim in monte Mario. Turnefortius & D. Goiffon Hispaniæ indigenam dicunt.



849. Astragalus Alpinus, incanus, major, albo florè. Astragaloides montana, incana, major, flore albo Barr. Icon. 557. Foliis est Astragali longis, acutis, angustis, villosis, alatim in longo pediculo dispositis, unico utramque seriem in extremo claudente, juxta radicem latioribus & brevioribus, in caule angustioribus & longiusculis, alternisque. Caules ex radice perenni palmares, repandos, villosos, ex albo gilvescentes emittit, quorum cacumen foliis nudum spicato florum thyrso decoratur, deorsum nutantium, alborum & è calycibus villosis, virentibus & oblongis emergentium. Siliquæ ejus teretes sunt, unciae dodrantem longæ, villosæ, in longam congestæ spicam & sibi incumbentes, surrectæ, folliculosæ, in mucronem incurvum desinentes atque seminibus foetæ, quæ non vidi. Sapor amarus est. E Jugis Amatricensium in Aprutio eruebat Barr.

850. Astragalus supinus, siliquis villosis, glomeratis Inst. R. Heb. 416. Astragaloides incana, flore purpureo, Lentis siliquis Barr. Icon. 537. n. 1. Hispaniæ indigena est. Planta pusilla vix medio palmo altior.

851. Astragalus pusillus, incanus, amplo flore purpureo. Astragaloides pusilla, incana, amplo flore purpureo Barr. Icon. 537. n. 11. Pusilla est Planta, incana, pubescens, vix duabus unciis altior. Radix ejus crassa est longiuscula, cervicosa & perennis. Flores pro magnitudine plantæ magni, purpurei & surrecti. Occurrebat Barr. in Regno Valentino viâ ab urbiculâ Almença ad oppidum vulgò al Pera.

852. Astragalus pumilus, incanus, hispidus, flore albo. Astragaloides pumila, incana, hispida, flore albo Barr. Icon. 537. n. 111. Superioris congener, sed minor & surrectus. Præterea folia incana licet, obtusiora & magis villosâ, densâ serie pediculo seu nervo medio articulata. Flores porro nivei sunt candoris. Radix perennis pariter & crassa. Totaque Planta vix duabus unciis major. Hispaniæ indigena est.



853. Pelecinus vulgaris *Inst. R. Herb.* 417. Hedysarum congestis & utrinque lunatis filiquis *Barr. Icon.* 1137. Lunaria radiata Robini *I. B.* 2. 348. & *Raii Hist.* 939.



854. Arachidna quadrifolia, villosa, flore luteo *Plum. Nov. Plant. Amer. Gener.* 49. Lupinus quadrifolius, flore luteo, saturo, exoticus *Barr. Icon.* 1215. Mundubi Brasiliensibus *Margr.* 37.



855. Balsamina lutea, Polonica *Barr. Icon.* 1197. Balsamina lutea sive Noli me tangere *C. B. Pin.* 306. *Raii Hist.* 1328. *La Balsamine à fleur jaune.*



856. Viola Martia, minor, flore violaceo *Barr. Icon.* 695. Viola Martia, inodora, sylvestris, foliis majoribus & rotundioribus *C. B. Pin.* 199. *Raii Hist.* 1050. *La Violette de Mars, sans odeur.*

857. Viola montana, minima, flore albo, parvo *Barr. Icon.* 760. E radice perenni, crassiusculâ, longâ, repente, filamentosâ & fibris è fusco luteis capillatâ erumpunt folia è nigro virentia, quina aut sena & ampliùs, tenui, tres quatuorve uncias longo surrectoque nixa pediculo, juxta radice cervicem rufescente; è quorum medio surgit cauliculus unus aut alter, crassiusculus, palmo paulò brevior, firmus, imâ parte è luteo rufescens, nudus, unico duntaxat folio versus florem interruptus, in cujus summo flos unicus, parvus, albusque eminet. Summis in pratis Amatricensium montium in Aprutio, sed præsertim in illo monte qui vulgò dicitur à pastoribus *Monte Radicina*, Maio & Junio florebat.

858. Viola Hispanica, fruticans *Barr. Icon.* 568. Viola Hispanica, fruticosa, longifolia *Inst. R. Herb.* 421. Radicem hujus rupium rimis altè infixam habere non potui, ex eâ surculi lignosi erumpunt ramosi, medio palmo, vix altiores & densis foliis frondosi, longis, angustis, in extremo nonnihil obtusis, per oras integris nec serratis. Ex eorum sinu per totum caulem exeunt sparsim pediculi tenues, fescunciales, nudi, singularibus Violæ floribus è cæsis cæruleis onusti parvis & minoribus quàm Violæ Martiæ, quibus marcescentibus succrescunt utriculi trigoni, & trifariam dehiscentes. Totius Plantæ formam & magnitudinem habes in Icone. Differt à *Viola montana*, *pumila Clus. Cur. Post. in fol.* 31. floris colore. In deserto *la Murtha* dicto sex leucis ab urbe Valentia, meridiem versus, non longè à mari inter saxa erumpit.

859. Viola montana, lutea, subrotundo crenato folio *Barr. Icon.* 691. Viola montana, lutea, grandiflora *C. B. Pin.* 200. Radix huic cespitosa, albâ, fibrosa, sed perennis, ex quâ enascuntur folia oblonga, crenata, & subrotunda; quæ verò cauliculis hærent altiùs incisa & ex alis suis longos, quandoque semipalmares, angulosos, nudos emittentia pediculos quibus flos eminet omnium Violarum amplissimus, odore suavissimo præditus, deorsum nutans, aureo nitore fulgens & flavus, ex quinque petalis crispantibus & undantibus constans, quorum superiora majora & ampliora. Sapor totius plantæ subacris est. In omnibus altioribus Apenninorum Alpiumque Delphinatûs prætis passim est obvia.

860. Viola montana, cærulea, tricolor, folio subrotundo, crenato *Barr. Icon.* 692. Viola montana, tricolor, odoratissima *C. B. Pin.* 199. *Raii Hist.* 1052. A superiori distinguitur florum colore, folia quandoque ei paulò ampliora, sed flos ejus variat plurimùm albo, atropureo, violaceo, dilutè cæruleo

leo, vel cæruleo colore; odore tamen suavissimo præditus. In monte Maliano in Aprutio ad Septentrionem observavit Barr. Nos in Alpibus supra Camberiacum, Gratianopolim & Vapincum, necnon in valle Barfilionensi, & in monte Pilati supra Lugdunum.

861. Viola tricolor, hortensis, violacea, alba, lutea, incisus foliis Barr. Icon. 696. Viola tricolor Dod. Pempt. 158. Viola tricolor, hortensis, repens C. B. Pin. 199. Raii Hist. 1052. Pensées. Hujus flos triplici accenditur colore violaceo scilicet albo & luteo.

862. Viola tricolor, sylvestris, subrotundo folio, purpurascens flore Barr. Icon. 757. n. 1. Viola sylvestris Lob. Icon. 611. Viola bicolor, arvensis C. B. Pin. 200. Raii Hist. 1053. Superiora petala florum huic purpurea sunt, lateralia duo unguibus albescentibus insignita; inferiora verò lutea cum unguibus albidis subindè per oras purpurascens. Sequentes variant foliis & floribus.

863. Viola tricolor, sylvestris, angustifolia, flore albo Barr. Icon. 757. n. 11.

864. Viola tricolor, sylvestris, angustifolia flore cæsis Barr. Icon. 757. n. 11. Flos huic exiguus, cujus superiora petala purpurea sunt, lateralia è cæsis albicantia; inferiora juxta unguem lutea, reliquum è cæsis albicat.



865. Fumaria tenuifolia, erecta, purpurea, Hispanica Barr. Icon. 41. Fumaria minor tenuifolia C. B. Pin. 143. Capnos tenuifolia Clus. Hist. ccviii. Raii Hist. 406. La Fumeterre d'Espagne.

866. Fumaria henneaphyllos, Hispanica, saxatilis, flore vario Barr. Icon. 42. Fumaria henneaphyllos, Hispanica saxatilis Bocc. Mus. part. 2. 83. Tab. 73. Fumaria Hispanica, saxatilis, foliis amplioribus, cordiformibus, semine compresso Inst. R. Herb. 422. Elegans hæc planta è radice in saxorum rupiumque rimis mersâ, longâ, tenui, sed vivaci, multis densisque latum in cespitem congestis foliis cordatis, glaucis, pediculo ramoso novenis adnatis luxurians, cauliculisque teneris infirmis, succulentis, geniculatis, fragilibus, varièque inflexis vix supra palmum sursum assurgit, ternis aut quinis ornata in summo floribus ex albo rubro & luteo mixtis, hiatu latiore, & longo acutoque calcari juxta & ponè pediculum præditis, semen compressum est. Juxta Sigoviam Castiliæ veteris urbem extra muros, in valle ad Septentrionem, inter rupes frequens & semper virens.

867. Fumaria tuberosa, insipida, Canadensis Barr. Icon. 107. Fumaria tuberosa, insipida Corn. 126. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.



868. Capnoides Inst. R. Herb. 423. Fumaria filiquosa, semper virens, Canadensis, flore carneo, rictu aureo Barr. Icon. 108. Fumaria filiquosa, semper virens Corn. 58. Raii Hist. 974. Icon. Barr. & descriptio ex Corn. Hist. l. c.



869. Reseda minor, incisus foliis Barr. Icon. 587. Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo Mor. H. R. Bles.



870. Luteola pumila, Pyrenaica, Linariæ folio Inst. R. Herb. 424. Reseda minor, alba, dentatis foliis Barr. Icon. 588. Hujus descriptionem non invenio.



871. Aconitum reticulatâ radice, flore sulfureo albicante, latifolium Barr. Icon.

Icon. 599. Aconitum Lycoctonum, luteum C. B. Pin. 183. & Raii Hist. 704. L'Aconit à fleur jaune. Reperitur in Alpibus & aliis montibus editioribus (ut rectè monet Dodonæus Hist. Pempt. 439) ampliore caule amplioribusque foliis, quandoque humilibus ac minoribus. Flos etiam modò luteus, interdum pallidior.

872. Aconitum reticulatâ radice, flore sulfureo albicante, angustifolium Barr. Icon. 600. Prioris varietas Julio & Augusto utrumque florebat in monte Sancti Vicini in Italiâ, necnon in monte Assisi juxta locum quem majus Mortarium vocant.

873. Aconitum cæruleum, minus, sive Napellus minor C. B. Pin. 183. Thora Italica sive Napellus minor, flore cæruleo Barr. Icon. 610. Thora Italica Clus. Hist. xcviij. Le Napel.

874. Aconitum salutiferum sive Anthora C. B. Pin. 184. Raii Hist. 705. Anthora vera, flore luteo Barr. Icon. 609. L'Anthora. Ex montibus majoris Carthusiæ habuit, ibique invenimus ascendendo ad montem Grandson dictum.



875. Aquilegia simplex, corniculata, flore cæruleo Barr. Icon. 628. Aquilegia hortensis, simplex C. B. Pin. 144. Raii Hist. 707. L'Ancolie.

876. Aquilegia alba, multiplex, è purpureo violaceo variegata Barr. Icon. 618.

877. Aquilegia corniculata, violacea, umbellâ reflexâ Barr. Icon. 614.

878. Aquilegia corniculata, flore albo, minore Barr. Icon. 31.

879. Aquilegia corniculata, flore cæruleo, minore Barr. Icon. 32.

880. Aquilegia corniculata, rosea, prælongo flore albo Barr. Icon. 616.

881. Aquilegia corniculata, rosea, cærulea, brevi & densissimo flore Barr. Icon. 615.

882. Aquilegia corniculata, rosea, altera Barr. Icon. 676.

883. Aquilegia corniculata, crispa, longior Barr. Icon. 675.

884. Aquilegia corniculata, crispa, saturè rubra, major Barr. Icon. 630.

885. Aquilegia corniculata, crispa, minor, rubra Barr. Icon. 629.

886. Aquilegia promiscua, vario flore Barr. Icon. 625.

887. Aquilegia inversa, pleno flore Barr. Icon. 613. Aquilegia hortensis, multiplici flore inverso C. B. Pin. 145. Aquilina pleno inverso flore Clus. Hist. cciiij. Barrelieri Icon. ex Clusio l. c.

888. Aquilegia stellata, simplex, violaceo-purpurea, major Barr. Icon. 624.

889. Aquilegia stellata, purpurea, albis foliorum acuminibus Barr. Icon. 626.

890. Aquilegia stellata, purpureo-violacea, minor Barr. Icon. 625.

891. Aquilegia stellata, albo-violacea, variegata Barr. Icon. 621.

892. Aquilegia stellata, maxima, alba, μελαροσίχτος Barr. Icon. 622.

893. Aquilegia stellata, umbellâ reflexâ, flore pleno, tenuifolio, violaceo Barr. Icon. 634.

894. Aquilegia stellata, violacea, minor, latifolio & plenissimo flore Barr. Icon. 633.

895. Aquilegia stellata, alba Barr. Icon. 673.

896. Aquilegia stellata, cærulea Barr. Icon. 674.

897. Aquilegia stellata, flore violaceo, latifolio, crispo Barr. Icon. 620.

898. Aquilegia stellata, flore violaceo, latifolio Barr. Icon. 619.

899. Aquilegia stellata, crispa, minor, violacea Barr. Icon. 635.

900. Aquilegia stellata, crispa, minor, rubra Barr. Icon. 636.

901. Aquilegia degener, virescens, stellata, rosea Barr. Icon. 608. Aquilegia degener, virescens C. B. Pin. 145.

902. Aquilegia rosea, cæruleo-violacea, rara Barr. Icon. 607. Hæc floris gratiâ

gratiâ cæteras vincit; Petala enim quamvis numerosa, ita eleganter ordinata sunt, radiique ad amussim & veluti filo ducti ita distinguuntur, ut eorum numerum facile possis assequi. Flos totus cæruleo-violaceus, circa umbilicum maculis quibusdam pallidis notatus, quasi venustatis causâ.

903. Multum ludunt Aquilegiæ tum colore tum ordine petalorum. Has variationes sufficienter hisce tabulis expressisse videtur *Barr.*; omnes tamen in *Icone 627.* habes simul collectas.

904. Aquilegia tenuifolia, præcox, Canadensis, purpuro-luteo simplici flore *Barr. Icon. 617.* Aquilegia pumila, præcox, Canadensis *Corn. 60. Raii Hist. 607. L'Ancolie de Canada.*



905. Fraxinella *Clus. Hist. 99.* Dictamnus albus officinarum, minor, Hispanicus *Barr. Icon. 1318. Le Dictame blanc, ou la Fraxinelle.* Vires vide in *Hist. Raii 699.* In Hispaniâ & Galliâ Narbonensi provenit.



906. Calceolus Marianus, albo sandalio & brevior, Canadensis *Barr. Icon. 260.* Calceolus Marianus, Canadensis *Corn. 204. Le Sabot de Notre-Dame.* *Icon. Barr. & descriptio ex Corn. Hist. l. c.*



907. Ambrosia vulgaris *Barr. Icon. 1144.* Ambrosia maritima *C. B. Pin. 138. Raii Hist. 164. L'Ambrosie.*



908. Gnaphalodes Lusitanica *Inst. R. Herb. 439.* Gnaphalium sylvestre, supinum, retusis foliis, Hispanicum *Barr. Icon. 1147. n. 11.*



909. Carduus tomentosus, Acanthi folio vulgaris *Inst. R. Herb. 441.* Acanthium tomentosum, capite & semine majoribus, crispantibus caulium alis *Barr. Icon. 502.* Acanthium vulgare *Park. Theat. 979. Raii Hist. 313. Chardon à feuilles d'Acante.*

910. Carduus Acanthi folio angustiore *Inst. R. Herb. 441.* Acanthium virens, majoribus, capitibus spinis *Barr. Icon. 501.* Acanthium Illyricum *Park. Theat. 979. & Raii Hist. 313.*

911. Carduus nutans *I. B. 3. 56.* Onopoxus amplo capite purpureo, angustifolius *Barr. Icon. 1116.* Caulem emittit pedalem & cubitalem, erectum, striatum, lanuginosum, aculeis secundum longitudinem echinatum, non tamen alatum, cui hærent folia quinque vel sex uncias longa, vix uncia latiora, angusta, profundè sinuosa & laciniata, ad oras acutè serrata & spinis aculeata; dum verò altiùs surgunt, in caule minora & acutiora. Summo in caule caput Cardui amplum insidet squamis aculeatum planis, virentibus & in longos, tenues, & lutescentes desinentibus aculeos, supra flosculos etiam purpureos quos complectuntur, quandoque eminentibus. Semen maturum non vidi. In campestribus Latii & Etrusciæ frequens cum superioribus.

912. Carduus seu Polyacantha vulgaris *Inst. R. Herb. 441.* Acarna Theophrasti Imperato, Ilvensis seu Italica *Barr. Icon. 1211. Imper. 669.* Acarna major, caule folioso *C. B. Pin. 379. Raii Hist. 315. Icon. Barr. ex Imper. Hist. l. c.* Flores ejus purpurascunt; malè azureos dicit Imperatus, malè flavescens Lobelius. In collibus ad Septentrionem oppidi *Rio* dicti non longè à Ferri fodinis Ilvensibus provenit.

913. Carduus maritimus, major, canescens, flore purpureo. Jacea maritima,

tima, incana, capite purpureo, spinoso, major *Barr. Icon. 1217*. Radice est Raphani tenuiore, pedali, subfusca, paucis fibris à lateribus capillatâ, ex quâ aliquot caules erumpunt rotundi, sesquicubitales, semialati, striati, lanuginosi, repandi, foliis vestiti alternis, Centaurii majoris formâ, palmo longioribus, longo pediculo & carinato innixis, in sex aut quatuor lobos geminos, minores, Erucae modo divisus inferioribus, superioribus verò integris, nonnihil sinuosis, per oras dentatis, ad basim auriculatis, quàm inferiora longè minoribus & angustioribus. Summis insident ramis capita squamata, virentia, spinosa, singulis squamis in stellam spinarum ex septem aculeis quorum medius longior est, constantem, desinentibus. Flosculi purpurei staminibus & stylis albicantibus variegati. Tota planta incanâ pubescit lanugine. Odor saporve illius ingratus & amarus. Maritimæ oræ & Italiæ indigena est.

914. *Carduus maritimus*, canescens, alato caule, medius. *Jacea maritima*, cinerea, capite purpureo, spinoso, media *Barr. Icon. 235*. Radice potitur longâ, fusca, lignosâ, cujus caput in multos furculos & cauliculos dividitur tenues, tortuosos, angulosos, striatos, pubescentes, ramosos, supinos & humi per arenam latè fusos & sparsos, foliis vestitos minoribus quàm in præcedenti, alternis, tenuibus brevibusque pilis hirsutis & è viridi subcinereis, infimis palmaribus, & in obtusos lobos laciniatos divisus & cinereis, basi latâ caulem amplexantibus, sensim minoribus, brevioribus, per oras dentatis, aut in tres paucioresve & inæquales lobos divisus. Extremis ramis insident singularia capita, quàm in præcedenti, minora, aculeisque brevioribus spinosa, quorum etiam flosculi nonnihil ex albido rubescunt. In arenoso littore maris Tyrrheni & juxta Centumcellas crescit.

915. *Carduus maritimus*, canescens, alato caule, minor. *Jacea maritima*, incana, folio integro, caule folioso, capite purpureo, spinoso, minor *Barr. Icon. 236*. Hæc species à superioribus duobus distinguitur, tum quòd minor, tum foliis integris, angustis, quatuor uncias longis, quandoque palmaribus, incanâ lanugine subpubescentibus, in ambitu dentatis, in extremo aculeatis, præsertim circa caulis summitates, carnosus, amplexicaulibus, alternis & sinuosis. Caulis illi alatus, angularis, striatus, lanuginosus, ramosus, erectus firmusque. Caput ut in superiori, sed minus. Flosculi inodori. Caules & folia fœrent, amara & ingrati saporis.

916. *Carduus stellatus*, luteus, aculeatis & profundè incisus foliis *Barr. Icon. 346*. Arrecta in caule, alternaque fert folia tenuia, levi lanugine albicantia, quorum singuli lobi & incisuræ tenui acutâque rigent spinulâ. Summo in caule caput squamosum, magnumque pro conditione plantæ promit, cujus singulæ squamæ in rigidos radiatimque sese explicantes spinas, quadrantem uncia longas desinunt, & in medio flosculi lutei quales *solstitialis spinæ*, delitescunt. Radicem seminaque non observavi. Hispaniæ est indigena.

917. *Carduus purpureus*, Cyani folio *Barr. Icon. 418*. *Bocc. Mus. part. 1. Tab. viij. Fig. 2.* *Carduus stellatus*, Leucoii folio *Mor. H. R. Bles. & Raii Hist. 318*.

918. *Carduus pumilus*, erectus, *Jaceæ* incano folio & tenui. *Jacea pumila*, incana, tenuifolia, capite spinoso, erecta *Barr. Icon. 179*. Radice nititur longâ, tereti, raris fibris capillatâ, rufâ & nigricante. Caules tres aut quatuor ab imâ parte rectos, incanos, pubescentes, firmos, palmaresque promit foliis vestitos mollibus, inferioribus latiusculis & *Hieracii* facie vel *Jaceæ*, fescunciam & ampliùs longis, sensim tenuioribus & brevioribus, lobisque in quos dividuntur, angustioribus & rarioribus, adeò ut quæ à medio caule sursum enascuntur, videantur ferè capillaria & integra, & quæ capiti supponuntur, florem sæpè superent altiusque erigantur. Summi caules singularia sustinent capita spinosa, minora tamen nonnihil quàm in sequenti. Flosculi purpurascunt.

919. *Carduus pumilus*, supinus, *Jaceæ* folio incano & tenui. *Jacea pumila*,
L la,

la, incana, tenuifolia, capite spinoso, supina *Barr. Icon. 180.* Plures ex radice emittit cauliculos supinos & subinde erectos, alternis rarisque & vix uncia dodrantem longis vestitos foliis, quorum ima in paucas lacinias, angustissimas & profundas sunt divisa, superiora verò ut plurimum integra & *Stachados citrinæ* æmula. Singuli cauliculi singularia ferunt capita, spinosa, purpureis composita flosculis. Tota planta incana est, & facie suâ externâ *Stachadem citrinam* mentitur.

920. *Carduus pumilus*, supinus, *Jaceæ* folio tenui & incano, capite brevior. *Jacea pumila*, tenuifolia, supina, capite brevi spinoso *Barr. Icon. 181.* Plurima folia humi fusa, incana, & in tenues angustas pluresque lacinias altè divisa edit ex radice perenni, longâ, raris fibris capillatâ & fuscâ. Ex foliorum medio quatuor aut quinque cauliculi exeunt supini, incani, teretes, striati, tenuioribus, angustioribusque foliis vestiti, & in duos tresve ramulos summâ parte divisi, in quorum fastigio insident capita quàm in superiori minore, breviora, sed spinosa. Tota planta incana est & amara.

921. *Carduus Hispanicus*, minor, *hieracii* folio, flore luteo. *Jacea minor*, *Hieracii* folio, capite spinoso, *Hispanica Barr. Icon. 160.* E parvâ biennique radice folia edit parva, humi congesta, *Hieracii* formâ, obtusè sinuosa, dentata hispidaque, ternos etiam aut quaternos cauliculos raris vestitos foliis minoribus, angustis, minùs sinuosis & quandoque uncialibus. Ramulorum non modò in vertice capita insident pluribus squamis spinosis imbricatim loricate, flosculisque referta luteis, quibus succedunt semina *Jaceæ* pellucida & papposa: verùm juxtâ radicem humum inter & folia, terna, quandoque plura erumpunt capita pariter spinosa cum floribus luteis.

922. *Carduus Jaceæ* folio breviori & angusto, capitulis cum squamis tricuspidebus. *Stæbe Linifolia*, capite spinoso *Barr. Icon. 308.* Folia huic oblonga, breviora, angusta, per oras nonnihil dentata, virentia, per ramos inæqualiter & satis rarè sparsa. Flosculi purpurei, calyce comprehensi tumidiore, squamato, squamis singulis in tres aculeos breves desinentibus. Foliorum & capitulis magnitudinem habes in Icone. Semina fusca sunt. Radicem non vidi. Sapor totius plantæ amarus. *Hispaniæ alumna* est.

923. *Carduus Pineis* foliis, flore luteo. *Stæbe major*, *Pineis* foliis, luteo flore, capite spinoso *Barr. Icon. 316.* & *Bocc. Mus. part. 2. 83. Tab. 76.* Radice pollet perenni, è quâ plures caules erecti exeunt incani, sursum ad duos palmos & ampliùs aliquandò assurgentes, firmi, striati seu potius angulosi, crebris, angustis, subtilibus & teretibus, prælongis & *Pineis*, nisi molliora essent, arrectisque vestiti foliis quorum superiora sensim breviora. In summo caulium capita singularia prominent, quandoque bina, spinosis squamis imbricatim armata & flosculos luteos complectentia. Romæ in Horto Vaticano cultum vidit *Barr.* Distinguitur à *Chamaepeuce. P. Alp. Exot. 76* foliis suis teretibus & capitibus spinosis.

924. *Carduus montanus*, *Italicus*, foliis tenuissimis & spinosis. *Stæbe montana*, tenuifolia, foliis & capite spinosis, *Italica Barr. Icon. 385.* Pari nititur radice ac *Stæbe Salmaticensis III. Clusii*, ex cujus capite folia confertim erumpunt tenuissimè incisa, nonnulla capillaria, & *Fœniculi* æmula, viridia, in extremo mucronata, ut plurimum medio nervo subincano & subhirsuto sustentata, in latum se spargentia, basi latiore & villosâ donata, alterna, amplexicaulia, quinque aut sex uncias longa, quæ longissima, duas lata, in caule verò minora & rariora. Caulis rectus, firmus, lanuginosus, nonnihil incanus, pedalis ut plurimum, semi nudus, alternis ramis & foliis vestitus. Extremis ramis & caule insident singularia capita squamosa, villosis squamis pallidis acutis & in trientem uncia longas spinas atrofuscas surrectasque desinentibus. Flosculorum color, & semina ut in *Stæbe Salmaticensi*. Junio florebat in Gualdo Umbriæ monte in Italiâ.

925. *Carduus nemorosus*, *Italicus Barr. Icon. 417.* Descriptionem non invenio

invenio. A *Carduo pycnopolycephalo* *Triumf.* 10. non multum distat; si non idem.

926. *Carduus* foliis integris, Intybaceis. Jacea Intybacea, capite rubro spinoso *Barr. Icon.* 1218. & *Bocc. Mus. part. 2. 60. Tab. 48.* Descriptam non reperio in scriptis Barrelieri. Boccone qui Iconem Barrelieri sumpsit, Bipedalem dicit & indigenam Etrusiae.

927. *Carduus* Syriacus. Cyani facie, flore purpureo. Cyanus purpureus, capite spinoso, Syriacus *Barr. Icon.* 503. Prima plantae folia oblonga erant, integra, alia in caule Cyani modo aut *Erucæ* altius in tres, aut quatuor à latere lobos incisa, obliquis venis virgata, glabra & lætè virentia. Flos ruber erat, Cyani formâ, id est flosculis marginalibus amplioribus, stellatis, in disco verò minoribus, dilutiùs rubentibus aut purpureis, è quorum cavo styli tenues, acuti, purpurei & surrecti prominebant. Capituli squamæ parte imâ virent, & summâ albescunt & canescunt, necnon in spinam simplicem abeunt. Tota planta amari est saporis. Romæ florebat Julio in horto sancti Xysti semine ex Syriâ delato, sed brevi interiit.

928. *Carduus* crispis Theophrasti *Barr. Icon.* 376. n. 1. Quid?

929. *Carduus* ferox, Hispanicus, spinis majoribus *Barr. Icon.* 474. *Cardus Polyacanthus*, Hispanicus, brevior folio, longissimis aculeis munito *Inst. R. Herb.* 441. Folia rigidiora multò & duriora, minusque sinuosa quàm in sequentibus, sed contortis velut eorum oris nonnihil crispa & undantia, longioribusque spinis & ferocioribus binis ternisque per oras & per intervalla armantur unciam ferè longis, crassis, luteis, rectis; supernè lætè virent folia, infernè subincanâ pubent lanugine. Caulem nec flores vidi.

930. *Carduus* ferox, mitior Hispanicus *Barr. Icon.* 473. In montibus *Jaen* Boeticæ in Hispaniâ folia ejus tantum ima vidi, quæ erant semipalmum longa, dodrantem unciae lata, per oras sinuosa, longis, duris, crassiusculis & luteis spinis horrida, ad oras profundiores brevioribus & tenuioribus spinis armata, supernè viridia, infernè villosa & incana.

931. *Carduus* Italicus, spinosior, amplo capite. Arcana latifolia, spinosior, amplo capite *Barr. Icon.* 484. Hanc speciem superiori simillimam, si non eadem est, reperiēbam in Italiâ, sed flores jam abierant, undè colorem non potui observare. Caput erat amplum & uncialis diametri, è duris, nigris, ramosis crassisque spinis in extremo albidis, & quartâ unciae parte longis conflatum. Semen ejus subrotundum & rufum. Folia latâ basi caulem amplexabantur, emittebantque hinc inde appendices, quibus media caulis pars fiebat alata & erat spinis circumsepta.



932. Jacea nigra, major, foliis integris *Barr. Icon.* 1324. Jacea Lusitanica, semper virens *H. R. Par. Raii. Hist.* 326. *La Jacee de Portugal.*

933. Jacea angustifolia, Intybaceis dentatisque imis foliis. Stæbe angustifolia, Intybaceis, dentatisque imis foliis *Barr. Icon.* 307. Huic ima folia latiora, per oras dentata *Hieracii fruticosi*, *Sabaudi Lobelii* modo, in caule verò angustiora & nonnihil etiam incana, dentata & sinuosa. Caules vix palmares, tortuosi, in plures ramos brachiati, sustinentes singularia capita teretia, squamosaque; semen glabrum est, albicans & pappis instructum. Varietas *Jaceæ nigrae angustifoliae* *C. B. Pin.* 27.

934. Jacea fruticans, incana, *Hysopi* folio, major. Stæbe fruticans, *Hysopi* folio, major *Barr. Icon.* 305. Sequenti similis est, sed majoribus donatur foliis, ut videre est in Icone. Semen ejus crassius, brevius & pappis pariter instructum; caput etiam crassius, glabrum, nullisque pilis in cirros crispatis tectum ut in sequenti. Distinguitur ab *Cyano peramaro*, *supino*, capitulis squarrosis, *sesamoidis parvi Lobelii* *Observ.* 296. foliis quæ in nostrâ minora sunt, in *Cyano vero Lobelii* ampliora & obtusiora.

935. *Jacea fruticans*, incana, brevi *Hyssopi folio*. *Stæbe fruticans*, incana, brevi *Hyssopi folio*, capite tereti & cirroso *Barr. Icon. 306*. Humilis est planta vix medium palmum alta & fruticans, cujus caulis lignosus, incanus & ramosus, densis, alternis, arrectis & incanis instruitur foliis rigidis, quàm *Stachados citrinæ* longè brevioribus: capita oblonga, teretia, squamata, cirris crispisque pilis comosa. Flosculi purpurei. Semina argentei coloris & pappis instructa subluteis.

936. *Jacea minor*, *Globulariæ folio*, flore purpureo, Hispanica *Barr. Icon. 159*. Ex radice parvâ & perenni folia enascuntur quinque aut sex, vix fescunciâ longiora, ad basim angustiora, sensim latiora, *Globulariæ* modo & obtusa, per oras nonnihil sinuata hispidaque; è quorum medio caulis rectus, vix dodrantalis, hispidus, raris alternisque foliis, sed angustioribus vestitus assurgit non ramosus, exile caput *Jaceæ* squamosum villosumque sustinens, imâ parte rotundius, summâ verò compressius & flosculis purpureis refertum. Squamæ capitis in pilos etiam purpureo-violaceos desinunt. Aridis & saxosis Hispaniæ collibus delectatur.

937. *Jacea minima*, *Globulariæ folio*, flore purpureo, Hispanica *Barr. Icon. 162*. *Jacea Hispanica*, pumila, *Linariæ folio Inst. R. Herb. 445*. Cæteris humilior & supina radicem habet crassiusculam, brachiatam, subrusam & in varia capita divaricatam, ex quibus densè satis humi fundit foliola integra, villosa, ima obtusè acuta, in caule verò acutiora, longiora & angustiora. Cauliculi biunciales sunt & supini; capita verò villosa & parva. Flores purpurei. Tota planta vix Icone major.

938. *Jacea pumila*, supina, purpurea, integro folio *Barr. Icon. 142*. Supina est plantula foliis & cauliculis repandis hirsuta & aspera; foliis *Anchusæ*, sed minoribus, longis, quorum prima latiuscula, oblongo angustoque pediculo sensim in latum extensa, in extremo acuta & *Globulariæ* formâ, quò magis à radice recedunt, angustiora fiunt & acutiora. Cauliculi alternis vestiuntur foliis, teretes, rotundi, densè villosi, incani & humifusi, ferentes capita squamosa, densis pilis longiusculis, crispis, rufis, è squamarum oris & mucrone confestim enatis comosa. Flosculi verò purpurei sunt. Vix ad duas uncias surgit semipalmaris tamen planta fusis in gyrum ternis aut quaternis furculis. Hispaniæ indigena est.

939. *Jacea minor*, purpurea, parvis & integris foliis *Barr. Icon. 139*.

940. *Jacea capitata*, *Rorismarini folio H. R. Monsp.* *Chamæ chrysocome* prælongis purpurascentibusque *Jaceæ* capitulis *Barr. Icon. 406*. *Stachadi citrinæ* affinis, capitulis longioribus *I. B. 3. 156. Raii. Hist. 326. & 283*. Circa *Monspelim* & supra *Massiliam* in monte dicto *Notre-Dame de la Garde* crescit.

941. *Jacea Stachadis folio*, flore luteo *Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 65*. *Stæbe Stachadis folio*, flore luteo *Barr. Icon. 315*.

942. *Jacea minor*, *Stachadis citrinæ folio Barr. Icon. 141*. Caulis huic sesquipedalis, striatus, angulosus, & in plures ramos ab ipsâ radice divisus, incanâ lanugine pubentes, crebrisque foliis vestitos angustis, oblongis, capillaribus, fescunciam longis, unâ aut alterâ brevi laciniâ dentatis. Capita ejus oblonga brevibus spinis innocuis ferè armata, & flosculis insignita luteis.

943. *Jacea minima*, tenuifolia, erecta, Hispanica *Barr. Icon. 161*. Annua est planta tenui, rectâ fuscâque è radice caulem unicum, rectum, vix triunciale, nec Icone majorem, tenuibus & usque ad medium nervum tenuiter incisus foliolis densè instructum & ramosum, cujus summo insident capita oblonga, squamata, squamis laxis, parvis, acutis, paleaceis & per extrema purpurascentibus. Desfloruerat, cum occurrit, nec semen maturuerat. Inter saxa erumpens pusilla est, in collibus verò & pinguiori solo altior & amplior fit in Hispaniâ.

944. *Jacea pumila*; tenuifolia, supina, capite brevi non spinoso *Barr. Icon.*

Icon. 182. Folia ejus in profundas tres lacinias incisa & divisa, vix uncia longiora sunt, fortè ob petrosi soli in quo creverat, siccitatem. Cauliculi supini sunt & fescunciales quibus alterna hærent folia, & in summo insidet caput squamosum, breve & satis amplum pro plantæ magnitudine, evanido flore in pappum sericeum non deciduum sese explicans. Amari est saporis.

945. *Jacea pumila*, incana, cespitosa, latiusculis foliis *Barr. Icon. 177.* Radicem habet prælongam, pro ratione plantæ quæ vix fescuncia altior, palmarem, teretem, è rufo subnigricantem, raris brevibusque fibris capillatam, in tria aut quatuor capita divisam, à quibus capitibus conferta & densè congesta erumpunt folia humi sparsa, fescuncia vix longiora & sextante uncia latiora, in duas, tres pluresve lacinias ad nervum usque dissecta. Ex eorum medio cauliculi erumpunt foliis plurimis vestiti, unciales, nec ipsis foliis altiores & sustinent capita parva, oblonga, squamata, nonnihil spinosa, purpureis decorata flosculis. Tota planta tenui canescit lanugine, nec Icone major.

946. *Jacea pumila*, incana, cespitosa, tenuifolia *Barr. Icon. 178.* Radix hujus ut in superiori, non tamen adeò fusca, nec cespitosa. Folia fescuncialia ferè sunt & in longiores, tenuiores & quasi capillaceas lacinias sunt dissecta. Cauliculi incani, biunciales, quandoque majores brevioribus & raris vestiuntur foliis. Caput oblongum & superiori simile. Tota planta amarescit.

947. *Jacea tenuifolia*, purpurea, Hispanica *Barr. Icon. 140.*

948. *Jacea annua*, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore *Inst. R. Herb. 444.* *Chondrilla purpurea*, tenuifolia, capite *Jaceæ*, semine *Cardui* *Barr. Icon. 1136.* *Senecio Carduus Apulus* *Col. part. 1. 34. Raii Hist. 331.* *Icon. Barr. Ex Fab. col. l. c.*

949. *Jacea montana*, incana, odora *C. B. Pin. 272.* *Stæbe montana*, glabra, flore albicante *Barr. Icon. 318.* *Jacea montana*, Narbonensis *I. B. 3. 32. Raii Hist. 329.* Perennis est Planta quam à fissuris rupium montis *Redon* propè *Massiliam* erumpentem vidimus, *Stæbe Salmaticensi* similem, glabram, viscosam & odoram.

950. *Jacea montana*, Hispanica; tenuifolia, villosa. *Stæbe montana*, tenuifolia, villosa, Hispanica *Barr. Icon. 317.* Folia ejus in angustissimas, tennes, obtusas modò, modò acutas lacinias alternatim sunt divisa, mollia tamen & surrecta. Flores non vidit. Tota planta villis hispida colore cineritio perfunditur.

951. *Jacea Cretica*, laciniata, argentea, flore parvo flavescente *Cor. Inst. R. Herb. 32.* *Jacobæa Cretica*, argentea, foliis incisis, seu *Argentea* *Prosperi Alpini* *Barr. Icon. 218.* *Argentea Prosp. Alp. Exot. 117.* *Icon. Barr. ex Alpino l. c.*

952. *Jacea Cretica*, argentea, tenuifolia, flore parvo. *Stæbe tenuifolia*, incana, parvo capite, *Cretica* *Barr. Icon. 347.* Ex Promontorio *Capo Spada* sicca ad *Barrelierum* missa floribus erat destituta, vel jam abierant flosculi, remanebant tantùm capita parva, squamosa, è gilvo pallescentia. Folia tenuissimè erant divisa, & incana ut & caulis. Superiorem congener si non eadem, quantum ex Icone conjicere possumus. Capita namque hujus ejusdem sunt formæ ac superioris quam in Horto Regio habuimus missam à *D. Turnefortio* dum peregrinaretur per *Insulas Orientales*.

953. *Jacea montana*, incana, subrotundis foliorum lobis, capite magno. *Stæbe montana*, nivea, capite *Cardui*, subrotundis foliorum lobis *Barr. Icon. 309.*

954. *Jacea montana*, incana, acutis foliorum lobis capite magno purpureo. *Stæbe montana*, incana, moschata, acutis foliorum lobis, *Acanaceo*, purpureo flore *Barr. Icon. 310.* *Stæbe incana*, acutis foliorum lobis, *Cardui* tomentosi capitulo *Bocc. Mus. part. 2. 168. Tab. 119.* Hujus & superioris descriptionem non invenio.

955. *Jacea cinerea*, laciniata, flore purpureo *Triumf. 72.* Stæbe tenuifolia, incana, magno capite, Italica *Barr. Icon. 348.* *Jacea montana*, candidissima, Stæbes foliis *C. B. Pin. 272. Rait Hist. 329.* Ex fissuris scopulorum & murorum Arcis Terracinenfis, Caietæ, Neapolim versus prorumpit nivea tota & utrinque lanugine pubescens.

956. *Jacea tenuifolia*, erectior, Hispanica. Stæbe tenuifolia, erectior Hispanica *Barr. Icon. 359.* Nec hujus nec sequentium descriptionem invenio.

957. *Jacea minor*, laxioribus & longioribus capitis squamis. Stæbe minor, laxioribus & longioribus capitis squamis *Bar. Icon. 360.*

958. *Jacea rubra* foliis Intybaceis, capite μελανοσίτω *Barr. Icon. 1229.*

959. *Jacea Hispanica*, latifolia, nervis foliorum lanuginosis *Barr. Icon. 137.* & *Bocc. Mus. part. 2. 64. Tab. 54.*

960. *Jacea purpurea*, Intybacea, breviori folio *Barr. Icon. 390.*

961. *Jacea Hispanica*, humilior, angustifolia, Arctii facie. Arctium montanum, angustifolium, Hispanicum *Barr. Icon. 1193.* & *Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 69.* Folia ejus oblonga sunt, angusta, in ambitu sinuosa, crassa, tomentosa, incana, texturæ *Verbasci albi*, sed candidiori & densiori lanugine contexta, acuta, tres uncias longa, vix mediâ unciâ latiora, utrinque canescentia, prima humi fusa, alia verò se erigentia; ex quorum medio brevi caule innixum foliisque paucis amplexicaulibus vestito caput se exerit squamatum, incanum; sed nondum perfectum erat, cùm occurrit.

962. *Jacea incana*, Chamæleonis capitulo *Bocc. Mus. part. 2. Tab. 109.* *Jacea supina*, Carlinæ capitulo, acaulos, tota incana. *Ejusd. Mus. part. 2. 146.* Arctium montanum, minus, incano Taraxaci folio *Barr. Icon. 386.* Ex radice nigrâ, oblongâ & perenni folia emittit *Taraxaci* instar incisa, sed longè minora, infernè argenteâ lanugine candida, supernè viridiora & cinerea, stellatim & in orbem humi fusa & expansa, quorum prima, ima scilicet, in latiores dividuntur lacinias, superiora verò in tenuiores. Interdum omnia folia latiuscula sunt, modò tenuius incisa, nunc supina, modò verò arrecta, ut videre est in Icone. Ex foliorum medio incanum pilosumque caput acaulon densis confertisque squamis rigidis, oblongis & nonnihil spinosis erectisque munitum delitescit vix sese exerens. Florem nondum ediderat cùm observavi.



963. *Cyanus montanus*, medius, caule folioso seu multifolius *Barr. Icon. 389.* *Cyanus montanus*, caule folioso, capitulo oblongo *Bocc. Mus. part. 2. 20. Tab. 2.* Ex radice cespitosâ, crassâ & fibris tenuibus, octo vel novem, teretibus, longis, gilvis & subfuscis folia erumpunt oblonga, angusta, ad oras per intervalla dentata & sinuosa, mollia, subcinerea, levique lanugine hispida, in caule nullo pediculo adnata, sed amplexicauli & latâ basi confertim hærentia vix trientem uncix lata, tres uncias longa; Caules teretes, angulosi, complures & surrecti, densis foliis & juxta caulem erectis alternisque ac velut imbricatim positos vestiti. Flos in summo singularis, Cyani planè, sed major, purpurascens, quandoque cæruleus, Mellini & grati odoris. Junio & Julio mensibus florebat in monte *Morone* Aprutii quatuor ab urbe *Sulmone* milliaribus ad Septentrionem.

964. *Cyanus montanus*, angustifolius, purpureus *Barr. Icon. 1323.* *Le Bluet ou l'Aubifoin des montagnes, à feuilles étroites.* Folia ex radice perenni & fibrosâ emittit angusta, oblonga, integra, incano pubentia tomento, medio nervo albicante obscurisque & transversis venis paucis exarata, sed in caule sinuosa fiunt & in aliquot breves lobos dividuntur. Flores porrò solitarii extremos ramos occupant, purpurei, interdum cærulei, sed *Arvensi Cyano* majores. In Montibus Apenninis, in Etrusiâ, Umbriâ, Latio & Aprutio observavit *Barr.*

965. Cyanus Erucae folio, flore rubro. Stæbe Erucae folio, rubro Cyani flore, Italica Barr. Icon. 504. Jacea Cyanoides altera, alato Caule H. R. Par. & Par. Bat. 189. Annua est planta Junio florens, & satis obvia Romæ & in Campaniâ Romanâ, præsertim in viâ quæ ab Æde Divi Pancratii ad vineas & agros superioresque segetes ducit.



966. Cirsium Acanthii Illyrici folio, purpureum Barr. Icon. 1117. Cirsium maculis argenteis notatum Inst. R. Herb. 448. Longâ, tenui, & circum fibris capillatâ, fulvâ, annuâ & bienni potitur radice, è quâ caulis surgit rectus, firmus, quandoque bicubitalis, sed ut plurimum pedalis & bipedalis, striatus, alatus spinisque hispidus, quem folia vestiunt alterna, Acanthii Illyrici ferè formâ, semipalmum longa, unciam & ampliùs lata, sinuosa & per oras rotundè incisa, longioribusque & brevioribus spinis armata, in caule verò altiora, minora & breviora. Extrema caulium ramorumque foliis nuda sustinent nutantem purpureumque florem. Capitis & seminis magnitudo seorsim in tabulâ exprimitur. Romæ in novalibus agrisque quiescentibus viâ Prænestinâ occurrit, & alibi in Campaniâ Romanâ. Nos Monspelli vidimus in vineis supra la Colombiere foliaque lacteis maculis erant conspersa. Illudque nomine Cardui Cirsium dicti folio laciniato nigrioris I. B. 3. 43. indigitat Magnol. Bot. Monsp.

967. Cirsium acaulos, flore purpureo Inst. R. Herb. 448. Carlina montana, minor, acaulos Barr. Icon. 493. Carlina minor, purpureo flore Clus. Hist. cluj. Raii Hist. 310. E montibus Apenninis Amatricensium in Aprutio, è monte Cardito propè locum dictum il pozzo grande habuit Barr. sed ejus caput nondum erat apertum.



968. Centaurium majus, purpureum, foliis Cynaræ, Pyrenæum Barr. Icon. 513. Centaurium foliis Cinaræ Corn. 72. La grande Centaurée des Pyrénées. Icon. Barr. ex Corn. l. c.

969. Centaurium majus, luteum, Alpinum Barr. Icon. 514. C. B. Pin. 117. Prodr. 56. & Raii Hist. 330. Centaurium majus, luteum Corn. 70. Grande Centaurée des Alpes. Icon. Barr. ex Corn. l. c.

970. Centaurium majus, incanum, humile, capite Pini Inst. R. Herb. 449. Stæbe Pineæ, amplo capite Barr. Icon. 138. Jacea montana, incana, capite Pini C. B. Pin. 272. Raii Hist. 329. I. B. 3. 30.



971. Cnicus Hispanicus, cæruleus, incisus foliis. Attractylis cærulea, incisus foliis Barr. Icon. 595.

972. Cnicus cæruleus, humilis, Montis Lupi H. L. Bat. Carduncellus purpureus, tenuifolius, singulari flore Barr. Icon. 345. Carduncellus Montis Lupi Lob. Icon. 20. I. B. 3. 92. In Hispaniâ & in monte Divi Lupi propè Monspe-
lium observavit Barr.



973. Elichrysum seu Stæchas Citrina, Rorismarini foliis. Chrysocome major, Rorismarini folio Barr. Icon. 278. Sex, septem interdum ampliùs uno è cespite emittit caules rectos, pedales, rotundos, incanâ lanugine albicantes & hispidos. Folia illi oblonga, angustiora quàm Rorismarini, latiora quàm Stæchadis Citrinæ vulgaris, longiora & duriora, circa caulem arrecta & acclivia, levi lanugine ex albo virentia & pubentia, in caule minùs hirsuta & incana, latiora, vix lineam tamen lata, duas ferè uncias longa, alterno situ & per gy-
rum

rum caulem ambientia, sensimque breviora & minùs frequentia, quò altius surgunt. Extremis caulibus insident flores densè & in corymbum conglobati, antequam explicentur, turbinati, compressi & paleacei; dein *Stachadis Citrinae* formâ & colore. Sapore acri & linguam vellicanti potitur. Juxta Valentiam in Hispaniâ, in Montibus qui urbem & Carthusiam à Portâ Cœli interjacent, & in Toleti viciniâ cum sequenti occurrebat.

974. Elichrysum seu *Stachas citrina*, angustifolia *C. B. Pin. 264. Raii Hist. 281.* Chrysocome media, seu *Stachas citrina*, vulgaris *Barr. Icon. 409. L'Immortelle, ou Stachas citrin ordinaire.* A superiore discrepat foliis brevioribus & tenuioribus.

975. Elichrysum seu *Stachas citrina*, minor. Chrysocome seu *Stachas citrina*, minor *Barr. Icon. 410.* Ex radice lignosâ fruticat emittitque cauliculos medio palmo vix altiores, lignosos, rotundos, tenues, incanâ lanugine pubentes, parvis, brevibus, angustis & contortis foliis semunciâ vix longioribus, in summo rarioribus & paulò minoribus vestitos, quorum fastigia multis floribus turbinatis comantur, qui crassiores, latiùs panduntur quàm in superioribus.

976. Elichrysum umbellatum, maritimum, Hispanicum *Inst. R. Herb. 452.* Chrysocome marina, umbellata *Barr. Icon. 1125.*

977. Elichrysum sylvestre, angustifolium, capitulis conglobatis *C. B. Pin. 264. Raii Hist. 283.* *Stachas citrina*, spuria, longioribus foliis *Barr. Icon. 368.*

978. Elichrysum sylvestre, angustifolium, raris & fuscis capitulis. Chrysocome muralis, paucioribus, congestis fuscisque capitellis *Barr. Icon. 277.* In tractu maritimo ad muros Barcinonæ & inter rudera, & saxosa Regni Valentini occurrebat *Barr.* Capita erant è luteo rufescentia.

979. Elichrysum angustifolium capitulo fusco & minori. Chrysocome mollior, singulari minorique capitello *Barr. Icon. 407.* Superiori congener, sed capitulis donatur minoribus singularibus rarius binis. Caules primùm supini dein erecti & rotundi tenui canescunt lanugine, tenuioribusque instruuntur foliis.

980. Elichrysum sylvestre, latifolium, flore parvo, singulari *Inst. R. Herb. 452.* Chrysocome latifolia, minima, singulari flore *Barr. Icon. 425.* Elichryso sylvestri, flore oblongo similis *C. B. Pin. 265. Raii Hist. 282.*

981. Elichrysum sylvestre, latifolium, flore magno, singulari *Inst. R. Herb. 452.* Chrysocome latifolia, major, singulari flore *Barr. Icon. 426.* Heliochrysum saxatile *Bocc. Mus. part. 2. 142. Tab. 104.* A superiori discrepat foliis multò longioribus.

982. Elichrysum Hispanicum, maximum *Barr. Icon. 225.* Nec hujus nec sequentium descriptionem invenio.

983. Elichrysum trifidis foliis, Hispanicum, majus *Barr. Icon. 189.* Elichrysum Siculum, trifidis foliis asperiusculis *Bocc. Mus. part. 2. 43. Tab. 37.*

984. Elichrysum trifidis foliis, Hispanicum, minus *Barr. Icon. 190. Bocc. Mus. part. 1. Tab. 8. fig. 4.*

985. Elichrysum sylvestre, latifolium, capitulis conglobatis *C. B. Pin. 264. Raii Hist. 284.* Chrysocome citrina, supina, latifolia, Italica *Barr. Icon. 367.*

986. Elichrysum Orientale *C. B. Pin. 264. Raii Hist. 280.* Gnaphalium majus, flore citrino, amplo *Barr. Icon. 73.*

987. Elichrysum Creticum *C. B. Pin. 264.* *Stachas citrina*, globoso & amplo flore, Cretica *Barr. Icon. 814.* E Cretâ delata est sicca planta tota incana & tomentosa, cujus folia crassa, villosa & angustiora sunt quàm in figurâ. Flores & capitula aureo nitore splendebant.

988. Elichrysum latifolium, album, repente radice. Gnaphalium majus, album, repente & cespitosâ radice *Barr. Icon. 74.*

989. Elichrysum Syriacum, flore purpureo. Gnaphalium Syriacum, flore purpureo *Barr. Icon. 34.* Picturam hujus communicabat Eques Corvinus.



990. Filago seu Impia Hispanica, major. Gnaphalium vulgare, majus, flore citrino, amplo, Hispanicum *Barr. Icon. 33.* E tenui fibrosâque radice folia humi fundit unciam & amplius longa, angusta, in extremo nonnihil latiora, obtusa & subrotunda, ut altius in caule surgunt angustiora, acutiora & alterna. In summo, qui ut folia, totus lanugine canescit, eminet globus minor florum citrinorum simul collectorum; è cujus basi alii sursum eriguntur cauliculi terni aut quaterni, in summo pariter florum globos sustinentes. Ab *Impia Dod. Pempt. 66.* differre videtur foliis majoribus, floribus amplioribus & citrinis, tum etiam hirsutiae foliorum & caulis. Aridis incultis quiescentibusque Hispaniæ agris gaudet.

991. Filago maritima, capite folioso *Inst. R. Herb. 454.* Gnaphalium roseum 1. C. Bauhini *Barr. Icon. 127. n. iv. C. B. Pin. 263. Prodr. 122.*

992. Filago maritima, capite folioso, in hortis culta *Inst. R. Herb. 454.* Gnaphalium roseum, hortense seu 11. latifolium C. Bauhini *Barr. Icon. 127. n. iv. C. B. Prodr. 122.* Utraque *Icon. Barr. Ex Bauhini Prodr. l. c.*

X 993. Filago capite folioso, acaulos, Hispanica. Gnaphalium roseum, acutioribus foliis, ἀχρὺς, Italicum & Hispanicum *Barr. Icon. 1147. n. i.* Supina, humilis sessilisque est plantula tota rosea multiplici serie & ordine foliorum sibi ipsi impositorum, in orbem humi explicatorum rosæ instar, ita ut folia exteriora interioribus longiora sint. Majora folia ferè unciam longa, lineam unam aut alteram lata, utraque sive breviora, sive majora, acuta sunt, incana, brevi pubentia tomento & complanata. E medio foliorum sex aut septem florum capita densè congesta, melino luteoque colore splendentia aut pallentia erumpunt. In incultis aridisque locis Castiliæ novæ, Toletani agri, necnon in Boeticæ confiniis juxta Montes Marianos, vulgò *Serra Morena*; tum etiam in Italiâ, præsertim in agro Romano juxta villam Mullianam, in collibus vicinis secundùm Tyberim provenit.

994. Filago capite folioso, hirsuta, caulescens. Gnaphalium roseum, supinum, caulescens *Barr. Icon. 127. n. iiii.* Hæc à superiori discrepat foliis longè minoribus, angustis, acutis, tenuioribus, mollioribus, cinereâ pubentibus lanugine & glaucâ. E tenui paucisque & exiguis fibris capillatâ radice aliquot humi fundit cauliculos tenues, qui sursum dein & ad fescunciæ altitudinem se erigentes parvisque foliis acutis, trientem uncie latis vixque semunciam longis vestiti, & ad summum in rosam latiusculam sese explicant, cujus umbilicum caput unicum stellatum occupat floribus instructum è luteo ferrugineis Aridis Castiliæ novæ delectatur.

995. Filago Alpina, capite folioso *Inst. R. Herb. 454.* Gnaphalium Leontopodium erectum & supinum *Barr. Icon. 127. 128. n. viij.* Gnaphalium Alpinum, magno flore, folio oblongo C. B. *Pin. 264. Raii Hist. 296.* Modo supina, sed frequentius erecta occurrit in Montibus editioribus supra Vapincum & vallis Barsilionensis. Flos ejus primùm candicans, qui adultior flavicans, & expansis flosculis staminibusque fusco atroque colore inficitur.

996. Filago Alpina, capite folioso, minor. Gnaphalium erectum, angustifolium, minus *Barr. Icon. 128. n. vj.* Radice nititur tenui, fibrosâ rufescente, stellam foliorum incanâ lanugine albertium statim in exortu explicans, è cujus medio cauliculus unicus, rectus surgit densis foliis parvis, angustis, obtusis, crassis, in summo caule ferè dodrantem uncie longis (cùm ima vix quadrantem uncie assequantur, mediamque lineam vix ultra non attingant) incanis & hispidis instruitur abique in rosam, cujus umbilicus floribus è luteo rufescentibus fæctus est. Videtur prioris varietas, neque enim à *Leontopodio Lob. Icon. 484.* multùm distat.

997. Filago Serpilli folio, supina minor. Gnaphalium roseum, supinum, Serpillifolium *Barr. Icon. 128. n. v.* Exilis est humilis supinaque plantula è radice crassiusculâ, fibrosâ & rufescente plures emittens cauliculos supinos, repandos, vixque unciâ altiùs se erigentes, foliis multis, oblongis, angustis, in extremo obtusis, densâ serie sine ordine imbricatim acclivibus, ex incano & cinereo tomento lanuginosis vestiti, quorum vertex in foliorum rosam se explicat, tenuesque flores subluteos, simul collectos, medio in umbilico erectos & nonnihil depressos sustinet. Ima folia vix Serpillo majora, quæ vero umbellæ seu Rosæ viciniora sunt, sensim fiunt longiora, angustiora.

998. Filago Serpilli folio, supina, minima. Gnaphalium bombycinum, Serpilli folio, minimum *Barr. Icon. 128. n. vij.* Radix illi tenuis, teres & rufescens, è quâ in orbem sparguntur plures tenuissimi ramusculi, simul & confestim nascentes, alternis rarisque foliolis Serpilli instructi, tenui alboque tomento totam plantam obducente, spatiaque folia inter & ramos remanentia opplente, quod pictor omisit, ut plantam distinctiùs adumbraret. Extremi cauliculi in rotundam luteolorum florum comam araneoso illo tomento obsitam desinunt. Tota planta vix Icone major.

999. Filago supina, capitulis rotundis, tomento obsitis. Leontopodium verius Dioscoridis, Hispanicum *Barr. Icon. 296.* Radicem habet longiusculam, fibrosam, rufescentem, è quâ cauliculi plurimi erumpunt supini, incanâ lanugine pubentes, foliis pariter tomentosis & incanâ obductis lanugine, alternisque vestiti, & in summo desinentes globosam in comam è multis floribus subluteis bombace & tomento ita factis, ut penitus occultentur. Comam hanc circumstant quoque folia aliquot flavicantia, adeò ut pedem Leonis suis unguibus luteis armatum diceret.

1000. Filago minima, supina, Hispanica, Gnaphalium minimum, supinum, Hispanicum *Barr. Icon. 295.* Descriptionem non invenio in scriptis *Barr.*



1001. Conyza major, Chrysocomes folio *Barr. Icon. 405.*

1002. Conyza minor, Chrysocomes folio *Barr. Icon. 408.* Utriusque descriptionem non reperio.

1003. Conyza Americanæ, Urticæ folio, flore albo *Inst. R. Herb. 455.* Cacalia Urticæ folio, flore albo *Barr. Icon. 358.* Valeriana Urticæ folio, flore albo *Corn. 20. & Raii Hist. 292.* Icon. *Barr. ex Corn. l. c.*



1004. Eupatorium folio oblongo, rugoso, caule purpurascente *Inst. R. Herb. 456.* Eupatoria foliis Enulæ, seu latifolia *Barr. Icon. 71.* Eupatoria foliis Enulæ *Corn. 191. & Raii Hist. 294.* Icon. & descriptio ex *Corn. Hist. l. c.*



1005. Absinthium pumilum, palmatum, crasso, tomentoso, pallescentoque folio *Barr. Icon. 481.*

1006. Absinthium pumilum, palmatum, minus, argenteo sericeoque folio, Hispanicum *Barr. Icon. 462. & Bocc. Mus. part. 2. 81. Tab. 71.*

1007. Absinthium minus, majoribus, altiùsque incisiss foliis cinereis, Hispanicum *Barr. Icon. 459. L'Absinthe d'Espagne à feuilles découpées fort menu.*

1008. Absinthium minus, tenuifolium, altè incisiss foliis, cinereum, salsum, Hispanicum *Barr. Icon. 460.*

1009. Absinthium incanum, lanuginosum, crispo, cristato folio, longiori pediculo, seu majus, acrius & amarius densiorique folio *Barr. Icon. 433.*

1010. Absinthium incanum, cristato, crispo tenuiorique folio, medium *Barr. Icon. 434.*

1011. Absinthium incanum, minus, tenuifolium, crispum, Hispanicum *Barr. Icon. 485.* Absinthium seriphium, Hispanicum, flore oblongo *Inst. R. Herb. 458.*

1012. Absinthium minus, oblongis dentatisque foliis cineritiis, Hispanicum *Barr. Icon. 461.* Descriptiones non invenio. Vires Absinthii vide in *Hist. Raii 366.*



1013. Abrotanum tenuifolium, incanum, minimum *Barr. Icon. 448.* & *Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 74.*

1014. Abrotanum mas, tenuifolium, latifolium, Hispanicum, *πολυσπερ- μον Barr. Icon. 447. L' Auroonne d'Espagne.*

1015. Abrotanum tenuifolium, majus, Hispanicum. *Arthemisia tenuifo- lia, major, Hispanica Barr. Icon. 540.*

1016. Abrotanum tenuifolium, medium, Hispanicum. *Arthemisia tenui- folia, media, Hispanica Barr. Icon. 589.*

1017. Abrotanum incanum, foliis Botryos ferratis. Botrys incana, ferra- tis foliis, Hispanica *Barr. Icon. 486.* Desunt descriptiones. Vires vide *Hist. Raii 371.*



1018. Santolina foliis teretibus *Inst. R. Herb. 460.* Abrotanum foemina, in- canum, Hispanicum *Barr. Icon. 463.* Abrotanum foemina, foliis teretibus *C. B. Pin. 136. Le Petit Cyprès, ou la Garde-Robe.*

1019. Santolina foliis Rorismarini, major *Inst. R. Herb. 461.* Abrotanum foemina, virens, vermiculato, serrato folio *Barr. Icon. 464.* & *Bocc. Mus. part. 1. Tab. viij. Fig. 3.* Abrotanum foemina, foliis Rorismarini, majus *C. B. Pin. 137.*

1020. Santolina foliis Ericæ vel Sabinæ *Inst. R. Herb. 460.* Abrotanum foe- mina, Hispanicum, tenuifolium, virens *Barr. Icon. 429.* Abrotanum foemina, foliis Ericæ vel Sabinæ *C. B. Pin. 137.*

1021. Santolina foliis minoribus, incanis. Abrotanum foemina, tenuifo- lium, incanum, Hispanicum *Barr. Icon. 430.*

1022. Santolina repens & canescens *Inst. R. Herb. 460.* Abrotanum foemi- na, tomentosum, crispum, incanum Hispanicum *Barr. Icon. 226.* & *Bocc. Mus. part. 2. 79. Tab. 70.* Abrotanum foemina, repens & canescens *C. B. Pin. 137.* Vires vide in *Hist. Raii 359.*



1023. Conyzoides flore flavescente, cernuo *Alt. Ac. Reg. Par. 86. ann. 1706.* Aster Cernuus Columnæ, flore citrino *Barr. Icon. 1142. Col. part. 1. 252.* & *Raii Hist. 338.*



1024. Bidens folio non dissecto *Cæsalp. 488.* Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum *Barr. Icon. 1209.* Cannabina aquatica, folio non diviso *C. B. Pin. 321. Raii Hist. 361.*

1025. Bidens cærulea, javana. Scabiosa cærulea, javana Bontii *Barr. Icon. 826. Bont. Hist. 158.* & *Raii Hist. 376.* Siccam habuimus ex Insulâ Masca- rinâ, vulgò l'Isle de Bourbon. Vires habet præstantissimas adversus marasimum & contabescientiam, ut refert Bontius l. c.



1026. Echinopus major *I. B. 3. 69.* & *Raii Hist. 383.* Carduus Sphæroce- phalus, latifolius, albus *Barr. Icon. 143.* Junio & Julio florentem vidit *Barr.*

in sylvosis circa Romam. Nos in Montibus propè Vapineum, secus fluvium *Drac*, & in valle Barfilionensi Augusto cum flore sæpiùs invenimus. In hortis quoquè familiaris.

1027. *Echinopus minor* *I. B. 3. 72. & Rati Hist. 383.* *Carduus Sphærocephalus*, latifolius, cæruleus, major *Barr. Icon. 412.* *Crocodilium Monf. peliensium Lugd. 1476.* *Carduus Sphærocephalus*, cæruleus, minor. *Barr. Icon. 411.* *Carduus Sphærocephalus*, minor, seu annuus, Boeticus, minor *Morissonii Bocc. Mus. part. 1. Tab. viij. Fig. 3.* Ritro floribus cæruleis *Lob. Icon. 8. Tom. 2. Adv. 369.* Ultima *Icon. Barr. deprompta ex Lobe-lio l. c.*

1028. *Echinopus tenuifolius*, violaceus *Inst. R. Herb. 463.* *Carduus Sphærocephalus*, tenuifolius, violaceus *Barr. Icon. 144.* *Echinopus minor*, annuus, magno capite *Inst. R. Herb. 463.* *Scabiosa Carduifolia*, annua *Par. Bat.* Annua est planta quam *Barr.* collegit circa Cordubam in Hispaniâ, quam etiam coluit Romæ in horto suo.

1029. *Echinopus cæruleus*, capite ferrugineo, major. *Carduus Sphærocephalus*, cæruleus, capite ferrugineo, major *Barr. Icon. 413.* E radice perenni, crassâ & divaricatâ, variisque nixâ fibris in caulem assurgit cubitalem, firmum, erectum, striatum mollique & albicante lanugine obductum, quem folia ambiunt rigidiora, quàm *Echinopi majoris*, licèt similia, supernè atrovirentia & splendentia, infernè incana, lata, nec profundè incisa, sed magis integra, sinuosa tamen spinisque munita, alterna, sensimque breviora & minora, quò altiùs surgunt. In Ramorum extremis capita globosa nascuntur *Echinopo minori* similia, minora tamen, primùm viridia, & subinde adultiora facta, è cæsis glaucoque colore & qui in ferro polito nitet, unde ferrugineus color, splendentia. E singulis enim calycibus acerosi flosculi cæsi emicant intermedio stylo cæruleo, qui flore jam adulto extremâ parte bifurcatur in duos velut uncus, obsoletumque in colorem quem pardum vocant, degenerat. In horto suo Romæ alebat *Barr.*

1030. *Echinopus cæruleus*, capite ferrugineo, minor. *Carduus Sphærocephalus*, cæruleus, capite ferrugineo, minor *Barr. Icon. 414.* *Pedalis & cubitalis* est planta, cujus radix perennis, & ab imo caule tria aut quatuor gerit folia prælonga & palmum æquantia, angusta, aculeata & velut in alas tenuiter, profundè & ferè usque ad medium folii nervum seu pediculum, qui supernè cavus & fulcatus est, divisa, humi procumbentia, supernè atrovirentia splendentia, infernè niveâ lanugine magis candida; quæ minora semper fiunt, integra & tenuiora, quò in caule altiora. Caulis vix striatus, nec ut prior albescit. Capita extremis hærent ramis, superioribus simillima, sed longè minora, vixque *Pruno minore Damasceno* majora, è cæsis glaucoque colore pariter splendentia. Flosculi è cæruleo violacei, stylo violaceo stipati. Tota planta rigidioribus & longioribus horret aculeis. Odor nullus floris, sapor totius plantæ non ingratus, salivam viridi colore inficit. Cæteris florebat tardiùs in horto *Barr.*; Romæ enim has quinque species alebat.



1031. *Scabiosa montana*, integro folio, Hispanica, major *Barr. Icon. 165.* *La Scabieuse d'Espagne à feuilles entieres.* Ex radice lignosâ, perenni, mersâ inter rupium scissuras, atque in plura capita cespitatim divisâ folia confertim prodeunt incanâ lanugine pubentia, integra, mollia, lævia, nulloque nervo extuberante exasperata, supernè minus albida, infernè magis canescentia, quatuor uncias longa, semunciam & ampliùs lata: ex quorum medio surgit caulis palmaris aut pedalis, incanus, lævis, lanuginosus, raris vestitus foliis semper binis & ex adverso nascentibus & minoribus quò magis ad caput accedunt. Caput nondum apertum erat. Folii habes magnitudinem in Icone.

1032. *Scabiosa montana*, integro, angustoque folio, Hispanica, minor *Barr.*

Barr. Icon. 166. Radix hujus magis scabra, nigricans, lignosa, digitum minorem circiter crassa, inter rupium fissuras altè etiam, palmum ferè demersa & in varia pariter & crassiora capita scissa, è quibus confertim erumpunt folia magis incana, lævia, integra, acuta, vix unciam longa, & trientem unciae lata. Caules nondum emiserat.

1033. Scabiosa montana, integro subrotundoque folio, Hispanica, minor *Barr. Icon. 163.* Folia huic latiora & subrotunda. Cauliculus vix biuncialis, crassus & erectus. Flos nondum perfectus erat, cùm occurrit.

1034. Scabiosa montana, integro folio subrotundoque, Hispanica, minima *Barr. Icon. 164.* E tenuiore, vix lineam crassâ, lignosâ scabrâ & nigricante radice quatuor aut quinque emittit foliola, incana, lanceolata, minora quàm in superioribus; inter quæ cauliculi duo, lignosi, fescunciales, incani & flexuosi prodeunt. Flos pariter nondum apertus. Totius plantæ magnitudinem habes in Icone. Has quatuor species observabat Barr. in deserto Murrhenfi sex circiter leucis ab urbe Valentia diffito inter rupium fissuras Montis vulgò dicti *La penna forada*, Occidentem versus.

1035. Scabiosa alba, fuccisæ folio, Polonica *Barr. Icon. 770. n. 1.*

1036. Scabiosa sulfurea, incisæ foliis, Polonica *Barr. Icon. 770. n. 11.* Scabiosa multifido folio, flore flavescente *C. B. Pin. 270. Raii Hist. 376. Clus. Hist. iij.*

1037. Scabiosa angustifolia, glabra *Barr. Icon. 246.* Radice nititur perenni, longâ & subnigricante, è quâ ab imo multa in orbem spargit erecta folia, angusta, & ad nervum usquè incisa, glabra, firma & lætè virentia. Caulis illi pariter firmus, erectus, rotundus; pilis brevibus hispidus, & per intervalla foliis vestitus binis ex adverso semper nascentibus, angustioribus & minoribus quàm inferiora. In vertice & extremis ramis nudis oblongisque insident flores globosi, albicantes & quales *Scabiosæ montanæ calidarum regionum Lobelii.* Aridis Hispaniæ collibus gaudet.

1038. Scabiosa maritima, Rutæ caninæ foliis *Barr. Icon. 245.* Hujus & sequentium descriptiones desunt.

1039. Scabiosa peregrina, integris & acutis foliis *Barr. Icon. 224.*

1040. Scabiosa peregrina, integris seu Bellidis foliis, altera *Barr. Icon. 223.* Scabiosæ vires vide in Hist. Raii 374.



1041. Dens Leonis foliis Erysimi vulgaris *Cor. Inst. R. Herb. 35.* Hieracium seu Taraxacum tenuifolium, saxatile, Italicum *Barr. Icon. 237.* Taraxacum saxatile *Bocc. Mus. part. 2. 147. Tab. 106. La Dent de Lion à fenilles du Velar.*



1042. Hieracium purpureum, integris foliis, montanum *Barr. Icon. 210.*

1043. Hieracium purpureum, incisæ foliis, montanum *Barr. Icon. 209.*

1044. Hieracium incanum, tomentosum, integro folio *Barr. Icon. 238.* & *Bocc. Mus. part. 2. 147. Tab. 106.*

1045. Hieracium murorum, folio minùs piloso, non maculato *H. R. Par. Pulmonaria Gallorum rotundifolia, lævior Barr. Icon. 342.*



1046. Lactucâ sylvestris costâ spinosâ *C. B. Pin. 123. Raii Hist. 222.* Endivia major, Lactucina spinosa *Barr. Icon. 135. La Laitue ou Endive sauvage, épineuse.*

1047. Lactuca sylvestris, angusto laciniato folio *Bot. Monsp. App.* Endivia minor, Lactucina spinosa *Barr. Icon. 136.* Lactuca sylvestris altera, angustiore folio *H. R. Par.*



1048. *Sonchus maritimus*, angustifolius, asper *Barr. Icon.* 341. *Sonchus angustifolius*, maritimus *C. B. Pin.* 124. *Prodr.* 61. & *Raii Hist.* 226. *Le Laitron* qui croit au bord de la mer.



1049. *Scorzonera laciniatis foliis* *Inst. R. Herb.* 477. *Tragopogon Resedæ minoris folio*, erectum *Barr. Icon.* 799. Pumila est planta cujus radix satis crassa, ex quâ numerosa satis, supina primum, dein extremâ parte se erigunt folia erumpunt, *Resedæ minoris* modo inæqualiter nulloque ordine dissecta, biuncialia, ad radicem latiuscula, in caule rara, brevissima, acuta integraque ut plurimum, & latiore basi caulem amplexantia. Flos pro magnitudine plantæ magnus, luteus, semine maturo in amplam sphaeram tumescens. Tota planta vix iconè major, Maio florebat.

1050. *Scorzonera laciniatis foliis*, supina. *Tragopogon Resedæ minoris folio*, supinum *Barr. Icon.* 800. Folia huic breviora, minora, tenuius laciniata. Calyx quoque floris brevior, & caput semenque minora quàm præcedentis. Utraque circa Cordubam in Hispaniâ observavit *Barr.* *Scorzonera* vires vide in *Hist. Raii* 248.



1051. *Tragopogon Pinifolium*, Hispanicum *Barr. Icon.* 496. Radicem habet fugacem & tenuem, è cujus capite plurima confestim prodeunt folia erecta; qualia *Croci* seu potius *Pini*, tenuia tamen & in extremo subtilia. Caulis ex eorum medio surgit iisdem foliis, sed brevioribus, alterno densoque situ cinctus, rectus, semipalmaris, quandoque triuncialis. Flos in vertice unicus infidet luteus, grandis & satis amplus, ut è calyce superstitè videatur. Circa Cordubam provenit.

1052. *Tragopogon montanum*, angustifolium, flore ferrugineo, Italicum *Barr. Icon.* 811. Graminis donatur foliis quinque aut sex è radice tenui erumpentibus, minoribus & paucis in caule humili & vix dodrantali. Flos è luteo & rubro mixtus seu ferrugineus, calyce tenui & oblongo comprehensus. In ascensu ad Montem Neronis juxta Callium in Umbriæ confinibus sub finem Maii florebat.

1053. *Tragopogon montanum*, flore atropurpureo, Italicum *Barr. Icon.* 812. Vires vide *Hist. Raii* 252.



1054. *Catanance quorumdam* *Lugd.* 1190. *Chondrylla Cyanoides*, cærulea, *Coronopi folio* *Barr. Icon.* 1134. *Raii Hist.* 257.

1055. *Catanance flore luteo*, latiore & angustiore folio *Inst. R. Herb.* 478. *Chondrilla Cyanoides*, lutea, *Coronopi folio* non diviso *Barr. Icon.* 1135. & *Booc. Mus. part. 2.* 21. *Tab.* 7. *Stæbe Plantaginis folio* *P. Alp. Exot.* 286. Juxta Cordubam trans fluvium *Quadalquivir* ad primum milliare in agris reperitur.



1056. *Cichorium spinosum Imperati* *Barr. Icon.* 1159. *Imp.* 667. *C. B. Prodr.* 126. *Raii Hist.* 255. *La Chicorée Epineuse.* *Icon. Barr.* ex *Imp.* l. c.



1057. *After palustris*, luteus, folio longiori, lanuginoso *Inst. R. Herb.* 483. *Conyza montana*, incana, villosa, folio acuto, flore aureo non singulari *Barr. Icon.* 362. *Britannica vera Dalechampii* *Lugd.* 1082. Radice Gramineâ sub terram

ram repente & se latè propagante folia fert longa, angusta, acuta, villosa, medium palmum circiter longa: Caules pedales, recti, ramosi, in quorum summo flos eminet amplius, radiatus & luteus. In pratis ad confluentem Tyberis & Albulæ positus, supra fontem Aquæ Acetosæ qui à Ponte Milvio sursum versus ad dextram illius ripam mille passibus distat, frequens est necnon Parisiis ad Sequanæ ripam in pratis non longè ab oppido Villanovâ Divi Georgii.

1058. Aster montanus, Bellidis folio, croceo flore. Conyza montana, Bellidis folio, croceo flore singulari, Italica *Barr. Icon. 361*. Radix hujus fusca, crassa, longiuscula, perennis, & multis fibris tenuibus à latere capillata. Folia eadem quæ ejus *Bellidis medicæ*, humifusa, per oras leviter crenata. Cauliculus vulgò semipalmaris, quandòque major, molli incanâque lanugine pubescens, non ramosus, foliis vestitus longis, angustis, acutis, lanceolatis, alternis, in summo semper minoribus. Flos in summo caulis unicus eminet, radiatus, croceus, crasso virentique comprehensus calyce. Semen longum, angustum, fulvo fuscum, è ciliaribus pilis comosum, quibus in pappos solutis evolat, seque ipsum humi cadens pondere suo & acumine, papporum alis se erigentibus, terræ infigit & implantat in spem novæ prolis. Hic papporum usus in omnibus papposis seminibus idem observatur. Tota planta humilis & villosa est, tenui pubens lanugine.

1059. Aster Verbasci folio *H. R. Par. Jacobæa Cretica*, incana, integro Limonii folio *Barr. Icon. 217*. Aster tomentosus, luteus, Verbasci folio *Bocc. Rar. Plant. 60*. E scopulis Promontorii *Capo spada* allata.

1060. Aster luteus, radice odorâ *C. B. Pin. 266*. Baccharis minor, Italica flore Asteris luteo *Barr. Icon. 1145*. Asteris species, an Baccharis *Col. part. 1. 253*.

1061. Aster Conyzoides, luteus, Pilosellæ foliis, Hispanicus *Barr. Icon. 1208*. Ex radice mediocriter crassâ, nigricante folia septem aut octo emit tit *Pilosellæ vulgaris* formâ, sericea longâque lanugine ut & tota planta canescentia. Caulis semipalmaris tribus aut quatuor foliis minoribus vestitus, in cujus summo insidet flos singularis, luteo pallidus, radiatus, calyce villosa & sericeâ canitie vestito comprehensus. Aridis & saxosis Hispaniæ collibus delectatur.

1062. Aster maritimus, tuberosus, luteus *Inst. R. Herb. 483*. Conyza marina, tuberosa *Barr. Icon. 157*. & *Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 68*. Conyza marina *Lugd. 1366. I. B. 2. 1055*. & *Raii Hist. 264*. In deserto Murthenfi Regni Valentini observavit *Barr.* In sylvâ Valenâ Monspelii quoque provenit.

1063. Aster saxatilis, foliis glutinosis, villosis & graveolentibus *Inst. R. Herb. 483*. Conyza montana, saxatilis, Hyssopi folio villosa & glutinosa, Hispanica *Barr. Icon. 158*. Conyza montana, foliis glutinosis, pilosis *C. B. 265. Raii Hist. 265*. Perennis est planta è rupium scissuris erumpens villosa, viscosa & graveolens, cujus flores sunt radiati, lutei & ad croceum vergentes qui etiam in pappos abeunt. Totius plantæ magnitudinem habes in Icone. In montibus Regni Valentini & Deserti Carthusiæ à Portâ Cœli, necnon circa locum *Vatganga de Baranquel* dictum viget. In montibus Galloprovinciæ, vulgò Divæ Magdaleniæ dictis, & propè Massiliam in Monte *Redon*. Provenit necnon in Monte Serrato in Catalauniâ.

1064. Aster Conyzoides, angustissimo Linariæ folio, Hispanicus *Barr. Icon. 605*. & *Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 67*. Folia huic glabra & obscurè virentia, angustissima & ferè capillacea. Flos *Asteris Tripolii flore*, sed minor. Perennis est planta cujus radix fibrosa. Florebat Julio & Augusto in deserto Murthenfi Regni Valentini.

1065. Aster angustifolius, Tripolii flore *Barr. Icon. 606*. Aster latifolius, Tripolii flore *H. R. Par.*

1066. Aster palustris, fruticosus, minor, Italicus, luteus. Conyza minor, fruticans,

fruticans, viridi Stachadis Citrinæ folio, flore folioso, luteo, Italica Barr. Icon. 369. Caulem subrigit lignosum, ramosum, rotundum, glabrum, parvis, longis, angustisque folis Stachadis Citrinæ minoribus, villosis, viscosis, virentibus, firmis, obtusè acutis & alternis cinctum. Flores fert in extremis ramis luteos radiatos qui maturo semine exiguo, oblongo & fusco, in pappos diffluunt. Porro furculorum rami minoribus vixque Thymo majoribus vestiuntur foliis. Tota planta acris, mordax, sapore unctoso, gravique odore prædita. In humidis locis nascitur propè Centumcellas, vulgò Civita Vecchia.

1067. Aster palustris, fruticosus, minimus, Hispanicus. Conyza palustris, minima, Hispanica Barr. Icon. 1175. Parva est planta, sed furculosa, fruticosa & ramosa, cujus folia breviora quàm superioris, vix semuncialia, interdum Thymo non longiora, nec latiora, acuta & mucronata. Flores ejus lutei sunt aurei, radiati, qui sub maturitatem in pappos abeunt. In Alveo sicco Rivi dicti Xeradama juxta Pontem Madriti, dum ex Horto Regio redditur.

1068. Aster ramosus, annuus, Canadensis Mor. H. R. Bles. Bellis ramosa, umbellifera, Canadensis Barr. Icon. 388. Corn. 194. Raii Hist. 270. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.



1069. Virga aurea, montana, minor Barr. Icon. 783. Bocc. Mus. part. 2. 169. Tab. 118. Petite Verge dorée des montagnes.

1070. Virga aurea Canadensis, altissima, folio subtus incano Inst. R. Herb. 485. Solidago maxima, Americana Barr. Icon. 201. Corn. 169. & Raii Hist. 279. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.

1071. Virga aurea angustifolia, cespitosa, exotica Barr. Icon. 784. Virga aurea ferratis foliis, Americana, hirsuta Bocc. Mus. part. 1. Tab. vij. Fig. 3. Virga aurea angustifolia, paniculâ speciosâ, Canadensis H. R. Par.

1072. Virga aurea minor, foliis glutinosis & graveolentibus Inst. R. Herb. 484. Conyza minor, vera Lobelii, lutea Barr. Icon. 370. Lob. Icon. 346. Raii Hist. 261.

1073. Virga aurea Virginiana, annua Zan. 205. Hist. Plant. circa Paris. nascent. 173. Conyza minor, unicaulis, annua, pallido flore Barr. Icon. 1164. Conyza alba, acris, annua Mor. H. R. Bles. & Raii Hist. 271.

1074. Virga aurea patula, foliis auritis, floribus dilutè purpurascens Inst. R. Herb. 484. Aster autumnalis, latifolius, parvo, purpureo, medio luteo flore Barr. Icon. 526. Asteriscus latifolius, autumnalis Corn. 64. Raii Hist. 269. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c. Virgæ aureæ vires vide Hist. Raii 278.



1075. Jacobæa incana, repens Barr. Icon. 153. Jacobæa Senecionis folio, incano, perennis Raii Hist. 285. La Jacobée vivace. Radici hæret albæ, repentî Graminis instar, caulis singularis rectus, rotundus, nonnihil striatus & angulosus, cavus & spongiosus, villosus, alternis foliis Jacobææ marinæ ferè formâ, pariterque incisus, sed minùs incanis, licèt villosâ albenteque subtus pubescant lanugine, vestitus; cubitalis & major, qui tandem in vertice suo flores luteos gerit radiatos, Jacobææ vulgaris modo, majores tamen nonnihil quàm Jacobææ marinæ, atque laxiorem in umbellam compositos. Surculus verò quot annis marcescit, radice vivâ & serpente. A vulgari Jacobæâ distinguitur floribus majoribus, radice repente, & foliis incanis. Florebat Septembri in Marcâ Anconitanâ, juxta Syroli oppidum, secus rivulum in mare descendentem; necnon Romæ juxta Pontem Milvium versus fontem Aquæ Acetosæ, & aliis passim Italiæ locis. Circa Parisios quoque provenit.

1076. *Jacobæa major*, *Arthemisia folio*, incana, latifolia, non repens *Barr. Icon. 267*. *Jacobæa vulgaris*, laciniata *C. B. Pin. 131*. & *Raii Hist. 284*. *La Jacobée ordinaire*.

1077. *Jacobæa minor*, *Abrotani folio* *Barr. Icon. 262. n. 11*. *Jacobæa Sicula*, *Chrysanthemi facie* *Bocc. Rar. Plant. 66*.

1078. *Jacobæa Alpina*, incana, minor, *Barr. Icon. 262. n. 1*. *Jacobæa Alpina*, *Abinthii folio*, humilior *Inst. R. Herb. 486*. *Chrysanthemum Alpinum*, *Judenbergense*, *Jacobææ affine* *I. B. 2. 1058*. & *Raii Hist. 341*. Flos ejus aureus & radiatus, maturo semine, in pappos abit. Inter saxorum rimas erumpit in editissimis Jugis Montium Delphinatus & Vallis Barfilionensis.

1079. *Jacobæa maritima*, minima, glabra, *Senecionis folio*, Italica *Barr. Icon. 261*. *Jacobæa maritima*, *Senecionis folio* crasso & lucido, *Massiliensis* *Inst. R. Herb. 486*. Radix huic fugax, tenuis, fibrosa ex quâ cauliculus erumpit modò unicus, modò multiplex, foliis lucidis, viridibus, crassis, glabris, succulentis, *Senecionis foliis* formâ & incisurâ similibus, vix fescunciam longis, lato & crasso nixis pediculo alternisque vestitus, succulentus, crassus, striatus, angulosus, subpurpureus, nunc repandus, nunc surrectus, vix semipalmo altior, & in summo flores quatuor aut quinque edens radiatos & luteos. Tota planta interdum vix Icone major. Post Æquinoctium Martii ad littus maris florebat in Italiâ. Nos Septembri florentem adhuc vidimus *Massiliæ* in fossis humidis circa muros urbis versus *Navium Valetudinarium*, vulgò *le Lazaret*.

1080. *Jacobæa montana*, *Senecionis folio*. *Senecio montanus*, amplo aureo flore. *Barr. Icon. 402*. Multos è radice quam non vidi, cauliculos emittit palmares, firmos, tortuosos, albicantes, striatos & intus cavos, foliis cinctos alternis, nonnihil villosis, *Senecionis formâ*, tenuius incis; Flores sex octove in summo fert in thyrsus velut congestos, luteos, quàm *Senecionis* ampliores, radiatos; semen oblongum est angustum, teres, subfuscum & pappis instructum. Ramus tantum depingitur. Tota planta odore nonnihil gravi prædita est, sapore verò subnitroso. In montibus asperioribus *Apenninorum* apud *Amatricenses* in *Aprutio* collegit *Barr.*

1081. *Jacobæa montana*, *Senecionis pallido*, parvo flore. *Senecio montanus*, mollior, pallido parvo flore *Barr. Icon. 401*. Vulgari *Senecioni* similis facie suâ externâ, glabra, lætè virens; Folia tamen latiora, altiùs divisa mollioraque ut tota planta, quæ *Senecione* longè est tenerior. Caulis glaber, striatus. Flores plures in summo cauliculorum congeruntur pallidi, semiflocculis è calyce angusto & parvo vix se exerentibus. Tota planta fœtida & saporis nitrosi ac ingrati. Occurrit *Barr.* in Montibus *Apenninis*.

1082. *Jacobæa Linifolia*, Italica *Barr. Icon. 268*. Ex radice multiplici, crassiusculâ, lignosâ fibrisque altè demissis capillatâ & perenni cauliculos multos emittit rectos, striatos, virides & lanugine quâdam tenui pubentes, foliis cinctos Lini, sed crassioribus, carnosioribus, angustis, tres quandoque uncias longis, vix tertiâ uncie parte latioribus, latiusculâ basi alternoque situ cauli hærentibus, denso ordine & serie circumpositis, oris secundum longitudinem & deorsum convolutis ut *Rorismarini*, & concavis, supernè verò convexis, virentibus & longiore lanugine hispidis. Flores fert in summo numerosos, aureos, radiatos & in umbellam quasi dispositos. Tota planta cinerea viridis, villosa, & inæqualiter lanuginosa ac hispida. Ex ipsâ radice & furculis annotinis, quot annis novi luxuriant cauliculi latum in cespitem sese diffundentes. In colle saxoso *Umbriæ* ad *Austrum* verso, propè locum dictum *el Peglio* provenit.

1083. *Jacobæa Linifolia*, Hispanica *Barr. Icon. 802*. *Jacobæa Linifolia* Hispanica & Italica *Bocc. Mus. part. 2. 60. Tab. 49*. *Jacobæa Hispanica*, *Rorismarini folio* *Inst. R. Herb. 486*. Hæc superiori congener planè, ab eâ tamen discrepat foliis multò angustioribus, subincanis, nonnihil hispidis, crassis, carnosis, *Rorismarini*

marini formâ. Surculos è radice pariter cespitosâ edit plures rectos, pedales, non ramosos. Flores etiam summis in caulibus in umbellam disponuntur aurei & radiati. Juxta *Cantillana* oppidum, viâ Hispalensi, secus fluvium *Guadalquivir*, & aliis Boeticæ locis reperitur.

1084. *Jacobæa montana*, integro, rotundo folio *Barr. Icon. 145. Bocc. Mus. part. 2. 61. Tab. 49.*

1085. *Jacobæa montana*, *Betonica* folio *Barr. Icon. 801. & Bocc. Mus. part. 2. 61. Tab. 49.* Utriusque descriptiones defunt.

1086. *Jacobæa montana*, integro sublongo folio *Barr. Icon. 146. Jacobæa maritima*, non laciniata, lanuginosa, latifolia *Inst. R. Herb. 486. Jacobæa montana*, non laciniata, nostras *Raii Hist. 272.* In horto culta minus est lanuginosa, magisque virescit.

1087. *Jacobæa Doronici* foliis & flore, montana *Barr. Icon. 229.* Folia huic crassa, *Lapathi*, nonnihil canescentia, & tenui lanugine obducta, per oras dentata, prælongo hærentia pediculo, spatulæ formâ, palmi dodrante quandoque longiora quæ infima sunt, sensim dein angustiora & minora, in summo tandem brevissima & angustissima. Caulis rotundus, lanuginosus, sesquipedalis, firmus, erectus, raris vestitus foliis, in summo quatuor aut quinque flores amplos profert, crassos, vix dodrante uncia in diametro majores. Radix multiplex, tenuis, filamentosa, cespitosa & gilva. Sub finem Junii florebat.

1088. *Jacobæa montana*, croceo, amplo, singulari flore, spatulæ folio, elatior *Barr. Icon. 265.* Folia in sicca plantâ ex Montibus Apenninis missâ, erant oblonga, longoque pediculo innixa, spatulæ formâ, ad radicem palmi dodrante quandoque longiora, unciam lata quâ parte latiora sunt & in extremo obtusè acuta, per oras leviter & rarè denticulata, tenui brevique hispida pube, in caule rara, alterna, angustiora, breviora, acuta, lanceolata nulloque pediculo fulta, sed latiori basi caulem amplexantia & eò minora quò thyrso florum viciniora. Caulis cubitalis, quandoque major, cavus, angulosus, striatus, sulcatus, albâ lanugine & stupeâ inæqualiter diffusâ albescens, in cujus cacumine flos insidet singularis modò, modò umbellatus, radiatus, & *Jacobææ* floribus similis, amplus, croceus, calyce subviridi comprehensus. Semen longum, angustum, striatum, acutum, subfuscum & pappis instructum.

1089. *Jacobæa montana*, polyanthos, flore aureo, foliis longis & integris, Italica *Barr. Icon. 266. Jacobæa montana*, lanuginosa, non laciniata *C. B. Pin. 131. Raii Hist. 272.* A superiori distinguitur foliis magis villosis & incanis, floribusque minoribus, & plurimis in umbellam dispositis.



1090. *Doronicum minus*, rotundifolium *Barr. Icon. 1149. Doronicum* nigra radice, *Campoclarense Col. part. 2. 36. Raii Hist. 274. Doronic à feuilles arrondies.* In summâ Montis Januarii apud Sabinos Tiburto quinque vel sex miliaribus ad Septentrionem dissi, crepidine, necnon Montibus Trifulti Aprutio conterminis & Apenninorum jugis saxosis reperitur. Radix ejus è fulvo nigricans. A *Doronico* ramen *Campoclarensi Columnæ* differre videtur radicibus minùs nodosis & geniculatis.



1091. *Corona solis Salicis* folio, alato caule *Inst. R. Herb. 490. Aster luteus*, alato caule, *Canadensis Barr. Icon. 535. Aster luteus*, alatus *Corn. 62. Icon. & descriptio Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



1092. Chrysanthemum Bellidis folio, seu Bellis lutea *Barr. Icon. 1244.*
Chrysanthemum latifolium *I. B. 3. 105. Raii Hist. 340.*

1093. Chrysanthemum pallidum, minimis imisque foliis incis, superiori-
bus integris & capillaribus *Barr. Icon. 421.* Nec hujus, nec sequentium des-
criptionem invenio.

1094. Chrysanthemum majus, latiori Chamæmeli folio, flore aureo folio-
so, Italicum *Barr. Icon. 451.*

1095. Chrysanthemum tenuifolium, flore bullato aureo *Barr. Icon. 450.*

1096. Chrysanthemum tenuifolium, flore luteo, aphylo, minore *Barr.*
Icon. 452.



1097. Leucanthemum Indicum, maximum, glabrum. Bellis montana,
maxima, glabra, ramosa, subrotundo folio, Indica *Barr. Icon. 438. La Mar-*
querite des Indes. Radice nititur crassiusculâ, transversim in densum cespitem
serpente, fibras emittente secundum longitudinem altè in terram descenden-
tes. Ex ejus capitibus multa erumpunt folia oblonga, acuta, spatulæ formâ,
ferrata, glabra, unciam lata, tres ut plurimum uncias longa, prælongo &
canaliculato nixa pediculo. Caulis surgit ex foliorum medio bipedalis, quan-
doque major, teres, rotundus, striatus, glaber, rectus & in summo quando-
que ramosus, foliis brevioribus, angustioribus pediculo destitutis, sed caulem
amplexantibus basi latiore, vestitus. In cujus summo rariora brevioraque hæ-
rent folia, caulisque ferè nudus est, & sustinet singularem florem uncialis
diametri, cujus umbilicus luteus, semiflosculis albis radiatus. Florebat Romæ
in horto *Barr.* semine accepto ex horto serenissimi Principis Gastonis Aure-
lianensium Ducis.

1098. Leucanthemum montanum, hirsutum, folio acuto, ferrato. Bellis
montana, major, hirsuta, caule folioso, non ramosa, Neursina *Barr. Icon.*
437. Folia huic longiora, angustiora, acutiora & profundius ferrata, sensim
in caule breviora nulloque pediculo innixa. Caulis bipedalis rarioribus cin-
ctus foliis, florem unicum profert in summo amplissimum, fescuncialem ut
plurimum, album, medio luteum. Tota planta levi mollique horrescit lanu-
gine. Romæ florebat Augusto mense in horto sancti Xysti, ex paludoso &
amplo prato ad radicem Jugi Neursini Octobri mense erutum.

1099. Leucanthemum montanum, glabrum folio obtuso, ferrato. Bellis
montana, minor, ramosa, glabra, Cotyledonoides, Neursina *Barr. Icon.*
1237. Plurima abs radice effundit folia minora longè quàm in superioribus
duobus, *Gei* aut *Sedi* modo in gyrum ordinata & sibi invicem imbricatim
incumbentia, obtusa, crenata & longo donata pediculo. Caulis ex eorum
medio surgit ramosus, brevioribus foliis floribusque minoribus instructus. Folii
magnitudinem naturalem habes in Icone. Iisdem locis ac superior erescit.

1100. Leucanthemum Alpinum, latifolium *Barr. Icon. 458. n. i.* Leucan-
themum montanum, minus *Inst. R. Herb. 492.*

1101. Leucanthemum Alpinum, angustifolium *Barr. Icon. 458. n. ii.* Leu-
canthemum Alpinum, foliis Coronopi *Inst. R. Herb. 493.*

1102. Leucanthemum Alpinum, tenuifolium *Barr. Icon. 458. n. iii.* Leu-
canthemum Alpinum foliis profundè incis *Inst. R. Herb. 493.*

1103. Leucanthemum minimum, foliis inferioribus integris, superioribus
incis. Bellis minima, incis caulis foliis, Hispanica *Barr. Icon. 1153. n. i.*
Bellis foliolis laciniatis ad caulem adnatis. *Bocc. Mus. part. 2. 162. Tab. 116.*
& 124.

1104. Leucanthemum fruticans, pinnatis superioribus Quamoclit foliis,
imis vermiculatis & torosis *Barr. Icon. 422.*



1105. Pyrethrum alterum, minus, cespitosâ radice, Anthemidis flore, Italicum *Barr. Icon. 522*. Cespitosa est planta quæ è capite suo multas emittit radices rufescentes, fibrosas, palmi quadrante quandoque longiores. Folia è crasso surgunt capite villosa, numerosa, rigida, latè virentia, carnosâ, levi lanugine hispida & tenuifolia Saxifragiæ aut Chamameli modo. Cauliculos edit nonnihil hirsutos, subcanescentes, teretes, palmares, minoribus & raris vestitos foliis & in summo sustinentes caput Chamameli quod jam marcidum erat cùm occurrebat in Montibus Moroni in Aprutio, non longe à Sulmone. Tota planta subacris salivam promovet.



1106. Matricaria Tanacetii folio, flore majore, semine umbilicato *Inst. R. Herb. 493*. Tanacetum inodorum, latifolium, magno Bellidis flore *Barr. Icon. 781*. Tanacetum inodorum 1. *Clas. Hist. 338*. La Matricaire à feuilles de Tanaisie. Folia promit pinnata seu alata, ut Vulgari Tanaceto, sed tenuius & acutius altiusque incisa, minus rigida erectaque, nonnihil humi procumbentia, obscurius virentia, palmum ferè longa, costâ folii & pinnarum supernè canaliculatâ eique costæ utrinque alterno ut plurimum situ, quandoque adverso laxa satis per intervalla adnascuntur foliorum pinnæ obliquæ non transversæ ut in aliis infrâ describendis; quæ quidem pinnæ acutè laciniantur & minores breviores acutioresque fiunt quò altius in costâ adhærent. Inter sex aut octo folia caulis erigitur cubitalis & bipedalis, teres, erectus, firmusque, nonnihil villosus, raris vestitus foliis & minoribus quàm in imo caulis, è quorum alis alii foliosi, sed minoribus vallati foliis enascuntur cauliculi qui sursum panduntur in fasciculum florum Bellidis majoris formâ, colore & magnitudine similibus. Odor illi nullus, sapor plantæ levis linguamque leviter vellicans. Ex Apenninorum sylvis in horto sancti Xysti translata Junio & Julio florebat.

1107. Matricaria Alpina, Tanacetii folio, flore majore. Tanacetum inodorum, latifolium, Alpinum, magno Bellidis flore *Barr. Icon. 786*. Superiori ita similis ut nonnisi foliis distinguatur; huic enim dilutius pallidèque virent folia, quorum pinnæ breviores, angustiores, latiora per intervalla costæ mediæ inferuntur. In Montibus Majoris Carthusiæ, & in collibus circa oppidum *Bourgdoysan*, in Delphinatu observavit *Barr.*

1108. Matricaria Tanacetii folio crispo, flore majore. Tanacetum inodorum, latifolium, crispum, magno Bellidis flore *Barr. Icon. 782*. Folia huic multò majora, pedalia, majoribus & densioribus foliorum pinnis & ordinibus instructa, pinnis tenuius altiusque incisis, & ab exortu longioribus acutioribusque laciniis luxuriantur, quibus tum caulem, cùm foliorum nervum medium vestiunt & amplectuntur. Pinnarum porrò ordines ita frequentes, ipsæque pinnæ adeò incisæ ut crispantia fiant folia sive ima, sive cauli & ramo hærentia. Flos quam in superioribus nonnihil minor. Caulis cubitalis ab imo ferè ramosus. E Montibus Carthusianorum Divi Bartholomæi apud Trisultum, in humidis umbrosisque provenientem in hortum sancti Xysti Translatam coluit per annos aliquot.

1109. Matricaria Tanacetii folio, flore minore, semine umbilicato *Inst. R. Herb. 493*. Tanacetum inodorum, tenuifolium, magno Bellidis flore *Barr. Icon. 785*. Tanacetum inodorum 11. *Clas. Hist. 332*. Foliorum pinnæ laxioribus intervallis costæ mediæ inferuntur, sed superioribus longè angustiores & profundius incisæ. Flos nonnihil minor, in cæteris cum superioribus convenit. In sylvis Montis Januarii Tiburto imminentis ad vigesimum quintum ab urbe Româ milliare viget. Matricariæ vires vide in *Hist. Raii 357*.



1110. Chamæmelum marinum *Barr. Icon. 521. I. B. 3. 122 Raii Hist. 355.* Camomille du bord de la mer. Tota planta crassa, carnosâ, glabra, odore Chamæmeli, sapore acri & aromatico, Abrotanum nonnihil referente prædita. Ad ostia Tyberina, & ad littora maris Mediterranei frequens observatur.

1111. Chamæmelum montanum, incanum, Absinthioides, Italicum *Barr. Icon. 457.*



1112. Cotula flore luteo, nudo *Inst. R. Herb. 495.* Chrysanthemum Valentinum, seu tenuifolium, flore aureo ἀφύλλω *Barr. Icon. 449.* Chrysanthemum Valentinum *Clus. Hist. 332. Raii Hist. 362.*



1113. Buphtalmum Tanaceti minoris folio *C. B. Pin. 134. Raii Hist. 341.* Chrysanthemum Tanaceti folio, flore aureo, Italicum *Barr. Icon. 465. L'Oeil de Bœuf.*

1114. Buphtalmum Tanaceti minoris folio, flore albo *Inst. R. Herb. 495.* Chrysanthemum Tanaceti folio, flore albo, montanum, Italicum *Barr. Icon. 466.* superioris est varietas.



1115. Millefolium minus, album, Hispanicum *Barr. Icon. 1115.*

1116. Millefolium minimum, crispum, flore albo, Hispanicum *Barr. Icon. 1114.*

1117. Millefolium minus, tenuifolium, Tanaceti odore. Tanacetum minus, albo Millefolii flore, odorum *Barr. Icon. 992.* Tota planta palmaris est quandoque elatior, cespitosa & Tanacetum olens, sed suavius & jucundius. In sylvis Viterbii Montibus, quos Cyminos vocant vel Cymineos, Viterbum inter & Ronfalionem, vulgò *Ronsiglion* in editâ jugi planitie, quâ Viterbo Romam iter est, occurrebat *Barr. Millefolii vires vide in Hist. Raii 346.*



1118. Parmica Cretica, frutescens, Santolinæ facie *Inst. R. Herb. 497.* Abrotanum fœmina, incanum, albo Achilleæ flore, Creticum *Barr. Icon. 572.* & *Bocc. Mus. part. 2. 46. Tab. 34.* Millefolium incanum, Creticum *C. B. Pin. 140. Prodr. 72. Raii Hist. 347.* E Promontorio *Capo spada* ad Barrelerium sicca delata est, cujus folia adulta majora erant, quæ verò recens erant enata, minora & incano prorsus obsita tomento.

1119. Parmica Alpina, Matricariæ foliis *Triumf. 83.* Tanacetum inodorum, Leucanthemum, Alpinum *Barr. Icon. 991.* Absinthium corymbiferum, Millefolii umbellâ, folio alato & laciniato *Raii Hist. 345.* In sylvis supra Cœnobium majoris Carthusiæ nascitur.



1120. Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis *Inst. R. Herb. 497.* Aster legitimus, Clusii alter, seu spinosus, luteus *Barr. Icon. 551. Clus. Hist. xiiij.* Aster luteus foliolis ad florem rigidis *C. B. Pin. 266. Raii Hist. 338.* In Campaniâ Romanâ frequens ad agrorum margines, necnon in Galliâ Narbonensi, atque in Hispaniâ.

1121. Asteriscus aquaticus, annuus, patulus *Inst. R. Herb. 498.* Aster legitimus Clusii, mollior, luteus *Barr. Icon. 552.* Aster annuus, Attico luteo similis, foliis ad florem mollibus *Bot. Monsp. & Raii Hist. 339.* In agro Romano viâ ad Civitatem veterem obviis.

1122. Asteriscus maritimus, perennis, patulus *Inst. R. Herb.* 498. Aster supinus, luteus, Massilioticus *Barr. Icon.* 1151. Aster 11. supinus *Clus. Hist.* xiiij. & *Raii Hist.* 339. Asteriscus maritimus, annuus, patulus *Inst. R. Herb.* 498. Circa Massiliam ad littus maris eundo ad Montem *Redon* provenit, ibique strigosa est planta & perennis quæ in hortis culta elatior, ramosior & paulò viridior fit; hyememque in regionibus frigidis difficilè patitur.



1123. Xeranthemum flore simplici, purpureo, minore *Inst. R. Herb.* 499. Jacea pusilla, Oleæ folio, purpureis congestisque floribus *Barr. Icon.* 1126. Jacea Oleæ folio, minore flore *C. B. Pin.* 272. *Raii Hist.* 287. In sterilibus circa Monspelium vix Icone majus est, sed in hortis cultum procerius & ramosius evadit.



1124. Carlina flore purpureo rubente *Inst. R. Herb.* 500. Acarna Atractylidis folio, amplo purpureo capite, prolifera *Barr. Icon.* 483. Acanthoides parva, Apula *Col. part.* 1. 29. *Raii Hist.* 289.

1125. Carlina Hispanica, tenuifolia, flore luteo. Atractylis Hispanica, tenuifolia, flore luteo *Barr. Icon.* 594.

1126. Carlina Hispanica, integro folio, flore citrino. Atractylis Hispanica, integro & cinereo folio, flore citrino *Barr. Icon.* 593. *Carlina sylvestris Hispanica Clusii Hist. clvj.* non ab similibus, folia tamen profert tenuiora, planiora, minùs crispa, minoribus armata spinis, incanâ similiter lanugine pubentia & cinerea. Flores pariter in summo caule è foliorum alis secundùm caulis longitudinem oriuntur citrini, vixque sese explicantes.

1127. Carlina minima, caulodes, Hispanica *Barr. Icon.* 592. Radice potitur longâ & crassiusculâ, à capite juxta terram multis parvis foliis, majoribus & latioribus tamen quàm in Icone exprimuntur, humifusis cinctâ, altè incis, sinuosis, glabris, rigidis, tenuibus, nigris, duris & duas vix uncias longis, surrectis, carinatis, multis spinis in extremo & secundùm longitudinem aculeatis. Caulis unicus, rectus, semipalmaris, foliosus & in summo juxta florem frondosus. E foliorum ambientium & subjectorum medio caput exurgit multis minoribus aliis & similibus foliolis surrectis & applicitis obvolutum; è multis flosculis luteis medium compingitur pluribus foliolis angustis, acutis circumvallatum & radiatum. In Icone formam & magnitudinem ferè totius plantæ habes. Semen illi oblongum, albidum ciliaribus pilis coronatum. In Regni Valentini deserto *la Murtha*, non longè à mare propè Valentiam sex milliaribus ad meridiem reperiebat *Barr.*



1128. Acetosa Americana, foliis longissimis pediculis donatis *C. B. Pin.* 114. *Prodr.* 54. & *Raii Hist.* 179. Oxalis seu Acetosa Americana, vesicaria *Barr. Icon.* 1112. *L'Ozeille d'Amerique.*

1129. Acetosa Americana acutiori folio. Oxalis seu Acetosa Americana *Barr. Icon.* 539. Folia hujus acutiora, folliculi seminum tricuspidati & acutiores. Utramque à Corvino accepit *Barr.* Acetosæ vires vide in *Hist. Raii* 178.



1130. Lapathum aquaticum, Luteolæ folio *Boec. Mus. part.* 2. *Tab.* 104. Blitum angustifolium, verticillatum *Barr. Icon.* 1181. *Boec. Mus. part.* 2. 85. *Tab.* 80. Lapathum Anthoxanthum *I. B.* 2. 987. *Raii Hist.* 174. *La Patience à feuille de la Gaude.*



1131. *Atriplex Lovitensis* Corvini, semine anguloso *Barr. Icon. 1210.*



1132. *Chenopodium Stramonii* folio. *Atriplex sylvestris*, major anguloso folio *Barr. Icon. 540.* *Atriplex Chenopodia*, *Datura* folio *H. R. Monsp.*

1133. *Chenopodium Ambrosioides*, Mexicanum, *Inst. R. Herb. 506.* *Botrys Boetica*, *Atriplicis sylvestris* facie, vulgò *Botrys Mexicana* *Barr. Icon. 1185.* *Botrys Ambrosioides*, Mexicana *C. B. Pin. 138.* & ejusdem app. 516. *Raii Hist. 196.*



1134. *Herniaria Alfine* folio *Inst. R. Herb. 507.* *Anthyllis Alfinefolia*, *Polygonoides*, major *Barr. Icon. 534.* *Anthyllis maritima*, *Alfinefolia* *C. B. Pin. 282.* & *Raii Hist. 1026.*



1135. *Paronychia Hispanica* *Clus. Hisp. 478.* *Polygonum montanum*, niveum, minus *Barr. Icon. 726.*

1136. *Paronychia Hispanica*, nivea, major. *Polygonum montanum*, niveum, roseum majus, *Hispanicum*, *Barr. Icon. 687.*

1137. *Paronychia Hispanica*, nivea, polyanthos. *Polygonum montanum*, niveum, polyanthos *Barr. Icon. 725.*

1138. *Paronychia Hispanica*, nivea, minor, compactioribus foliis. *Polygonum montanum*, niveum, roseum, minus, compactioribus foliolis *Hispanicum* *Barr. Icon. 688.* *Polygonum Cyrenæum* *Bocc. Mus. part. 2. 22. Tab. 7.*



1139. *Alchimilla minor*, hirsuta, cineritia, Italica *Barr. Icon. 728.* *Alchimilla Alpina*, pubescens, minor *H. R. Par. Le Pié de Lion des Alpes à feuilles & tiges velues.* In editoribus Apenninorum pratis, necnon in Monte Ventoso propè Avenionem provenit, vix Icone major; folia caulesque tenui cineritiâque pubent lanugine.

1140. *Alchimilla argentea*, montana, pentaphyllea *Barr. Icon. 756.* *Alchimilla Alpina*, *Quinquefolii* folio subtus argenteo *Inst. R. Herb. 508.* *Tormentilla Alpina*, folio sericeo *C. B. Pin. 326.* *Raii Hist. 209.* In montibus Gallia, in Alpibus, Apenninis, Pyrenæis obvia est. Vires *Alchimilla* vide in *Hist. Raii 209.*



1141. *Polygonum angustifolium*, majus *Barr. Icon. 546.* *Polygonum angustifolium*, oblongo folio *C. B. Pin. 281.* *Polygonum majus*, Romanum, longius radicum, foliis *Rorismarini*, longissimis flagellis donatum *Bocc. Mus. part. 2. 66. Tab. 58.* *La Renouée à feuilles étroites.* Ex radice longâ crassiusculâ, humi demissâ, è fusco rubente seu furvâ, fibris è lateribus longis & tenuibus capillatâ in multos cauliculos humi in circuitu se spargit repandos, eosque per extrema sursum se erigentes, geniculatos, foliis densè satis vestitos, duplò latioribus quàm in sequenti, majoribus, acutis, & obscurius virentibus: inter quæ glumosa & nivea intermiserunt foliola, præsertim in extremis vel tenerioribus sarmentis. Flores ex foliorum alis exoriuntur rubentes.

1142. *Polygonum angustifolium*, minus *Barr. Icon. 545.* Folia hujus vix mediam lineam lata, acutissima, nec semunciâ longiora. Flores ejus adeò parvi, ut visum fugiant. Rubescit & nonnihil candicat eorum calyx. Habes in Icone ramulum expressum qualis microscopio videtur. Utrumque Romæ occurrit viâ quâ è Monte Aventino ad Montem Testaceum itur.

1143.

1143. Polygonum rectum *Barr. Icon. 560. n. 11*. Pusilla palmaris & annua planta, caule unico erecto surgens, radice annuâ pollens, Polygoni folia & flores emittens. Flores albi sunt & subrubentes. Icone non est major. In Italiâ observavit Barr.

1144. Polygonum maritimum, majus, incanum *Barr. Icon. 560. n. 1*. Polygonum maritimum *I. B. 3. 376. & Raii Hist. 185*.

1145. Polygonum incanum, rotundifolium, Halimoides, fruticans, Hispanicum *Barr. Icon. 733*. Perelegans hæc planta fruticans, tota incana, ramosa, caudice crasso donata, Halimi formâ, erecta, lignosa quam densè vestiunt folia carnosâ, rotunda, incana, alterna, sed inordinato situ disposita, ex quorum alis germina foliosa & congesta erumpunt. Flores fructusque non observavi. In maritimis agri Toletani provenit. Hujus & sequentium character ignoratur, imperfectæ enim sunt Icones, descriptionesque desunt.

1146. Polygonum fruticosum erectum, Hispanicum *Barr. Icon. 713*.

1147. Polygonum fruticans, supinum, majoribus foliis, Hispanicum *Barr. Icon. 716*.

1148. Polygonum supinum, fruticosum, verticillatum, foliis minimis, Hispanicum *Barr. Icon. 715*.

1149. Polygonum fruticosum, supinum, Ericoides, cineritium, Thymifolio, Hispanicum *Barr. Icon. 714*.



1150. Bistorta montana, minima *Barr. Icon. 489. La petite Bistorte*.



1151. Panicum vulgare, spicâ multiplici, longis aristis circumvallatâ *Inst. R. Herb. 515*. Gramen palustre, Arundinaceum, Milii paniculâ, semine Phalaridis *Barr. Icon. 8*. Gramen Paniceum, spicâ aristis longis armatâ *C. B. Pin. 8. Le Panis des marais*.

1152. Panicum maritimum, spicâ longiore villosâ *Inst. R. Herb. 515*. Gramen Alopecurum, minus, spicâ virescente, divulsâ *Barr. Icon. 515. n. 1*. Gramen Alopecuros, minus, spicâ longiore *C. B. Pin. 4*.

1153. Panicum maritimum, spicâ divulsâ, villosâ. Gramen Alopecurum, majus, spicâ virescente, divulsâ, pilis longioribus *Barr. Icon. 115. n. 11*. Alopecuros altera, maxima, Anglica, paludosa, sive Gramen Alopecuroides, maximum *I. B. 2. 474*. In pratis circa Arcem Ostiensem collegit Barr.



1154. Gramen sparteum, spicatâ Bryzæ paniculâ & corniculatâ *Barr. Icon. 25*. Gramen spicâ Bryzæ, majus *C. B. Prodr. 18. Le Chiendent*. In Campaniâ Romanâ frequens juxta sepes locis aridis, necnon ad Tyberis margines circa Ostiam.

1155. Gramen spicâ Bryzæ, minus *C. B. Prodr. 19*. Festuca gracilis, paucis utriculis *Barr. Icon. 83. n. 11*. In arvis juxta vias frequens per totam Italiam.

1156. Gramen sparteum, longâ & spicatâ paniculâ, Lolii utriculis Festucæ potius, majus *Barr. Icon. 13. n. 1*. Radice potitur perenni, cespitosâ fibrosâque, foliis longis, angustis, planis & sensim in Junceam formam convolutis in extremo. Culmo est tenui, glabro, nitido, lævi & raris vestito foliis, in cujus summo spica surgit angusta, longa, palmi dodrantem sæpè superans, è multis brevibus Lolii utriculis conflata, tenuibus & longioribus insertis pediculis, longâ serie & sine ordine aggestis. Inter glumas paleaceas & acutas delitescit semen Loliaceum, longum, angustum, utrinque acutum. In Monte Æquicolorum Guadagnolo dicto, aridis & saxosis, necnon in pratorum

rum aggeribus, primo lapide à Ponte Milvio ad Aquam transversam oritur.

1157. Gramen Sparteum, spicatum, Lolii utriculis, majus *Barr. Icon. 748. n. 1.* Spica hujus duas ut plurimum uncias longa, paniculata & spicis aliis parvis, inæqualibus, rectis modò, modò inclinatis composita, sed minoribus quam in superiori & brevioribus, aristis tamen tenuissimis & longioribus circumvallatis. Culmi pedales, duri, firmi, glabri, læves, juncei & erecti. Circa & supra muros Arcis *Guadagnoli* nascitur.

1158. Gramen palustre, locustis Erucæformibus *Barr. Icon. 2.* Annuum est & palustre uliginosis & depressis gaudens ac humidis scrobibus sylvæ Ostiensis. Breves & fibrosas agit radices subfuscas, & ab iis unum aut alterum culmum cubitalem emittit, raris & quinis vestitum circiter foliis longis, angustis, mollibus, fragilibus & amplexicaulibus parte suâ inferiore; glabrum teretiâ sui parte, in summo foliis nudum, striatum & nonnihil angulosum, in longam spicam palmo & pede quandoque longiorem, ex viridi subalbescentem, rigidiusculam, sed non asperam, tenuem, raris locustis & per longitudinem alterno situ circumstantibus, quarum singulæ Erucam arborum ramis & furculis arreptem non malè referunt, unciam quandoque longæ; quæ inferiores & primæ sunt, longioribus à se invicem distant intervallis, & ut plurimum unâ aut alterâ juxta basim ejusdem formæ, sed quadruplo brevior appendice fultis: at quæ in spicâ altius procedunt, sensim breviores, tenuiores & vicinior congestæ. Singularum dorsum rotundum & echinatum est, glumis in quatuor series digestis recto & medio sulco à summo ad finem eleganter striatum, carinatum, totidem pedes, quot ab utroque latere glumis constat, ostentans.

1159. Gramen Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, maximum *Barr. Icon. 905. n. III.* Ex radice tenui, fibrosâ, albâ, plures surgunt culmi primum supini, fursùm statim erecti, ad primum geniculum flexi, angulosi, raris, brevibus, acutis, amplexicaulibus, angustis pilosisque foliis cincti, tribus aut quatuor nodis nigricantibus discreti, recti, firmi, læves & nitentes, quorum extrema in longam, palmarem, tenuem, angustam, albicantem, pilosam, plumaceamque spicam desinunt Lolii formâ, planam, laxam & aristatam. Granum tenue, oblongum, Loliaceum, nigricans glumas inter geminas delitescit. Majores spicæ palmo quandoque longiores, minores verò seu locustæ laterales majores unciales; minores verò semunciales tantum. Aristæ sunt geniculatæ. Totum brevibus pilis hirsutum est.

1160. Gramen Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, medium seu vulgare *Barr. Icon. 905. n. II.* Priori simile, sed minus, angustioribus instructum foliis, spicisque strictioribus. Prioris videtur varietas. Utrumque in Campaniâ Romanâ frequens locis aridis & incultis.

1161. Gramen Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, minus *Barr. Icon. 905. n. I.* Angustis donatur foliis aliis duobus superioribus cæteris similibus, brevibus, & in geniculato culmo nigris nodis articulo & infra anguloso flexu contorto quinque aut senis alterno situ dispositis. Culmos fert quinos aut plures, vix palmo longiores, quorum pars major in spicam cedit Lolii formâ, sed angustam, unicoque grano per singulas glumas foetam crassiusculas, acutas, duriores, rarioresque quam in superioribus. Granum recondunt duæ tenuiores & albidæ glumæ, utrinque una & super has alia durior, virens, exterior, erecta & quæ ex nodis singulorum articulorum spicæ ortum ducit. Aristæ pariter sunt geniculatæ. In campestribus Gallicani territorii reperitur.

1162. Gramen Loliaceum, Junceum, majus *Barr. Icon. 5.* Tenui fibrosâ, albâque est radice multiplici, brevi & capillatâ; foliis angustis, vix duas uncias longis, paucis, tenuibus, subinde marcescentibus. Culmi numerosi in globum convoluti & arcuati, rotundi, raris & minoribus quam in imo foliis vestiti, in extremo acuminati, densis internodiis articulati, acutisque & viri-

dibus ad singulos nodos corniculis hærentibus, in quorum alis tenues infident glumæ. Pumilum est, vix quinque uncias altum, totumque è cæso virens. Aridis apricisque jugis Montis *Guadagnoli* in Latio *Præneste* imminenti, delectatur. Maio occurrebat quo tempore nec flores, nec semina ediderat.

1163. Gramen Loliaceum, Junceum, minus *Barr. Icon. 6*. Culmis gracilioribus, supinis & per humum sparsis, ac minoribus à priori discrepat. Iisdem locis provenit.

1164. Gramen Junceum, nodosum, minimum, capillare *Barr. Icon. 117. n. 1*. Gramen Loliaceum, maritimum, spicis articulatis *Mor. Hist. Oxon. part. 3. sect. 8. Tab. 2. fig. 8*. Exile, fugax annuumque est, cujus radix fibrosa, capillata & nigricans, tres aut quatuor exiles, geniculatos, articulatos teretesque culmos promit. Habes in Icone totius plantæ magnitudinem. In pratis ficcioribus Montis *Marii* frequens, necnon in pratis quæ Tyberim imminet, non longè à *Malliano* cœnobio, quarto infra urbem milliari.

1165. Gramen Junceum, spicatum, minus *Barr. Icon. 117. n. 11*.

1166. Gramen Loliaceum, aquaticum, acerosum. Lolium aquaticum, acerosum; *Phoenix* aquatica *Barr. Icon. 906. n. 1*.

1167. Gramen Caryophyllatum, Loliaceum, repens *Barr. Icon. 906. n. 11*. Radice est repente Graminis canini instar, albâ & geniculatâ; foliis Arundinaceis, rigidis, quartam uncie partem juxta cespitem & culmum cui adnascuntur latis, cæsi coloris seu Caryophylli, sensim ut altius surgunt angustioribus & acutioribus, in summo junceis, oris convolutis. Plures culmi vasto è cespite surgunt bicubitales quandoque, in quorum summo spica eminet nutatque è duplici utriculorum Loliaceorum serie non alatum ut Lolium, sed imbricatim alterno situ hinc inde sibi incumbentium. Ex albo & cæso virent utriculi rigidi & surrecti. Flores staminei & candidi. Circum Tyberis ripas & Cannetorum aggeres denso pertinacique cespite crescit infra & supra Pontem *Milvium*.

1168. Gramen Loliaceum, Zeæ spicâ. Zea Dioscoridis, Mutica *πολύτακτος*, minor *Barr. Icon. 111. n. 11j*.

1169. Gramen caninum, maritimum, spicatum, echinatis glumis *Barr. Icon. 718*. Gramen spicatum, locustis echinatis *Inst. R. Herb. 519*. Gramen caninum, maritimum, asperum *C. B. Pin. 2*.

1170. Gramen Sparteum, pennatum, majus *Barr. Icon. 46*. Gramen spicatum, aristis pennatis *Inst. R. Herb. 518*. Gramen Sparteum, pennatum *C. B. Pin. 5. Raii Hist. 1260*.

1171. Gramen Hordaceum, *δριξὼν*, majus, ciliaribus glumis, durius *Barr. Icon. 112. n. 1*. Gramen Creticum, spicatum, Secalinum, glumis ciliaribus *Cor. Inst. R. Herb. 39*.

1172. Gramen Secalinum, bulbosâ radice, seu ex Alepo Bauhini *Barr. Icon. 112. n. 11. I. B. 2. 444*. Gramen Creticum, spicatum, Secalinum, altissimum, tuberosâ radice *Cor. Inst. R. Herb. 39*.

1173. Gramen Hordaceum, minimum *Barr. Icon. 111. n. 1*.

1174. Gramen Secalinum, spicâ longiore & angustiore. Zea Briza barbata *Barr. Icon. 111. n. 11*.

1175. Gramen spicatum, folio aspero *C. B. Pin. 3*. Gramen spicatum, folio aspero, spicâ grumosâ, longiore *Barr. Icon. 26. n. 1*. Gramen spicatum folio aspero, spicâ grumosâ, brevior ejusd. *Icon. 26. n. 1j*.

1176. Gramen minimum, spicâ globosâ echinatâ *Barr. Icon. 28. n. 1*. Gramen spicatum, spicâ subrotundâ echinatâ *Inst. R. Herb. 519*. Gramen echinatum, tribuloides *Col. part. 1. 338*. Gramen capite globoso, echinato, minus *Barr. Icon. 863. n. 11*.

1177. Gramen Alopecurum, spicâ asperâ *Barr. Icon. 123. n. 11*. Gramen spicatum, echinatum, locustis unam partem spectantibus *Inst. R. Herb. 519*.
Gramen

Gramen Alocuperoides, spicâ asperâ C. B. Pin. 4. Raii Hist. 1265. Circa Romam, tum etiam Monspelii & in agro Massiliensi frequens.

1178. Gramen spicatum, tomentosum, longissimis aristis donatum *Inst. R. Herb. 517*. Gramen Alopecurum, molle, spicâ incanâ, obtusâ, majus *Barr. Icon. 116. n. 11*. Gramen Alopecurum, molle, spicâ incanâ, acutâ, minore *Barr. Icon. 116. n. 1*. Gramen Alopecuros, spicâ rotundiore C. B. Pin. 4.

1179. Gramen Alopecurum, viridi & molli spicâ *Barr. Icon. 123. n. 1*. E luteo rufescentibus fibrillis brevibus, contortis & numerosis constant radices hujus Graminis annui, ex quibus surgunt culmi plures, pedales modò, surrecti, modò ad latus inclinati, læves, glabri, rigidi, mediâ ferè sui parte spicam versus nudi, atro-violacei, palmaribus foliis angustis, brevibus & acutis leviterque pilosis vestiti, quorum vertici insidet spica duas uncias circiter longa ex multis aliis parvis spicis lanuginosisque utriculorum glumis in unam spicam compactis & coeuntibus; tenuibus tamen pilosisque è glumis angustis densè congestis composita, contortis & incurvis, crispisque & lanuginosis aristis munita. Typhæ in modum nonnihil inæqualiter tumet gibbosaque è viridi albescit, mollis, lævis & sericeo nitore nonnihil fulgens. Juxta vias & in arvis totâ Romanorum Campaniâ obvium, necnon murorum crepidinibus innascens.

1180. Gramen sciurum seu Alopecurum, minus, heteromallâ paniculâ *Barr. Icon. 4*. Gramen Barcinonense, paniculâ densâ, aureâ *Inst. R. Herb. 523*. Fibrosâ, molli, contortâ, brevi & nigricante est radicè pluribus foliis mollibus, glabris, vix duas uncias longis, sextam unciaë partem latis comosa planta. E radicibus culmi plures tumido cespite confestim assurgunt foliis tribus aut quatuor ejusdem magnitudinis, quorum summa spicam quandoque æquant, vestiti, breves, geniculati, glabri, medium palmum vix superantes; in quorum vertice spica biuncialis ex congestis numerosâ congerie & sub unâ ferè serie spicis parvis, quadrantem circiter unciaë longis, singulis uno pediculo oblongo nixis, nutantibus, filo crassiori vix majoribus, mollibus, paleaceis, & ex parvarum, obtusarum, & tenuissimarum glumarum imbricatum repositarum serie compactis, cunctis simul mollem venustamque paniculam spicamve Alopecuroideam efformantibus. Semen exile, tenui aristâ armatum delitescit inter sericeas albas & tenues glumas ac aristatas. Maturo semine facilè decidunt spicæ adeò ut senium passâ hæc Graminis species spicæ spina nuda apparet deciduis spicis lateralibus. Tota planta vix semipalmo altior, cespitosa & annua. Juxta Colysæum supra muros vineæ quondam Cardinalis Pii sub finem Maii cum maturis spicis exsiccatis & albescentibus occurrebat.

1181. Gramen Alocuperum, spicâ glumosâ, luteâ, villis crispis *Barr. Icon. 124. n. 1*. Gramen Antoxanthum, spicatum I. B. 2. 466.

1182. Gramen Myurum, spicâ è viridi albescente *Barr. Icon. 124. n. 11*. Annuum est, cujus culmus sesquipedalis ferè, singularis, sex aut octo angustis & quinque uncias longis, tenerisque cingitur foliis, subinde crispantibus & oris convolutis dum marcescunt. Spica angusta est, utrinque acuta, in medio nonnihil ventricosa, ex angustissimis glumis longis, pilisque frequentibus densè congesta, quæ siccata argenteo aureoque mixtis coloribus nitet splendetque soli præsertim objecta, quatuor quandoque uncias longa, vix quadrantem unciaë lata quæ crassior. Paucis fibris radicatur.

1183. Gramen Sparteum, Alopecuroides, spicâ sericeâ *Barr. Icon. 13. n. 11*.

1184. Gramen Sparteum, Alopecurum, spicâ sericeâ, grumosâ *Barr. Icon. 3. n. 1*.

1185. Gramen Sparteum, Alopecurum, spicâ sericeâ, glumosâ, Typhinâ *Barr. Icon. 3. n. 11*. Gramen Avenaceum, montanum, lanuginosum C. B. Pin. 10.

1186. Gramen spicatum, cristatum, perenne, majus. Gramen Typhinum, Plantaginis spicâ glumosâ, digitatâ, heteromallon, majus *Barr. Icon. 27. n. 1*

E fibrosâ & multiplici, ac stupis velut implexâ radice fibrosâ & capillatâ culmi numerosi surgunt geniculati pedales, & ad Typham usque foliosi; Folia angusta sunt, quatuor uncias circiter longa, amplexicaulia & in caule duplo majora. In summo culmo spica Typhina, Plantaginea, angusta, glabra, quatuor unciis quandoque longior, vix octavâ unciae parte latior sequenti similis ordine & situ glumarum digitatarum, quæ huic majores, crassiores, bicolores, id est, partim virentibus, partim pallescentibus, ab imâ parte singulis glumis ad mediam maturitatem perductis pallidis, à mediâ ad extremam virentibus adhuc, quod in sequenti non observavi. Circa Romanum Amphiteatrum quod Colysæum vocant, in murorum crepidinibus, necnon supra antiquas ruinas in hortis Cœnobii Divi Petri ad vincula ad Austrum provenit.

1187. Gramen spicatum, cristatum, annuum, minus. Gramen Typhinum, Plantaginis spicâ, glumosâ, digitatâ, heteromallon, minus *Barr. Icon. 27. n. 11*. Annuum est cujus radix parva & fibrosa; folia angusta vix duas uncias longa. Culmus ut plurimum singularis, lævis, glaber, capillaceus, pedalis, erectus, firmus, geniculatus, paucis vestitus foliis, ab ultimo folio ad spicam usque palmum ferè longus & nudus. Spica ut in superiori è cristatis glumis composita, sed longè tenuior, exilior, tres uncias quandoque longa, non planè rotunda, spicæ spinâ in lateribus nudâ existente confluentibus glumis & recto filo collectis in spicam. Harum glumarum quæ interiores geminæ & latiusculæ & pallidæ in singulis utriculis duo semina oblonga, nec Milio longiora, sed angustiora continent; quæ verò exteriores clypei modò ab injuriis externis regentes, eæque non simplices, sed uno brevique articulata pediculo multas in glumas angustiores, radiatas, palmæ modò digitatas, mucronatas, pilisque tenuibus hispidas, densis ordinibus dispositas dividuntur. In Campaniâ Romanâ viget.

1188. Gramen pratense, Alopecurum, sericeâ paniculâ *Barr. Icon. 11*. Folia profert angusta, acuta, crispantia, & alterna. Culmus in mollem, sericeam, & virescentem, densè compactam, uncialis diametri, & palmi trientem quandoque longam paniculam desinit ad latus inclinatam, nutantem, punctisque subfuscis variegatam. In aggeribus Sabinarum ad ostia Tyberina sinistrumque alveum Tyberis provenit.

1189. Gramen Typhinum, pratense, tuberosum, spicâ asperâ *Barr. Icon. 22. n. 11*. Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ, crassiori *Inst. R. Herb. 520*. Ex bulbis corticosis, foliisque ad basim latioribus, aliis aliis super impositis rufescentibus & adnatis constat radix ejus, fibris tamen infra capillaribus, firmis, crassiusculis, triuncialibus nixa, è quibus alia crassiuscula, longior, alba, lævis & Gramini Canino similis, sed longè exilior & capillaris altius se demittit; è quâ aliarum fibrarum ejusdem coloris & longitudinis fasciculus pendet. Bulboso & multiplici à capite multa surgunt folia latiuscula, biuncialia, in acutum desinentia, & è foliis culmi minores palmo, geniculati, & erecti, tribus aut quatuor ad summum foliis vestiti, quorum summo insident spicæ Typhinæ singulares, vix uncia longiores, sæpè minores, è parvis conflatae rigidis, duroque mucrone & incurvo deorsum hamato armatis, in utriculos digestis serie longâ glumis, quibus asperior spica in sulcos striata à summo ad imum, duplici serie corniculorum aculeorum distinguitur.

1190. Gramen Typhinum, arvense, radice tuberosâ, spicâ asperâ, longâ *Barr. Icon. 22. n. 1*. Radicibus carnosioribus, bulbosis nullâque fibrosâ appendice capillatis à superiori distinguitur. Culmi præterea supini & repandi, obliquè geniculati, & in cubiti formam articulati. Spica aspera, fescunciâ quandoque major & sextante unciae latior, densioribus utriculorum & glumarum ordinibus strobilorum Abietis modò imbricatim dispositis stipatur. Porro glumæ in summo latae & velut transversum in spicâ componuntur. Utrumque Romæ in siccioribus, & gramineis locis reperitur.

1191. Gramen Typhinum, supinum, tuberosum, spicâ non asperâ *Barr. Icon. 53.* Radice donatur multis veluti Allii capitibus corticosis tumidâ fibrosâque, multis deorsum fibris capillatâ iisque albicantibus. Foliis Triticeis, mollibus, latiusculis & culmum amplexantibus. Culmis multis, supinis, nodosis, geniculatis & variè contortis spicam Typhinam è foliorum alis emittentibus biuncialem, tortuosam, firmam, non asperam & erectam. In Agris Campaniæ Romanæ crescit.

1192. Gramen Typhinum, supinum, Italicum, minus *Barr. Icon. 54.* Paucis, fibrosis & brevibus ex radicibus ex albo pallentibus. multos transversos supinos & geniculatos humi fundit culmos foliis latis & amplexicaulibus sensim angustioribus & in acutum desinentibus, alternis vestitos. Tota planta è cæsis viret, repanda & annua, è latioribus foliorum alis culmos in spicam unam aut alteram desinentes edit, unciâ vix longiorem, & sextâ unciae parte crassior, è tenuissimis densissimisque glumis albidis, acutis, mollibus, non asperis compactam, quam unum aut alterum folium in exortu vaginæ modo latius complectitur geniculatum, mucronatum, firmum rigidumque. Semen inter glumas rufum & grani Triticei formâ. In Tusciâ latè se spargit locis paludosis, necnon Romæ in udis cænosisque locis juxta Tyberim viâ ad Pontem Milvium, vulgò *le Pont Molle.*

1193. Gramen Typhinum, maritimum, longius radicatam *Barr. Icon. 717.* Gramen Typhinum, maritimum, minus *Raii Hist. 1267.* Radice longâ & palmari, fibrosâ, molliusculâ, capillaceâ & flavescenti altius se dimittente in latiusculum cespitem, multis simul collectis & luxuriantibus ex semine deciduo enatis, humifunditur. Culmi singuli ternis quaternisque foliis ad basim folliculosis & tumidiusculis ac amplexicaulibus, juxta radicem mollioribus & fragilioribus, latioribus, sed sensim angustioribus, brevioribus vixque sescunciâ aut unciâ longioribus quæ à culmo abscedunt; villosisque cinguntur glabri nitentes, in summo tenuissimi, & tertiâ ferè sui parte foliis nudi. Spicæ Phalari similes, sed angustiores, minus tumidæ & glumis longè minoribus imbricatim & pluribus vestitæ. Ad ostia Tyberina locis arenosis & maritimis frequens.

1194. Gramen Typhinum, spicâ conoide, striatâ, culmo violaceo *Barr. Icon. 21. n. 1.*

1195. Gramen Typhinum, Junceum, perenne *Barr. Icon. 21. n. 11.*

1196. Gramen Typhinum, longissimâ spicâ Phalaridis, molli, albicante *Barr. Icon. 14. n. 1.*

1197. Gramen Typhinum, minori spicâ Phalaridis, duriore, subfuscâ *Barr. Icon. 14. n. 11.*

1198. Gramen Typhinum, Paniceum, utriculatum, amplo utriculo *Barr. Icon. 28. n. 11.* Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ, longissimâ *Inst. R. Herb. 519.*

Gramen Typhoides maximum, spicâ longissimâ *C. B. Prodr. 10.*

1199. Gramen Typhinum, Plantaginis spicâ, aristis geniculatis *Barr. Icon. 699. n. 11.*

Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ, tenuissimâ, longiore *Inst. R. Herb. 520.*

Gramen cum caudâ muris purpurascens *I. B. 2. 473. & Raii Hist. 1265.* Junio Romæ occurrebat *Barr. eundo à Portâ majore ad Portam Piam.*

1200. Gramen Typhinum, Phalaroides, majus, bulbosum, aquaticum *Barr. Icon. 700. n. 1.* E bulbosâ albâque radice crassis fibris capillatâ bicubitalem, tortuosum, geniculatum, nodis parte superiore fuscis, inferiore albicantibus calamum emittit foliaque in imo cubitalia, angusta, erecta, duo aut tria aliaque ad summum usque sensim breviora, lævia, & in summo spicam Alopecuroideam edit seu Typhinam, digitum crassam, longam & mollem, nonnihil curvam & nutantem, virentem, quandoque rubentem, è multis parvis, latiusculis Phalaridis glumis duplici lineâ viridique depictis & congestis conflata, quas inter glumas singulis pedicellis binas Avenæ modo duo aut tria

longa & Triticæ grana delitescent. Maio mense, denso bulbosarum radicum cespice culmoque plurimo, numerosas spicas emittebat mediis in aquis rivisque & fossis per prata ductis, viâ inferiori quæ Ostiam ducit, juxta Tyberim cum sequenti reperiēbat Barr.

1201. Gramen Typhinum, Phalaroides, minus, bulbosum, aquaticum *Barr. Icon. 700. n. 11.* Radice est similiter bulbosâ & albicante; foliis quàm in superiori angustioribus, & Typhâ quæ etiam minus æqualiter compacta, nonnihilque magis divulsa, è tenuioribus angustioribusque glumis & magis aculeatis composita, vix mediam digiti parvi crassitudinem superat, longitudine tamen paulò major.

1202. Gramen Typhinum, Phalaroides, pilosâ spicâ, aquaticum, bulbosum *Barr. Icon. 699. n. 1.* Radix huic pariter alba, bulbosa tenuibusque fibris capillata. Culmus sesquicubitalis, cum geniculis fuscis, quinque foliis semipalmum longis, angustis, striatis, arrectisque instructus. Culmi summum obtinet Typha duas & amplius uncias longa, angusta, vixque duas lineas lata, ex innumeris glumis exiguis & denso ordine imbricatum compactis constans, subfuscis, pilosis, aristisque tenuissimis & mollibus stipata. Stamina alba viridem Typham denso ordine cingunt. Iisdem locis ac superior.

1203. Gramen Typhinum, Phalaroides, arvense, bulbosâ radice *Barr. Icon. 10.* Bulbis est minoribus, magis compressis quàm in superioribus, bulbis aliis super aliis impositis, ut in *Gladiolo* aut *Gramine nodoso Avenaceo*. Culmis geniculatis ad nodos partim fuscis & partim nigris. Spicâ oblongâ, crassâ, firmâ. Romæ supra & circa muros suburbiorum viâ ad Ostia Tyberina, Maio Typha ejus staminibus pallidis erat onusta.

1204. Gramen Phalaroides, verius, bulbosâ radice *Barr. Icon. 9. n. 11.* Gramen spicatum, perenne, semine Miliaceo, tuberosâ radice *Inst. R. Herb. 519.* Phalaris bulbosa, semine albo *Park. Theat. 1163. Raii Hist. 1249.*

1205. Gramen Crucis, seu Cruciatum, tetradactylon *Barr. Icon. 753. n. 1.* Gramen dactylon, radice repente, five Officinarum *Inst. R. Herb. 520.* Gramen legitimum *Clus. Hist. ccxvij. Raii Hist. 1271.*

1206. Gramen dactylon, spicatum, aristis geniculatis *Barr. Icon. 753. n. 11.* Gramen dactylon, angustifolium, spicis villosis *C. B. Pin. 8. Raii Hist. 1273.*

1207. Gramen Caninum, pratense, paniculatum, glumis Asparagi foliis similibus, mucronatis, sylvestre *Barr. Icon. 364.*

1208. Gramen Miliaceum, majus, nutante paniculâ, Arundinaceum *Barr. Icon. 754.* Gramen segetum, paniculâ Arundinaceâ *C. B. Pin. 3.*

1209. Gramen Miliaceum, aquaticum, Bryzæ locustis, semine rufo *Barr. Icon. 7.* Gramen paniculatum, aquaticum, fluitans *Inst. R. Herb. 521.* Gramen fluviatile *Tabern. Icon. 216. 7. Spec. Raii Hist. 1281.*

1210. Gramen Miliari paniculâ, minus *Barr. Icon. 704.* Exile & humile est, vix semipalmo majus & ad margines arborum & itinerum frequens. Ex radice tenui, fibrosâ, pallidâ, brevi multos emittit culmos brevibus foliis compositos mollibus & paleaceis. E culmorum summo foliosâque & latiusculâ è vaginâ erumpit Miliacea panicula nonnihil sparsa & assurgens, densis locustis & acerosis glumis exilioribus planè & surrectis stipata paleaceis. Inter glumas hæc Avenaceas & exiles delitescit semen tenue admodum, Avenaceum & subfuscum. Pilosa est & acerosa panicula; aristarum tenuitas pictoris oculos fugerat, qui eas non expressit.

1211. Gramen paniculatum, proliferum *Inst. R. Herb. 523.* Gramen arvense, paniculâ crispâ pallidâ, seu majus *Barr. Icon. 703. n. 11.* Gramen murale, Junceum, minus, Allii radicibus, paniculâ lanthinâ, non crispâ *ejusd. Icon. 272.* Gramen arvense, paniculâ crispâ, lanthinâ, folio geniculato, minus *ejusd. Icon. 703. n. 1.* Tres istæ Icones *Barr.* exprimunt lusum *Graminis arvensis, paniculâ crispâ C. B. Prodr. 6.* Circa Romam has variationes observavit Barr.

1212. Gramen arvense, Filicinâ duriori paniculâ, gracilius *Barr. Icon. 49.*
Gramen exile, duriusculum, in muris & aridis proveniens *Raii Synops. 269.*

1213. Gramen arvense, Polypodii paniculâ crassiore *Barr. Icon. 50.*

1214. Gramen Eranthemum, supinum, congestâ Bryzæ paniculâ *Barr. Icon. 744.* Gramen paniculis elegantissimis, live ἐπαργοςίς, majus *C. B. Pin. 2.*

1215. Gramen Eranthemum, seu ἐπαργοςίς, Phalaroides, paniculatum, multiplici & tenui Bryzæ spicâ *Barr. Icon. 43.* Prioris varietas.

1216. Gramen Eranthemum, palustre, tenui & sparsâ Bryzæ paniculâ *Barr. Icon. 743.* Radix huic brevis & fibrillis plurimis crispis, contortis & subflavis capillata: folia longâ, striata & molliâ. Panicula laxior brevioribus, crassioribus & turbinatis onerata locustis, quæ locustæ majores fiunt, quò altius procedunt. Ad Tyberis ripas humidiores reperitur.

1217. Gramen Phalaroides, sparsâ Bryzæ paniculâ, minus *Barr. Icon. 44. n. 11.* Gramen paniculis elegantissimis, minimum *Inst. R. Herb. 522.* Radicibus constat albidis fibrosis & longiusculis. Folia ejus præangusta, è cæcio virentia & pauca. Culmi plures surrecti, geniculati, raris nodis & foliis distincti, quorum summa abeunt in latam & tenuem paniculam laxius sparsis rarioribusque spicis parvis angustioribus comatam: singulæ spicæ è glumis longâ, sed laxâ serie componuntur è fusco rubentes, semunciam longæ & lineâ vix latiores, ac inæqualiter sparsæ. Cum primum erumpit panicula densa, fulva, nigra & Arundinacea apparet, quæ matura latè se explicat, calvescit canescitque deciduis glumis. Pusillum aridis incultisque locis Campaniæ Romanæ delectatur, præsertim juxta Tyberim supra Monasterium Malianum.

1218. Gramen Phalaroides, sparsâ paniculâ, minimum, angustifolium *Barr. Icon. 44. n. 1.* Gramen paniculatum, locustis parvis, purpuro-argenteis, annuum *Raii Hist. 522.* In Italiâ, & juxta Romam ac alibi frequens.

1219. Gramen tremulum seu Phalaroides, minus, latâ, sparsâ paniculâ *Barr. Icon. 16.* Gramen tremulum, majus *C. Pin. 2. Raii Hist. 1274.*

1220. Gramen Phalaroides, majus, ferrugineâ nutante paniculâ *Barr. Icon. 15. n. 1.* Gramen paniculatum, locustis maximis, phœniceis, tremulis *Inst. R. Herb. 523.*

1221. Gramen tremulum seu Phalaroides, majus, erectâ paniculâ, rufum *Barr. Icon. 23. n. 1.* Palmare & annuum est; locustis erectis à superiori discrepans.

1222. Gramen tremulum seu Phalaroides, majus, erectâ paniculâ, citrinum *Barr. Icon. 23. n. 11.* Prioris varietas. In Italiâ, circa Romam, in aridis scilicet Montis Marii has variationes observavit Barr.

1223. Gramen Phalaroides, minus, erectâ collectâque paniculâ *Barr. Icon. 15. n. 11.* E tenui fibrosâque radice lævis, tenuis & cæcio è colore virens surgit culmus raris angustisque foliis cinctus, pedalis, cujus summum in tenuia filamenta ramosa juxta calamum erecta, spicatamque paniculam exhibentia, dividitur. Totâ panicula semipalmaris locustis inæqualibus è luteo pallentibus, imo & albescentibus (quarum interdum glumæ fiunt subfuscæ) & absque ordine positis constat. In Montibus Æquicolorum, præsertim Guadagnolo, necnon in Germaniæ editioribus locis & Tarvisio tractu.

1224. Gramen Phalaroides, majus, acerosâ, erectâ, parvâ paniculâ *Barr. Icon. 9. n. 1.* Calamus huic pedalis tenuibus rarisque foliis frondosus, per intermedia è fusco rubens; apicem ejus comant tres, quatuor vel quinque spicæ unciam ferè longæ, arrectæ & aristis erectis stipatæ, brevi tenuique filamentis innixæ. Semen illi gracile breve, sulcatum & fuscum. In Æquicolorum Montibus occurrit.

1225. Gramen Phalaroides, majus, acerosum, nutante spicâ *Barr. Icon. 24. n. 1.* Gramen Avenaceum, locustis amplioribus, candicantibus, glabris

&

& aristatis *Inst. R. Herb. 525*. Fibrosâ Cerealique nititur radice; culmis nodosis & contortis, seu geniculatis, nodis nigricantibus, qui angustis brevibus, que foliis per intervalla cinguntur, & in quorum summo surgit panicula è septenis locustis constans, quas longa tenuissimaque filamenta fulciunt, unciam vix longas, quartam uncie partem latas, ex glumis albicantibus duplici serie imbricatim positæ & aristatis compositas & ad latus inflexas. In Montè *Guadagnolo* non longè ab *Æde B. Virgini* dicatâ vulgò *Menterellâ* ad Meridiem provenit. Necnon passim per Galliam.

1226. Gramen Phalaroides, minus, erectâ spicâ, obliquis aristis *Barr. Icon. 24. n. 11*. Huic locustæ minores, erectæ, breviores, vix enim dodrantem uncie longæ, duabus lineis latiores, aristis tamen longis & obliquis stipatæ. Iisdem locis ac superior reperitur.

1227. Gramen Phalaroides, sparsâ & nutante Bryzæ paniculâ, obliquis aristis, minus *Barr. Icon. 84*. Annuum est pedale & quandoque cubitale, cuius folia semipalmum longa, angusta & hirsuta; panicula latè se spargit nutatque: locustæ verò binæ aut tres è longis & alternis pediculis capillaribus per intervalla exoriantur & inæqualiter propendent, angustæ, hirsutæ & aristis obliquis oblongisque munitæ. Frequens ad ripam Tyberis, infra Pontem Milvium, juxta Arundineta, sesquimillari ab urbe Româ.

1228. Gramen Avenaceum, spicis villosis, angustis, candicantibus & aristatis *Inst. R. Herb. 526*. Festuca Graminea, hirsutis Bryzæ glumis compactior *Barr. Icon. 83. n. 1*. Festuca Graminea, glumis non hirsutis, erectior *ejusd. Icon. 75. n. 1*.

1229. Gramen Avenaceum, utriculis lanugine flavescentibus *Inst. R. Herb. 525*. Festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescentibus *Barr. Icon. 75. n. 11*. Romæ circa muros crescit.

1230. Gramen Avenaceum, longâ erectâque paniculâ violaceâ *Barr. Icon. 96. n. 1*.

1231. Gramen Avenaceum, tenui spicatâque paniculâ, albis utriculis *Barr. Icon. 96. n. 11*.

1232. Gramen Avenaceum, latifolium, minus, sparsâ paniculâ *Barr. Icon. 95. n. 11*. Gramen Avenaceum, nemorense, glumis rarioribus, ex fusco xerampelinis, nostras *Raii Hist. 1289*.

1233. Gramen Avenaceum, angustifolium, paniculâ pyramidalî *Barr. Icon. 95. n. 1*. Radice potitur perenni, cespitosâ, fibrosâ, nodosâ, siccis, fuscis, longis tenuibusque fibrillis capillatâ & inter lapidum commissurâ ita immersâ, ut vix evelli possit. Ex ejus capitibus multa prodeunt folia Juncea, tenuia, equinis setis vix crassiora, latè virentia, acuta erecta, rigida, aspera scabraque (si ab imo sursum manum ducas) medioque palmo vix longiora; ex quorum vaginis emergunt tenues, Juncei pariter culmi erecti, sesquipalmum quandoque longi, interdum palmo minores, erecti & firmi, qui abeunt in paniculam pyramidatam, palmi dodrantem longam, è quinque vel sex ramorum ordinibus compositam. E singulis filamentis seu ramis ab exortu eodem binis ut plurimum, pendent tres aut quatuor locustæ Avenaceæ, albescentes, glumosæ, tenues, pellucidæ, geminis glumis tenue oblongumque granum rufum, nitens utrinque acutum complectentes. Romæ inter Portam Divi Laurentii & Piam, in muris ad Septentrionem versis oritur.

1234. Gramen Sparteum, Bromoides, brevioribus utriculis, nutante paniculâ *Barr. Icon. 17. n. ij*. Cespitosum perenneque est longis & palmaribus innixum radicibus fibrosis, cirrosis & altè se demittentibus. Folia profert longa, angusta, scabra, surrecta, firma, acuta, capillacea & caulem tubuli modo cingentia. Culmus geniculatus obliquè primum inclinatus, dein repandus surgit glaber, lævis, bicubitalis, in oblongam spicam desinens ad latus nutantem, Avenaceam, glumis brevibus, divaricatis & rubescentibus, inter quæ semina latent. Tota planta aspera est, sicca & exsucca. Ad margines latioris viæ Montis Marii occurrit.

1235. Gramen Sparteum, Bromoides, longioribus & erectis utriculis *Barr. Icon. 17. n. 1.* Sesquicubitali donatur culmo lævi, cæsis, rotundo, firmo; foliis angustis & quasi Junceis, asperis, ad summam usque paniculam ferè assurgentibus: panicula ejus semipedalis ferè, per lata & semuncialia intervalla tenuissimis constans filamentis, quinis aut senis inæqualis longitudinis, capillatis, bifidis, uno ab exortu alternoque situ ortis, quorum in vertice bini singularibus pedicellis eriguntur Avenacei oblongique utriculi spicæ in modum è quatuor aut quinque glumis angustis, acutis, acerosis seu quas aristæ longiusculæ tenues & surrectæ involvunt, compositi, inter quas semen oblongum & Avenaceum, per latera compressum delitescit. In Montibus Æquicorum collegit *Barr.*

1236. Gramen Sparteum, Bromoides, paniculâ spicatâ, majoribus utriculis *Barr. Icon. 18. n. 1.* Gramen Arundinaceum, paniculâ molli, spadiceâ, majus *C. B. Pin. 7. Raii Hist. 1287. & Scheuch. Agrostograph. Prodr. 21.* In Monte Mario, necnon juxta Aquam Traversam, itinere Viterbiensi observabat *Barr.* Sparsum per Galliam, & in agro Parisiensi provenit.

1237. Gramen Sparteum, Festuceum, seu Ægyllops Sparteum, villosa *Barr. Icon. 18. n. 11.* Cespitosum & perenne est, cujus radix crassa, alba & fibrosa. Culmi ex ejus capitibus Allii modo tumidis, foliaque angusta, longa, villosa, aspera, carinata, latè virentia, emittentibus, oriuntur læves, nodosi, ad genicula rubentes, & rotundi, tres aut quatuor pedes longi, surrecti, quorum fastigium panicula comat Avenacea, semipalmaris, è latioris folii spathâ, seu vesicâ erumpens, & ut in *sparto Clusii*. Quævis locustæ prælongis & tenuissimis articulatae pediculis nonnihil nutant; singulæ è basi nodosâ hirsutâ & albicante in duas angustas, oblongas glumas exteriores è fusco rubentes, crassiusculas, duasque alias interiores, tenuiores & albescentes, aristis munitas, se explicant, granumque subhirsutum, longum, Secalinum, sed tenuius complectuntur prælongâ & contortâ (ut Avenaceis) aristâ armatum, singulisque in locustis unicum. In Monte Mario occurrit.

1238. Gramen Avenaceum, paniculâ erectâ, majus. Bromos sterilis, erectâ paniculâ, major *Barr. Icon. 76. n. 1.*

1239. Gramen Bromoides, Festuceâ tenuique paniculâ, minus *Barr. Icon. 76. n. 11.*

1240. Gramen Festuceum, Myurum, minori spica heteromallâ *Barr. Icon. 99. n. 1.* Gramen murorum spicâ longissimâ *Ger. Emac. 29.* Romæ frequens supra veteres parietes viâ Flaminia & Appiâ.

1241. Gramen Festuceum, Myurum, elatius, spicâ heteromallâ, gracili *Barr. Icon. 99. n. 11.* Annuum est pariter ac superius, nec ab eo discrepans, nisi magnitudine & spicis nonnihil gracilioribus. Iisdem locis ac superius.

1242. Gramen exile, Junceum, mollius, Festuceâ paniculâ, radice rufâ *Barr. Icon. 100.* Nec hujus, nec sequentium descriptiones invenimus.

1243. Gramen Avenaceum, Arundinis facie. Calamagrostis Nastoides, Avenaceâ paniculâ *Barr. Icon. 363.*

1244. Gramen paniculatum, latifolium *Barr. Icon. 1307.* quid?

1245. Gramen paniculatum, angustifolium *Barr. Icon. 1308.* quid?



1246. Scirpus maritimus, capite glomerato *Inst. R. Herb. f. 28.* Juncus maritimus, spicâ subrotundâ, glumosâ *Barr. Icon. 203. n. 1.* Gramen Cyperoides, maritimum *C. B. Pin. 6. Raii Hist. 1298.* Inter caricta littoris Ostiensis invenitur.

1247. Scirpus maritimus, minor, graciliore spicâ. Juncus maritimus, minor, graciliore spicâ *Barr. Icon. 256. n. 11.* Superiori congener, sed exilior. Cespitosa est planta multis fibrosis, nigris & longis durisque & lignosis constans radicibus, quas ad palmum usque demittit humi pluribus foliis & capitibus

capitibus luxurians. Folia infra terram basi sunt latiore & sibi invicem incumbentia, exteriora nigra & nitentia, interiora spadicei coloris & striata, dum è terrâ seu è vaginâ erumpunt, contracta in rotundum, tenuem, glabrum, lævemque Scirpum obscure virentem, vix filo crassiorem, pedalem quandoque, acutum, sed non pungentem. Inter hæc densa folia exeunt culmi aliquot, foliis breviores nec crassiores, qui desinunt in spicam glumosam, vix quartâ unciae parte longam, sextâ latam, subfuscâ, è duorum foliorum sinu latiusculorum & inæqualium (majus enim vix semunciale, alterum verò multò minùs) emergentem. In Insulâ ad Ostium Tyberis positâ crescit.

1248. Scirpus minor, glumosâ, parvâ fuscâque spicâ. Juncus maritimus, minor, glumosâ & parvâ fuscâque Phalaridis spicâ *Barr. Icon. 256. n. 1.* Gramen Junceum, foliis & spicâ Junci, minus *C. B. Pin. 6.*

1249. Scirpus capitulo singulari, radice tomentosâ. Juncus minor, globoso singulari capitulo, radice tomentosâ *Barr. Icon. 255. n. 111.* Fibrosas, crassiores, carnosas longasque & tomento pubentes habet radices Junci, in unum caput coeunt, unde plura confertim emergunt foliola, in exortu parva, & tres uncias longa, angusta acutaque: è quorum medio Scirpi rotundi, nudi, Juncei, læves palmaresque surgunt, qui tribus circiter uncis infra suum cacumen globulares pilulas verrucosas, inæquales, rufas, *Hederæ* baccâ paulò minores, singulares è latere edit è pluribus aliis minoribus rotundis globulis dense compactas, Rubi instar, & tenui semine ac pulverulento refertas. Tota planta cæsi est coloris, firma & erecta. In locis humidis & paludosis Campaniæ Romanæ reperitur.

1250. Scirpus omnium minimus, capitulo brevior *Inst. R. Herb. 528.* Juncus Gramineus, minimus, capillari folio, capite squamoso *Barr. Icon. 118. n. 11.* Juncellus inutilis *C. B. Pin. 12.*



1251. Scirpoides spicâ, laxâ, locustis longioribus acutis. Gramen Spartem, Cyperoides, echinatâ spicâ, nemorum, majus *Barr. Icon. 19.* Gramen nemorum, spicâ rufescente, molli *C. B. Pin. 7.* Gramen sylvaticum, sive nemorum *Tabern. Icon. 226.* Denso spissoque è cespite plurimis fibris fuscis longis, tenuioribus & brevioribus veluti capillato multa confertaque folia profert tres quandoque palmos longa, angusta, striata & angulosa, inter quæ multi surgunt cauliculi tenues, angulosi, quadrangulares quandoque, sed ut plurimum triangulares & tricubitales, læves & glabri, si ab imo ad summum manus ducatur è contra scabros & asperos, si manum aliter referas, quod pariter in foliis observatur. Spica parva est, vix unciam longa, echinata & divulsa, è duris, rigidis & acutis squamosisque utriculis Tribuli conflata capita æmulantibus & singularia grana Miliacea, pellucida & rufa continentibus.

1252. Scirpoides spicâ laxâ minus. Gramen Cyperoides, echinatâ & rarâ spicâ, nemorum, minus *Barr. Icon. 20. n. 11.* Gramen Cyperoides, spicatum, minus, spicâ longâ, divulsâ seu interruptâ *Raii Hist. 1297.*

1253. Scirpoides spicâ laxâ, locustis acutis, medium. Gramen Cyperoides, palustre, echinatâ spicâ, medium *Barr. Icon. 20. n. 111.*

1254. Scirpoides repens, grumosâ & echinatâ spicâ. Juncus repens, grumosâ & echinatâ spicâ *Barr. Icon. 114. n. 11.* Gramen Cyperoides, palustre, majus, spicâ compactâ *C. B. Pin. 6.*

Scirpoides à Scirpo caulibus triangularibus & capitulis squamosis per caulem sparsis distinguitur, à Cyperoide verò quòd spicis sterilibus careat.



1255. Cyperoides spicâ pendulâ, longiore & angustiore *Inst. R. Herb. 529.* Gramen Cyperoides, latifolium, Typhâ pendulâ, longiore *Barr. Icon. 45.*
Gramen

Gramen Cyperoides, spicâ pendulâ, longiore & angustiore C. B. Pin. Prodr. 13.

1256. Cyperoides latifolium, minus. Gramen Cyperoides, Typhinum, latifolium, minus Barr. Icon. 1. Cespitosa est planta multis abs radice capitibus & surculis luxurians. Radix fibrosa, multiplex, singulis ejus capitibus altè demissis, gilvofusca, subrubens, & tortuosa: Folia lata, triangularia & carinata intus, foris pluribus lineis striata secundum longitudinem & concava, utroque folii latere intus compresso, palmo sæpè longiora, acuta & vix quatuor lineas, si explicentur, seu trientem uncia lata, deorsum arcuata & inflexa, imbricatim ex radice in caulem triangularem pedalemque surgentia & Cyperi foliis similia. Ex eorum medio caulis surgit triangularis quidem, sed obtusis angulis, in cujus summo vertice insidet spica Typhina fusca, teres, angusta & in acutum desinens, vix uncia longior, ex pluribus exiguis glumis imbricatim sibi incumbentibus, appressis & surrectis constans; duæ aliæ ut plurimum è lateribus, alternò situ cauli appressæ & surrectæ adnascuntur, sed breviores, graciliores & è fusco nigricantes. Differt à 1^o. & 2^o. Gramine Cyperoide Bauh. Pin. foliis latioribus & Typhis brevioribus. Ad ripam Ostii dextri Tyberis invenit Barr.

1257. Cyperoides latifolium, Typhâ erectâ, minus. Gramen Cyperoides, latifolium, Typhâ erectâ, minus Barr. Icon. 113. n. 1. Radicibus nititur pariter cespitosis & fibrosis, sed crassioribus, magis crispis, minusque villosis & fuscis, è quarum capitibus Allii modo turgidulis & nigris multa congestaque folia lata, sed angustiora duplò & quadruplò quàm in superiori, rigida, glabra, lævia, angulosa, Cyperoidea sursum assurgunt sesquipedem & amplius longa & lætè virentia. Caules tenues, longi, triangulares, graciles pro longitudine bicubitali, foliis ferè nudi, quibus tamen tres aut quatuor hærent ad summum spicæ unciam vix longæ, lata per intervalla, ex foliorum alis erumpentes (præter spicas molles, steriles & subfuscas nullis fultas foliis, & summum caulis occupantes) asperæ & multis è triquetris, rotundis, mucronatisque glumis è nigro rubescentibus densâ serie compactæ & surrectæ. Inter glumas grana reconduntur triquetra, Milio paulò majora, lucida & è rufo fusca. In Montibus Æquicolorum locis umbrosis eruebat Barr.

1258. Cyperoides angustifolium, Typhâ nutante, minus. Gramen Cyperoides, angustifolium, Typhâ nutante, minus Barr. Icon. 113. n. ij. E radice cespitosa, fibrosa, è fusco rufâ capita exeunt multis foliis cubitalibus & angustioribus multò quàm in superiori, ac convolutis compacta, ex quibus caules surgunt sesquicubitales, tenuiores, infirmi, spicis parvis, raris, Typhinis & brevioribus quàm in suprâ descripto, subrubescentibus & nutantibus onusti. In sylvis Æquicolorum invenit Barr.



1259. Linagnostis paniculâ minore Inst. R. Herb. App. 664. Gramen pratense, Junceum, nutante, amplâ, sparsâ & bombycinâ paniculâ Barr. Icon. 12. In paludosis Italiæ & Galliæ frequens est. Usum vide in Hist. Raii 1306. & 1307.



1260. Cynocrambe Alsinifolia Barr. Icon. 335. Cynocrambe Dioscoridis C. B. Prodr. 59. Cor. Inst. R. Herb. 52.



1261. Salicornia geniculata, annua Cor. Inst. R. Herb. 51. Kali geniculatum Barr. Icon. 192. Kali geniculatum, annuum C. B. Pin. 289. & Raii Hist. 211. Le Salicor.



1262. Filix baccifera Cornuti *Barr. Icon. 1120. & Corn. 5.*



1263. Lonchitis mas seu latifolia, aspera, minor *Barr. Icon. 1121. Lonchitis aspera C. B. Pin. 359. La Lonkite.*



1264. Polypodium majus, ferrato folio *Barr. Icon. 38.*

1265. Polypodium majus, acuto folio, Viterbiense *Barr. Icon. 1110. Boec. Mus. part. 2. 60. Tab. 47. & 48. Le Polypode. A vulgari Polypodio differre non videtur.*

1266. Polypodium majus, acutioribus foliis, Cordubense *Barr. Icon. 1111. Polypodium minus, acutioribus foliis, Cordubense Boec. Mus. part. 2. 59. Tab. 46. Polypodii vires vide in Hist. Raii 137.*



1267. Filicula fontana, major sive Adiantum album, Filicis folio *C. B. Pin. 358. Adiantum Filicinum, aquaticum, mollius, minimum Barr. Icon. 432. n. 2.*

1268. Filicula saxatilis, pinnulis brevioribus, acutis *Inst. R. Herb. 542. Adiantum Filicinum, durius, crispum, minimum Barr. Icon. 432. n. 1.*



1269. Adiantum stellatum, Canadense, Polypodii radice *Barr. Icon. 1206. Adiantum Americanum Corn. 7. & Raii Hist. 148. & 149. Capillaire de Canada.*

1270. Adiantum Filicinum, leptophyllum, elatius, Hispanicum *Barr. Icon. 431. Adiantum minimum, folio vario Elem. Bot. 433. H. R. Monsp. & Inst. R. Herb. 543.*



1271. Asplenium sive Ceterach *I. B. 3. 749. Raii Hist. 139. Ceterach officinarum vulgare seu Asplenium Mathioli Barr. Icon. 1051. & 1042. Le Ceterac ordinaire.*

1272. Asplenium vulgare, majus. Ceterach officinarum, majus, seu Asplenium majus *Barr. Icon. 1044. A vulgari discrepat, quod majus sit & procerius.*

1273. Asplenium minus. Ceterach officinarum, minus seu Asplenium minus *Barr. Icon. 1052. Folia huic longè minora, pinnulaeque breviores, densiores & sibi invicem imbricatim posita atque rotundiores.*

1274. Asplenium crispum, subrotundis dentatisque foliorum alis *Barr. Icon. 603. Densioribus luxuriat foliis, quorum pinnulae latiores, magis sinuosa, dentatae & veluti crispae sibi invicem imbricatim incumbunt, quod pictor non satis accuratè expressit.*

1275. Asplenium majus, oblongis, ferratis foliorum alis *Barr. Icon. 604. Nec minori foliorum numero luxuriat istud cujus pinnulae longiores, angustiores, acutiores & ad Lonchitidis pinnulas accedunt, per oras sinuatae, & laeviter ferratae. Has quinque vel sex varietates in horto coluit, & inter saxa Montium Latii, circa Ananiam invenit Barr.*

1276. Asplenium ramosum *Inst. R. Herb. 544. Lonchitis mollior, lanuginosa, Ceterach facie Barr. Icon. 858. Lonchitis mollior, lanuginosa, Ceterach facie, minor, Hispanica Ejusd. Icon. 857. Lonchitis folio Ceterach C. B. Pin. 359. Vires Asplenii vide in Hist. Raii 139.*



1277. *Osmunda Hispanica*, minor. *Filix florida*, minor, *Hispanica* Barr. *Icon.* 37. *Bocc. Mus. part. 2. 61. Tab. 50.* *Osmundæ palustris* faciem habet, sed minor & pumila tenuibus & infirmis in virgultis humifusis & contortis pinnulas raras & sibi oppositas alatim proferens, glabra & palmaris planta è cespitosâ radice fibrosâque sex aut septem humifusa emittens folia. Juxta Cordubam, in profundâ humidâque viâ exesis & sudantibus rupibus excavatâ, ad sinistram, statim atque è pratis itur versus colles deserti Carthusiæ à Portâ cœli, crescit.

1278. *Osmunda foliis lunatis* *Inst. R. Herb.* 547. *Lunaria botrytes* Barr. *Icon.* 252. n. 111. *Lunaria racemosa*, minor, vel vulgaris C. B. *Pin.* 354. *Raii Hist.* 127.



1279. *Ophioglossum latifolium*, vulgare Barr. *Icon.* 252. n. 1. *Ophioglossum vulgatum* C. B. *Pin.* 354. & *Raii Hist.* 126. *La Langue de serpent*, ou l'Herbe sans couture.

1280. *Ophioglossum angustifolium*, minimum Barr. *Icon.* 252. n. 11.



1281. *Lichen Pulmonarius*, saxatilis, digitatus, major, cinereus *Inst. R. Herb.* 549. *Muscus Pulmonarius*, Fungoides Barr. *Icon.* 1278. n. 1. *Lichen terrestris*, cinereus *Raii Hist.* 117.

1282. *Lichen Pulmonarius*, cinereus, mollior, in amplas lacinias divisus *Inst. R. Herb.* 549. *Muscus digitatus* Barr. *Icon.* 1278. n. 1v.

1283. *Lichen Pulmonarius*, saxatilis, cinereus, minor, umbilicis nigricantibus *Inst. R. Herb.* 549. *Muscus cristatus* Barr. *Icon.* 1278. n. 111.

1284. *Lichen pyxidatus*, prolifer *Inst. R. Herb.* 549. *Muscus pyxioides* Barr. *Icon.* 1278. n. 11.

1285. *Lichen cinereus*, cornua Damæ referens *Inst. R. Herb.* 645. *Muscus Alcicornis* Barr. *Icon.* 1277. n. 111.

1286. *Lichen tubulatus*, cinereus *Inst. R. Herb.* 549. *Muscus fistulosus*, corniculatus Barr. *Icon.* 1277. n. 1.

1287. *Lichen cinereus*, vulgaris, capillaceo folio, minor *Inst. R. Herb.* 550. *Muscus Fœniculaceus* Barr. *Icon.* 1277. n. 1v. *Muscus arboreus*, cum orbiculis C. B. *Pin.* 361.



1288. *Muscus capillaceus*, major, pediculo & capitulo crassioribus *Inst. R. Herb.* 550. *Polytricum aureum*, majus Barr. *Icon.* 251. n. 111. C. B. *Pin.* 356. & *Raii Hist.* 123.



1289. *Fungus cespitosus*, ramosus, umbellatus, major, pallidè luteus Barr. *Icon.* 1269.

1290. *Fungus cespitosus*, ramosus, umbellatus, minor, albus Barr. *Icon.* 1270. Utriusque descriptiones desunt.



1291. *Boletus cancellatus*, purpureus *Inst. R. Herb.* 561. *Fungus Coralloides*, cancellatus, purpureus Barr. *Icon.* 1263. *Clus. Hist. App. alt. auct. La Morille rouge.* *Icon.* Barr. ex Clusio l. c.

1292. *Boletus cancellatus*, flavescens *Inst. R. Herb.* 561. *Fungus Coralloides*

des, cancellatus, flavescens *Barr. Icon. 1265*. Lupi crepitus, vulgò Vescaia *Col. part. 1. 336*. Morille jaune. *Icon. Barr. ex Fabio columnâ l. c.*

1293. Boletus Phalloides, Gallus. Fungus Phalloides, Gallus *Barr. Icon. 1264*. xxij. generis Fungorum perniciosorum species V^a *Clus. Hist. cclxxxvj.*

1294. Boletus Phalloides, Batavus. Fungus Phalloides, Batavus *Barr. Icon. 1258*. Phallus Adriani Junii *Clus. Hist. ccxcv*. Utraque *Icon. Barr. ex Clus. l. c.*



1295. Agaricus præcox, albo-gilvus, cristatus *Inst. R. Herb. 562*. Fungus palmatus *Barr. Icon. 1267*. Fungus palmatus, albo-gilvus, cristatus *Bocc. Mus. part. 1. Tab. 302*.

1296. Agaricus major, dendroides, cristatus *Inst. R. Herb. 562*. Fungus foliatus, major, carnosior, dendroides, cristatus *Barr. Icon. 1268*. *Bocc. Mus. part. 1. Tab. 302*.

1297. Agaricus dendroides, cristatus, medius. Fungus ramosus, cristatus, medius *Barr. Icon. 1271*.

1298. Agaricus major, dendroides, multifidus *Inst. R. Herb. 562*. Fungus ramosus, cristatus, angustioribus lobis & crispis *Barr. Icon. 1272*. *Bocc. Mus. part. 1. 304*.



1299. Coralloides Abietina, nivea, procerior *Inst. R. Herb. 564*. Fungus ramosus, Abietinus, niveus *Barr. Icon. 1257*. *Bocc. Mus. part. 1. Tab. 304. fig. 2*. Fungus ramosus, Abietinus, niveus, villösus, Coralloides Barrelieri *Inst. L. c. xxv*. perniciosorum fungorum species *Clus. app. alt. auct.*

1300. Coralloides violacea, corniculis brevioribus *Inst. R. Herb. 564*. Fungus ramosus, crispus, violaceus *Barr. Icon. 1261*.

1301. Coralloides Alpina, purpurea *Inst. R. Herb. 564*. Fungus ramosus, Coralloides, purpureus *Barr. Icon. 1262*.

1302. Coralloides Italica, lutea. Fungus Coralloides, luteus, Italicus *Barr. Icon. 1260*.

1303. Coralloides Italica, rosea. Fungus Coralloides, roseus, Italicus *Barr. Icon. 1259*.

1304. Coralloides ramosa & comosa. Fungus ramosus, comosus *Barr. Icon. 1266*. xix. Generis Fungorum esculentorum 2. species *Clus. Hist. cclxxv*. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.*

1305. Coralloides ramis longioribus prædita *Barr. Icon. 1280*.

1306. Coralloides ramosa, palmata *Barr. Icon. 1279*. Recensitæ istæ Coralloidum species sunt varietates *Fungi ramosi I. B. 3. 837*.

1307. Coralloides cornua Corvi referens, corniculis brevissimis. Muscus Coralloides *Barr. Icon. 1277. n. 11*.



1308. Fucus folliculaceus, serrato folio *Barr. Icon. 1122*. & C. B. *Pin. 365*. Lenticula marina, ferratis foliis *Lob. Icon. 256*.

1309. Fucus spiralis, ferratus *Barr. Icon. 1303*. Fucus spiralis, maritimus, minor *Inst. R. Herb. 568*. Alga spiralis, maritima *Bocc. Rar. Plant. 70*. Ad ostia Tyberina retibus piscatorum obvolutum colligebat *Barr.*

1310. Fucus manum referens *Inst. R. Herb. 569*. Fungus Amanita, marinus, purpurascens *Barr. Icon. 1294*.

1311. Fucus manum referens, luteus. Fungus Amanita, marinus gilvo-luteus *Barr. Icon. 1293. n. 1*.

1312. Fucus dentem Lupi referens. Cucumis marinus Rondeletii, Aldrovandi, forte dens Lupinus, Fungus marinus, *ῥομφύρα Barr. Icon. 1293. n. 11*. Concombre de mer de Rondelet 91. Carnosus, fungosus & membranaceus est è gilvo carneus ac albescens, duas uncias ut plurimum longus, interdum minor,

minor, quadrante unciae vix latior, cujus basis lata, rotunda, multis favo-
rum modo foraminulis est pervia; pars verò superior laevis, aequalis, tumi-
da, obtusè acuminata & ad latus inflexa. Ad ostia Tyberina cum aliis plan-
tis marinis colligebat Barr. A piscatoribus vulgò dicebatur Dens Lupi.

1213. Fucus pennam referens *Inst. R. Herb. 569*. Penna marina, carnei co-
loris *Barr. Icon. 1273. n. 1. Panache de mer de Rondelet 90*.

1314. Fucus pennam referens, purpureus. Penna marina, coloris purpu-
rei *Barr. Icon. 1273. n. 11*. Prioris varietas. Zoophyti species est pennam An-
serinam referens, pluribus constans pinnulis compressis, tenuibus, dorso
convexo, & ab alterâ parte concavo ac sulcato, fimbriatis, utrinque pinna-
ta ut avium pennis evenit. Calami tubus carnosior est & cavus, praesertim
juxta basim, eumque interius à radice seu pede ad summum usque pervadit
spina tenuis, alba ac ossea, quæ erigitur & juxta basim calami quâ oritur,
mediâ uncia, interdum amplius, nuda est, quâ quidem locis rebusque qui-
bus innascitur, infigitur & adhærescit. Modò rubram, carneam, purpuream,
majorem minoremve observabat ad Ostia Tyberina.

1315. Fucus pennam referens, spinosus, ruber. Penna marina, spinosa,
rubra *Barr. Icon. 1274. n. 1*. A superioribus discrepat calamo crassiore & car-
nosiore, tum quòd amplior sit penna & spinis seu aculeis magis referta.

1316. Fucus pennam referens, spinosus, griseus, obsoletus. Penna marina,
spinosa, grisea, obsoleta *Barr. Icon. 1274. n. 11*. Hæc species cæteris visci-
dior, humidior, carnosior nonnihil, & griseo obsoletoque colore imbuta. Iis-
dem locis ac superiores invenitur.

1317. Fucus niger, vermiculatus & viscosus. Muscus marinus, niger, visco-
sus, vermiculatus, non crispus *Barr. Icon. 1297*. Viscosa est planta nigra spi-
cis foliisque lento velut glutine sibi cohærentibus, planis latisque cauliculis
& membranaceis, in plures furculos foliosos sursum assurgentibus. Folia plu-
rima sunt, crassa, vermiculata, longa, acuta & in alia minora divisa, Fœni-
culi modo; semunciam longis ut plurimum extremis foliis seu foliorum aut
ramorum, si mavis, laciniis in spicam aut caudæ formam congestis. E scopu-
lis marinis juxta Arcem Pali eruebat Barr.

1318. Fucus latifolius, albicans, crispus, pilosus. Muscus marinus, latifo-
lius, albicans, crispus, pilosus *Barr. Icon. 1300*. E sordido albicat, in multos
furculos expansus juxta exortum suum rotundos, dein compressos & planos
quò altius surgunt, tortuosos; è scopulis quibus latâ & membranaceâ ra-
dice hæret sursum assurgens & folia proferens lata, tenuius laciniata, crispa,
& variè convoluta ac per extrema in tenuissimas, inæquales, acutas, integras
que fimbrias non ferratas dissecta.

1319. Fucus angustifolius, fruticans, atropurpureus. Muscus marinus, an-
gustifolius, fruticans, atropurpureus *Barr. Icon. 1299*. Ab imâ radice latâ &
membranaceâ multos, rotundos tortuososque emittit furculos fruticis modò,
in multa folia tenuia, plana, altiùs divisa Fœniculi marini, id est Crithmi
modo, se explicans. Tota planta atrorubescit & comosa ac tenera est, unde
à piscatoribus cum oleo & aceto comedi solet. Extrema foliorum sæpè è ru-
bro albescunt.

1320. Fucus fruticosus, Coralloides, subluteus, major. Muscus fruticosus,
Aphyllantes, major *Barr. Icon. 1291. n. xij*. Sequenti proximè affinis est; sed
furculi crassiores duplo, teneri tamen & comestibiles sunt, ejusdemque co-
loris & saporis.

1321. Fucus fruticosus, Coralloides, subluteus, minor. Muscus fruticosus,
Aphyllantes, minor *Barr. Icon. 1291. n. xj*. Fruticat & ab uno caudice sive
furculo in plures ramos dividitur inter se variè implexos & foliis destitutos,
multis duntaxat secundum eorum longitudinem germinibus brevibus inæ-
qualiter sparsis onustos; superioribus non est major, è gilvo carneus est &
subluteus, mollis & tener, qui etiam in acetariis admittitur. Saxi conchy-
liisve innascitur lato & membranaceo pede.

1322. Fucus crispus, virens, & è gilvo luteus. Muscus marinus, crispus, λεπτο-
 χαυλος, virens & gilvo luteus *Barr. Icon. 1302. & Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab.*
 42. Duplicis est naturæ species ista, quæ furculos fert eadem è radice ortos, è
 carneo gilvos, in tenues ramosasque fimbrias abeuntes, & alios parasiticos
 virentes densioribus ramis & foliis, Musci crispi facie. Mollis & edulis est,
 dum recens.

1323. Fucus crispus, loricatus, nigricans. Muscus marinus, crispus, πανχαυ-
 λος, loricatus, nigricans *Barr. Icon. 1301. & Bocc. Mus. part. j. Tab. vij. fig. 1.*
 Multos emittit furculos ramosos, eosque crassos, villosos, crispas ac filamen-
 tosos (quæ filamenta fortè sunt plantæ folia) tenui, albâ & tophaceâ crustâ
 per intervalla loricatos & circumvestitos, tres uncias quandoque longos &
 subinde in crassos, frondosos, cristatos ramososque lobos abeuntes, qui cir-
 rosis crispisque pilis dense congestis intumescētes, nigras paniculas planas
 grumosasque ægrè sustinent & sæpè pondere succumbunt.

1324. Fucus crispus, niger, crasso & grumoso caule. Muscus marinus,
 crispus, niger, crasso & nudo caule *Barr. Icon. 1290. n. 1. Ad Corallum ni-*
 grum, vulgò *Anthipates*, accedit frutex iste muscosus, vix quatuor uncias
 altus, è radice latâ & membranaceâ cauliculum proferens, ramosum, tor-
 tuosum, nigrum, quorum rami Herculeam massam referunt, cirrisque in ex-
 tremo pilosis & crispantibus comantur.

1325. Fucus crispus, niger, tenuifolius. Muscus marinus, crispus, niger,
 λεπτοχαυλος, comosus *Barr. Icon. 1290. n. 11.* Multis luxuriat furculis vix Ico-
 ne majoribus, planis quos folia tenuissima, ramosa, nigra & inter se variè
 intertexta vestiunt, & quæ copiosius congeruntur in summo.

1326. Fucus fruticans, tenuifolius, atropurpureus. Muscus marinus, fruti-
 cans, λεπτοφυλλος, atropurpureus *Barr. Icon. 1289.* Tenuibus planisque fru-
 ticescit ramis, ac furculis mollioribus, vix se erigentibus. Folia ejus te-
 nuissima sunt angustissima & pilosa nonnihil. Tota planta ex atro purpurascit.
 In littore maris Tyrrheni juxta Arcem Pali Ditionis Ducis Bracciani colle-
 git cum superioribus.



1327. Corallina I. B. 3. 810. & *Raii Hist. 62.* Muscus Coralloides, Filici-
 nus *Barr. Icon. 1276. n. 1. La Coralline.* Denso cespite scopulis innascens, fur-
 culisque crebris luxurians in parvum vixque biunciale fruticulus, nodosum,
 articulatum, fragilem, pennatum & Filicinum se explicat. Variat colore
 modò niveo, quandoque rubescēte.

1328. Corallina cristata, minima. Muscus Coralloides, cristatus *Barr. Icon.*
1276. n. 11. Hæc furculis donatur tenuioribus & ferè capillaribus, ramosis
 & in summo comosis ac cristatis. Nodosa pariter est & geniculata, sed est
 tenuior ac mollis. Modò est nivea, modo carnea, vel purpurascens, obsolete
 grisea vel subvirescens.

1329. Corallina minima, bifida. Muscus Coralloides, bifidus *Barr. Icon.*
1276. n. 111. Tenuissimis & densissimè compactis simul eodem in cespite fur-
 culis longis & contortis nonnihil seu potius crispantibus, utpotè capillari-
 bus, ramosis in duo & duo cornicula & sic ad summum usque divisis, bifi-
 dis, tenuibus, geniculatis, & albo sordidis seu leucophæis discrepat à supe-
 rioribus.

1330. Corallina, minima, Fœniculacea. Muscus Coralloides, Fœnicula-
 ceus *Barr. Icon. 1276. n. 1v.* Ista longè tenuioribus & tenuius dissectis donatur
 foliis in summo in plura filamenta spicatum, sed laxius congesta.

1331. Corallina minima, crispa, albida. Muscus Coralloides, crispus *Barr.*
Icon. 1275. n. v. Surculi hujus tenues, albidis, sed mucosi, crispis, raris bre-
 vibusque ramulis in extremo vestiti, adeò ut stupei & laciniatis divulsisque
 fimbriis similes appareant.

1332. Corallina crustacea, bifida. Muscus Coralloides, bifidus, minor *Barr. Icon. 1275. n. vi.* Extremæ huic ramorum oræ seu fimbriæ nonnihil crassiores sunt quàm ramorum furculi & candidiores; reliqua planta è gilvo fit fusca, tophacea & quæ sub dentibus crepitat, insipida tamen.

1333. Corallina fistulosa, fragilis, crassior *I. B. 3. 811. Raii Hist. 65.* Muscus Polygonoides, Salicorniæ folio, major *Barr. Icon. 1275. n. vii.* Crassiuscula est carnei aut potius gilvi coloris, cujus folia geniculata, nodosa, semunciam ferè longa & mediâ lineâ vix latiora.

1334. Corallina fistulosa, fragilis, subtilior *I. B. 3. 811. & Raii Hist. 66.* Muscus Polygonoides, Salicorniæ foliis, minor seu bifidus *Barr. Icon. 1275. n. viii.* Ex radice membranaceâ in multos surgit cauliculos ab imo ramosos, & in duos alios & duos ad summum usque divisos, geniculatos, nodosos, quorum extrema flagella seu extremi furculi nonnihil tumescunt & foliorum vices implent, unciam longi, teretes, porosi, geniculati & oculatis punctis referti. Tota planta minor est longè quàm superior, albo fordida, lapidea & insipida. Porro singuli plantæ articuli tenuissimo & nigro cohærent filo.

1335. Corallina Astaci corniculorum æmula *Inst. R. Herb. 571.* Fucus pilosus, erectus, minor *Barr. Icon. 1292. n. 111. & Icon. 1298.* Muscus marinus, Equisetiformis, non ramosus *Raii Hist. 79.*

1336. Corallina fruticosa, pennata. Palma marina *Barr. Icon. 1292. n. 11.* Muscus maritimus, Filicis folio *C. B. Pin. 363.* Myriophyllum pelagium *Corrui Clus. Hist. celj.* Caulem emittit Tritici culmo tenuiorem, ramosum, griseum, semipalmarem, foliis instructum duplici serie & Palmæ modo dispositis, uncia vix longioribus, capillaribus, nodosis & geniculatis, ut & tota planta, quæ sublutea est & nonnihil inflexa.

1337. Corallina capillacea, è cinereo fusca. Muscus spicatus, capillaris *Barr. Icon. 1291. n. xiiij.* Tenuissimis potitur foliis Fœniculaceis, circum cauliculos rectos, tenues, ramososque in spicæ Nardi formam densè congestis. Tota planta vix fescunciâ altior, cespitosa, mollis, tenera & è cinereo fusca. Ad littora maris Tyrrheni cum superioribus reperiēbat Barr.

1338. Corallina fusca, Fœniculacea & mollior. Hippuris setaceus *Barr. Icon. 1123. n. 1.* Radix potius videtur quàm planta; ab uno eodemque furculo filamentosa, tenuissima, longa & ramosa emittit flagella crispantia, fibrillis brevibus intercisa. Fusca est aliisque permixta Corallinis.

1339. Corallina reticulata. Muscus marinus, reticulatus *Barr. Icon. 1123. n. 11.* Pertenuis, surrecta, sicca, rigida & parasytica ut plurimum, supra plantas marinas, cochleas, crustacea, tophaceaque innascens, filamentosa, fibrillis transversis ita implicata ut retium maculas exprimere videatur, subfusca est, non tamen tophacea. Has omnes Corallinæ species ad ostia Tyberina collegit Barr.




1340. Litophyton marinum, albicans *Gesn. de Fig. Lapid. 136.* Sparthum marinum *Barr. Icon. 1292. n. 1.* Coralloides fruticosa, recta, alba *C. B. Pin. 366.*

1341. Litophyton cinereum, rugosum *Inst. R. Herb. 574.* Rhamnus marinus, Coralloides *Barr. Icon. 1304.* Corallina cinerea, rugosa *C. B. Prodr. 153.* Ad littora maris Tyrrheni utrumque sparsim reperitur cum aliis purgamentis, ut dicunt, marinis.



ARBORES



ARBORES ET FRUTICES.

1342. **A**bies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo *Inst. R. Herb.* 585. Picea ἄφουλλος, Polonica Corvini *Barr. Icon.* 730. Picea major, prima, sive Abies rubra *C. B. Pin.* 493. *Le Picea.*



1343. Pinus sylvestris, minor, cono parvo, Polonica Corvini *Barr. Icon.* 729. Pinus sylvestris, vulgò Genevensis *I. B.* 1. 253. *Le Pin sauvage.*



1344. Larix folio deciduo, conifera *I. B.* 1. 266. Pinus sylvestris, minor, Laricis strobilo; Larix Polonica Corvini *Barr. Icon.* 500. *Le Meleze.*

1345. Larix Orientalis, fructu rotundiore, obtuso *Inst. R. Herb.* 586. Cedrus Libani *Barr. Icon.* 499. Cedrus conifera, foliis Laricis *C. B. Pin.* 490. *Le Cedre.*



1346. Ephedra maritima, major *Inst. R. Herb. app.* 665. Polygonum fruticans, botryoides, majus, Hispanicum *Barr. Icon.* 732. n. 111. Polygonum fruticans, ἀφουλλόν, crassioribus flagellis ejusd. *Icon.* 732. n. iv. Tragus, sive Uva maritima, major *I. B.* 1. 406.

1347. Ephedra maritima, minor *Inst. R. Herb. app.* 665. Polygonum fruticans, botryoides, Hispanicum, medium, 1. Clusii *Barr. Icon.* 731. n. 1. *Clus. Hist.* 92. Polygonum fruticans, botryoides, Narbonense, minus, 11. Clusii *Barr. Icon.* 731. n. 11. & *Clus. Hist.* 92. Fructus in Icone Barrelieri malè depingitur; exactior Icon exhibetur in hort. Med. Camer.

1348. Ephedra corniculata, minor. Polygonum fruticans, ἀφουλλόν, corniculatum, minus *Barr. Icon.* 134. n. v. Planta est superiori congener, sed minor, ramosa, furculosa, corniculata, bifurcata, geniculata, lævis, fragilis.



1349. Rhamnus Hispanicus, Buxi folio, minor *Inst. R. Herb.* 549. Lycium Latifolium, Hispanicum *Barr. Icon.* 995. Lycium quorundam *Clus. Hist.* 111.

1350. Rhamnus Hispanicus, saxatilis, capillaceo folio, rupibus innascens *Inst. R. Herb.* 593. Lycium angustifolium, Hispanicum *Barr. Icon.* 996. Frutex est quatuor pedes circiter altus, plura abs radice emittens virgulta lignosa, erecta, ramosa & per extrema acuta ac pungentia, densis, angustissimis, vix triente uncia longioribus, Rorismarini formâ, sed minoribus, alternis foliis vestita. E foliorum alis erumpunt flores parvi & pallidi, brevi nixi pediculo, qui in baceas abeunt. In sylvis Castiliæ novæ saltibusque succisivis, dum Madrito Toletum itur.



1351. Thymelæa saxatilis, Oleæ folio *Inst. R. Herb.* 594. Chamælea pumila, saxatilis, flore pallido, Italica *Barr. Icon.* 234. Chamælea Alpina, folio infernè incano *C. B. Pin.* 462. In Montibus Retinis non procul ab oppido *il paggio del Bastone* dicto, novem circiter milliaribus ab urbe *Rieti*, Sabinæ capite, ad Septentrionem, in acclivi & saxoso loco Montis super illud imminens, inter rupes crescit.

1352. *Thymelæa* foliis candicantibus, serici instar mollibus *C. B. Pin. 463. Raii Hist. 1588. Sanamunda argentea, latifolia Barr. Icon. 221. Circa Massiliam & in Insulis Stæchadibus viget.*

1353. *Thymelæa* tomentosa, foliis Sedi minoris *C. B. Pin. 463. Raii Hist. 1589. Sanamunda 3. Clusii; Erica Alexandrina Lobelii Barr. Icon. 233. Clus. Hist. 88. Per Hispaniam sæpius occurrit, necnon per Etruriam & circa Massiliam.*

1354. *Thymelæa argentea angustifolia. Sanamunda argentea, angustifolia Barr. Icon. 222. Fruticescit virgasque edit ramosas, vix sesquicubito longiores, foliis vestitas angustis, Lini æmulis, sed brevioribus, nec semunciam longis, argenteis & sericeâ canitie nonnihil hirsutis. Flores inter foliorum alas secundum cauliculos & ramos in extremo frondosos erumpunt parvi, herbacei coloris. Sapor illi urens. Obvia est dum progreditur ab oppido Aiora ad urbem Xativa dictam, in Regno Valentino.*

1355. *Thymelæa vermiculata, subcinerea. Sanamunda vermiculata, παχυδλως Barr. Icon. 231. Virgis potitur crassioribus & magis scabris ac asperis, nigricantibus & nudis ferè, nisi in summis & annotinis virgultis quæ frondosa sunt; congeruntur enim folia multa in eorum extremis, angusta, vermiculata, in se convoluta Sedi modo, acuta & è cinereo fuscè virentia, nec tertiâ uncia parte longiora. Iisdem locis ac superior observatur.*

1356. *Thymelæa* foliis *Chamælex* minoribus, subhirsutis *C. B. Pin. 463. Sanamunda media, angusto breviorique folio. Barr. Icon. 232. Sanamunda. Clus. Hist. 88. Media est inter duas superiores, iisdemque observata locis. Folia tamen huic leviori, cineraceâ incanâque magis pubent lanugine.*

1357. *Thymelæa Linariæ folio, Hispanica Inst. R. Herb. 594. Rubeola montana, major, Hispanica Barr. Icon. 596. Descriptionem non invenio. Congener tamen est Thymelææ Linariæ folio, vulgari Inst.*



1358. *Laurus Latifolia, Indica Barr. Icon. 877. Laurus Regia, Indica Aldini H. R. Par. & Ald. Hort. Farnes. 61. Raii Hist. 1553. Le Laurier Royal. Discrepat multum à Perseâ Clusii; nec confundendæ sunt istæ arbores.*



1359. *Jasminum flavum, odoratum H. R. Par. Gelseminum trifolium, odoratissimum, semper virens, exoticum seu Indicum Barr. Icon. 62. Gelseminum Indicum, arborescens, semper virens, flore luteo Bross. Le Jasmin Jonquille.*

1360. *Jasminum Alexandrinum, Citrii folio, flore pleno. Gelseminum Aurantii folio, flore albo, duplici, odoratissimum, seu Alexandrinum Barr. Icon. 61.*



1361. *Arbutus vulgaris Barr. Icon. 674. Arbutus folio serrato C. B. Pin. 460. Raii Hist. 1576. L'Arbousier. Frequens est in Italiâ & Galliâ Narbonensi.*

1362. *Arbutus oblongo & acuto fructu Barr. Icon. 673. Arbutus fructu turbinato, folio serrato Inst. R. Herb. 598. A vulgari differt fructu turbinato; tardiùs floret; foliaque levius huic serrata sunt. In vineâ Eminentiss. Card. Barberini, Urbani VIII. nepotis, propè Montem Marium, altero ab urbe Milliari secundum Tyberim, observavit Barr.*



1363. *Eleagnus Orientalis, angustifolius, fructu parvo, Olivæformi, subdulci*

dulci *Cor. Inst. R. Herb.* 53. Arbor tristis Shardonii *Barr. Icon.* 1196. Olea sylvestris, folio molli, incano *C. B. Pin.* 472.



1364. Aquifolium echinatâ folii superficie *Corn.* 180. Agrifolium dorso folii echinato *Barr. Icon.* 518. Aquifolii vires & usus vide in *Hist. Raii* 1622.



1365. Lilac cærulea, laciniatis foliis *Barr. Icon.* 903. Lilac laciniato folio *Inst. R. Herb.* 602. Agem Lilac Persarum *Corn.* 189. *Le Lilac de Perse.*



1366. Acacia Ægyptia *Barr. Icon.* 1138. Acacia Indica, Farnesiana *Ald. H. Farnes.* 2. *La Cassie.*



1367. Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino, rubro *C. B. Pin.* 451. Caprifolium erectum, minus, Xylostei Dodonei species *Barr. Icon.* 511. In Apenninis Montibus, necnon in Vastiniâ, circa Fontem Bellaqueum, vulgò Fontainebleau, provenit.



1368. Cotinus coriaria *Dod. Pempt.* 780. *Raii Hist.* 1696. Coccygria Theophrasti, Cotinus Plinii *Barr. Icon.* 528. *Le Fusset.*



1369. Toxicodendron triphyllum, folio sinuato, pubescente *Inst. R. Herb.* 611. Hedera trifolia, racemosa, Canadensis *Barr. Icon.* 228.



1370. Vitis Corinthiaca, alba, πολυκαρπύλλος *Barr. Icon.* 702. Vitis Corinthiaca, seu Apyrina *I. B.* 2. 72. *Raii Hist.* 1614. *Le Raisin de Corinthe.*

1371. Vitis Cretica, alba, laciniatis foliis *Barr. Icon.* 701. Vitis laciniatis foliis *Corn.* 183. Vitis folio Apii *I. B.* 2. 73. *Raii Hist.* 1614. *La Cioutat.*

1372. Vitis quinquefolia, Canadensis, scandens *Inst. R. Herb.* 615. Hedera quinquefolia, Virginiana *Barr. Icon.* 227. Edera quinque folia, Canadensis *Corn.* 100. *La Vigne-vierge.*



1373. Rubus non spinosus, major, fructu nigro *Barr. Icon.* 395. Rubus vulgaris, spinis carens *H. R. Par. Ronçe de Saint-François.* Rubo vulgari similis est, sed spinis destituitur; Flos pariter rubens, & fructus niger.

1374. Rubus non spinosus, fructu nigro, majori, Polonicus *Barr. Icon.* 1250. Folia hujus ampliora, longiora & acutiora; fructus etiam major. A Corvino pictum habuit *Barr.*

1375. Rubus odoratus *Corn.* 150. Chamærubus odoratus, Vitis folio, Canadensis *Barr. Icon.* 396. *Ronçe de Canada.* Fructus edit majores quàm Rubus vulgaris; sed sabrubentes, nec adeò grati saporis.



1376. Spiræa Hispanica, Hyperici folio crenato *Inst. R. Herb.* 618. Oxycantha angustifolia, non spinosa; Hypericum fruticans, Canadense Robini *Barr. Icon.* 564. Frutex est humanæ altitudinis, pluribus abs radice stolonibus virgisque

virgisque rectis luxurians, iisque rubentibus, adultioribus griseis. Folia in ramis alterna sunt, angusta, tertiam unciae partem vix lata, uncia non longiora, in acumine tribus aut quatuor dentibus crenata, obrusa tamen, & ad oras integra, ad basim angusta, acuta, pediculo adnata, glabra, tribus praecipuis nervis secundum longitudinem striata, tenuissimis quasi foraminibus pervia, aut saltem pelluentia, & late virentia. Ex eorum alis flores exeunt polypetali & Oxyacanthae, umbellati, exilibus capillaribusque pediculis innixi, pentapetali, albi, staminibus pluribus albis referti. Floris, folii, embryonisque fructus formam & magnitudinem habes in Icone. In Monte Gualdo Umbriae, in via media Spoletum inter & Fuliginium ad dextram, juxta hospitium, sepe longam vidit Barr. ex illo frutice constantem, quod nuntiavit Robino, qui hunc fruticem Indiarum tantum indigenam putabat.



1377. Lauro-Cerasus Barr. Icon. 873. Clus. Hist. 4. I. B. 1. 420. & Raii Hist. 1549. Le Laurier-Cerise.



1378. Persea Arbor semper virens, aromatica Barr. Icon. 878. Clus. Hist. 2. Raii Hist. 1552. & Plum. Nov. Gener. Plant. Amer. 44.



1379. Mespilus aculeata, Amygdali folio Inst. R. Herb. 642. Pyracantha sempervirens Barr. Icon. 874. Oxiacantha Dioscoridis, sive spina acuta, Pyri folio C. B. Pin. 434. Raii Hist. 1459. Le Buissou ardent. In Italia frequens est praesertim in territorio & planitie Umbriae Narniam inter & urbem Terni.

1380. Mespilus Anthedonoides, folio minore; Oxiacantha spinosa, minore folio Barr. Icon. 563. Varietas Mespili Apii folio sylvestris C. B. In Monte Gualdo pumila erat, foliisque minoribus frondosa, tenuibus & late virentibus ac lucidis, spinis tamen longioribus stipata.

1381. Mespilus folio rotundiori, fructu nigro, subdulci Inst. R. H. 642. Amelanchier Galloprovinciae Barr. Icon. 527. Alni effigie lanato folio, minor C. B. Bin. 452. Raii Hist. 1461.



1382. Genistella herbacea, sive Chamæspartium I. B. 1. 393. Raii Hist. 1725. Chamæspartium supinum, caule folioso, Hispanicum Barr. Icon. 570. In Montibus Serra Morena dictis eundo ad Cordubam, prope Hospitium dictum La Venta de l' Alcada crescit, & alibi; sparsim quoque per Galliam occurrit.



1383. Anagyris foetida, Cretica, oblongis foliis, violaceis luteis floribus Barr. Icon. 569. Discrepat ab Anagyride foetida Clusii floribus, quorum pericarpium ex atro & violaceo rubescit, floris vero partes è luteo pallent; Porro vexillum floris brevius est. Nec eadem est ac Anagyris Cretica, foetida, Hon. Belli; folia enim hujus oblonga & angusta. Pictam communicabat Corvinus.



1384. Pseudo-Acacia vulgaris Inst. R. Herb. 649. Acacia Americana, albo Cytisi flore Cornuti Barr. Icon. 740. Acacia Americana Robini Corn. 172. L'Acacia. Fructus non sunt echinati, ut depinguntur in Icone.



1385. Coronilla five Colutea minima *Lob. Icon. 87.* Polygala montana, Italica, flore aureo *Barr. Icon. 721.*

1386. Coronilla caule Genistæ fungoso *Inst. R. Herb. 650.* Dorychnium luteum, Hispanicum, carnosius *Barr. Icon. 133.* Colutea caule genistæ fungoso *I. B. 1. 383.*

1387. Coronilla lutea, major. Dorychnium, luteum, majus *Barr. Icon. 134.*



1388. Barba-Jovis Lentifolia, incana, flore luteo, 1^a. Anguillaræ *Barr. Icon. 378.* Barba-Jovis pulchrè lucens *I. B. 1. 385.* Flos non est luteus, sed pallidus.

1389. Barba-Jovis Cytisi folio, flore rubello, seu altera Anguillaræ *Barr. Icon. 377.* Ebenus Cretica *Pon. Bald. Ital. 128. Prosp. Alp. Exot. 278.* Lagopus Creticus, incanus marinus, spicâ rubente *Barr. Icon. 913.* Icon. *Barr. ex Pon. L. cit. L'Ebene de Candie.*


1390. Barba-Jovis Hispanica, incana, flore luteo *Inst. R. Herb. 651.* Spartium latifolium, flore parvo *Barr. Icon. 1182.* Cytisus vi. *Clus. Hist. 96.*

1391. Barba Jovis pumila, villosa, flore globoso, purpureo *Breyn. Prodr. 2.* Astragalus, incanus, tomentosus, pallido, globoso flore, Italicus *Barr. Icon. 722.* Astragalus villosus, floribus globosis *C. B. Pin. 351. & Raii Hist. 939.* E Monte Aprutii dicto *Morone* habuit *Barr.*



1392. Chamæbuxus flore Coluteæ flavescente *C. B. Pin. 471.* Myrthi & Chamæleæ media plantula *Barr. Icon. 538.*





PLANTÆ INCERTI GENERIS.

1393. **A** Momum *Barr. Icon. 571.* Amomum racemosum *C. B. Pin. 413.* *Raii Hist. 1697.* Amomum novum, Cardamomi vulgaris facie, sive Indicus racemus *I. B. 2. 195.* Elettari primum. *H. Mal. 11. pag. 9. L'Amomum en grappe.*



1394. Cardamomum majus *Barr. Icon. 571. Math. Edit. Latin. Valgrif. 27.* Grana Paradisi officinarum *C. B. Pin. 413.* Hujus semina vulgò Maniguette dicimus.

1395. Cardamomum medium *Barr. Icon. 571. Math. Edit. Lat. Valgrif. 27.* Cardamomum majus officinarum *C. B. Pin. 413.* Cardamomum majus, vulgare *Clus. Exot. 187.* Cardamomum majus *Bont. 127. Raii Hist. 1204.*

1396. Cardamomum minus *Barr. Icon. 571. Math. Edit. Lat. Valgrif. 27.* Cardamomum simpliciter in officinis dictum *C. B. Pin. 414.* Cardamomum cum siliquis, seu thecis brevibus *I. B. 2. 205.* Cardamomum minus *Bont. 126. Raii Hist. 1204.* Elettari 2. *H. Mal. 11. pag. 9. Raii Hist. 3. 644.* *Icon. Barr.* Amomum tresque illas Cardamomi species referens desumpta est ex Maronæ tractatu de Amomo, qui tractatus ad calcem latinæ Descriptionis Montis Baldi à Ponâ Veronensi editæ annectitur. Non sunt genuinæ nec ex vivâ plantâ delineatæ Icones Amomi & Cardamomi quas protulit *D. Pomet* in Historiâ suâ Gallicâ de Medicamentis simplicibus. De succedaneis eorumve viribus legi meretur *Dale Pharmacol. 368.*



1397. Coccus Indorum Corvini *Barr. Icon. 1314.* quid?



1398. Contrayerva *Barr. Icon. 482. Bocc. Mus. part. 1. 277. & part. 2. 168. Tab. 121.* Vires vide in *Hist. Raii 1339.*



1399. Glans unguentaria, seu Myrobolanus *Barr. Icon. 1238. Ald. H. Farnes. 72.* Glans unguentaria *C. B. Pin. 402. Raii Hist. 1738. Dale Pharmacol. 503. Ben blanc. Pomet Hist. des Drogues 227. Icon. Barr. ex Ald. l. c.*



1400. Griebegne Polonorum Corvini *Barr. Icon. 1171.* quid?



1401. Origanum inodorum, Polonicum *Barr. Icon. 1155.* quid?



1402. Symphytum petræum Dioscoridis, Thymifolium *Barr. Icon. 331.* quid?

6229

1403. Thé frutex Chinenſis, Tſia Japonenſis *Barr. Icon. 904.* Thé frutex *Bont. 89.* Thé Sinenſium, ſive Tſia Japonenſibus *Breyn. Cent. 1. 111.* & *Raii Hiſt. 1619.* Chaa *C. B. Pin. 147.* Le Thé ou Thée *Pomet Hiſt. des Drogues pag. 143.* Icon. *Barr. ex Bont. l. c.* Vires & uſus Thee vide in *Hiſt. Raii L. c.* & in *Tractatu Simonis Pauli de uſu & abuſu Thee.*



NEMICÆSPECIMEN

SPECIMEN

INSECTORUM QUORUMDAM MARINORUM, Mollium, Crustaceorum, & Testaceorum.

CUM ex Virorum eruditione illustrium reliquiis nihil non pretiosum Litteratis sit habendum, furtum iis facere mihi visus forem; si eos aliquâ Barrelieri nostri operis naturalis particulâ defraudassem. Eo animo hæc Historiæ Insectorum marinorum fragmenta ad Botanices collectionis calcem subjunxi sub *Mollium Crustaceorum Testaceorumque Speciminis* nomine. *Specimen* verò illa nuncupavi; vel quòd ipsi ea veluti integræ naturalis historiæ quam meditabatur, exempla sibi proponeret, vel quòd sicut in stirpium recensione nondum descriptas prodidit, ita & in Insectorum marinorum disquisitione, Icones à Bellonio, Rondeletio, Gesnero & Aldrovando ineditas publici juris facere voluisset.

Ea sit de opere, quod imperfectum videbitur, excusatio, quo tamen benè de Litterariâ Republicâ meruisse fatendum, cum hæc suâ ætate nullius adhuc curâ & methodicis observationibus in lucem prodissent, nonnisi multis ab annis Bonnanus, Lysterus, Rumphius rudem tunc indigestamque adhuc historiæ partem ad meliorem ordinem composuissent: sed tamen eorum pace dicam, multa in eorum methodo desiderari, perfectioremque quondam fore, si quemadmodum ad certa genera species plantæ redactæ sunt, ita & insecta huiusmodi revocarentur. Ne fragmentorum horum occasione materiem, quæ volumen conficeret, inaniter aggrediar, depictorum sequentibus Iconibus Insectorum characteres ex partibus quæ magis essentielles frequentioresque visæ sunt, designabo; factâque Insectorum marinorum divisione in *Mollia*, *Crustacea* & *Testacea*, & ultimò *Testacea* in univalvia, bivalvia, *speciminis* saltem titulum explevero.

INTER MOLLIA INSECTA

recensebo genus sequens.

Holothurium Uvâ marinâ, seu Ovis Sepiæ fœcundis septum *Barr. Icon.*
1298. n. i. & n. ii.
Holothurium Uvâ marinâ, seu Ovis Sepiæ fœcundis septum *Barr. Icon.*
1298. n. iij.

INTER CRUSTACEA

annumerabo sequentia.

Stella marina, major, spinosior, fusca *Barr. Icon.* 1281. Spinosissima est multiplici aculeorum albicantium & longiusculorum serie, secundum laterum & radorum oras echinata, supinè dilutior paulò & profundo sulco in medio carinata, cujus utrasque crepidines per singula internodia quibus constat, tres spinæ vallant & sepiunt. Dorsum medium totumque spatium

R

inter

inter utrasque singulorum radiorum oras supernè multis & densis granulis grandinatum est; venter verò seu pars inferna paucioribus, in medio spatio quod fulcum inter & latera excurrit ultrò citròque. Tota ejus compages interior ossea est vertebrisque constans per ginglymum sibi connexis & articulatis, corio arenoso, fragili obducta & aculeis sextantem unciae longis, crassis, duris, albis horrida, ac secundum radiorum oras rotundorum sphondylorum serie vallatur duobus aculeis armatorum.

Stella marina, major, aranciata, minoribus spinis echinata *Barr. Icon. 1285*. Superiori magnitudine par est ista; utraque enim pedalis est diametri, crassisque radiis ut ex ruptis particulis in Icone apposis facile est conjicere. Illius radii in angulos acutos centrum versus & caput stellæ coeunt hujus in rotundos & utrique truncum versus & medium fescunciâ latiores, medio palmo longiores, imo palmum longi. Prona illius pars dorsumque in aliam Stellam intumescit ad extremum usque radiorum pertingentem; per oras unico hinc inde sphondylorum ordine vallatur, lateraque numerosâ tuetur spinarum brevium congerie seu totidem palis, quas ad libitum erigit & inclinat ad latus. Quidquid osseis spinosisque vallis intus clauditur ex Aranciato rubet corio obductum grandinoso ac arenoso. Pars supina albescit, medio sulco secundum longitudinem excavata, cujus crepidinem utramque sepiunt ad singulos sphondylos quini aculei, quos inter & orarum spinas protenduntur duo sphondylorum ordines.

Stella marina, media, latè rubens, spinosa *Barr. Icon. 1283*. Decussatis est hæc radiis & usque ad os ferè angusto sinu divisis, in medio tumidis & versus caput & extrema sensim tenuioribus. Tota exiguis horret spinis brevibus, sed densis utrinque toto corpore sparsis; coloris est latè rubentis & velut Aranciati vel Phœnicei, non major medio palmo, diametro inter extrema ramorum sumpto, cætera aliis similia. Supinâ parte sulcata, pronâ æqualis, nullo per oras limbo prætexta.

Stella marina, minor, non spinosa *Barr. Icon. 1295. n. 11*. Species hæc tam venusta, quàm parva, vix fescunciâ longiore diametro, radiisque singulis haud unciae dodrante longioribus, in angulos ferè acutos inter duos radios sinuosa & incisa, per oras angustis squamulis testaceis & alis transversim positis, utrinque pronè & supinè prætexta; supinè minoribus & brevioribus, albâ & arenosâ membranâ tecta, pronè profundè secundum radiorum longitudinem sulcata, angusto in medio & centro quo capit cibum ore donata, ut aliæ species, nullis spinis aculeata, sed quinis duntaxat armata dentibus ad cibos comminuendos.

Stella marina, *δευξάνημος*, fimbriata *Barr. Icon. 1282. n. 1*. Dorso gibboso est & tumido, ore barbato & fimbriato, quinisque velut mystacibus iisque nodosis, cirris fimbriatis, fescunciam longis, surrectis & versus oris hiatum convolutis & crispantibus vallato, quibus seu manibus prædam ori admoveere credibile est, iisque uti, ceu proboscide Elephantis, labio superiore Equus, quos tenuiores, breviores & minus ramosos & cirrosos quàm par fuit, malè & jejuniùs oscitantiusque expressit pictor. E centro medioque ventre quinque radios emittit, qui ipso in exortu statim in alios duos singuli finduntur teretes, densis nodis pressisque circulis & juncturis articulatos; quorum commissura tenerrima est & facilè rumpitur solviturque, tres uncias longos & crebris cirris, crispantibus, nodosis, & articulatis acutis ac velut osseis duriusculisque condylis secundum longitudinem longâ unicâ serie utrinque fimbriatos. De eâ primus egisse videtur *Fab. Col. Observ. Cap. 111*. & post eum *Aldrovand. Lib. VII. de Insect. Cap. xviii*. Ad Ostia Tyberina capta tota colore è croceo rubescit, fragilis & in lanæ floccum statim se contrahit.

Stella marina, *λεπτόκνημος*, spinosa *Barr. Icon. 1282. n. 11*. Hæc tenuibus, rotundis, teretibus caudæ serpentum instar radiis albo fordidis, exiguo corpore & vix lato unciae quadrantem diametro, radiis quinis, quatuor & amplius uncias longis,

longis, vulgari rubentique Verme terræ non crassioribus, binis ordinibus spinarum tenuium, acutarum, pellucidarum utrinque à lateribus armatis singulis sphondylis. Pars supina quinque foraminibus quæ ad exortum quinque radiorum sunt, hiat, quibus singulorum egeruntur excrementa, in quorum medio, quo cibi ingeruntur, os locatum est. Nec enim credibile est eodem meatu ingeri cibos, egeri excrementa, ut quidam censuisse videntur. Planè venusta & elegans est. Pronâ enim suâ parte seu dorso gnarè cælata est quinque cordis figuris, singulis radiorum sinui & divaricationi parte latiori & sinuosâ hærentibus. Alia videtur esse ab eâ quam Aldrovandus *Stellam echinatham Rondeletii* vocat.

Stella marina, ὀφιδόκημος seu ὀφιδέες Barr. Icon. 1295. Stellæ azureæ Aldrov. congener videtur, at longè discrepat ab eâ, ut docet utriusque figuræ inspectio. Nostra enim grisei & lividi est coloris non azurei, tenuissimis radiis & palmi dodrantem longis, rectis & viperinorum fœtuum caudas planè referentibus, squamis similiter vestita susdèque: supinè triplici squamarum ordine quorum medius & angustior tegitur radiis orbem ipsum stellæ pervadentibus & ad os usque ferè pertingentibus. Os in orbis centro ubi stellæ caput in rosæ formam intumescit. Nec minus elegans prona orbis facies quæ uncialis cùm sit diametri, & crassiuscula carnosaque, aream suam eleganti stellulâ exornatur, cujus radiorum extrema quina quinis radiis majoribus respondent, duabus oblongis & aliis majoribus squamis, utrinque una stipata, reliquâ superficie aliis minoribus squamulis ceu opere musivo distincta & depicta: majores porrò radii pronâ parte seu dorso pariter squammosi sunt, triplici serie dispositis squamis, quarum quæ media est latior, laterales angustiores & seu limbo oras prætexantes. Fragilis est adeò ut vix integra in manus veniat piscatorum, seu quod retium plagis incidentes faciliè rumpantur, seu quod sæpè variè sese inflectentes mutilentur. Nullis horret spinis, aut pectinibus aculeatur, radiis enim squamosis, lævibus, rotundis, teretibus, tenuibusque donatur.

Cùriosa de hujuscè Insecti motu progressivo vide in Act. A. R. Par. pag. 485. ann. 1710.



Eruca echinata, marina, griseo fusca Barr. Icon. 1284. n. I.
— echinata, marina, minor Barr. Icon. 1284. n. II.



Cancer quadratus, lividus, μακροκέφαλος Barr. Icon. 1286.
— minor, rhomboides, luteo rubens Barr. Icon. 1287. n. I.



Pagurus niger, βραχυκέφαλος, remipes Barr. Icon. 1287. n. II.



Astacus minor, villosis chelibus, Pediculi marini facie, alter Barr. Icon. 1288. n. I.



Squilla Urfa minor, altera, remipes Barr. Icon. 1288. n. II.



INTER TESTACEA TURBINATA

assignabo sequentia genera.

Murex est Conchæ turbinatæ genus longo amploque patens hiatu, parte unâ oris in alæ modum expansâ, parte verò alterâ in conum abeunte. Species erunt sequentes.

- Murex lævis, minor n. 1. Tab. 1323.
- lævis, minimus n. 2. Tab. 1323.
- fusiformis n. 3. Tab. 1323.
- rugosus, minor & fasciatus n. 4. Tab. 1322.
- dorso rugoso n. 5. Tab. 1323.
- dorso rugoso & tribus verrucarum ordinibus exasperato n. 6. Tab. 1323.



Aporrhais est Conchæ turbinatæ genus à Murice distinctum parte illâ oris alatâ quæ fit digitata, uncinata & in utroque extremo canaliculata.

- Aporrhais Aldrovandi n. 7. Tab. 1322. L' Aragnée.
- polydactylos, rugoso & sinuoso dorso n. 8. 1323.
- pentedactylos n. 9. Tab. 1323.



Buccino-Murex est Conchæ turbinatæ genus Buccino congener claviculâ suâ, sed longiori angustiorique rictu donatum; à Murice distinctum gemino oris labro externè reflexo.

- Buccino-Murex parvus n. 10. Tab. 1323.



Echinophora est Conchæ turbinatæ genus tuberosum, hiatu amplo, interno oris labro externè reflexo.

- Echinophora nodosa n. 11. Tab. 1321.



Buccino-Echinophora est Conchæ turbinatæ genus à Buccino discrepans claviculâ minus productâ, ab Echinophorâ labro oris interno non reflexo.

- Buccino Echinophora rugosa n. 12. Tab. 1321.



Neritoides est Conchæ turbinatæ genus hiatu amplo præditum, labro externo cochlearis ampli instar excavato, dorso ut plurimum secundum longitudinem striato.

- Neritoides variegata, elegans n. 13. Tab. 1322. Concha *νπιραδης*, altera, minor, variegata Col. observ. lxxix. La Cassandre, ou la Harpe.
- Frequentiùs striata n. 14. Tab. 1322.



Strombus est Conchæ turbinatæ genus oblongum, hiatu longo angustoque præditum; columellâ rugosâ, & claviculâ brevi instructum.

- Strombus lævis n. 15. Tab. 1322.
- variegatus n. 16. Tab. 1322.
- labro exteriori crasso & veluti pulvinato n. 17. Tab. 1322.
- minor, angustiori rimâ n. 18. Tab. 1322.

Erythræa



Erythræa est Conchæ turbinatæ genus claviculâ vix conspicuâ donatum, dorso gibbofo; unâ parte prominens, alterâ verò planum & hiatu longo fectum in duo labia denticulata, ferè æqualia, in se introrsum convoluta.

- Erythræa varia, ad hiatum punctata n. 19. Tab. 1321.
 — variegata, & maculata n. 20. Tab. 1321.
 — punctata n. 21. Tab. 1321.
 — maculis fuscis notata, lineâ latâ dorsum percurrente n. 22. Tab. 1321.
 — lituris punctulisque maculosâ, lineâ angustiore dorsum percurrente n. 23. Tab. 1321.
 — maculosa, major, lineâ angustâ supra dorsum serpente n. 24. 1322.
 — oblonga, oculata n. 25. 1321.
 — minor, albicans, interdum flavescens, dorso protuberantiis inæqualibus exasperato n. 26. Tab. 1322. Antalium officinarum quibusdam, vulgò *Coris des Maldives*.
 — minor, variegata & fasciata n. 27. Tab. 1322.
 — omnium minima, rugosa & striata n. 28. Tab. 1322.



Galea est Conchæ turbinatæ genus tuberosum, claviculâ ejus vix se exerente & conspicuâ, hiatu longo, angusto, denticulato, & labro utroque reflexo, & se externè devolvente.

Galea tuberosa & nodosa n. 29. Tab. 1321. *Le Casque*.



Porcellana est Conchæ turbinatæ genus ab Erythræâ distinctum labro externo in se introrsum minimè collecto aut saltem vix convoluto: à Strombo discrepans claviculâ vix conspicuâ & columellâ.

- Porcellana vulgaris n. 30. Tab. 1322. *La Porcelaine*.
 — vulgari similis, utrinque acuminata n. 31. Tab. 1322.
 — vulgari similis utrinque acuminata, minima n. 32. Tab. 1322.
 — Erythræam referens, major n. 33. Tab. 1321.
 — Erythræam referens, minor, acuminata n. 34. Tab. 1322.
 — Erythræam referens, minima n. 35. Tab. 1322.



Persica est Conchæ turbinatæ genus ad Neritoidem & Erythræam accedens, hiatu amplo, inæquali, cochlearis instar excavato, utroque latere rictûs sese internè colligente præditum.

- Persica major n. 36. Tab. 1322.
 — minor n. 37. Tab. 1322. Concha utroque latere sese colligans *Col. observ. l. ix.*

INTER TESTACEA, BIVALVIA ET POLYSTACHIA

sequens genus locum habebit.

Cancellifera est Bivalvium genus pluribus testis, invicem loricatis constans.

Cancellifera, seu Anatifera falsò credita. Concha *περιοσπιδος*, Cancellifera, Anatifera *Barr. Icon. 1296. n. 1.* Basi latâ subtus hiantē, quâ Cancellus rebus quibus innascitur, hæret, in medio ventricosa, extremâ parte acuminata, Episcopalis Mitræ planè formam referens; unciâ paulò longior quæ longissima, R. iij dodrantem

dodrantem vix uncia lata quæ latissima, duabus squamis majoribus partem inferiorem, latera, ventrem basimque duabus minoribus, planis, mucronem quintâ carinatâ dorsum munientibus. Tota Concha nitidè splendens è cæsis albicat testâ tenui, sed durâ; tenuis Cancelli hospita, imò propria domus & congenita in quâ & cum quâ generatur, crescit vivitque. Cancelli hujus longitudo uncialis est aliis congeneribus similis ternis aut quaternis pedibus tenuibus, teretibus, articulatis villosisque, nonnihil incurvis & falcatis, sexunciam longioribus hinc inde donatis præter pedes bifurcatos, crassiores, sed minores, geminos & hispidos utrinque. Unum caput exiguum acutum inter pedes depressum & versus Conchæ cuspidem obversum; cauda illi dodrantem longa, carnosâ, articulata, mollisque nec testis tecta quæ fundo Conchæ hæret. Lignis, carinis, pumicibus, tophis aliisque rebus mari mersis aut innatantibus numerosâ congerie passim innascitur.

Cancellifera cartilagineâ mollique testâ. Concha *μελανοσπράκος*, Cancellifera, Anatifera altera Lobelii *Barr. Icon. 1296. n. 11*. Superiori congener, licet testâ molli cartilagineâ, Bivalvis itidem non tamen Ostracodermos, nec è quinque testis composita. In Uvæ modum aut umbellæ potius racematim totidem pediculis, seu tubulis cartilagineis anulatis & rugosis Laryngis ad instar, quot Conchis dives, adhærent simul quinque aut sex in unum pediculum ejusdem naturæ cavum & cartilagineum convenientes. Eæ coloris sunt albo fusci, compressæ, fructibus Amygdali similes cortice molli & coriaceo, seu cartilagineo, flexili, unciam paulò longiores, & mediâ unciam nonnihil latiores quâ pediculo hærent latâ & rotundâ basi in acutum delincentes, quâ parte sæpius hiant & exerunt pedes senos, incurvos, ad formam caudæ Gallinacæ arcuatim inflexos quos pennarum Anatis rudimenta putant, at delitescantium viventium intus & innatorum Cancellorum pedes veri sunt, cum singula filamenta non ut pennæ alata sint, sed nodosa articulata, rotunda & teretia. Cætera carnem Mitulorum referunt. Hæc ut mollior nonnullis villis erat obsita.

Anates ex hujusce generis Conchis oriri, piscatorum certè commentum est, & credulæ simplicitatis fabula.



K
K Ali.
 Ketmia.

49
 9

L

L Actuca.	93
Lapathum.	101
Larix.	122
Lavandula.	30
Lauro-Cerasus.	125
Laurus.	123
Lens.	70
Leontopetalon.	59
Leonurus.	26
Lepidium.	40
Leucanthemum.	99
Leucoium.	42
Lichen.	117
Ligusticum.	62
Lilac.	124
Lilio-Narcissus.	69
Lilium.	59
Limonium.	65
Linagrostis.	115
Linaria.	21
Linum.	65
Lithospermum.	17
Lonchitis.	116
Lotus.	71
Lunaria.	42
Lupinus.	71
Luteola.	78
Lychnis.	62
Lycopersicon.	17
Lycopus.	26
Lytrophyton.	121

M

M Alacoides.	9
Malva.	8
Mandragora.	1
Marrubium.	28
Marum.	37
Matricaria.	100
Medica.	76
Medicago.	76
Melampyrum.	23
Melilotus.	73
Melissa.	28
Melongena.	18
Mespilus.	125
Millefolium.	101
Moly.	70
Muscus.	117
Myagrum.	38
Myrrhis.	60

N

N Arcissus.	67
Nasturtium.	39

O

O Cimum.	31
Omphalodes.	17
Onagra.	59
Ophioglossum.	117
Origanum.	127
Ornithogalum.	69
Osmunda.	117
Oxys.	8

P

P Anicum.	104
Papaver.	46
Paronychia.	103
Pedicularis.	22
Pelecinus.	77
Persea.	125
Peucedanum.	61
Phlomis.	23
Phytolacca.	58
Pimpinella.	18
Pinus.	122
Plantago.	14
Polium.	33
Polygonatum.	1
Polygonum.	103
Polygoni vel Linifolia.	46
Polypodium.	116
Pseudo-Acacia.	125
Pseudo-dictamnus.	26
Parmica.	101
Pulmonaria.	16
Pyrola.	53
Pyrethrum.	100

Q

Q Uamoclit.	12
Quinquefolium.	58

R

R Anunculus.	56
Rapistrum.	38
Rapunculus.	10
Rapuntium.	20
Reseda.	78
Rhamnus.	122
Ros Solis.	48
Rubeola.	14
Rubus.	124
Ruscus.	1
Ruta.	53

S

S Alicaria.	52
Salicornia.	115

Santolina.	91
Saxifraga.	52
Scabiosa.	92
Scirpoides.	114
Scirpus.	113
Sclarea.	24
Scorzonera.	94
Serophularia.	20
Sedum.	53
Serpentaria.	19
Sideritis.	26
Sinapi.	44
Sinapistrum.	45
Sium.	60
Smilax.	58
Sonchus.	94
Sphondylium.	61
Spiraea.	124
Stachys.	26
Stachas.	30
Stramonium.	13
Symphytum petraeum.	127

T

T Eucrium.	37
Thé.	128
Thalictrum.	56
Thapsia.	61
Thlaspi.	38
Thlaspidium.	39
Thymbra.	29
Thymelaea.	122
Thymus.	28
Tithymalus.	5
Toxicodendron.	124
Tordylium.	61
Trachelium.	15
Tragoriganum.	37
Tragopogon.	94
Tragoselinum.	60
Tribulus.	54
Trifolium.	71
Turritis.	43

V

V Aleriana.	15
Valerianella.	15
Verbena.	30
Veronica.	17
Viola.	77
Virga aurea.	96
Vitis.	124
Vulneraria.	70

X

X Eranthemum.	102
----------------------	-----

Y

Y Uca.	70
---------------	----



TABLE FRANCOISE.

A.		Coquelicoc à fleur double & couleur de chair.	
A Bfinte d'Espagne à feuilles découpées fort menu.	1007	Coqueret à petites bayes rangées comme par anneaux le long des tiges.	160
Acacia.	1384	Coqueret des Indes.	161
Aconit à fleur jaune.	871	Coqueret de Virginie.	162
Aigremoine odoriférante.	604	Coralline.	1327
Amarante.	435	Crapaudine de Candie, à fleur jaune.	254
Ambrosie.	907	D.	
Amelanchier.	1381	D Ent de Lion à feuilles de Velar.	1041
Amomum en grappe.	1353	Dictame blanc.	905
Ancolie.	875	Digitale d'Espagne à petites fleurs rouges.	187
Anemone à fleur jaune.	574	Doronic à feuilles arrondies.	1090
Angelique à tige rouge.	627	E.	
Anthora.	874	E Bene de Candie.	1389
Apocin de Canada.	65	Endive sauvage, épineuse.	1046
Arbousier.	1361	F.	
Aubifoin des montagnes, à feuilles étroites.	964	F Aux Dictame d'Espagne à feuilles blanches & velues.	249
Auronne d'Espagne.	1014	Fleur de la Passion.	477
B.		Fraisier à fleur double.	590
B Alfamine à fleur jaune.	855	Fraxinelle.	905
Basilic ordinaire.	296	Fumeterre d'Espagne.	869
Basilic à feuilles de chesne.	300	Fustet.	1368
Belladone.	785	G.	
Ben blanc.	1399	G Arde-Robe.	1018
Benpoite des Alpes.	588	Grande Centaurée des Pyrenées.	968
Berce.	630	Grande Centaurée des Alpes.	969
Bluet ou Aubifoin des montagnes à feuilles étroites.	964	Grande Gentiane à fleur pâle.	7
Boucage.	615	Grande Gentiane à fleur purpurine.	9
Brunelle d'Italie à fleur couleur de chair.	239	Grande Joubarbe des montagnes.	550
Bugle.	349	Guimauve Arbre.	69
Buglose sauvage.	136	H.	
Buiffon ardent.	1379	H Erbe aux Mittes, à fleur blanche.	158
C.		Herbe aux verrues à grandes fleurs.	151
C Alament de montagne à fleur purpurine.	265	Herbe sans couture.	1279
Camomille du bord de la mer.	1110	Hormin.	225
Campanule de montagne à feuilles étroites.	77	Houx Frelon à feuilles larges.	4
Capillaire de Canada.	1269	J.	
Cardinale couleur de feu.	185	J Acée de Portugal.	952
Cassie.	1366	Jacinte à fleur simple.	693
Cataire d'Espagne.	289	Jacinte à fleur double.	695
Cedre.	1345	Jacobée ordinaire.	1076
Ceterac ordinaire.	1271	Jacobée vivace.	1075
Chardon à feuilles d'Acante.	909	Jasmin de Virginie.	186
Chicorée épineuse.	1056	Jasmin Jonquille.	1359
Chiendent.	1154	S	
Choux Caraïbe du P. du Tertre.	173		
Ciguë de montagne.	612		
Cioutat.	1371		
Colchique à fleur blanche.	706		
Concombre de mer de Rondelet.	1312		

Immortelle ou Stœchas citrin ordinaire. 974
Jonc. 489
Juliane qui n'a point d'odeur. 405
Jusquiame de Candie. 107

L.

Laitron qui croist au bord de la mer. 1048
Laitue sauvage, épineuse. 1046
Langue de Serpent. 1279
Lavande à feuilles découpées. 282
Laurier Alexandrin. 6
Laurier Cerise. 1377
Laurier Royal. 1338
Lentille du Bresil. 795
Lilac de Perse. 1365
Lin à feuilles larges, & à fleur blanchâtre. 670
Linaire odorante, à fleur couleur de pourpre. 201
Liseron de Portugal à fleur bleuë. 28
Lis Martagon de Canada. 778
Lonkite. 1263
Lotier hemorrhoidal. 803
Lupin à fleur jaune. 800

M.

MAndragore femelle. 1
Maniguette. 1394
Marguerite des Indes. 1097
Marrube d'Espagne à feuilles foyeuses & argentées. 263
Matricaire à feuilles de Tanaisie. 1106
Mauve d'Italie à grande fleur purpurine. 66
Mayenne ou Melongene à fruit long. 164
Mayenne à fruit rond. 165
Meleze. 1344
Melisse d'Italie, veluë & moins agréable que la vulgaire. 264
Morille rouge. 1291
Morille jaune. 1292
Mourron d'Espagne, à grandes fleurs. 154
Mufle de Veau à fleur pâle. 190

N.

NApel. 873
Narcisse à fleur blanche, ou *totus albus*. 712

O

OEil de bœuf. 1113
Orpin à fleur purpurine. 560
Orpin de Portugal, à fleur blanchâtre. 561
Ozeille d'Amerique. 1128

P.

PAnache de mer de Rondelet. 1213
Panis de Marais. 1151
Patience à feuille de Gaud. 1130
Pavot épineux. 476
Pediculaire à feuilles du petit Chefne. 206
Perce-feuille annuelle. 621
Petit Basilic. 311. 312

Petit Basilic violet. 313
Petit Cypres. 1018
Petit Houx à feuilles larges. 4
Petite Bistorte. 1150
Petite Centaurée à fleur blanche. 110
Petite Feve. 799
Petite Verge dorée des montagnes. 1069
Pié de Lion des Alpes à feuilles & tiges veluës. 1139
Picea. 1342
Pimprenelle à feuille d'Aigremoine. 167
Pimprenelle de Canada. 166
Pimprenelle épineuse. 168
Pin sauvage. 1343

Q.

Queuë de Pourceau. 519

R.

RAiponce. 88
Raisin de Corinthe. 1370
Renoncule du Levant, à fleur simple. 575
Renouée à feuilles étroites. 1141
Reprise à fleur purpurine. 560
Reprise de Portugal à fleur blanchâtre. 561
Ronçe de Canada. 1375
Ronçe de S. François. 1373
Roquette sauvage à feuilles de Tabouret. 422
Rose de Cayenne à fleur double. 74

S.

SAbot de Nostre-Dame. 906
Saffran d'Italie à feuilles larges. 708
Salicor. 1268
Scabieuse d'Espagne à feuilles entieres. 1031
Scrophulaire à fleur jaune. 188
Seau de Salomon à fleur odorante. 3
Serpentaire. 178
Soude veluë d'Espagne. 502
Stœchas citrin ordinaire. 974

T.

Terre-noix. 613
Thé ou Té. 1403
Thim de Crete. 270
Thim d'Espagne. 278
Titimale, Arbre. 37
Titimale doux. 45
Tubereuse. 705
Tulipe du Cap de Bonne Esperance. 792

V.

Valeriane bulbeuse de Candie. 132
Veronique mâle, droite. 155
Verveine de Canada, à feuille d'Ortie. 284
Vigne vierge. 1372
Violette de Mars sans odeur. 856
Viperine à feuilles de Plantain. 145
Vulneraire. 796

P R I V I L E G E D U R O Y

L OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Grand Conseil, Prevost de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : Salut. Nostre Academie Royale des Sciences Nous ayant très-humblement fait exposer, que depuis qu'il Nous a plu luy donner par un Reglement nouveau de nouvelles marques de nostre affection, Elle s'est appliquée avec plus de soin à cultiver les Sciences qui sont l'objet de ses Exercices ; en sorte qu'outre les Ouvrages qu'Elle a déjà donnez au public, Elle seroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaisoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilege, attendu que celles que Nous luy avons accordées en date du 6. Avril 1699. n'ayant point de temps limité, ont été déclarées nulles par un Arrest de nostre Conseil d'Etat du 13. du mois d'Aoust dernier. Et desirant donner à ladite Academie en corps, & en particulier à chacun de ceux qui la composent, toutes les facilités & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leur travaux utiles au public ; Nous avons permis & permettons par ces Presentes à ladite Academie, de faire imprimer, vendre & debiter dans tous les lieux de nostre obéissance, par tel imprimeur qu'Elle voudra choisir, en telle forme, marge, caractère, & autant de fois que bon luy semblera : *Toutes les Recherches ou Observations journalieres, & Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Assemblées de l'Academie Royale des Sciences ; comme aussi les Ouvrages, Memoires ou Traitez de chacun des particuliers qui la composent, & generalement tout ce que ladite Academie voudra faire paroistre sous son nom, lors qu'après avoir examiné & approuvé lesdits Ouvrages aux termes de l'article xxx. dudit Reglement, elle les jugera dignes d'estre imprimez : & ce pendant le temps de dix années consecutives, à compter du jour de la date desdites Presentes.* Faisons très-expresses défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition que ce soit, d'imprimer, faire imprimer en tout ni en partie, aucun des Ouvrages imprimez par l'Imprimeur de ladite Academie ; comme aussi d'en introduire, vendre & debiter d'impression étrangere dans nostre Royaume, sans le consentement par écrit de ladite Academie ou de ses ayans cause, à peine contre chacun des contrevenans de confiscation des Exemplaires contrefaits au profit de sondit Imprimeur, de trois mille livres d'amende, dont un tiers à l'Hostel-Dieu de Paris, un tiers audit Imprimeur, & l'autre tiers au Dénoncateur, & de tous dépens, dommages & interets : à condition que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs-Libraires de Paris, & ce dans trois mois de ce jour : Que l'impression de chacun desdits Ouvrages sera faite dans nostre Royaume & non ailleurs, & ce en bon papier & en beaux caractères, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les exposer en vente il en sera mis de chacun deux Exemplaires dans nostre Bibliotheque publique, un dans celle de nostre Château du Louvre, & un dans celle de nostre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Presentes ; du contenu desquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Academie ou ses ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie desdites Presentes qui sera imprimée au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers-Secretaires, foy soit ajoutée comme à l'original : Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & necessaires, sans autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : C A R tel est nostre plaisir. D O N N É à Versailles le neuvième jour de Fevrier, l'an de grace mil sept cens quatre, & de nostre Regne le soixante & unième. Par le Roy en son Conseil, **LE COMTE.**

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, Numero cvi. page 136. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Conseil du 13. Aoust dernier. A Paris ce 13. Fevrier 1707. P. E M É R Y, Syndic.

Je consens que Monsieur Ganeau fasse imprimer, & qu'il se serve du Privilege que l'on m'a cédé pour les Ouvrages de l'Academie des Sciences, le Livre intitulé *Icones & Descriptiones Plantarum per Galliam, Italiam, &c. à Barreliero observatarum, in-folio*, avec des Planches en Taille-douce. A Paris ce 23. Octobre 1713. **R I G A U D.**

Registré sur le Registre Numero 3. page 667. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du 13. Aoust 1703. A Paris ce 5. Novembre 1713. L. J O S S E, Syndic.

E R R A T A.

In Indice Auctorum. sub titulo Flor. Pruss. quas. pro Lozelii præficit, lege Loesclii præfixit.

In Observationibus. Cuilibet citationi mensis, in quâ mensis vox deest, addatur. Quoties Caricta, toties lege Carecta. Ubi Stachas, Stæbe, lege Stachas, Stoebe. Character, lege Character.

N°. 8. lin. 5. æquanti, lege æquante. N°. 35. lin. 3. multifidus, lege multifidus. N°. 44. lin. 5. subineana, lege subincana. N°. 45. lin. 3. Timale, lege Titimale. N°. 223. lin. 12. filiorum, lege foliorum. N°. 239. lin. 3. latifolia, lege lata. lin. 9. late, lege latè. N°. 245. angusto, lege angusto. N°. 248. lin. 1. actabulis, lege autabulis. N°. 260. lin. 2. foetidissima, lege foetidissima. N°. 279. lin. 2. venticillatum, lege verticillatum. N°. 280. lin. 3. sylvestra, lege sylvestre. N°. 335. lin. 10. fabuloso, lege fabuloso. N°. 339. lin. 4. capitat, lege cespitat. N°. 364. lin. 1. fructicosum, lege fruticosum. N°. 407. lin. 10. tetrapeta, lege tetrapetali. N°. 480. lin. 6. pentapetolo, lege pentapetalo. N°. 505. polyspermon, lege polyspermos. N°. 543. Androsocum, lege Androsæmum. N°. 669. lin. 3. lusu, lege lusus. N°. 689. Πολυκλάσιον, lege Πολυκλάσιον. N°. 711. la Narcisse blanche, lege le Narcisse à fleur blanche. N°. 714. la Narcisse, lege le Narcisse. N°. 852. lin. 3. obtusiora, lege obscuriora. N°. 860. lin. 4. atropurco, lege atropurpureo. N°. 1066. pag. 96. lin. 3. folis, lege foliis. N°. 1109. lin. 2. Tenacetum, lege Tanacetum. N°. 1177. pag. 107. lin. 1. Alocuperoides, lege Alopecuroides. N°. 1339. lin. 3. tophaceaqué innascens, lege tophaceaqué corpora innascens.

In specimine Insectorum marinorum, in secundâ holthurii specie pro Ovis sepia fecundis, lege Oves sepia sterilibus septum.

Ad 5. speciem Erythraa maculosâ, lege maculosa.

In Iconibus autem qua reperiuntur errata, emendantur in Indice generali earundem Iconum; sicuti & errata qua in numeris irrepere potuissent, delentur in eodem Indice generali.

Ceteris Lector benevolus pareat.

ÍCON:



Gramen Cyperoides Typhinum latifolium minus.



Gramen palustre locustis Erucae formibus.



*I. Gr. Sparteum alopec. spica sericea grumosa.
II. Gr. Sparteum alopec. spica sericea plumosa typhura.*



*Gramen Scirum seu Alopecurum minus
heteromalla panicula.*



Gramen Loliaceum iunceum maius.



Gramen Loliaceum iunceum minus.



Gr. Miliaceum aquat. Brizæ locustis sem. rufo.



Gr. palustre Arundinaceum Mily panic semine Phalaridis.



I. Gr. Phalaris mai aceros erecta panis paniculata
II. Gr. Phalaroides Verius bulbosa radice.



Gr. Typhium Phalaroides aruense bulbosa rad.



Gramen prat. alopecour. sericea panic.



Gramen pratense, vinceum, nutante, ampla, sparsa, et borbicaria panicula.



I. Gr. *Sparteum longa et spicata panic. Loli. Viricul. Festua potius manus*
II. Gr. *Sparteum Alopecuroides spica sericea.*



I. Gr. *Lophium longiss. spica phalar. mollis, alba.*
II. Gr. *Lophium minus spica phalar. durior, subrusca.*



I. Gr. *Phalaroides minus ferrugineo nutante panicula.*
II. Gr. *Phalaroides minus erecta collectaque panic.*



Gr. *Temulum seu Phalaroides minus lata sparsa panicula.*



I. Gr. Sparteum Bromoides longioribus et erect. Vtric.
II. Gr. Spart. Bromoid. brevior. Vtric. nutante panic.



I. Gr. Sparteum Bromoides panicula spicata maj. Vtricul.
II. Gr. Sparteum Festucetum seu Acgilops. Spartea villosa.



Gr. Sparteum Cyperoides echinata spica nemorum maius.



II. Gr. Cyperoid. echinata et rara spica nem. minor
III. Gr. Cyp. palust. echinata spica medium.



Gr. typh. spica conoide striata cul. violac. I.
Gr. typh. unceum perenne. II.



Gr. Typh. pratense tuberos. spica. aspera. II.
Gr. typh. aturadic tube. spic. aspe. longuo. I.



Gr. tremulum seu Phalaroides majus erecta Panic.
Irisum II Citrinum.



Gr. Phalar. majus acerosum nutante spica. I.
Gr. Phalar. minus erecta spic. Obliq. aristis. II.



Gr. Sparteum spicata Brizæ panicul et corniculata



I Gr. Spicati fol. aspero spica grumosa long. II. breuiore.



Gr. Tiphinum Plantag. spica glum. digitat. heteromallon.
I. majus. II. minus.



Gr. minimum spica globosa echinata. I.
Gr. Typh. panicum vtriculat. amplo vtric. II.



Mandragora foemina flore ceruleo



Malum Aethiopicum fructu luteo An Mandragora Theophr.?



Aquilegia cornicul. fl. albo minore.



Aquilegia cornicul. fl. caeruleo minore





Filix Florida minor hisp.



Polypodium majus Serrato folio



Geranium Batracoides fl. purp. reflex. Italicum.



Geranium mont. rotundifol. perenne flore purp. majori



Fumaria tenuifolia erecta purpurea hisp.



Fumaria Henneaphyllos hisp. saxatilis fl. varia



*Gr. Eranthemum seu Epoxystis phalar. paniculatum
multiplici et tenui Bryze sepea.*



*Gr. Thalargoides sparsa panic. minus angustifol. I.
Gr. Phalar sparsa Brizae panic minus. II.*



Gr. Cyperoides latifolium typha pendula longiore.



Gramen sparteum pennatum maius.



Gentianella Helvetia amplo azureo fl.



Gentianella annua azureo flore



Gramen aruense filicina duriori panic: gracilius



Gramen aruense Polypodij panicula crassiflora



I. Pneumonanthe Cordi quoad fig.
II. Gentiana miranda Maith.



I Gentianella seu Campanula prat. Lugd.
II Gentianella seu Calathiana Viola Lugd.



Gr. Typhium supinum tuberos. spica aspera.



Gr. aquat. Typhium supinum italicum minus.



Spondylium glabrum montanum albo flore



Spondylium vulgare folijs acute incis



Gallium album minimum ἑρπυλλοειδὲς



Aparine minima flore albo



Gelsemium Clematis flore igneo amplo seu Virginianum



Convolvulus pinnato folio muriceo Gelsemini flore



61
Gelsemium arantii folio, flore alba duplici, odoratissimum seu Alexandrinum.



62
Gelsemium trifolium, odoratissimum sempervirens, exoticum seu Indicum.



63
Gentiana mai Vulg. pallido et paruo flore.



64
Gentiana mai purpureo flore i Clus.



Gentiana minor cruciata flo. caeruleo erectior



Gentiana min. cruciata flo. purpureo supina.



Geranium Hematodes purpureum parvo flore Ital.



Geranium noctu odorum Indicum; Geran. triste Cornuta



Gentiana Alp. mai flo. aureo et purp. obsoleto



Gentiana Asclepiadis folio



Eupatoria folijs Enulæ seu latifoliæ



Apocynum minus rectum canadense



Gnaphalium mai. album repente, et cespitosa radice.
I



Gnaphalium mai. fl. citrino amplo.
II



Festuca graminea glumis hirsutis, erectior.
Festuca Dumetorum Viriculis lanugine flavescent.



Bromus sterilis erecta panicula maior.
Gramen Bromoides festuca tenuia panic. min.
I



Ferula durior seu rigidis et brevissimis fol.



Peucedanum Ital. longioribus fol seu Maius



Kali minus tenuifol incanum fruticosum siculum.



Dentaria mai. et pullos Orobanche facie.





Esula minor πολυχλῶνος aculeata



Pituisa frutic angustis acutisq. folijs minima



Geranium minus Saniculae fol. albo flore.



Ranunculus albus Apenninus Saniculae mai fol.



Fragaria flore pleno fructu rubello



Fragaria spinosa fructu



Gentiana caerulea punctata annua.
Pennae. XII. Clusij.



Gentiana concaua Anglica Gerar.



Gr. Bufonium supinum mollius seu Umbellatum.



Gr. Bufonium glomeratis Vtriculis.



I. Gr. Auenaceum angustifol panic. pyramidalis
II. Gr. Auenac. lufifol. min. sparsa panicula.



I. Gr. Auenac. longa erecta panicula violac.
II. Gr. Auenac. tenui spicataq. panic. albis vtric.



I. *Gentiana caerulea fimbriata angustifolium* autumn Col. II. *Gentianella purp. minor* Col.



Gentianella alp. verna minor. Subrotundo folio flore caeruleo.



I. *Gramen fistucium myurum min. spica heteromalla.* II. *Gramen fist. myurum clatius, spica heterom. gracili.*



Gramen exile unguem mollius, festuca panicula, radice rufa.



I. *Gentianella autumn. serpillifolia* Bauar. mai.
II. *Gentianella aut. serpillifolia fl. crenato* Bauar. min.



Gentianella autumn. annua caeruleopurp. multiflo.



I. *Gentianella fugax aestiva caerulea minor.*
II. *Gentianella fugax aest. stellata caerulea min.*
III. *Gentianella fugax Clux*



Gentianella fugax Alpina flore aurco



105
*Gentianella Alp-Lato, rotundiore fol. fl. amplo
reflexo colore azureo*



106
*Gentianella Alp-Lato acuto fol. fl. minus patulo
albo est: et caeruleo et caesio*



107
Fumaria tuberosa insipida, Canadensis



108
*Fumaria siliquosa semper virens Canad. flore
carneo, rictu aureo*
D.L.



I Gentianella minor. Verna caerulea stellato flore Clus.
II Gentiana min. caeruleo stellato, et p. oris crenato fl.



I Gentianella min. ex & d. viol. et max. Convolvuli flore
II Gentianella min. purp. Viola Mariana flore



I Gr. Hordeaceum minimum. H. Zea Briza barbata
III Zea Diosc. multiflora πολύσπερος min.



I Gr. Hordeacei siccum mai. ciliaribus glumis, durius.
II Gr. Secalinum bulbosa radice seu ex Alepo B.



I. Gr. Cyperoides latifol. typha erecta minus.
II. Gr. Cyperoides angustifol. typha nutans minus.



I. Luncus repens & xox & p. minor botroides
II. Luncus repens grumosa, et echin-spicata



I. Gr. Alopecurū minus spic. Viresc. diuisa.
II. Gr. Alopec. mai. spica Viresc. diuisa pilis longior.



Gr. Alopecorū molle spica inaeq. I. acuta minor
II. obtusa maius.



I. *Gr. Junceum nodosum minimum capillare.*
II. *Gr. Junceum spicatum minus.*



I. *Hunc gram. Cypri rud tenuis fol. elatior.*
II. *Hunc gram. minimum capillari fol. apice squam.*



Kali Vermiculatum albo globoso flore



Kali Moluginis folio Umbellatum.



Gentiana autumn-min-ann-fl. caerulea cruciata
ad latera pilosiorum Fugax



I. *Pneumonanthe* Lob. Dod. Chusy. Geror.
II. *Gentianella caerulea cordata* Col.



I. *Gr. alopecurum viridi et molli spica*.
II. *Gr. alopecurum spica aspera*.



I. *Gr. alopecurum spica glumosa luc. Vilis crisp.*
II. *Gr. Myurum spica e viridi albescente*.



Lilio-Mariagon Canadense lutei maculis purp.



Lilio narciss-Ind polyanthes cocineus minor.



III. Gnaphal. ros. supin. caulis. IV. Roseu hortens. seu II. lat. fol. et B. VII. Gnaph. Leontop. erectum Gnaphal. Leontopodiu supinum IV. Roseum I. C. B.



V. Gnaphal. ros. supin. serpilli. fol. VI. Gnaph. erecti angustifol. VII. Gnaph. bombianum serpilli fol. minim. VIII. Gnaph. Leontopodium erectum.

129



Dytamnus falsus Verticillat Pericarpio
choanoide Cret.

130



Dytamnus Creticus Verticillatus odoratus

131



K. I

Eruca Vininea Iberidis folio luteo flore

132



Eruca Sylvestris flore albo Italica

133

*Dorychnium luteum hisp-carnosius*

134

*Dorychnium luteum majus*

135

*Endivia major Lactucina spinosa*

136



L. I

Endivia minor Lactucina spinosa



Iacea hisp. latifol. nervis fol. lanuginosis.



Stoebe Pinea amplo capite.



Iacea min. purp. parvus è integris fol.



Iacea tenui fol. purpurea hisp.







Solanum mai vesicarium coralloides



Solanum maius racemosum



Solanum Vesicarium annuum erectum



Solanum Vesicarium annuum procumbens.



Jacobaea incana repens herba



Marrubium aquaticum incanum profunde incis. folijs



Sisymbrium mont. tenuifolium fl. muscoso purpureo



Sisymbrium mont. latifol. flore purpureo



Conysa marina tuberosa




Conysa mont-Saxat. Hissopi folio uilloso et glutinoso, hisp.



Jacea minor globularia folio flore purp. hisp.



Jacea minor hieracii folio capite spinoso hisp.







Hyacinthus caeruleus pleno flore praecox Ital. Fiorentino



Hyacinthus caeruleus plenissimo flore Serotinus Ital. Stradoppio



Sideritis montana trifido folio



Sideritis montana Hyssopi folia minor



Hyacinthus purpurouiolaceus, serot. semi duplex οὐδ' ὁμοῖος
Ital. Comosus.



Hyacinthus roseus caeruleus fl. duplici.



Hyacinthus Orient. parvus fl. caeruleus. Πολυανθός. Serot.



X.1

Hyacinthus caeruleus, caule folioso



*Iacea pumila incana cespitosa latiusculis.
foliolis.*



Iacea pumila incana cespitosa tenuifolia.



*Iacea pumila incana tenuifolia capite spinoso
erecta.*



*Iacea pumila incana tenuifolia capite spinoso
supina.*



Iacea pumila tenuifolia supina capite breui spinoso.



Iacea pumila tenuifolia supina capite breui non spinoso.



Hyacinthus Stellatus caeruleo-violaceus Campanulatus.



Hyacinthus Stellatus caeruleus Borraginis flore.



Horminum Sylu. maj. hamatodes glabrum fl. caeruleo



Horminum Sylu. maj. hastato fol. fl. caesio hisp.



Horminum Sylu. maj. fl. albo integri folijs



A. 2. Aethyopsis fasciniatis folijs



Helichrysum trifidum folijs hisp- majus



Helichrysum trifidum hispanicum minus



Kaly polygonoides frutex Polyspermum



Kaly geniculatum

B.2.



Faba minor.



Lens Brasiliensis minor. fl. subteruleo-



1. Erucula hirsuta floribus albis. 2. Erucula flore rubello hisp.



Erisimum s. praeox flore carneo.



E. fula fruticans, Seu Pithyusa Romanorum.



Tithymalus nemorosus Villosus mollior.



Hormimmon sylv. hirsutus L. anapsanæ fol. fl. caesio.



Hormimmon subrotundo folio flore caesio hisp.



Solidago Maxima Americana



Scordium Spinosum odoratum Annuum.



I. *Iuncus marit. spica subrot. glumosa.*
II. *Iuncus marit. Sorghi panicula viriculata.*



I. *Iuncus caeruleus reflexo min. panicula maiore.*
II. *Iuncus caeruleus reflexo min. panicula minore.*



Kali Vermiculatum, hisp. incanum fruticans



Kali Vermiculatum hisp. Viride fruticans



Horminum minus subrotundum scabro folio.



Horminum syl. minus inciso folio fl. azureo.



Hieracium purp incisis folijs mont.



Hieracium purp integris folijs montanum.



Esula minor myrthifolia longius radicata



Esula rotundifolia serrata carnosior

G. 2.



1. *Draba seu Arabis latifolia* flore albo.
2. *Draba angustifolia Babilonica* fl. albo.



1. *Thlaspi Creticum mont. luteum* Leucoj flore
2. *Thlaspi Creticum perenne* flore albo.



Kali geniculatum aphyllantes giluis
paleaceisq. flosculis hisp.



Kali Vermiculatum fruticans minori folio hisp.

H. 2.



Jacobaea Cretica incana integro limonij fol.



Jacobaea Cretica argentea folijs incisus seu Argentea P. Alpini



Heliotropium medium Strigosius Ital.



Horminum syl. intiso folio, caesio flore Ital.



Scabiosa peregrina integris seu Bellidis fol. altera



Scabiosa peregrina integris et acutis folijs



Sanamunda argentata latifolia



Sanamunda argentata angustifolia

K. 2.





Jacobaea Doronici folijs et flore montana



Ionodraba Alyssoides lutea angustifol.



Sanamunda vermiculata παχύσελεχης



Sanamunda media angusto brevioris folio



Sanamunda 3 Clus- Erica Alexandrina Lob.



Chamaelea pumila Saxat. fl. pallido Ital.



lacea marit cinerea, cap. purpur. spinoso media



N. 2.
lacea marit incana folio integro, caule folioso,
cap. purp. spinoso min. 20



*Hieracium, seu Taraxacum tenui folium
saxatile Italic.*



Hieracium incanum tormentosum integro folio.



Hyssopus mont. verticillata major.



Hyssopus mont. verticillata minor.



Seseli subrotundo selini folio fl. luteo Italic.



Saxifraga rotundifol. fl. albo annua Italic.



Saxifraga mai Germ. folijs altius incis.



Bulbocastanum alterum caule firmiore



Scabiosa maritima Rutæ Caninae fol.



Scabiosa angustifolia glabra



Hyoscyamus Indicus Solani folio flore atropurpureo Corlaui



Hyoscyamus Creticus sulfureo flore medio atropurpureo





I. *Iondraba Apula Alyssoides spicata*
II. *Leucolum Alyssoid umbellatum* mont. F.C.



Ionthlaspi Alyssoides angustifol luteum



II. *Juncus gram Cyperi rad. rufacthos spica*
III. *Juncus min. globoso singulari capitulo rad. toment*



I. *Juncus marit min. glumosa et parva fusca Phalarid spica*
II. *Juncus maritimus minor graciliore spica*





Jacobaea maritima minima glabra Senecione foliata



I. Jacobaea Alp incana minor
II. Jacobaea minor Abrotani folijs



I. Cram. Bufonium erectum latifol.
II. Gr. Ruscium erectum angustifol. min.



Gr. Bufonium erectum angustifolium maius.



*Jacobaea mont. croceo amplo singul. flore spatul.
le fol. elatior.*



*Jacobaea mont. polyanth. fl. aureo fol. longis, et
Integr. Italica.*



Jacobaea mai Arthemisiae fol. incana dat non rep.



Jacobaea linifolia Italica



Draba angustifolia I. minima II. media



Draba angustifolia major



Juncus bulbosus maritimi floridus siliculosus.



Gr. murale junceum min. ally rad. panicula lanthina non crispa.



273

Scrophularia mont. maxima latifol fl. luteo.



274

Scrophularia aquat. mont. mellior.



275

*Euphrasia rotundifolia torte Alsine An Anthyl.
lides rotundifol*



276

*I. Euphrasia Vulg vera flore albo
II. Euphrasia sylu mai purp. latifol. atro pur.*



*Chrysocome muralis paucioribus congestis fur-
cis capitellis.*




Chrysocome maior rosmarini folio.



Stachys alba angustifolia Salvia folio



Stachys alba latifolia minor.





Cistus minor Thymi folio flore ferrugin.



Cistus minor breui Vermiculato folio hisp.



Cistus halymi minoris folio.



Cistus lauridula latifolia folio.









Stoechas Arabica caulesol. flore albo, hisp.



Thymum cephalotum hisp.



Crocus autumnalis flore albo verus.



Colchicum autumn. angustifolium album.
An. Hermodastilis verus!

G. J.



305
Stoebe fruticans incana Hyssopi folio maior.



306
Stoebe fruticans incana breui Hyssopi folio capite tereti et cirroso



307
Stoebe angustifolia intybaceis dentatisq. imis folijs.



308
Stoebe linifolia capite spinoso



Stoebe mont-nivea capite cardui Subrotundis folijs lobis.



Stoebe montana incana muscata acutis foliorum lobis acaulis purpureo flore



Coniolum minus Spica folijs hisp-



Coniolum betonica allhea q folijs repens argenteis fl-









325

Buglossum sylv. angustifolium.



326

Buglossum sylvestre.



327

Cistus humilis compactis in verticillis minoris thymi fol.



328

Chamæcistus mas flore rubello Thymi folius

N 3





Buglossum syl. minus fl. azureo radice perenni Ital



Cynglossum mont. minus angustifolium purpureu



Gynocrambe Alsinefolia



Portulaca Batia luteo flore spuria aquatica



Bugla minima glabra flore azureo



Bugla media flore caeruleo



Betonica montana lutea



Betonica Alpina incana purpur.



Senchus marit. angustifolius asper.



Pulmonaria Gallorum rotundifolia laevior.



Sideritis mont. Scordioides glabra



Sideritis mont. uermiculato folio



*Carduncellus purpureus tenui folius
singulari flore.*



*Carduus Stellatus, lucus, aculeatis, et
profunde incisus folijs.*



Stoebe tenuifol incana paruo capite Cretica



Stoebe tenuifol incana magno capite Italica



Sphondylium minus Syriacum



Oreoselinum rotundifol. hisp.



Coris lutea ericoides fruticans hisp.



Hyppocum Clus tenuifolium fl. pallido



Brassica syl. albido flore, nutante siliqua



Anonis non spinosa purpurascens minor, Italia.



Rubia marina strigosior flore rubello



Rubia laevis linifolia floribus albis



*Cacalia verior, Vrticæ fol. purpurascens
Leucosy flore.*



Cacalia Vrticæ folia flore albo.



Stoebe tenuifolia erectior Hisp.



*Stoebe minor laxioribus et longioribus capitulis
squammis*



Conyza mont. Bellid. fol. croceo flore singul. Ital.



Conyza mont. incana villosa fol. acuto flore aureo non singul.



Calamagrostis Nasloides Auenacea panicula



Gr. Canin praten paniculatum olumis Asparagi foliis similibus mucronis sylu.



Cistus Oleæ folio Villos flore aur Italicus



Cistus Serpilli folio Villos flor. pallido Italic.



Chrysocome cetrina supina latifolia Ital.



Stoechas citrina spuria longioribus folijs.



*Conyza minor fruticans Viridi Stoechadis Citrina
folio flore folioso luteo ital.*



Conyza minor Vera lob. lutea.



Sphondylium Vulgare flore albo.



Panax Heracleum albo fl. altius incisus acutioribus q. folijs.



Sedum mont. serratum roseum flore purpureo



Sedum mont. umbilicatum incanum min. fl. saure purp.



*Grateogonum pumilum luteum
absinthii fol. hisp.*



*I. Carduus Crispus Th. II. Grateogonum hisp.
III. Crinqueum pumilum Amethystinum*



377

Barba Iouis Cynisifolia fl. rubel seu altera Anguill.



378

Barba Iouis lenifolia incana fl. lut. I. Anguill.



379

Lychnis Ocyroides muscosa strictiore folio



380

Lychnis Ocyroides muscosa Latifolia.

C. f





Stoebe montana tenuifolia folijs et capite spinosis Ital.



Arctium mont. min. incano Taraxaci folio.



Rapistrum maxymum novg. αραβ. gemma lutea flore nitida.



Bellis ramosa Umbellifera Canad.



Cyanus mont. medius caule folioso se multifolius.



Lacea purpurea inyhacea brecciori folio.



*I. Sedum mont. roseum minus reticulatu.
II. Sedum maius non reticulatum, flore
purpureo mont. angusti fol.*



*Sedum roseum Soratum. I. Longius radiculatum.
II. Acute fol. III. Curuo folio. IV. Obuso fol. V. Ma*



Sedum mont. roseum minus reticulatum



Sedum maius non delictatum fl. purp. mont.



Rubus non spinosus mai. fruct. nigr.



Chamærubus Odoratus Vitis folio Canadensis







Stachys fruticosa repens purpureo floro.



*Stachys fruticosa vulg. fl. aur. seu Verbascum
Salutifol. fruticosa fl. luteo.*



Conyza maior Chrysocomes folio.



*Chamaechrysocome praelongis purpurascensibusque
laxe capitulis.*



Chrysocome mollior singulari minoris capitello.

Conyza minor Chrysocomes folio.



Chrysocome media seu Stoechas citrina vulgaris.

Chrysocome seu Stoechas citrina minor.

L. 4.



Carduus Sphaerocephalus caeruleus minor



Carduus Sphaerocephalus latifolius caeruleus major.



Carduus Sphaerocephalus caeruleus capite ferrugineo major



Carduus Sphaerocephalus caeruleus capite ferrugineo minor.





Cicer mont. fruticans incanum angustifolium serrul. minus



Cicer mont. fruticans incanum latifolium caule tortuoso et tomentoso
flore purpureo hisp.



Chrysanthemum pallidum minimis imbricatis foliis Superi-
oribus integris et capillariis.



Leucanthemum fruticans pinatis Superi-
oribus Quamoclit folijs
imbricatis et tomentosis.



Centaurium minus purp- angustifol-



Centaurium minus vulg- flore albo, latifol-



Chrysocome latifolia minima Singulari flore



Chrysocome latifolia maior Singulari flore.



Althaea rugosior rubro flore hisp-



Althaea fruticans incana minore folio hisp-



Ravatera maritima Gouan?



Abrotanum foem- hisp- tenuifolium urens.



Abrotanum foem- tenuifolium incanum hispanicum









443

Chamæcistus luteus Thymi folio polyanthos Seu maior



444

Chamæcistus luteus Thymi folio ὀλιγάνθος Seu minor.



445

Chamæcistus luteus Vermiculato folio, maj-



446

Chamæcistus breui uermiculato q1 folio, minor, hisp-

V. 4



Abrotanum mas tenuifolium lati. hisp. facie. ωδισσω ερμω.



Abrotanum tenuifolium incanum minimū.



*Chrysanthemum Valerianum seu tenui folium flore aureo
ἀφ' ἁλλω.*



Chrysanthemum tenuifolium flore bullato, aureo.



Chrysanthemum maj. latiori Chamædi folio fl. aureo folioso, italicum



Chrysanthemum tenuifolium flore cæteo, aphillo, minore.



Campanula saxat. rotundifolia hispida fl. cæzio, amplo, ital.



Campanula minor Alp. fol. Cochleariæ.





Abynth minus oblongis dentatis folijs cineritius hisp.



*Abynth. pumilum palmatum minus Argenteo Sericeisq
folio hisp.*



Abynthium minus maioribus altiusq. incis folijs cineris hisp.



Abynthium minus tenuifol. alt. incis fol. cinereu Salsu hisp.







Alcea Veneta, seu vesicaria trifoliae hirsuta.
flore sulfur. unguib. purpur.



Alcea Africana, seu vesicaria trifoliae glabra.
flore sulfur. unguib. purp.



Carduus ferox mitior hisp.



Carduus ferox hisp spinis maioribus.

D.S.



475

Amaranthus minor luteo paleaceus Pyramidalis flagellis erectioribus cristatis.



476

Amaranthus minor aureus Pyramidalis flagellis hispides crispis et cristatis.



477

Amaranthus minor luteo purpureus pyramidalis longis sparsis, et cristatis flagellis.



478

Amaranthus minor purpureo violaceus amplilati, globosa, crispa et cristata panicula.

E.S.



479

*Alchaea Virens rotundifolia flore amplo pur-
-purascēte Ital.*

Savatera arborea?



480

*Thalictrum Batrachoides minus flore albo
Ital.*



481

*Absinthium pumilum palmatum crasso
tormentoso pallescenteq. folio*



482

Contrayerua

F. 5.



Acarna Avradytis folio amplo purp. capite prolifera



Acarna latifolia spinosior amplo capite.



Absynthium incanum minus tenuifolium crispum hisp.



Botrys incana serratis fol hispan. Abrotant facie



487

Campanula mont. minor, angustifolia.



488

Cistus angusto Serpilli fol. villosus fl. aureo Ital.



489

Bistorta montana minima.



490

Androsæmum mont. minus.



Althæa frutex fl. albo *rubr. carn. purpur. viol.*



Geranium Creticum minus seu alacru. Villosum.



Carlina mont. minor acaulos.



Pulsatilla trianthos sulfur. semine non papposo.



Caryophyllus minor foetidus purpurouiolaceus



Tragopogon Pinifolium Hisp.



Caryophyllus mont. Umbellatus floribus variis luteis ferrugineis Ital.



Lychnis lutea mont. Globularia capite, et facie



Cedrus Libani



Pinus sylvestris Larix strobilo Larix Polon.
Corum.



Acanthium Virens maioribus capitulis spinis.



Acanthium tomentosum capite et sem mai crispantibus caulium alis

BARRELL

PLANTA

TOM. I.