





Est. 77
Tab. 3-B
N. 400 N.
155

18 11 15
11 11 15



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO







ILLUSTRISSIMO VIRO D. D.
GUIDONI CRESCENTIO
FAGON,
COMITI CONSISTORIANO,
ARCHIATRORUM PRINCIPI,
REGIÆ SCIENTIARUM ACADEMIÆ SOCIO HONORARIO,
NECNON
SUMMO HORTI REGII PARISIENSIS
ADMINISTRO,
MOECENATI SUO OPTIMO
S. P. D.
ADDICTISSIMUS OBSEQUENTISSIMUSQUE
ANTONIUS DE JUSSIEU.

ALIO quàm tuo sub sydere, VIR
PRÆSTANTISSIME, lucem
ab annis plusquam quadraginta
refugisse Barrelieri Opus videtur; quibus
enim felicioribus prodiisset auspiciis, quàm

EPISTOLA

ejus, cui jacens olim, nunc tandem exsuscitata in Gallis Botanice se totam debet? locupletissima hac materia Medica pars, quâ neglectâ, sterilis & manca foret ars medendi, in Scholis suasores solum, indefessos in agris nondum duces sibi patronos adsciverat, donec Te, labore itinerum improbo, difficillimarum regionum perlustratione, sudoribusque potius quàm voce præconem habuerit; sed non præconem modò in eruditissimis his quibus animos omnium demonstrationibus atque lectionibus Botanicis, Chymicis & Pharmaceuticis quondam rapiebas. Imò ipsius Apollinis æmulum in numerosâ curationum serie quarum favore unico Regiæ tibi salutis Provinciam promeruisti. Doctrinam probavit eventus; quot enim Arte divinâ Ludovici Magni annis annos, tot tibi laureas addis: sicque summæ ipsius gloriæ factus particeps, Principis perpetuam imperii sui tranquillitatem stabilientis incolumitate, æternum tibi apud posteritatem Gallicam nomen consecras; nec annoso tanti Regis ævo minus celebrabere, quàm generoso usu flagrantissimæ ejus in te gratiæ ac munificentiae, quas non in privatam, sed publicam utilitatem convertis; Ma-

NUNCUPATORIA.

gis de Medicina quàm de rei domesticæ augmento sollicitus, plusque Parisiensis Scholæ, quàm familiæ splendoris ampliandi studiosus, quas alii importunâ prece dignitates aucupantur, Tu eas modestâ tuorum oblivione his consequeris. Quæ verò tuum opum contemptum, innatumque salutis publicæ amorem magis arguent, quàm ditissimum illud naturalis historiæ suppellectilis gazophylacium in rei Medicæ studiosorum gratiam instructum, quàm Horti Regii tantis sumptibus locupletati, tot laboribus in faciliorem melioremque ordinem dispositi instauratio, quàm tua innumera in homines delectos beneficia, ore institutisque tuis efformatos, quorum opera tui in Re herbariâ progressus publici Juris fiunt? Quis autem MOECENAS OPTIME, his me cumulator, cui recens ex Provinciâ advenæ, Te adeò facilem præbuiisti, quem ex itineribus plantarum inquisitionis ergò reducem tam benignè, tam comiter excepisti, quem Regio Botanices Professoris munere, priùs à Te honestato, moxque ab insigni Turnefortio decorato spontè donasti, quem deniquè Tibi socium in saluberrimâ Parisiensium Medicorum Facultate cooptatum

EPISTOLA.

*esse jussisti ? Tot in me benemerita, nec ci-
ves, nec indigenas, nec peregrinos, me vivo
fugient; celebris eorum memoria, Bota-
nophylis, me accepta à Te illis reddente,
instaurabitur; donecque ex penu nostro
potiora grati animi tradenda posteris mo-
numenta prodeant, hocce penè extinctum,
lucubrationibus nostris tibi redivivum
opus ne aspernare. Vale, VIR EX-
CELLENTISSIME.*

Parisiis, Kalendis Martii anni Domini 1714.

R. P. JACOBI BARRELIERI VITA.

JACOBUS BARRELIERUS natus est Parisiis anno Domini 1606 ex nobili genere, parentibus Francisco Barrelier & Magdalenâ Bochetâ. Adolescens ita optimis disciplinis operam dedit, ut Græcè Latinèque brevi doctissimus evaderet. Dehinc Philosophiæ studiis sedulò imbutus, Medicinæ ultrò se addixit, atque in Facultate Parisiensi Baccalaurei titulo ornatus, mox cum Theses Medicas magnâ cum laude propugnasset, examiniq; ad praxim spectante se subjecisset, Licentiatûs gradum adeptus est, Lauream tamen Doctoris Medici anno 1634, sibi debitam neglexit, cum secularem vitam fastidians, regularem amplexari cogitaret. Arridente ergò ei præ cæteris Fratrum Prædicatorum Instituto, in Dominicanorum Novitiatum Lutetiæ in Sangermanensi suburbio situm se recepit, atque anno 1635 Novembris die 29^a se votis obstrinxit. Theologiæ quidem tunc præcipuè incubuit, atque in SS. Scripturarum Lectione ita versatus est, ut eas penè ad verbum teneret. Interea tamen horis subsecivis Herbarum quoque scientiæ, quâ semper flagraverat, nonnihil temporis ac curæ impendebat. Anno autem 1646. R. P. Thomas TURCO totius Ordinis FF. Prædicatorum summus Præpositus ac Magister Generalis Lutetiam cum venisset, Barrelierum ob ingenii acumen ac solertiam sibi adjungendum statuit, & Assistentis Gallici, ut vocant, munere ornavit; hunc itaque Barrelierus Conventus Ordinis visitandi causâ Parisiis discedentem comitatus est; quâ datâ itinerum occasione, dum Occitaniam, Aquitaniam & varias Galliæ Provincias, dumque exinde Hispaniam peragrarent, amplissimam Botanicarum observationum suppellectilem congeffit. Siquidem ut quamque urbem pertransibat Barrelierus, adibant eum Botanophili & Historiæ naturalis periti & studiosi, ac quidquid singulare vel observatum dignum investigaverant, deinceps in hortos suos translatum aut in Museis collectum ei impertiebant, quorum per litteras commercio non mediocriter postea in penitiori Plantarum perscrutatione adjutus est. Hujus scientiæ amore ductus, Valentiniæ Castiliæque Regnorum loca deserta & inculta maximo cum labore tum fructu emensus est, ignotas aut nondum, vel malè descriptas stirpes manu propriâ delineans. Ex Hispaniis Italiam adiit, ac viginti trium annorum spatio quibus Romæ præcipuè commoratus est, R. P. TURCO hujusque successor operam longè utilissimam navavit. Sub Pontificibus Innocentio X. Alexandro VII. & Clemente IX. exortis disceptationibus in religione valdè intricatis, S. Thomæ Aquinatis dogmata acerrimè prudenterque propugnavit, atque ad impetranda in eorum favorem decreta plurimum contulit. Ibidem etiam studio Plantarum incubuit, & Medicinales, si quæ rariores erant Apenninis & Æquicolorum montibus, plurimas asportabat, quibus hortum

R. P. Jacobi Barrelieri Vita.

in Conventu S. Xylti adornaret, construeretque; necnon & Portum Ostiensem, ita jubente Eminentiss. Cardinale Barberino, Urbani VIII. Nepote, Plantas investigandi causâ perlustravit, Marinasque plurimas, Insecta simul & Conchylia depinxit; tot laboribus ad Historiam generalem Plantarum adornandam susceptis scopus erat opus evulgare sub hoc titulo *Hortus Mundi vel Orbis Botanicus*. Hunc in finem exactissimè delineatas à se Plantas in ære incidi curabat; floris & fructûs anatome & proportionibus in figuris ad Fabii Columnæ normam diligenter observatis. Ac dum operi tanto ipse insudabat, simul eruditorum ex variis regionibus Botanophilorum, quibuscum per litteras consuetudinem alebat, consiliis inventisque utebatur. Sereniss. Principis Gastonis, Aurelianensium Ducis jussu Apenninas Gratianopolitanas, & Allobrogum Alpes perlustravit. E Regno Neapolitano, Montibus Æquicolorum aliisque Italiæ locis quæ obibat, semina stirpesque colligebat ad Sereniss. Principem dirigenda. Anno autem 1672. Lutetiam redux in Cœnobio Dominicanorum, quod in Vico S. Honorati situm est, magno cum gaudio exceptus est, ibique dum inchoatum opus ad umbilicum perficere nititur, asthma quod in reditu ex Italiâ contraxerat, extinctus est anno 1673. die 17^a Septembris manè.

Scriptorum, Itinerum Physicarumque observationum ad Plantas, Fungos, Conchylia Insectaque marina spectantium seriem, Topographiamque universalem Botanicam hîc ad vitæ ejus Coronidem subjungere locus esset; at proh litteratorum dolor? Extremum factum in Historiæ naturalis perniciem subiere inopinato ejus funere, quo vel descriptiones nonnullæ fuerunt tantum leviter adumbratæ; Chartæ verò quamplures vel absque ordine relictæ, vel penitus dissipatæ. Cùm eadem sorte perierint innumeræ virorum toto litterario orbe Physicâ eruditione illustrium Epistolæ ad Barrelierum, ita & ejus de eo elogiorum Myriades quibus erant refertæ, desiderantur. Solus ergo fragrans adhuc pietatis eruditionisque ejus odor in FF. Prædicatorum tabulariis Botanophilorumque memoriâ diu post eum erit superstes. Nisi de prudentiâ, sapientiâ ejusque de suo Ordine meritis, ex his quæ diximus, abundè constaret, Litteras quas vocant Encyclicas, in obitu ejus à R. P. Francisco Penon ejusdem Ordinis Cœnobiique Parisiensis in vico S. Honorati Priore eleganter conscriptas hûc referrem.

De Barreliero mentionem faciunt Robertus Morisson in Horto Regio Blæsensi, dum Melissam Romanam describit, & in Historiâ Oxoniensi, in quâ Poliorum nonnullæ species ex Iconibus Barrelieri, Iconum Parisiensium nomine recensentur. Boccone Musæo suo Venetiis cuso. Is enim plerasque Musei sui & Icones & Plantas à Barreliero accepit, si quæ omnes quas ab eo mutuatus est, citasset, Barrelierianum, non suum opus evulgasset. Turnefortius in Institutionibus Rei Herbariæ multas ab eo detectas numerat, & Plumerius qui Americanam Plantam novi generis, Barrelieri nomine nuncupavit.

PRÆFATIO

A D

LECTOREM BOTANOPHILUM

DE RATIONE OPERIS.

OPERA posthuma edentibus ea est sors, ut dum alieno labori perficiendo incumbunt, gratum sibi neminem reddant; dumque defuncti Authoris gloriæ student, nullam fere sibi, aut certè minimam promercantur. Quanto autem fastidio, quanto temporis dispendio perfectum quid in lucem emittunt? Si maxime multorum dierum, auctoritatum collationumque opus iis sit evulgandum, quale Barrelierianum?

Illud altero tantum supra quadragesimum anno à R. Patris Barrelieri funere in possessionem nostram venit. Quo verò in statu? *Æneæ* tabulæ ob metalli sui duritiem ab incendio servatæ, æruginem ex humore jam contrahere cœperant. Ad Plantarum iis expressarum Icones pertinens volumen nullam eas comitabatur; quædam tantum nobis transmissæ, nec sibi coherentes schedæ flammarum reliquiæ blattis tineisque pabulum fiebant. Nuda illis stirpium nomina, per pauca descriptionibus ornata. Ad effigies suas singula referre, convenientibusque synonymis illustrare *Herculeus* labor erat.

Adde quod nullum ex schedis istis pateret indicium, nulla mentio locorum, ubi delineatæ Plantæ adolebant; qui defectus sive ex Authoris per Gallias, Hispanias, Italiamque diariorum combustionem acciderit, sive ex fugitivarum Chartularum quibus id notatum erat, jacturâ, certè non sine difficili operâ reparabilis erat.

Ut erant tamen elegantiores hæ tabulæ, summæque diligentia ad naturæ veritatem incisæ, & exempla singularum nonnulla jam excusa partim vivo, partim defuncto Authore pervenerant ad Botanographos, qui Icones in iis depictas in operibus suis ex Barreliero retulerant, hoc munere Medicos remque litterariam defraudari peccatum gravius fore existimavi, tum ob delineatarum stirpium raritatem, tum erroris tollendi gratiâ Botanophylis, qui harum Iconum ignari Plantas à Barreliero exaratas, deinceps colligentes nondum notas arbitrati, quasi novas publicarent, & repetitâ nominum crambe, Catalogorum molem auxissent.

Atque utinam hic in Plantarum indices error minus frequens irreperet? nullâ confusione Rei Herbariæ scientia intricaretur, nec tantus incertarum Plantarum numerus memoriam gravaret, si nullarum stirpium nomina absque descriptione traderentur. Hoc ipse incommodum Horti Catholici editor sensit, & animadvertente eruditissimo Sherardo, quas velut recens notas

P R Æ F A T I O.

protulerat, additis in supplemento synonymis, jam descriptas bonâ fide confessus est.

Ad utilitatis rationem accessit injuriæ stimulus Barreliero à Paulo Boccone illata, qui cum per multa ab eo, dum viveret, Iconum suarum exempla mutuò accepisset, ea defuncto Authore, ejus nomine prætermisso ut plurimum, & sub iisdem nominibus recusa in Museo suo Venetiis edito sibi arrogavit, & levioribus parumque accuratis Plantarum Siciliae ac Norciani Montis descriptionibus autopsiam minimè redolentibus, furtum detexit.

Labori igitur minùs parcens, quàm utilitati publicæ consulens, Barreliani Operis ad saniozem Turnefortii normam restituendi pensum suscepi. Alphabetica dispositionis in permiscendis generibus confusionem respuens, & Institutionum Rei Herbariæ ordinem secutus, cōgeneres Plantas congeneribus adjunxi, species ad genera, genera ad classes suas revocaui; delineatis duntaxat à Barreliero, necdum descriptis synonyma descriptionesque addidi, & jam datas descriptiones non repetitione fastidiosâ quæ supra modum volumen amplificasset, sed solâ locorum ex utroque Bauhino & Raio indicatione exhibui, quorum delectum ceteros inter Authores improbatum neminem arbitror; ac tandem quas ab Authoribus mutuatus est Barrelierus recensui, ne quid in opere nostro desideraretur.

Fuabit sanè supra modum Turnefortii Lectorem designatarum ab eo stirpium Hispanicarum, ac Italicarum ex Barreliero Icones apud nos reperire, eò magis Institutionum methodo accommodatas, quod hanc Barrelierus ipse animo præcepisse visus est, dum more Fabii Columnæ, ipsiusque post Columnam Turnefortii, florum fructuum seminumque effigies seorsim depinxit & characterismum ab hisce partibus esse desumendum censuit.

Non mediocris ergò utilitatis in Botanices scientiâ labor iste futurus est, qui quod Raii Turnefortiique descriptionibus deerat, additis eorum operi Iconibus specierum designantium genera expleverit. Adeò ut in hac Authorum Triade, quâ carere nequit ullus Rei Herbariæ studiosus, accuratissima jam Historiæ Generalis habeat primordia, eoque utiliora, quò faciliorem novis progressibus viam aperient.

Ceterum hac in Barrelieri Editione culpabit fortasse quispiam Icones nonnullas aliis elegantia inferiores reperiri; quod acciderit vel quia ex aliorum Authorum Iconibus vel ex schedis Corvini Equitis Romani & Plantarum studiosi minùs accuratè delineatis sint expressæ. Necnon & plures fortè arguent hoc in opere, Plantarum bulbosarum effigies velut Narcissorum, Hyacinthorum florumque ut Aquilegiarum varietates, quæ non sine Botanophilorum damno suppressi potuissent; parcant tamen meliùs consulti censores, si ad religiosam Editoris sedulitatem attendant, qui vel minimam Authoris sui Operum particulam deperire noluit.

ADMON.

ADMONITIO.

*N*onnulla, Lector benevole, super hac Editione monitum te volo.

Primum ad frontem operis spectat, in quâ nequid Botanicem non redoleret, duas Granadillæ species nullibi æpietas, & ex Plumerii Collectaneis manuscriptis desumptas tradidi, ratum nullum tibi prioris pagine ornatum fore gratiorem eo qui menti pariter ac oculis novitate suâ arrideret, quod ex sequentibus harum stirpium descriptionibus magis agnosces.

I. **G**RANADILLA fructu rubente, folio bicorni *Plum. Cat.* Hæc elegans Granadillæ species sarmenta edit rara, minimum digitum vix crassa, rubentia, subhirsuta, & triangula: Rara per intervalla & satis distita folium, flos & clavicula erumpunt. Clavicula satis longa & tenuis ab ipso pediculi folii exortu enascitur. Folium palmam manûs antipitudine suâ quandoque superat, cordatum & bicorni, pergamaceum, læto virore utrinque nitens, tribus nervis conspicuis striatum, longoque nixum pediculo; ex cujus sinu flos paulò magis pollicem amplius, quinque petalis angustis, acuminatis & candidissimis constans, quibus incumbit corona radiata, è radiis tenuibus, longiusculis etiam & candidissimis constructa. E fundo calycis in quinque segmenta multò quam ipsa floris petala ampliora & longiora dissecti, interius albicantis, exterius verò virentis surgit pistillum columnulæ rubicundæ instar & in apice embryone ex viridi albicante, & ovato instructum, cui insident clavæ tres & subsunt stamina quinque apicibus suis luteis onustæ. Embryo autem abit dein in fructum utrinque acuminatum, hexagonum, rubentem, seminibus plenum ovatis, nigris, calyptrâ albissimâ & membranaceâ involutis. Semel vel bis reperit Plumerius Leoganæ in Insulâ Sandominicanâ: de eâque mentionem fecit pag. 68. descript. Plantar. Americ.

II. Granadilla folio Hederaceo, flore albo, fructu globoso, villosa *Plum. Cat. & Inst. R. Herb. 241.* Aliarum more altissimas scandit arbores, capreolis suis sarmenta tenuia alligando. Folia ad singulos nodos promit circinata rotunditatis, sed duobus veluti sinubus in tres cuspides obtusas & breves incisa & membranacea, palmam manûs paulò excedentia, lætè virentia, nervulis obliquis striata. Flos ex alâ cujusque folii singularis erumpit, longo & tenui innixus pediculo, paulò magis pollicem amplius, petalis floris albissimis, quibus incumbit corona radiata, candida, punctulis rubentibus insignita. Calyx in segmenta quinque, petalis ampliora sectus, intus est albissimus, foris è viridi pallidus. Ex cujus centro surgit pistillum columnæ instar, ad basim corollâ simbriatâ, in apice verò embryone instructum globoso & subviridi, cui insident clavæ tres rubentes & subsunt stamina quinque suis apicibus lutescentibus ornata. Embryo dein abit in fructum globosum, Nuce juglandis æqualem, carnosum, saturè violaceum, totumque villis subtilibus & albicantibus pilosum, seminibus tandem factum multis, nigris zegrinatis, & calyptrâ membranaceâ & albâ obductis. Maio mense flores fructusque maturos proferebat; circa montem vulgò dictum *le morne de la Calebasse* in insulâ Martinicanâ provenit.

*A*lterum ad operis intelligentiam necessariò notandum observationum & Iconum series inter se dissonantium spectat; cum enim Icones Barrelierus non congeneres, sed prout cœlatu dignas & forma magnitudine pares binatim in unâquâque *Encâ Tabulâ* incidendas curasset; nec earum dispositionis ordinem in observationum serie servare jucundum fore censeremus, reductis ad Turnefortii Normam observationibus, earum cum Iconum serie dissonantia incommodo occurrimus, accuratissimo indice per ordinem alphabeticum composito in quo cujuslibet plantæ Icon & observatio ei congrua, ope *Caractheris Arithmetici* cuius apppositi designata, uno intuitu facillimè reperiri possint.

Quos verò didacticus generum ordo magis juvabit, hunc iis subiecimus in altero indice per genera plantarum speciesque distributo, necnon & Gallicè in nostratum gratiam reddito.

Observabis denique folia Iconum ad decimum quartum usque Alphabetum litterâ *M.* absolutum productâ esse, quorum tamen Alphabetorum prior nullus numerus *Arithmeticus* subiungitur.

EXPLICATIO NOMINUM ABBREVIATORUM,
& recensio Auctorum Rei-Herbariæ, quorum operâ usi sumus.

A. R. Par. Academia Regia Parisiensis. Hoc titulo designantur Acta Botanica, Typis Regiis Cusa anno 1676. & quæ Gallicè inscribuntur. *Memoires pour servir à l'Histoire des Plantes, dressés par M. Dodart de l'Academie Royale des Sciences, Docteur en Medecine de la Faculté de Paris. in fol.*

Act. A. R. Par. Acta Academiæ Regiæ Parisiensis. *Histoire de l'Academie Royale des Sciences, avec les Memoires de Mathematique & de Physique. A Paris, in 4.*

Adv. Adversaria Lobelii. Vide Lob.

Adv. part. 2. Adversariorum Lobelii pars altera. Vide Lob.

Ald. H. Farnes. Aldini Hortus Farnesianus. Descriptio exactissima rariorum quarundam Plantarum quæ continentur in Horto Farnesiano. Auctore Tobia. Aldino, seu potius Petro Castello. Romæ. 1625. in folio.

Aldrov. Dendr. Aldrovandi Dendrologia naturalis, seu Arborum Historia. Bononiæ 1688. in folio.

Ambros. Ambrosinus. Hyacinthi Ambrosini Horti publici Bononiensis Præfati Phytologia, sive de Plantis partis primæ, Tomus 1. Bononiæ 1666. in folio.

Amm. Caract. Pl. Ammanni Character Plantarum. Lipsiæ 1685. in 12.

Amm. Supp. Bot. Ammanni suppellex Botanica. Lipsiæ 1675. in-8.

Anguill. Anguillara. Simplicii dell'excellente M. Luigi Anguillara. In Venetiâ 1561. in 8.

Apul. Apuleius Platonius de Herbarum virtutibus. Parisiis 1528. in folio, & Lugdunæ 1587. Basil. 1560. in-8.

Banist. Banisterus. Johannis Banisteri Plantarum in Virginiâ observatarum Catalogus recensitus in Historiâ Raii, pag. 1926.

Barr. Icon. Barrelieri Icones Plantarum quales ære incidi curavit, & quales excusas nunc tradidimus.

Barth. Act. Hafn. Bartholini Acta Hafniensia.

Bellon. Obs. Bellonii Observationes. *Les Observations de plusieurs singularitez & choses memorables trouvées en Grece, en Asie, Judée, Egypte, &c. Par Pierre Belon du Mans. A Paris 1554. 1588. in 4. vel quas Clusius è Gallico in latinum sermonem translatus libro de Exoticis inseruit.*

Bellon. Conif. Bellonius de Coniferis. Petri Bellonii Cenomani de Arboribus Coniferis Resiniferis & aliis perpetuâ fronde virentibus. Parisiis 1553. in 4. Jungitur libris de Admirabili opere antiquorum, & de Medicato funere ejusdem auctoris.

Besl. Fasc. Bessleri Fasciculus. Basilii Bessleri Fasciculus rariorum animalium, lapidum, fructuum, marinarum plantarum, &c. Norinbergæ 1616. in formâ longâ.

Besl. Gazoph. Bessleri Gazophylacium. Gazophylacium rerum naturalium Michaëlis Rupertii Bessleri Medici. Norinbergæ 1613. in folio.

Bont. vel Bont. Hist. Bontii Historia. Jacobi Bontii Medici in Javâ Historiæ naturalis & Medicæ Indiæ Orientalis libri sex à Guillelmo Pifone in ordinem redacti & ad calcem Historiæ naturalis Indiæ Occidentalis Pifonis editi Amstelodami 1658. in folio.

Bocc. Mus. part. 1. Tab. 40. Boccone in Musæi sui parte primâ, Tabulâ 40.

Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 50. Boccone in Musæi sui parte secundâ, paginâ 50. Tabulâ 50. Museo di Fifica, di Pianto, &c. di Paulo Boccone. In Venetiâ 1697. in 4. 2. vol.

Bocc. Rar. Plant. Boccone Rariores Plantæ. Icones & descriptiones rariorum plantarum: Auctore Paulo Boccone. Oxonii 1674. in 4.

Boer. Ind. H. L. Bat. Boerhave Index Horti Lugduno-Batavi. Lugduno-Batavi 1710. in 8.

Bot. Monsp. Botanicum Monspeliense, sive Plantarum circa Monspelim nascentium Index. Authore Petro Magnol Doctore Medico Monspeliensi. Monspeli 1686. in 8.

Bot. Monsp. App. Botanici Monspeliensis Appendix. Huic altera accessit Plantas septem complectens.

Borell. H. Simpl. Borelli Hortus Simplicium, mineralium, animalium & plantarum ad artem medicam utilium. Castris 1666. in 8.

Breyn. Cent. 1. Breynii Centuria prima. Jacobi Breynii Gedanensis Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum Centuria prima, Gedani 1678. in folio.

Breyn. Prodr. 1. Breynii Prodrômus primus. Jacobi Breynii Prodrômus fasciculi rariorum plantarum primus. Gedani 1680. in 4.

- Breyn. Prodr.* 2. Breynii Prodrômus secundus. Jacobi Breynii Prodrômus fasciculi rariorum plantarum secundus. Gedani 1689. in 4.
- Bod. Stap. Theoph.* Theophrasti Eresii Historiæ plantarum libri decem à Joanne Bodæo à Stapel illustrati. Amstelodami 1644. in folio.
- Bross. Brossæus.* Description du Jardin Royal des Plantes Medicinales de Paris, par Guy de la Brosse Medecin ordinaire du Roy, & Intendant dudit Jardin. A Paris 1636. in 4.
- Bross. Nat. Plant.* Brossæus de Naturâ Plantarum. De la nature, vertu & utilité des Plantes, par Guy de la Brosse, Conseiller, Medecin ordinaire du Roy. A Paris 1628. in 8.
- Bumald. Bibli. Bot.* Bumaldi Bibliotheca Botanica. Bononiæ 1657. in-24.
- Camer. Epit.* Epitome Mathioli à Camerario. De plantis Epitome utilissima Petri Andreæ Mathioli Senensis aucta & locupletata à Joachimo Camerario Medico Norimbergenfi. Francofurti ad Mœnum 1586. in-4.
- Camer. Hort.* Camerarii Hortus. Hortus Medicus & Philosophicus, in quo plurimarum stirpium breves descriptiones, novæ Icones, &c. continentur. Auctore Joachimo Camerario Medico Norimbergenfi. Francofurti ad Mœnum 1588. in-4. huic horto annectitur sylva Hercynia, sive Index plantarum sponte nascentium in montibus & locis vicinis Hercyniæ, à Thelio conscriptus.
- Campeg. Hort. Gall.* Campegi Hortus Gallicus, in quo Gallos in Galliâ omnium ægritudinum remedia reperire docet. Lugduni 1543. in-8.
- C. B. Animadv.* Caspari Bauhini Animadversiones in Historiam generalem Plantarum Lugduni cufam. Francofurti 1600. in-4.
- C. B. Math.* Casparus Bathinus in Mathiolum. Petri Andreæ Mathioli opera sive Commentarii in Dioscoridem Iconibus novis synonymis notisque illustrati à Casparo Bauhino. Basileæ 1598. in-folio.
- C. B. Phytop.* Caspari Bauhini Phytopina. Basileæ 1596. in-4.
- C. B. Pin.* Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. Basileæ 1623. & 1671. in-4.
- C. B. Prodr.* Caspari Bauhini Prodrômus Theatri Botanici. Francofurti 1620. & Basileæ 1671. in-4.
- C. B. Theat.* Caspari Bauhini Theatri Botanici liber primus. Basileæ 1665. in-folio.
- C. B. Plant. Bas.* Caspari Bauhini Plantarum circa Basileam sponte nascentium Catalogus. Basileæ 1622. in-8.
- Castor. Durant.* Castor Dürantes. Herbario novo di Castore Durante, Medico & Cittadino Romano. Romæ 1585. in Venetiâ 1636. in-4. & 1684. in-folio.
- Cat. Plant. Holl.* Catalogus Plantarum indigenarum Hollandiæ. Auctore Joanne Commelino. Amstelodami 1685. in-12.
- Cat. H. Amst.* Catalogus Plantarum Horti Amstelædamensis. Auctore Joanne Commelino, 1762. in-8.
- Cat. us. H. Harl.* Catalogus Plantarum usualium Horti Medici Harlemensis. Auctore Egidio de Koker. Harleini 1702. in-8.
- Chabr. Chabræus.* Stirpium Icones & Sciagraphia. Auctore Dominico Chabræo Medico. Genevæ. 1666. in-folio.
- Chomel. Abregé de l'Histoire des Plantes usuelles,* par M. Chomel Conseiller Medecin du Roy & de l'Académie Royale des Sciences. A Paris 1712. in-12.
- Clus. App.* Clusius in Appendice Historiæ Plantarum.
- Clus. App. Alt.* Clusius in Appendice alterâ ad librum vi.
- Clus. Cur. Post.* Clusii curæ posteriores Antuerpiæ, 1611. in-folio & in-4.
- Clus. Exot.* Clusii Exotica. Caroli Clusii exotiorum libri decem. Antuerpiæ 1605. in-fol.
- Clus. Hisp.* Clusii rariorum Plantarum per Hispanias observatarum Historiæ. Antuerpiæ, 1576. in-8.
- Clus. Hist.* Clusii Historia. Caroli Clusii Atrebatensis rariorum Plantarum Historia. Antuerpiæ 1601. in-folio.
- Clus. Pann.* Clusii rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam, &c. observatarum Historia. Antuerpiæ 1583. in-8.
- Col. Columella.* L. Junii Moderati Columellæ de re Rusticâ libri 12. & de Arboribus liber unus. Lugduni 1541. in-8.
- Col. in Rech.* Columna in Rechum. Vide Hernandes.
- Col. Obs.* Columnæ observationes Aquatilium Animalium, ad calcem partis primæ.
- Col. part. 1.* Columnæ Ecphrasis pars prima. Fabii Columnæ Lyncei minus cognitarum stirpium Expansio 1616. in-4.
- Col. part. alt. vel part. 2.* Columnæ Ecphrasis pars altera seu secunda. Romæ 1616. in-4.
- Col. Phycob.* Columnæ Phytobasanos. Neapoli 1592. in-4.
- Com. Ac. R. Scient.* Commentarii Academiæ Regiæ Scientiarum. Vide, Acta Academiæ Regiæ Parisiensis.
- Constant. Constantinus.* Traité de la Pharmacie Provinciale, ou plutôt Provençale & famili-

- tière, pour montrer qu'on peut faire la Médecine avec les Plantes qui naissent en chaque Province. Par Antoine Constantin Médecin d'Aix en Provence. A Lion 1590. in-8.
- Contant. Les Oeuvres de Jacques & Paul Contant M^{rs} Apotiquaires de Poitiers, divisées en 5. traites, sçavoir un Commentaire sur Dioscoride, un Synopsis Plantarum, &c. A Poitiers 1628. in-fol.
- Cord. Hist. Valerii Cordi Historiæ stirpium libri iv. Argentinx 1561. in-folio.
- Cord. Annot. Cordi Annotationes. Valerii Cordi Simesusii Annotationes in Pedacii Dioscoridis libros de Materiâ Medicâ. Libris Historiæ stirpium Cordi Argentinx cufis 1561. præfiguntur, & ad calcem Dioscoridis Editi à Gualtero Rivio, Vid. Riv. Diosc.
- Cord. Jud. Cordi Judicium. Euricii Cordi Simesusii Judicium de herbis & simplicibus Medicinæ. Ad Calcem Dioscoridis editi à Gualtero Rivio.
- Corn. vel Corn. Hist. Cornuti. Cornuti Historia. Jacobi Cornuti Doct. Med. Parisiens. Canadensium Plantarum aliarumque nondum editarum Historia, cui accessit Elenchus Plantarum circa Parisios nascentium. 1635. in-4.
- Cor. Inst. R. Herb. Corollarium Institutionum Rei-Herbariæ. Josephi Pitton Tournefort. Parisiis 1703. in-4.
- Cresc. Crescentius. Petrus Crescentius vel de Crescentiis Bononiensis de Agriculturæ partibus libri 12. Basileæ 1548. in-folio.
- Dod. Gall. Dodonæi Historia Gallicè reddita. L'Histoire des Plantes communes, étrangères ou rares, &c. composée par Dadoens ou Dodonée, & traduite du bas Allemand ou Flamand en François par Charles de l'Ecluse ou Clusius. A Anvers 1557. in-folio.
- Dod. Pempt. Dodonæi Pemptades. Remberti Dodonæi Mechliniensis, Medici Casarei stirpium Historiæ Pemptades sex seu libri xxx. Antuerpiæ 1616. in-folio.
- Dod. stirp. Imag. Dodonæi stirpium Imagines seorsim cufæ cum nomenclaturâ variâ & brevibus annotatiunculis, in-8. 1553. Antuerpiæ.
- Donat. Donatus. Trattato de semplici, pietre & pesci marini di Antonio Donati. In Venetiâ 1631. in-4.
- Dorst. Bot. Dorstenii Botanicon. Botanicon continens herbarum aliorumque simplicium quorum usus in Medicina est, &c. Auctore Theodorico Dorstenio Medico. Francofurti 1540. in-folio.
- Duret. Duretus. Histoire admirable des Plantes & Herbes miraculeuses en nature. Par Claude Duret President à Moulins. A Paris 1605. in-8.
- Du Tertre. Histoire naturelle des Isles Antilles. Par le R. P. du Tertre de l'Ordre des Freres Prescheurs. A Paris 1667. in-4.
- Duval. Phyt. Duvallii Phytologia. Phytologia sive Philosophia Plantarum. Auctore Guillelmo Duval Doct. Med. Parisiens. Parisiis 1647. in-8.
- Elem. Bot. Elementa Botanices. Elementa de Botanique par M. Pitton Tournefort Professeur en Botanique au Jardin Royal de Paris. A Paris de l'Imprimerie Royale, 1694. in-8. 3. vol.
- Eyff. Eyfsterensis Hortus, operâ Basilii Besleri Philiatræ & Pharmacopæi. Norimbergæ 1613. in folio. 2. vol.
- Ferr. Hesp. Ferrarii Hesperides. Joannis Baptistæ Ferrarii Senensis, è Societate Jesu Hesperides sive de Malorum aureorum culturâ & usu libri iv. Romæ 1646. in-folio.
- Ferr. Flor. Cult. Ferrarii Florum cultura. Joannis Baptistæ Ferrarii, &c. de Florum culturâ libri iv. Romæ 1633. in-4. & Amstælodami.
- Flor. Altdorf. Floræ Altdorffinæ, Deliciæ Sylvestres sive Catalogus Plantarum in agro Altdorffino spontè nascentium, à Mauritio Hoffmanno. Altdorffi 1662. 1677. in-4.
- Florileg. Altdorff. Florilegium Altdorffinum, Deliciæ Hortenses, sive Catalogus Plantarum Horti Medici Altdorffini. Altdorffi 1660. & 1676. in-4.
- Flor. Bat. Floræ Lugduno-Batavæ Flores seu Enumeratio stirpium Horti Lugduno Batavi, in ordinem dispositarum; ex Lectionibus Hermanni. Lugduni Batavorum 1690. in-8.
- Flor. Malab. Flora Malabarica, sive Horti Malabari Catalogus quem in ordinem digessit, synonymisque illustravit Casparus Commelia. Lugduni Batavorum 1696. in-folio & in-8.
- Flor. Norib. Flora Noribergensis sive Catalogus Plantarum in agro Noribergensi tam spontè nascentium, quam Exoticarum in Viridariis aut Horto Medico educatarum. Auctore Joanne Georgio Volckamero Medico Noribergensi. Noribergæ. 1700. in-4.
- Flor. Pruss. Flora Prussica sive Plantæ in Regno Prussicæ spontè nascentes, quarum Catalogus à Joanne Loeselio primùm editus est absque figuris, denuò recusum Notis & Iconibus illustravit Joannes Gottsched. Regio Monti 1703. in-4.
- Flor. Pruss. quas. Flora Prussica quasimodo genita seu Enumeratio plantarum Indigenarum Prussicæ Auctore Georgio Andréâ Helving. Philippus Breynius Medicus Gedanensis. Jacobi Breynii filius operi huic præfationem de scriptoribus rerum naturalium Borussia, animadversionesque in Floram Prussicam Lozalii præfuit. Gedani 1712. in-4.
- Franc. Trif. Fib. Franci Trifolii Fibrini Historia. Francofurti 1701. in-8.
- Franc. Ver. Theez. Joannis Franci Veronica Théezans. Lipsiæ 1700. in-12.

- 5
- Fuchf.* Fuchsius. De Historiâ stirpium Commentarii insignes. Auctore Leonhardo Fuchsi. Basileæ 1542. in-folio, Lugduni 1551. in-8.
- Fuchf. Parad.* Fuchsi Paradoxorum Medicorum libri tres. Parisiis 1555. in-8.
- Ger. Emac.* Gerardus Emaculatus. Joannis Gerardi Angli Historia Plantarum emaculata, Anglicè conscripta. Londini 1597. in-folio.
- Gesn. Epist.* Gesneri Epistolæ. Epistolarum Medicinalium Conradi Gesneri Philosophi & Medici Tigurini libri tres. Tiguri 1577. in-4.
- Gesn. Epist. à Bauh. Edit.* Gesneri Epistolæ à C. Bauhino editæ Basileæ 1591. in-8.
- Gesn. de Fig. Lapid.* Gesnerus de figuratis lapidibus. Conradi Gesneri de rerum fossilium, lapidum & gemmarum maximè figuris & similitudinibus liber. Tiguri 1565. in-8.
- Gesn. H. Germ.* Gesnerus de Hortis Germaniæ liber cum historiâ stirpium Valerii Cordi editus.
- Gesn. Lunar.* Gesnerus de Lunariis herbis & rebus noctu lucentibus. Tiguri 1555. in-4.
- Gesn. Mont. Fract.* Gesneri descriptio Montis Fracti, seu Montis Pilati juxta Lucernam. Tiguri 1555. in-4.
- Goiffon.* D. Joannes-Baptista Goiffon Doctor Medicus Monspeliensis, Collegio Lugdunensi Aggregatus, rerum Anatomicarum & Botanicarum peritissimus, in Italiâ & Hispaniis, dum utriusque Coronæ exercituum Medici munere fungeretur, plantas plurimas rariores & nondum descriptas observavit & collegit; in Lugdunensi quoque agro, quod adolescens adhuc eum in primis meis Botanices studiis ducem secutus sum, multas non vulgares detexit quas cum Elencho stirpium Lugdunensis agri propediem evulgabit.
- Hannem. Meth.* Hannemanni Methodus. Nova & accurata Methodus cognoscendi vegetabilia juxta triplicem cognitionem Grammaticam, Philosophicam & Medicam. Auctore Joan. Ludovico Hannemann. Kilonii 1677. in-4.
- Hernand.* Hernandez. Rerum Medicarum Novæ Hispaniæ Thesaurus, seu Plantarum Animalium, Mineralium Mexicanorum historia ex Francisci Hernandi relationibus scripta, à Nardo Antonio Reccho in ordinem digesta, à Joanne Terentio Syneco notis illustrata, ac additionibus Fabii Columnæ Lyncei locupletata. Romæ 1618. in-folio.
- H. Amst.* Hortus Amstelodamensis. Horti Medici Amstelodamensis rariores plantarum historia. Auctore Joanne Commelino. Amstelodami 1697. in-folio.
- H. Amst. p. Alt.* Horti Amstelodamensis pars altera. Auctore Casparo Commelino. Amstelodami 1701. in-folio.
- H. Argent.* Hortus Argentinenfis. Catalogus Plantarum Horti Academici Argentinenfis. Authore Marco Mappo Medico Argentinenfi. Argentorati 1691. in-12.
- H. Beaum.* Hortus Beaumontianus. Horti Beaumontiani Exoticarum Plantarum Catalogus. Hagæ Comitum 1690. in-8.
- H. Cath.* Hortus Catholicus. Auctore R. P. Francisco Cupani. Neapoli 1696. in-4. ad calcem supplementum addidit.
- H. Cath. supp. Alt.* Horti Catholici supplementum alterum. Auctore R. P. Francisco Cupani. Panormi 1697. in-4.
- H. Edinb.* Hortus Medicus Edinburgensis. Auctore Jacobo Sutherland. Edinburgi 1683. in-8.
- H. L. Bat. Vorst.* Horti Lugduno-Batavi Catalogus. Præfector ejusdem Horti Adolfo Vorstio Med. ad calcem Isagoges rei-herbariæ Spigellii.
- H. L. Bat.* Hortus Academicus, Lugduno-Batavi Pauli Hermanni. Lugduni-Batavorum 1687. in-8.
- H. Mal.* Hortus Malabaricus duodecim voluminibus in-folio comprehensus, quorum primum 1678. ultimum verò 1693. fuit editum Amstelodami.
- H. Pat.* Hortus Patavinus Georgii à Turre. Patavii 1662. in-12.
- H. Pisan.* Hortus Pisanus Thomæ Bellutii Pistoriensis. Florentiæ 1662. in-16.
- H. R. Bles.* Hortus Regius Blesensis. Parisiis 1655. in-folio.
- H. R. Monsp.* Hortus Regius Monspeliensis Petri Magnol. Monspeli 1697. in-8.
- H. R. Par.* Hortus Regius Parisiensis. Parisiis 1665. in-folio.
- H. Vitemberg.* Hortus Vitembergensis. Index Plantarum Horti Medici Academiae Vitembergensis. Auctore Joanne Henrico Heuchero Med. Vitembergæ 1711. in-4.
- J. B. Absinth.* Joannes Bauhinus de Absinthio, seu de Plantis Absinthii nomen habentibus, cum tractatu de Absinthiis Claudii Rocardii. Montisbeligardi 1593. in-12.
- J. B. 1. 150.* Joannis Bauhini tomus primus, pagina 150. Historia Plantarum universalis, tribus voluminibus comprehensa; auctoribus Joanne Bauhino Archiatro, Joanne Henrico Cherlero Doctore, Basileensibus; quam recensuit & auxit Dominicus Chabræus Doct. Med. Genevensis. Ebroduni 1650. in-folio.
- J. B. Plant. à Div.* Joannes Bauhinus de Plantis à Divis denominatis. Basileæ 1591. in-8.
- J. B. Boll.* Joannes Bauhinus de Aquis Medicatis Bollenfis libri quatuor, item de variis

fossilibus, stirpibus & insectis Agri Bollenfis. Montisbeligardi 1607. in-4.

Icon. Robert. Icones Roberti. Variæ ac multiformes florum species appressæ ad vivum. Auctore Nicolao Robert. Parisiis apud Franciscum Poilly viâ Jacobæâ. in-4.

Imp. Imperatus. Historia naturale di Ferrante Imperato Neapolitano. Neapoli 1599. Venetiis 1672. in-folio.

Imp. lat. Imperati Historia latinè reddita.

Inst. R. Herb. Institutiones Rei-herbariæ Josephi Pitton Tournefort. Parisiis 1700. & Typographiâ Regiâ, 3. vol. in-4.

Inst. R. Herb. App. Institutionum Rei-herbariæ Appendix.

Joncq. Hort. Joncqueti Hortus. Dyonisii Joncquet Medici Parisiensis Hortus. Parisiis 1659. in-4.

Jonst. Dendr. Jonstonii Dendrologia. Joannis Jonstonii Dendrologia sive Historia de Arboribus. Francofurti 1662. in-folio.

Lauremb. H. Cult. Laurembergii de Horti Cultura libri duo. Francofurti ad Mœnum 1654. in-4.

Lauremb. App. Plant. Laurembergius Apparatus Plantarius, sive de Plantis Bulbosis & Tuberosis libri duo. Francofurti ad Mœnum 1654. in-4.

Lippi. Augustinus Lippi Parisinus, Medicus Parisiensis. Domino Du Roule Regio in Æthiopiam Legato, Botanices amore, itineris nec non & mortis à Barbaris illata comes fuit.

Lovell. Robert Lovell herball compleat sive Enchiridion Botanicum Anglice scriptum. Oxonii 1665. in-8.

Lob. Adv. Lobelii Adversaria. Stirpium Adversaria nova auctoribus Petro Penâ & Mathiâ de Lobel Medicis. Londini 1570. 1605. in-folio, & Antuerpiæ 1576.

Lob. Adv. p. alt. Lobelii Adversariorum pars altera. Antuerpiæ, Londini 1576. & 1605. in-fol.

Lob. Icon. Lobelii Icones. Icones stirpium. Antuerpiæ 1587. in formâ longâ.

Lob. Illust. Lobelii Illustrationes. Mathiæ de Lobel Botanographi Regii stirpium illustrationes, accurate Guillelmo How Anglo editæ. Londini 1655. in-4.

Lob. Obs. Lobelii Observationes, stirpium historia Mathiæ de Lobel Insulani. Antuerpiæ 1576. in-folio.

L. c. id est loco citato, vel locis citatis.

Lugd. vel Lugd. Hist. Lugdunensis Historia. Historia Generalis Plantarum à Dalecham-
pio Medico Lugdunensi elaborata. Lugduni 1586. in-fol. 2. vol.

Lugd. App. Lugdunensis Historiæ Appendix.

Lugd. Gall. Lugdunensis Historia Gallicè reddita. Lugduni 1676. in-folio 2. vol.

Marcgr. Marcgravius. Georgii Marcgravi de Liebstad, Misnici Germani historia rerum naturalium Brasiliæ libri octo editi cum historiâ Pisonis Lugduni - Batavorum 1648. in-fol.

Math. Lat. Valgrif. Mathiolus latinè editus à Valgrifio. Petri Andreæ Mathioli Senensis, Medici, Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis. Venetiis ex officinâ Valgrifianâ cum magnis figuris, 1565. in-folio. Italicè primùm, dein variis formis, linguis, & locis prodierunt in publicum.

Mentz. Mentzelius. Index nominum Plantarum multilinguis. Operâ Christiani Mentze-
lii. Berolini 1682. in-folio.

Mentz. Pugil. Mentzelii Pugillus rariorum Plantarum ad calcem Indicis multi-linguis editus.

Merret. Pinax. r. Brit. Merett. Pinax rerum naturalium Britannicarum. Londini 1667. in-8.

Mor. Hist. Oxon. part. 2. Morissonii Historiæ Oxoniensis pars secunda. Plantarum histo-
riæ universalis Oxoniensis pars secunda. Auctore Roberto Morisson. Oxonii 1680. in-folio.

Mor. Hist. Oxon. part. 3. Morissonii Historiæ Oxoniensis pars tertia. Auctore Roberto Morisson, à Jacobo Boberto edita & illustrata. Oxonii 1699. in-folio.

Mor. H. R. Blef. Morissonii Hortus Regius Blefensis auctus, seu præludia Botanica. Londini 1669. in-8.

Mor. Umb. Morissonii Umbelliferarum plantarum distributio nova. Oxonii 1679. in-fol.

Munting. Aloid. Muntingii Aloidarium. Sive Aloes mucronato folio, Americanæ majo-
ris, aliarumque specierum historia. Amstelodami 1680. in-4.

Munting. Herb. Brit. Muntingii de herbâ Britannicâ. De verâ antiquorum herbâ Britan-
nicâ ejusdemque efficacità. Auctore Abrahamo Muntingio Med. Doct. & Bot. Prof. Amste-
lodami 1681. in-4.

Munting. Phyt. Muntingii Phytographia curiosa. Amstelodami 1711. in-fol.

Mus. Petiv. Cent. Musei Petiveriani Centuriæ octo quæ variis prodire temporibus Lon-
dini. 1^a. 1695. & ultima 1700. in-8.

Olhaf. Elench. Plant. Dant. Olhafii Elenchus plantarum circa Dantiscum nascentium. Gedani. 1656. in-8.

Par. Bat. Paradisus Batavus Pauli Hermanni. Lugduni Batavorum 1698. & 1705. in-4.

Park. Parad. Parkinsoni Paradisus terrestris Anglicè conscriptus. Londini 1629 in-folio.
Park. Theat. Parkinsoni Theatrum Botanicum Anglicè scriptum. Londini 1640 in-fol.

Pass. Icon. Passæ Icones: Hortus floridus in quo rariorum & minus vulgariarum florum Icones ad vivum delineatæ & secundum anni tempora divisæ exhibentur à Crispo Passæ juniore. Arnheimi, & Trajecti ad Rhenum 1614 in formâ longâ.

Petiv. Gazoph. Petiverii Gazophylacium naturæ & artis. Londini 1702 in-folio.

Pison. Hist. Pisonis historia naturalis Brasiliæ. Lugduni-Batavorum 1648 in-folio.

Pillet. Pilleterius. Plantarum in Walachriâ Zelandiæ insulâ nascentium synonymia, Autore Casparo Pilleterio. Middelburgi 1610 in-8.

Plin. Plinius. Caii Plinii secundi historiæ mundi libri xxxvii.

Pluk. Almag. Plukenetii Almagestum Botanicum sive Phytographiæ Plukenetianæ Onomasticon. Londini 1696 in-folio.

Pluk. Amalth. Plukenetii Amalthæum Botanicum idest stirpium Indicarum alterum cornu copiarum. Londini 1703 in-folio.

Pluk. Phyt. Plukenetii Phytographia seu stirpium Icones ad vivum delineatæ, cujus Phytographiæ partes priores editæ sunt Londini 1691 in-folio; tertia 1692 in-fol.

Pluk. Mantiss. Plukenetii Mantissa Almagesti Botanici. Londini 1700 in-fol.

Plum. Plumerius. *Description des Plantes de l'Amerique, avec leurs Figures. Par le R. P. Plumier Minime. A Paris 1693. edition du Louvre in-fol.*

Plum. Fil. Plumerius de Filicibus Americanis. Parisiis 1705. ex Typographia regiâ in-fol.

Plum. Nov. Plant. Amer. gen. Plumerii nova Plantarum Americanarum genera. Parisiis 1703 in-4.

Plum. Cat. Plumerii Catalogus Plantarum Americanarum ab ipso descriptarum, & delineatarum ac in Institutionibus Rei-herbariæ recensitarum. Jungitur cum Novis Plantarum Americanarum generibus.

Bon. Bald. Ital. Pona Montis Baldi descriptio Italicè scripta. Monte Baldo descritto da Giovanni Pona Veronese. In Venetia 1617 in-4. Eadem descriptio latinam reddidit Clusius, & suæ Plantarum historiæ adjecit.

Pon. Bald. latin. Pona Montis Baldi descriptio latinè reddita, cui apposita est disceptatio de Ammono veterum habita à Nicolao Maronæ Medico Veronenfi. Basileæ 1608 in-4.

Pons Animad. in hist. Lugd. Jacobi Pons Medici Lugdunensis Animadversiones in historiam generalem Plantarum Lugduni cufam. Lugduni 1600 in-8.

Prodr. Par. Bat. Prodromus Paradisi Batavi cum scholâ Botanicâ editus. Vid. Schol. Bot.

P. Alp. Egypt. Prosper Alpinus de Plantis Egypti. Venetiis 1592 in-4.

P. Alp. Egypt. cum Not. Vessling. Prosper Alpinus de Plantis Egypti cum notis Vesslingii. Patavii 1640 in-4.

P. Alp. Exot. Prosper Alpinus de Exoticis Plantis. Venetiis 1627 in-4.

Raii Cat. Angl. Raii Catalogus Plantarum Angliæ & Insularum adjacentium. Londini 1677 in-8.

Raii Cat. Cant. Raii Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam nascentium. Cantabrigiæ 1660 in-12.

Raii Cat. Cant. App. Raii ad Catalogum Plantarum agri Cantabrigiensis appendix. Cantabrigiæ 1685 in-12.

Raii Hist. Raii Historia Plantarum. Londini 1686. 2. vol. in-fol.

Raii Hist. 3. Raii Historiæ Plantarum tomus tertius. Londini 1704 in-folio.

Raii Meth. Raii Methodus Plantarum nova, synopticè in tabulis exhibita. Londini 1682 in-8.

Raii Meth. Emend. Raii Methodus Plantarum emendata & aucta. Londini 1703 in-8.

Raii Syll. Raii Sylloge plantarum extra Britannias nascentium. Londini 1694 in-8.

Raii Synops. Raii Synopsis Methodica stirpium Britannicarum. Londini 1690. & 1696 in-8.

Raii Meth. Var. Raii de Methodis Plantarum variis dissertatio. Londini 1696 in-8.

Renealm. Renealmus. Pauli Renealmi Blæfensis Doct. Med. specimen historiæ Plantarum. Parisiis 1611 in-4.

Richier Anomat. Richieri Onomatologia, seu Nomenclatura stirpium Horti Regii Montpelienensis recens constructi, à Richiero de Belleval Medico Regio, Anatomes & Botanices Professore. Montpelii 1598 in-12.

Richier. Richierus de Belleval. *Dessein touchant la recherche des Plantes du Languedoc, par M. Richier de Belleval. A Montpellier 1605 in-8.*

Rivin. Rivinus. Introductio generalis in Rem-herbariam cum ordine Plantarum quæ sunt flore regulari monopetalo. Authore Quirino Rivino Med. Prof. Lipsiæ 1690 in-folio. Ordo vero Plantarum quæ sunt flore regulari, pentapetalo. Lipsiæ 1699 editus est in-folio.

Rob. Cat. Robini Botanici Regii Catalogus seu Enchiridion Isagogicum stirpium quas Lætiæ colebat. Parisiis 1624 in-8.

Rob. Florileg. Robini Florilegium à Petro Vallet cufum. *Le Jardin du Roy Tres-Chrestien Louis XIII. A Paris 1625 in-folio.*

- Rolfinc.* Rolfincius de Vegetabilibus. Jenæ 1670. in-4.
Rondel. Rondeletius de Piscibus. Lugduni 1554. in-fol.
Ruell. Ruellius. De naturâ stirpium libri tres Joanne Ruellio Auctore. Parisiis 1536. in-fol.
Scheuchz. Scheuchzerus. *O'ryzophorum Helveticus*, sive Itineris Alpini descriptio 1. 2. & 3. Authore Joanne Jacobo Scheuchzero Medico Tigurino. Londini 1708. in-4.
Scheuchz. *Agrostograph. Prodr.* Joannis Scheuchzeri Med. Tigurini Agrostographiæ Helveticæ Prodomus. Tiguri 1708. in-fol.
Schol. Bot. Schola Botanica sive Catalogus Plantarum quas in Horto Regio Parisiensi indigitavit Turnefortius, ut & Prodomus Paradisi Batavi P. Hermannii. Amstelædami 1689. in-12.
Scheuvenck. Scheuvenckius. Stirpium & Fossilium Silesiæ Catalogus à Casparo Schuvenckfelt. Lipsiæ 1600. in-4.
Scot. Illust. Scotia illustrata. Authore Roberto Sibbaldo. Edinburgi 1684. in-folio.
Sim. Paul. Quadr. Simonis Pauli quadripartitum Botanicum. Argentorati 1667. in-4.
Sim. Paul. abus. Tab. & Thé. Simonis Pauli de abusu Tabaci & Herbari Thé Commmentarius. Argentorati 1665. in-4.
Sloan. Cat. Jamaic. D. Hans Sloane Catalogus Plantarum Insulæ Jamaicae. Londini 1696. in-8.
Sloan. Hist. Jamaic. D. Hans Sloane Medici Londinensis Historia Naturalis Jamaicae Anglicè scripta. Londini 1707. in-folio.
Stephan. Prad. Caroli Stephani Prædium rusticum. Parisiis 1629. in-8.
Stephan. de re Hort. Carolus Stephanus de re Hortensi. Parisiis 1535. in-8.
Stephan. Semin. Caroli Stephani Seminarium seu Plantarium arborum quas post Hortos conferere solet vulgus. Parisiis 1536. in-8.
Suvert. Suvertius. Emanuelis Suvertii Florilegium. Francofurti 1612. Amstelodami 1647. in-folio.
Tabern. Hist. Tabernæ montani Historia Plantarum Germanicè scripta. Francofurti 1613. in-folio.
Tabern. Icon. Tabernæ montani Icones Plantarum. Francofurti 1590. in formâ longâ.
Thal. Sylv. Herc. Thalii Sylva Hercynia sive Catalogus Plantarum sponte nascentium in montibus & locis vicinis Hercyniæ. Francofurti 1558. in-4. Cum Camerarii horto editus.
Thev. Franc. Antarct. *Les singularitez de la France Antarctique*, par André Thevet. A Paris 1558. in-4.
Thev. Cosmograph. Theveti Cosmographia. *Cosmographie du Levant* par André Thevet d'Angonlesme. A Lyon 1554. in-4.
Thurneiss. Thurneisseri Historia seu descriptio Plantarum tam domesticarum, quàm exoticarum, earumdem vires influentiales & signaturas complectens. Berolini 1578. in-folio.
Trag. Tragus. Hyeronimi Tragi de stirpibus libri tres. Argentorati 1552. in-4.
Triumf. Observ. Triumphetti Observationes de Ortu ac vegetatione Plantarum. Romæ 1685. in-4.
Triumf. Prælus. Triumphetti Prælusio Botanica habita anno Jubilæi. Romæ 1700. in-4.
Triumf. Syllab. Triumphetti Syllabus Plantarum horto Medico Romano additarum. Romæ 1688. in-4.
Turnef. de Opt. Meth. Turnefortii Medici Parisiensis, & Bot. Profess. de Optimâ methodo instituendâ in re herbariâ, ad sapientem virum G. Sherardum Anglum Epistola. Parisiis 1697. in-8.
Turnef. Plant. Paris. Hist. Turnefortii Plantarum circa Parisios nascentium Historia. *Histoire des Plantes qui naissent aux environs de Paris*, avec leur usage dans la Médecine. Par M. Pitton de Tournefort. A Paris de l'Imprimerie Royale 1698. in-8.
Vaillant. D. Sebastianus Vaillant in Horto Regio Parisiensi Plantarum Prodemonstrator, à quo Plantarum in agro Parisiensi nascentium Turnefortianâ auctiorem perfectioremque historiam mox edendam expectamus.
Wepf. Wepferus de Cicutâ Aquaticâ. Basileæ 1679. in-4.
Vesling. in P. Alp. Veslingius in Prosperum Alpinum. Patavii 1638. in-4.
V. Lust. Viridarium Lusitanicum Gabrielis Grisley. Ulyssipone 1660. in-12.
Whel. Itin. Wheleri Itinerarium. *Voyage de Dalmatie, de Grece & du Levant*, par George Wheeler, traduit de l'Anglois. A Anvers 1699. in 8. 2. vol.
Zan. Hist. Zanoni Historia. Istoria Botanica di Giacomo Zanoni simplicista e sopra intendente all'horto publico di Bologna. In Bologna 1675. in-folio.

PLANTÆ

PER

GALLIAM, HISPANIAM ET ITALIAM
OBSERVATÆ,

ICONIBUS ÆNEIS EXHIBITÆ

A R. P. JACOBO BARRELIERO
PARISINO,

In sacrâ Theologiâ Magistro, Generalium Præpositorum Ordinis
FF. Prædicatorum Socio à Secretis, Alumno Provinciæ
sancti Ludovici, olimque Medico Parisiensi.

OPUS POSTHUMUM,

Accurante ANTONIO DE JUSSIEU, Lugdunæo, utriusque Facultatis
Monspelienfis & Parisiensis Doctore Medico, è Regiâ Scientiarum
Academiâ, necnon in Horto Regio Parisiensi Botanices Professore,
in lucem editum, & ad recentiorum normam digestum.

CUI ACCESSIT EJUSDEM AUCTORIS SPECIMEN
de Insectis quibusdam marinis, Mollibus, Crustaceis & Testaceis.



PARISIIS,

Apud STEPHANUM GANEAU, viâ Jacobæâ, ad Insignia
Dombarum, è regione Fontis Sancti Severini.

MDCCXIV.

CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIS.

P L A N T A

P E R

GALLIAM, HISPANIAM ET ITALIAM

O B S E R V A T A

ICONIBUS AENEIS EXHIBITA

A R P JACOBO BARRERERO

P A R I S I N O

In facti Theologiae Magistro, Gualtero Pignatelli Ordinis
P. R. Praedicatorum Socii & Socii, Alano Provine
hodi Ludovici, clausus & clausus Pignatelli.

O P U S P O S T H U M U M

Accuravit Antonio de Jussieu, Lignarius, antequam Pignatelli
Montpellier & Lignarius Doctoris, & Lignarius Scholasticum
Academii, necnon in facti Regio Lignarius Praedicator,
in facti clausus, & ad facti clausus clausus.

QUI ACCESSIT, EPUDEM, FACTORIS, EXECUTUM
ad facti clausus, clausus, clausus, clausus.



P A R I S I S

Apud STEPHANUM GARNIER, vii Jacobus, ad Pignatelli
Domus, & regione Fontis Sanguis Severus.

M D C C X V

CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGIS



I N D E X

I C O N U M B A R R E L I E R I

Prior numerus Iconem, alter observationem indicat.

A

	Icon.	Observ.
A BRO TANUM fœmina, incanum, albo Achilleæ flore, Creticum.	572.	1118
— fœmina incanum, Hispanicum.	463.	1018
— fœmina, virens, vermiculato, serrato folio.	464.	1019
— fœmina, Hispanicum, tenuifolium, virens.	429.	1020
— fœmina, tenuifolium, incanum, Hispanicum.	430.	1021
— fœmina, tomentosum, crispum, incanum, Hispanicum.	216.	1022
— tenuifolium, incanum, minimum.	448.	1013
— mas, tenuifolium, latifolium, Hispanicum, <i>πλευστόφυλλον</i> .	447.	1014
Abſinthium incanum, lanuginosum, crispum, cristatofolio, longiori pediculo, seu majus, acrius, amarius, densiorique folio.	433.	1009
— incanum cristato, crispum, tenuiorique folio, medium.	434.	1010
— incanum minus, tenuifolium, crispum, Hispanicum.	485.	1011
— minus, majoribus altiusque incisis foliis, cinereis, Hispanicum.	459.	1007
— minus, tenuifolium, altè incisis foliis, cinereum, salsum, Hispanicum.	460.	1008
— minus, oblongis dentatisque foliis cineritiis, Hispanicum.	461.	1012
— pumilum, palmatum, minus, argenteo sericeoque folio, Hispanicum.	462.	1006
— pumilum, palmatum, crasso, tomentoso, pallescenteque folio.	481.	1005
Acacia Ægyptia.	1138.	1366
— Americana, albo Cytisi flore Cornuti.	740.	1384
Acanthium virens, majoribus capitibus spinis.	501.	910
— tomentosum, capite & semine majoribus, crispantibus caulium alis.	502.	909
Acarna Atractylidis folio, amplo, purpureo capite, prolifera.	483.	1124
— latifolia, spinosior, amplo capite.	484.	931
— Theophrasti Imperato, Ilvensis seu Italica.	1211.	912
Aconitum reticulatâ radice, flore sulfureo albicante, latifolium.	599.	871
— reticulatâ radice, flore sulfureo albicante, angustifolium.	600.	872
Adiantum Filicinum, aquaticum, mollius, minimum.	432.	1267
— Filicinum, durius, crispum, minimum.	432.	1268
— Filicinum, Leptophyllum, elatius, Hispanicum.	431.	1270
— stellatum, Canadense, Polypodii radice.	1206.	1269
Æthiopis laciniatis foliis.	188.	233
Ageratum minus, saxatile, flore albo.	1192.	219
Agrifolium dorso folii echinato.	518.	1364
Agrimonium odoratum.	611.	604
Agrimonoides semine glabrò.	612.	605
Alcea Betonica folio, flore purpureo-violaceo.	1189.	72
— hirsuta, minima, flore cæſio, Hispanica.	1169.	71
— minor, variis foliis.	1201.	68
— Syriaca arboreſcens, Ketmia Syrorum Imperati.	1176.	73
— Veneta, seu Vesicaria, trifolia, hirsuta, flore sulfureo, unguibus purpureis.	471.	75
— Africana, seu Vesicaria, trifolia, glabra, flore sulfureo cum unguibus purpureis.	472.	76
Alchimilla argentea, montana, pentaphyllea.	756.	1140
— minor, hirsuta, cineritia, Italica.	928.	1139
Alectorolophos Italica, versicolor, spicata.	666.	208

	Icon.	Obser.
— Italica, luteopallida.	665.	209
— Montana, flore albo.	469.	210
Allium saxatile, Acori radice, flore purpureo.	1022.	782
Althæa frutex, flore albo, rubro, carneo, purpureo-violaceo.	491.	73
— fruticans, incana, minore folio, Hispanica.	428.	69
— rugosior, rubro flore, Hispanica.	427.	70
— virens, rotundifolia, flore amplo, purpurascens, Italica.	479.	66
Alyssum Creticum, incanum, orbiculatis siliquis.	862.	396
Amaranthus major, purpureus, crispis paniculis, semine rufo.	658.	435
— major, incurvâ & obsoletè rubrâ paniculâ, semine albo.	657.	436
— major coccineus, sparsis & longioribus thyrsi flagellis, semine nigro.	642.	437
— purpureus, crassioribus setis, nutante crispâ jubâ, semine nigro.	641.	438
— Æstivus, majoribus, coccineis nutantibusque flagellis, semine pallido.	659.	439
— major, purpureo-violaceus, erectis congestisque spicæ flagellis semine nigro.	649.	440
— major, purpureo-violaceus, tenuibus, transversis spicarum flagellis, semine nigro.	650.	441
— major, virentibus spicarum paniculis, semine nigro.	648.	442
— tricolore folio, è viridi pallidis flosculis.	647.	443
— purpureo-violaceus, tenuibus setis, nutante & crispâ jubâ, semine nigro.	645.	444
— coccineus, thyrsoides, semine nigro.	646.	445
— serotinus, major, purpureus, oblongâ sparsâque spicâ, semine nigro.	639.	447
— serotinus, major, purpureo-violaceus, tenuioribus spicis & flagellis, semine nigro.	640.	446
— major, præcox, nutantibus, roseis flagellis, semine carneo.	664.	448
— major, serotinus, arborescens, nutantibus, roseis flagellis, semine carneo.	663.	449
— major, præcox, crassâ, congestâ & coccineâ spicâ, semine albo.	662.	450
— serotinus, medius, purpureâ, crassâ, congestâque spicâ, semine pallido.	661.	451
— major, purpureus, rarioribus thyrsorum flagellis, semine nigro.	677.	452
— præcox, incurvis, crassioribus coccineisque flagellis, semine albo.	660.	453
— præcox, minor, coccineis erectis flagellis, semine albo.	678.	454
— minor, coccineus, paniculâ tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ.	506.	455
— minor, pallidus, paniculâ, tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ.	505.	456
— minor, aureus, pyramidalis, flagellis hispidis, crispis & cristatis.	476.	457
— minor, luteo-paleaceus, pyramidalis, flagellis erectioribus, cristatis.	475.	458
— minor, aureus, latâ & cristatâ paniculâ.	507.	459
— minor, coccineo-purpureus, latâ cristatâque in globum paniculâ.	508.	460
— minor, purpureo-violaceus, amplâ, latâ, globosâ, crispâ & cristatâ paniculâ.	478.	461
— minor luteo-purpureus, pyramidalis, longis, sparsis & cristatis flagellis.	477.	462
— minor, simplici paniculâ, semine nigro.	643.	463
— minor, coccineus, simplici & nutante paniculâ, semine albo.	644.	464
— minor, serotinus, obsoletè rubente spicâ, semine nigro.	671.	465
— minor, atro-purpureus, cristatis spicis.	672.	466
— minor, coccineus, sparsis thyrsi flagellis, semine rufo.	653.	467
— minor, serotinus, purpureo-violaceus, crassioribus & rarioribus spicæ flagellis, semine nigro.	654.	468
— minor, violaceo-purpureus, brevi, congestâ, acutâ spicâ.	679.	469
— viridi spicâ, Indicus, minor.	680.	470
— minor, spicâ singulari, albo-purpureâ luteâque, lunatis circum caulem foliis.	1195.	471
Ambrosia vulgaris.	1144.	907
Amelanchier Gallo-provinciæ.	527.	1381
Ammi Sii, vel Laveris folio, flore albo, semine nigro.	1190.	614
Amomum.	571.	1393

Anagyris foetida, Cretica, oblongo folio, violaceis-luteis floribus.	569.	1383
Anchusa angustis, villosis foliis, Hispanica.	577.	148
— angustis, dentatis foliis, Hispanica.	578.	142
— Lignosior, Monspeliensium, flore violaceo.	1168.	143
Androsæmum montanum, minus.	490.	543
Anemone latifolia, flava, 1. Clusii.	792.	574
Angelica Atropurpurea, Canadensis.	1319.	627
— lucida, Canadensis.	1320.	628
Aninga lba Bras. Ari facie.	282.	175
Anonis non spinosa, flore thyrsoides, carneo, Polonica.	1214.	830
— non spinosa, purpurascens, minor, Italica.	354.	831
— purpurea, non spinosa, minor.	1106.	832
— luteo-purpurea, minima, angustifolia, Hispanica.	1104.	833
— non spinosa, trifolia, glabra, luteo-purpurascens, saxatilis.	762.	834
— non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, Hispanica.	258.	835
— lutea, viscosa, minor, marina, latifolia, Hispanica.	1105.	836
— non spinosa, villosa & viscosa, Hispanica.	775.	837
— trifolia, pallidis nutantibusque flosculis, maritima.	766.	838
— lutea, Trixaginis folio, maritima.	776.	839
— lutea, viscosa, latifolia, minor, flore pallido.	1239.	840
— lutea, montana, non spinosa, minima.	1107.	841
Anthora vera, flore luteo.	609.	874
Anthyllis Alfinefolia, Polygonoides, major.	534.	1134
— Alfinefolia, incana, marina, minima.	529.	485
— trycophyllos, Lychnitos, minima, flore albo.	530.	482
— recta, trycophyllos, inverso flore albo, Hispanica.	533.	481
— Lychnites, annua, seu minor, angustifolia, flore albo.	580.	483
— Polygonoides, angustifolia.	579.	484
— Lychnoides, perenni radice, trycophyllos, minor.	531.	480
— Linifolia, flore albo, Polygonoides.	532.	572
— leguminosa, vesicaria, lutea.	554.	798
— leguminosa, montana, caeruleo flore.	553.	797
— leguminosa, lutea, Italica.	575.	796
— Lunaria, flore luteo, Italica.	576.	848
Antirrhinum majus, saxatile, angustissimis foliis, flore purpurascen-		
te, minori.	637.	192
— majus, angustifolium, amplo flore, purpureo, Romanum.	638.	191
— latifolium, pallido, amplo flore.	655.	190
— minus, flore carneo.	651.	195
— minus, flore carneo, elatius.	652.	194
— minus, albo, amplo flore.	656.	193
— saxatile, minus, Origani folio, viscoso & villoso, flore albo,		
amplo.	597.	203
— saxatile, villosum, folio Origani glutinoso.	598.	199
Aparine minima, flore albo.	58.	94
Apocynum minus, rectum, Canadense.	72.	65
Aquilegia.	627.	903
— simplex, corniculata, flore caeruleo.	628.	875
— alba, multiplex, è purpureo-violaceo variegata.	618.	876
— corniculata, violacea, umbellâ reflexâ.	614.	877
— corniculata, flore albo, minore.	31.	878
— corniculata, flore caeruleo, minore.	32.	879
— corniculata, rosea, prælongo flore albo.	616.	880
— corniculata, rosea, caerulea, brevi & densissimo flore.	615.	881
— corniculata, rosea, altera.	676.	882
— corniculata, crispa, longior.	675.	883
— corniculata, crispa, saturè rubra, major.	630.	884
— corniculata, crispa, minor, rubra.	629.	885
— promiscua, vario flore.	623.	886
— inversa, pleno flore.	613.	887
— stellata, simplex, violaceo-purpurea, major.	624.	888
— stellata, purpurea, albis foliorum acuminibus.	626.	889
— stellata, purpureo-violacea, minor.	625.	890
— stellata, albo violacea, variegata.	621.	891

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obsero.
— stellata, maxima, alba, <i>μελανοστιχες</i> .	622.	892
— stellata, umbellâ reflexâ, flore pleno, tenuifolia, violacea.	634.	893
— stellata, violacea, minor, latifolio & plenissimo flore.	633.	894
— stellata, alba.	673.	895
— stellata, cærulea.	674.	896
— stellata, flore violaceo, latifolio, crispo.	620.	897
— stellata, flore violaceo, latifolio.	619.	898
— stellata, crispa, minor, violacea.	635.	899
— stellata, crispa, minor, rubra.	636.	900
— degener, virescens, stellata, rosea.	608.	901
— rosea, cæruleo-violacea, rara.	607.	902
— tenuifolia, præcox, Canadensis, purpuro-luteo simplici flore.	617.	904
Arbor tristis Shardonii.	1196.	1363
Arbutus vulgaris.	674.	1361
— oblongo & acuto fructu.	673.	1362
Arctium montanum, angustifolium, Hispanicum.	1193.	961
— montanum, minus, incano Taraxaci folio.	386.	962
Argemone lutea Ponæ.	764.	475
Arisarum dulce, non lactescens, latifolium, minus, Brasilianum.	283.	183
— majus, caulescens, aquaticum, Brasilianum.	281.	184
— angustifolium, majus.	284.	177
— latifolium, minus, repens, cespitosum.	1150.	182
— latifolium, colubrinum, repens.	1130.	181
— serpentinum, rotundiore folio, radice globosâ, Italicum.	573.	180
Arthemisia tenuifolia, major, Hispanica.	550.	1015
— tenuifolia, media, Hispanica.	589.	1016
Arum Ægyptiacum, longâ radice.	669.	171
— Ægyptiacum, transversâ & repente radice.	670.	172
— Ægyptium, vulgatum, rotundâ minorique radice.	667.	169
— Ægyptium, rotundâ crassâque radice.	668.	170
Asperula erecta, cærulea, incana, angustifolia.	765.	97
— cærulea, supina, latifolia.	766.	96
— flore carneâ, acuto folio.	541.	96
— folio obtuso.	541.	105
Asplenium crispum, subrotundis dentatisque foliorum alis.	603.	1274
— majus, oblongis, serratis foliorum alis.	604.	1275
Alter Autumnalis, latifolius, parvo, purpureo, medio luteo flore.	546.	1074
— angustifolius, Tripolii flore.	606.	1065
— cernuus, flore citrino Columnæ.	1142.	1023
— Conyzoides, luteus, Pilosellæ folio, Hispanicus.	1208.	1061
— Conyzoides, angustissimo Linariæ folio, Hispanicus.	605.	1064
— legitimus Clusii alter, seu spinosus, luteus.	551.	1120
— legitimus Clusii, mollior, luteus.	552.	1121
— luteus, alato caule, Canadensis.	535.	1091
— supinus, luteus, Massilioticus.	1151.	1122
Astragaloides incana, flore purpureo, Lentis siliquis.	537.	850
— montana, incana, major, flore albo.	557.	849
— pusilla, incana, amplo, purpureo flore.	537.	851
— pumila, incana, hispida, flore albo.	537.	852
Astragalus incanus, tomentosus, pallido, globoso flore, Italicus.	722.	1391
Atractylis cærulea, incisiss foliis, Hispanica.	591.	971
— Hispanica, integro & cinereo folio, flore citrino.	593.	1126
— Hispanica, tenuifolia, flore luteo.	594.	1125
Attriplex Lovitiensis Corvini, semine anguloso.	1210.	1131
— sylvestris, major, anguloso folio.	540.	1132

B

Baccharis minor, Italica, flore Asteris luteo.	1145.	1060
Balsamina lutea, Polonica.	1197.	855
Barba Jovis Cytisi folio, flore rubello, seu altera Anguillaræ.	377.	1389
— Lentifolia, incana, flore luteo, i. Anguillaræ.	378.	1388
Bellis montana, maxima, glabra, ramosa, subrotundo folio, Indica.	438.	1097
montana,		

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Obfer. V</i>
—montana, minor, ramosa, glabra, Cotyledonoides, Nursina.	1237.	1099
—montana, major, hirsuta, caule folioso, non ramoso, Nursina.	437.	1098
—minima, incisus caulis foliis, Hispanica.	1153.	1103
—ramosa, umbellifera, Canadensis.	388.	1068
Betonica Alpina, incana, purpurea.	340.	294
—montana, lutea.	339.	295
Bistorta montana, minima.	489.	1150
Blattaria flore albo Corvini.	1249.	158
Blitum angustifolium, verticillatum.	1181.	1130
Botrys Bœtica, Atriplicis sylvestris facie, vulgò Botrys Mexicana.	1185.	1133
—incana, ferratis foliis, Hispanica, Abrotani facie.	486.	1017
Brassica sylvestris, albido flore, nutante siliquâ.	353.	403
Bromos sterilis, erectâ paniculâ, major.	76.	1238
Brunella latifolia, Italica, flore carneo.	562.	239
Bruscus seu Ruscus rotundifolius, vel Myrtacantha latifolia.	517.	4
Bugla media, flore cæruleo.	338.	349
—minima, glabra, flore azureo.	337.	350
Buglossum minus, angustifolium, flore violaceo, albo umbilico, Italicum.	1207.	140
—scorpioides, hirsutum, flore cæruleo, Italicum.	403.	141
—sylvestre, angustifolium.	325.	137
—sylvestre.	326.	136
—sylvestre, minus, flore azureo, radice perenni, Italicum.	333.	138
—sylvestre, minus, flore carneo, parvo, retuso.	1253.	149
Bulbocastanum alterum, caule firmiore.	244.	613
Buplevrum fruticans, angustifolium, Hispanicum.	1255.	623
—3. minimum Fabii Columnæ.	1248.	622

C

C Acalia verior, Urticæ folio, purpurascente Leucosii flore.	357.	405
—Urticæ folio, flore albo.	358.	1003
Capœa montana, minor, albido flore.	1170.	554
Calamagrostis Nastoides, Avenacæ paniculâ.	363.	1243
Calamintha montana, præstantior, flore purpureo.	398.	265
—Pulegii odore, minor, Italis Mentuccia minore, ô Nepetella.	1166.	266
Calathiana verna, cæruleo-purpurea Dalechampii.	509.	22
—verna, cæruleo-purpurea Dalechampii Joan. Bauh.	509.	22
Calceolus Marianus, albo sandalio & brevior, Canadensis.	260.	906
Campanula minor, Alpina, folio Cochleariæ.	454.	81
—Montana, minor, angustifolia.	487.	77
—saxatilis, rotundifolia, hispida, flore cæsis, amplo, Italica.	453.	80
Cannabis sputia, angustifolia, variegato flore, Polonica.	1158.	241
Caprifolium erectum, minus, Xylostei Dodonei species.	511.	1367
Cardamine aquatica, Cotyledonoides, flore albo.	1163.	419
—sylvestris, minor, Italica.	455.	418
Cardamomi species III. Ponæ.	571.	1394
Carduncellus purpureus, tenuifolius, singulari flore.	345.	972
Carduus Cypis Theophrasti.	376.	918
—ferox, Hispanicus, spinis majoribus.	474.	929
—ferox, mitior, Hispanicus.	473.	930
—nemorosus, Italicus.	417.	925
—purpureus, Cyani folio.	418.	917
—stellatus, luteus, aculeatis & profunde incisus foliis.	346.	916
—sphærocephalus, latifolius, cæruleus, major.	412.	1027
—sphærocephalus, latifolius, albus.	143.	1026
—sphærocephalus, cæruleus, capite ferrugineo, major.	413.	1029
—sphærocephalus, cæruleus, capite ferrugineo, minor.	414.	1030
—sphærocephalus, cæruleus, minor.	411.	1027
—sphærocephalus, tenuifolius, violaceus.	144.	1028
Carlina minima, caulodes, Hispanica.	592.	1127
—Montana, minor, acaulos.	492.	967
Caryophyllata Alpina, minima, flore aureo.	399.	588
—Alpina, tenuifolia, incana, flore luteo, longius radicata.	400.	589

	Icon.	Observ.
Caryophyllus minor, foetidus, purpureo-violaceus.	495.	647
— montanus, umbellatus, floribus variis, luteis ferrugineis, Italicus.	497.	648
Cedrus Lybani.	499.	1345
Centaurium majus, purpureum, foliis Cynaræ, Pyrenæum.	513.	968
— luteum, majus, Alpinum.	514.	969
Centaurium minus, vulgare, flore albo, latifolium.	424.	110
— minus, purpureum, angustifolium.	425.	113
— minus, angusto prælongoque folio, flore rubello.	435.	111
— minus, leptophyllum, polyanthes, accenso, acutoque flore.	436.	112
— minus, ramosum.	1242.	114
— minus perfoliatum, luteum, umbellatum.	515.	115
— minus, perfoliatum, luteum, non umbellatum, rarioribus & crassioribus florum capitellis.	516.	115
— minus, perfoliatum, luteum, crassioribus capitellis.	516.	115
— minus, luteum, latifolium, non perfoliatum.	468.	116
— minus, luteum, angustifolium, non perfoliatum.	467.	117
— minus, luteum, Allinoides, Polonicum.	1156.	118
Ceterac officinarum majus, seu Asplenium majus.	1044.	1272
— officinarum vulgare, seu Asplenium Mathioli.	1051.	1271
— officinarum minus, seu Asplenium minus.	1052.	1273
Chamæchrysocome prælongis purpurascensibusque Jaceæ capitulis.	406.	940
Chamæcistus mas, flore rubello, Thymi foliis.	328.	519
— luteus, Thymi durioris folio.	441.	521
— luteus, imis Thymi foliis.	442.	523
— luteus, Thymi folio, polyanthes seu major.	443.	517
— Thymi folio, oliganthes seu minor.	444.	518
— incanus, Tragorigani folio, Hispanicus.	415.	512
— angusto Thymi folio, Hispanicus.	416.	513
— luteus, toroso folio, Hispanicus.	439.	520
— luteus, imis Serpilli foliis.	440.	522
— luteus, vermiculato folio, major.	445.	515
— brevi vermiculatoque folio, minor, Hispanicus.	446.	514
— supinus, Hyssopti foliis villosis.	818.	535
Chamælea pumila, saxatilis, flore pallido, Italica.	234.	1351
Chamælinaria violacea, Italica.	1162.	202
Chamælinum subrotundo folio.	1165.	684
— gramineo, seu acuto folio.	1165.	479
Chamæmelum marinum.	521.	1110
— montanum, incanum, Absinthioides, Italicum.	457.	1111
Chamærubus odoratus, Vitis folio, Canadensis.	396.	1375
Chamæspartium supinum, caule folioso, Hispanicum.	570.	1382
Chondrilla Cyanoides, cærulea, Coronopi folio.	1134.	1054
— Cyanoides, lutea, Coronopi folio non diviso.	1135.	1055
— purpurea, tenuifolia, capite Jaceæ, semine Cardui.	1136.	948
Chrysanthemum Bellidis folio, seu Bellis lutea.	1244.	1092
— majus, latiori Chamæmeli folio, flore aureo folioso, Italicum.	451.	1094
— pallidum, minimis imisque foliis incisis, superioribus integris & capillaribus.	421.	1093
— Tanacetii folio, flore aureo, Italicum.	465.	1113
— Tanacetii folio, flore albo, montanum, Italicum.	466.	1114
— Valentinum, seu tenuifolium, flore aureo, aphylo.	449.	1112
— tenuifolium, flore bullato, aureo.	450.	1095
— tenuifolium, flore luteo, aphylo, minore.	452.	1096
Chrysocome citrina, supina, latifolia, Italica.	367.	985
— latifolia, major, singulari flore.	426.	981
— latifolia, minima, singulari flore.	425.	980
— marina, umbellata.	1125.	976
— major, Rorismarini folio.	278.	973
— media, seu Stachas citrina, vulgaris.	409.	974
— seu Stachas citrina, minor.	410.	975
— mollior, singulari, minorique capitello.	407.	979
— muralis, paucioribus, congestis fuscisque capitellis.	277.	978
Cicer montanum, fruticans, incanum, angustifolium, serratum, minus	419.	844

Index Iconum Barrelieri.

vij

	<i>Icon.</i>	<i>Observa.</i>
— montanum, fruticans, incanum, latifolium, caule tortuoso & tomentoso, flore purpureo, Hispanicum.	420.	843
— sylvestre, fruticans, incanum, angustifolium, ferratum, flore purpureo, Hispanicum.	299.	844
— sylvestre, fruticans, angustifolium, non ferratum, Hispanicum.	300.	845
Cichorium spinosum Imperati.	1159.	1056
Cicuta montana, tenuifolia.	1161.	612
Cirsium Acanthii Illyrici folio, purpureum.	1117.	966
Cistus Halimi folio, flore luteo, majore, Italicus.	291.	526
— Halimi folio, flore luteo, amplo, maximus, Hispanicus.	292.	525
— Halimi minoris folio.	287.	527
— Halimi minoris folio, minor.	289.	529
— Halimi minoris folio, Hispanicus.	1316.	528
— incanus, Majoranæ folio, Hispanicus.	313.	531
— Lavandulæ latifoliæ folio.	288.	532
— Lavandulæ folio, thyrsoides.	293.	533
— angusto Libanotidis folio, flore singulari.	294.	534
— latifolius, magno flore.	1315.	547
— Ledum, Salviæ folio, Hispanicus.	314.	548
— Oleæ folio villosus, flore aureo, Italicus.	365.	509
— Serpilli folio, villosus, flore pallido, Italicus.	366.	510
— Thymi folio, saxatilis, Italicus.	290.	516
— angusto Serpilli folio, villosus, flore aureo, Italicus.	488.	511
— minor, Thymi folio, flore ferrugineo.	285.	524
— minor, brevi vermiculato folio, Hispanicus.	286.	514
— humilis, compactis in verticillos minoris Halimi foliis.	327.	530
Clematitis cærulea, Pannonica.	397.	587
— trifolia, flore Melanthii clavato; Granadilla Monardi, Maracot Peruvianis.	1243.	477
Coccygia Theophrasti, Cotinus Plinii.	528.	1368
Coccus Indorum Corvini.	1314.	1397
Cochlearia Arctica.	1305.	381
Colchicum autumnale, angustifolium, album; an Hermodactylus?	304.	706
Contraerva.	482.	1398
Convolvulus longifolius, azureus, niveo umbilico, erectus.	321.	29
— longifolius, azureus, niveo umbilico, supinus.	322.	28
— marinus, repens, angusto & oblongo folio, flore purpurascens.	1132.	31
— minor, spicæfolius, Hispanicus.	311.	30
— Betonicæ Althææque foliis, repens, argenteus, flore purpureo.	312.	34
— saxatilis, erectus, villosus, perennis, flore ex albo purpurascens, Hispanicus.	470.	32
— quinquefolius, sive foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo Bauhini Prodromi.	319.	35
— henneaphyllos, flore purpureo.	320.	36
— pinnato folio, muriceo Gelsemini flore.	60.	106
Conyza montana, Bellidis folio, croceo flore singulari, Italica.	361.	1058
— montana, incana, villosa, folio acuto, flore aureo, non singulari.	362.	1057
— marina, tuberosa.	157.	1062
— major, Chrysocomes folio.	405.	1001
— minor, Chrysocomes folio.	408.	1002
— minor, fruticans, viridi Stæchadis citrinæ folio, flore folioso, luteo, Italica.	369.	1066
— minor, vera Lobelii, lutea.	370.	1072
— minor, unicaulis, annua, pallido flore.	1164.	1073
— montana, saxatilis, Hyssopi folio villosa & glutinosa, Hispanica.	158.	1063
— palustris, minima, Hispanica.	1175.	1067
Coralloides ramis longioribus prædita.	1280.	1305
— ramosa, palmata.	1279.	1306
Coris lutea, Ericoides, fruticans, Hispanica.	351.	542
Cratægonum pumilum, luteum, Absinthii foliis, Hispanicum.	375. 376.	580
Crocus vernus, minor, violaceus, medio purpureo flore, Italicus.	383.	710
— autumnalis, flore albo, verus.	303.	709
— vernus latifolius, flore violaceo, diluto, Italicus, maximus.	384.	708

	Icon.	Observ.
Cruciata montana, minor, flore cæruleo.	584.	154
— major, villosa, flore Molluginis albo.	324.	100
— minor, glabra, flore Molluginis albo.	323.	101
— marina, villosa, minor, duriuscula.	542.	103
Cucumis marinus Rondeletii, Aldorovandi, fortè dens lupi, fungus marinus, zoophytos.	1293.	1312
Cyanus purpureus, capite spinoso, Syriacus.	503.	927
— montanus, angustifolius, purpureus.	1323.	964
— montanus, medius, caule folioso, seu multifolius.	389.	963
Cynocrambe Alfinis folio.	335.	1260
Cynoglossum montanum, minus, angustifolium, purpureum.	334.	152

D

D aucus tertius Lugdunensis Historiæ.	1199.	616
— Mathioli, minor, tenuifolius.	1241.	641
— Selinoides, tuberosis geniculis, Illyridis semine.	1177.	614
Dentaria, major, αφύλλος, Orobanches facie.	80.	220
Diſtamnus albus officinarum, minor, Hispanicus.	1318.	905
— falsus verticillatus, pericarpio conoide, Creticus.	129.	248
— Creticus, verticillatus, odoratus.	130.	250
Digitalis Verbasci folio, purpurea, minor, Hispanica, perennis.	1183.	187
Doronicum minus, rotundifolium.	1149.	1190
Dorychnium luteum, Hispanicum, carnosius.	133.	1386
— luteum, majus.	134.	1387
— luteum, minus, incanum.	1179.	806
Draba, seu Arabis latifolia, flore albo.	213.	382
— angustifolia, Babylonica, flore albo.	213.	382
— angustifolia, major.	270.	413
— angustifolia, media.	269.	
— angustifolia, minima.	269.	
Dracunculus palustris, Polonicus Corvini.	574.	176

E

E chioides minus, globoso, echinato & singulari semine.	1246.	139
Echium luteum, minimum, Hispanicum.	1254.	144
Elleboraster Indicus, trifolius.	1143.	573
Elleborus Ferulaceus Lobelii, Bupthalmum Dodonæi, forte Pulsatilla lutea Corvini.	1178.	583
Elichrysum. Vide Helichrysum.		
Endivia major, lactucina, spinosa.	135.	1046
— minor, lactucina, spinosa.	136.	1047
Eruca sylvestris, flore albo, Italica.	132.	428
— sylvestris, minor, lutea, Bursa pastoris folio, Italica.	1016.	422
— Viminea, Iberidis folio, luteo flore.	131.	421
— minor, bulbi napique radice, siliquâ rotundâ.	1198.	426
— minimâ, oblongâ & hastatâ siliquâ.	1198.	427
— maxima, Canadensis, lutea.	706.	425
Erucula hirsuta, floribus albis.	195.	423
— flore rubello, Hispanica.	195.	424
Eryngium planum, cæruleum, campestre, Polonicum Corvini.	1174.	642
— pumilum, polyrrhizon.	1247.	645
— pumilum, Amethystinum.	376.	644
— minimum, trifidum, Hispanicum.	36.	643
— umbellatum, Hispanicum.	35.	646
Erysimum tertium, præcox, flore carneo.	196.	420
Esula fruticans, seu Pithyusa Romanorum.	197.	55
— minor, πολυχλυσ, aculeata.	85.	62
— minor, Myrtifolia, longius radicata.	211.	54
— rotundifolia, serrata, carnosior.	212.	57
Eupatoria foliis Enulæ, seu latifolia.	71.	1004
Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum.	1209.	1024
Euphrasia vulgaris, latifolia, atropurpurea.	276.	212

vulgaris,

Index Iconum Barrelieri.

- vulgaris, vera, flore albo.
- sylvestris, major, purpurea.
- rotundifolia, forte Alfine, an Anthylloides rotundifolium?
- vermiculato folio, Hispanica.

Icon.	Obser. ix
276.	213
276.	211
275.	214
1204.	215

F

- F**aba minor.
- Ferula durior, seu rigidis, & brevissimis foliis.
- Filix baccifera Cornuti.
- florida, minor, Hispanica.
- Festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescentibus.
- gracilis, paucis utriculis.
- Graminea, hirsutis Bryzæ glumis, compactior.
- Graminea, glumis non hirsutis, erectior.
- Fragaria flore pleno, fructu rubello.
- spinoso fructu.
- Fucus spiralis, serratus.
- folliculaceus, serrato folio.
- pilosus erectus, minor.
- Fumaria henneaphylla, Hispanica, saxatilis, flore vario.
- tenuifolia, erecta, purpurea, Hispanica.
- tuberosa, insipida, Canadensis.
- siliquosa, sempervirens, Canadensis, flore carneo, rictu aureo.
- Fungus palmatus.
- foliatus, major, carnosior, dendroides, cristatus.
- cespitosus, ramosus, umbellatus, major, pallidè luteus.
- cespitosus, ramosus, umbellatus, minor, albus.
- ramosus, cristatus, medius.
- ramosus, cristatus, angustioribus lobis & crispis.
- ramosus, Abietinus, niveus.
- ramosus, crispus, violaceus.
- ramosus, Coralloides, purpureus.
- Coralloides, luteus, Italicus.
- Coralloides, roseus, Italicus.
- ramosus, comosus.
- Coralloides, cancellatus, purpureus.
- Coralloides, cancellatus, flavesceus.
- Phalloides, Gallus.
- Phalloides, Batavus.
- Amanita, marinus, purpurascens.
- Amanita, gilvoluteus marinus.

193.	799
77.	638
1120.	1262
37.	1277
75.	1229
83.	1155
83.	1228
75.	
89.	590
90.	591
1303.	1307
1122.	1308
1292.	1335
42.	866
41.	865
107.	867
108.	868
1267.	1295
1268.	1296
1269.	1289
1270.	1290
1271.	1297
1272.	1298
1257.	1299
1261.	1300
1262.	1301
1260.	1302
1259.	1303
1266.	1304
1263.	1291
1265.	1292
1264.	1293
1258.	1294
1294.	1310
1293.	1311

G

- G**allium villosum.
- aquaticum, flore albo.
- album, minimum,
- Gelseminum, Arantii folio, flore albo, duplici, odoratissimo, seu Alexandrinum.
- trifolium, odoratissimum, semper virens, exoticum, seu Indicum.
- Clematites, flore igneo amplo, seu Virginianum.
- Gentiana major, vulgaris, pallido & parvo flore.
- Alpina, major, flore aureo & purpureo obsoleto.
- major, purpureo flore Clusii.
- Asclepiadis folio.
- minor, cruciata, flore cæruleo, erectior.
- minor, cruciata, flore purpureo, supina.
- cærulea, punctata, annua Pennæ, xij Clusii.
- minima Mathioli.
- autumnalis, minor, annua, flore cruciata, ad latera, piloso, fugax.
- cærulea, fimbriata, angustifolia, autumnalis Columnæ.
- concava, Anglica Gerardi.
- fugax Clusii, Bauhini purpureo-cærulea.
- minor, cærulea, stellato & per oras crenato flore, Dalechampii.

81.	95
82.	102
57.	98
61.	1360
62.	1359
59.	186
63.	7
69.	8
64.	9
70.	10
65.	11
66.	12
91.	13
51.	14
121.	15
97.	15
92.	669
510.	20
109.	25

	Icon.	Obfer.
Gentianella Alpina, lato, acuto folio, flore minus patulo, albo, cæruleo & cælio.	106.	
— Alpina, lato, rotundiore folio, flore amplo reflexo, colore azureo.	105.	24
— Helvetia, amplo, azureo flore.	47.	
— minor, purpurea, Violæ Marianæ flore.	110.	
— minor, ἀκαυλός, Violæ & maximi Convolvuli flore.	110.	
— fugax, Alpina, flore aureo.	104.	23
— minor, verna, cæruleo, stellato flore Clusii.	109.	25
— Alpina, minor, verna, subrotundo folio, flore cæruleo.	98.	25
— fugax, æstiva, cærulea, minor.	103.	22
— fugax, æstiva, stellata, cærulea, minor.	103.	22
— fugax Clusii, Bauhini subcærulea.	510.	21
— autumnalis, annua, cæruleo-purpurea, multiflora.	102.	19
— annua, azureo flore.	48.	18
— cærulea, cordata Columnæ.	122.	18
— fugax Clusii.	103.	17.
— purpurea, minima Columnæ.	97.	16
— seu Calathiana Viola Lugdunensis Historiæ.	52.	14
— seu Campanula pratensis Lugdunensis Historiæ.	52.	14
— autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, major.	101.	26
— autumnalis, Serpillifolia, flore crenato, Bavarica, minor.	101.	27
Geranium Batrachioides, flore purpureo, reflexo, Italicum.	39.	565
— Creticum, maximum Corvini.	1167.	570
— Creticum, minus, seu alterum, villosum.	492.	569
— hæmatodes, purpureum, parvo flore, Italicum.	67.	566
— minus, Saniculæ folio, albo flore.	87.	564
— montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore.	40.	567
— Myrrhinum, tenuifolium, amplo flore purpureo.	1245.	568
— noctu odorum, Indicum, Geranium triste Cornuti.	68.	571
Glans unguentaria, seu Myrobolanus Plinii.	1238.	1399
Gnaphalium vulgare, majus, flore citrino, amplo, Hispanicum.	33.	990
— majus, album, repente & cespitosâ radice.	74.	988
— majus, flore citrino, amplo.	73.	986
— Syriacum, flore purpureo.	34.	989
— sylvestre, supinum, retusis foliis, Hispanicum.	1147.	908
— roseum, supinum, caulescens.	127.	994
— roseum, I. Casp. Bauhin.	127.	991
— roseum, hortense, seu II. latifolium Casp. Bauhini.	127.	992
— roseum, supinum, Serpillifolium.	128.	997
— roseum, acutioribus foliis, acaulon, Italicum & Hispanicum.	1147.	993
— bombycinum, Serpillifolio, minimum.	128.	998
— minimum, supinum, Hispanicum.	295.	1000
— Leontopodium, erectum.	127. 128.	995
— Leontopodium, supinum.	127.	
— erectum, angustifolium, minus.	128.	996
Gramen Sparteum, spicatâ, Bryzæ paniculâ & corniculatâ.	25.	1154
— Sparteum, longâ & spicatâ paniculâ, Lolii utriculis, Festuæ potius, majus.	13.	1156
— Sparteum, spicatum, Lolii utriculis, majus.	748.	1157
— palustre, locustis Eruçæformibus.	2.	1158
— Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, maximum.	905.	1159
— Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, medium, seu vulgare.	905.	1160
— Loliaceum, spurium, hirsutum, aristis geniculatis, minus.	905.	1161
— Loliaceum, Junceum, majus.	5.	1162
— Loliaceum, Junceum, minus.	6.	1163
— Junceum, nodosum, minimum, capillare.	117.	1164
— Junceum, spicatum, minus.	117.	1165
— Caryophyllatum, Loliaceum, repens.	906.	1167
— caninum, maritimum, spicatum, echinatis glumis.	718.	1169
— Sparteum, pennatum, majus.	46.	1170
— Hordaceum, δισκόβ, majus, ciliaribus glumis, durius.	112.	1171
— Secalinum, bulbosâ radice, seu ex Alepo Bauhini.	112.	1172

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obser. &]
— Hordeaceum, minimum.	111.	1173
— spicatum, folio aspero, spicâ grumosâ, longiore.	26.	} 1175
— spicatum, folio aspero, spicâ grumosâ, brevior.	26.	
— capite globofo, echinato, minus.	863.	} 1176
— minimum, spicâ globosâ, echinatâ.	28.	
— Alopecurum, majus, spicâ virescente, divulsâ, pilis longioribus.	115.	1153
— Alopecurum, minus, spicâ virescente, divulsâ.	115.	1152
— Alopecurum, molle, spicâ incanâ, obtusâ, majus.	116.	} 1178
— Alopecurum, molle, spicâ incanâ, acutâ, minore.	116.	
— Alopecurum, spicâ asperâ.	123.	1177
— Alopecurum, viridi & molli spicâ.	123.	1179
— Sciurum, seu Alopecurum, minus, heteromallâ paniculâ.	4.	1180
— Alopecurum, spicâ glumosâ, luteâ, villis crispis.	124.	1181
— Myurum, spicâ è viridi albescente.	124.	1182
— Sparteum, Alopecuroides, spicâ sericeâ.	13.	1183
— Sparteum, Alopecurum spicâ sericeâ, grumosâ.	3.	1184
— Sparteum, Alopecurum, spicâ sericeâ, glumosâ, Typhinâ.	3.	1185
— Typhinum, Plantaginis spicâ glumosâ, digitatâ, heteromallon, majus.	27.	1186
— Typhinum, Plantaginis spicâ glumosâ, digitatâ, heteromallon, minus.	27.	1187
— pratense, Alopecurum, sericeâ paniculâ.	11.	1188
— Typhinum, pratense, tuberosum, spicâ asperâ.	22.	1189
— Typhinum, arvense, radice tuberosâ, spicâ asperâ, longâ.	22.	1190
— Typhinum supinum, tuberosum, spicâ non asperâ.	53.	1191
— Typhinum, supinum, Italicum, minus.	54.	1192
— Typhinum, maritimum, longius radicat.	717.	1193
— Typhinum, spicâ conoide, striatâ, culmo violaceo.	21.	1194
— Typhinum, Junceum, perenne.	21.	1195
— Typhinum, longissimâ spicâ Phalaridis, molli, albicante.	14.	1196
— Typhinum, minori spicâ Phalaridis, durior, subfuscâ.	14.	1197
— Typhinum, Paniceum, utriculatum, amplo utriculo.	28.	1198
— Typhinum, Plantaginis spicâ, aristis geniculatis.	699.	1199
— Typhinum, Phalaroides, majus, bulbosum, aquaticum.	700.	1200
— Typhinum, Phalaroides, minus, bulbosum, aquaticum.	6700.	1201
— Typhinum, Phalaroides, pilosâ spicâ, aquaticum, bulbosum.	699.	1202
— Typhinum, Phalaroides, arvense, bulbosâ radice.	10.	1203
— Phalaroides, verius, bulbosâ radice.	9.	1204
— Crucis, seu cruciatum, tetradactylon.	753.	1205
— daetylum, spicatum, aristis geniculatis.	763.	1206
— Caninum, pratense, paniculatum, glumis Asparagi foliis similibus, mucronatis, sylvestre.	364.	1207
— palustre, Arundinaceum, Mili Paniculâ, semine Phalaridis.	8.	1151
— Miliaceum, majus, nutante paniculâ, Arundinaceum.	754.	1208
— Miliaceum, aquaticum, Bryzæ locustis, semine rufo.	7.	1209
— Miliari paniculâ, minus.	704.	1210
— arvense, paniculâ crispâ, pallidâ, seu majus.	703.	} 1211
— arvense, paniculâ crispâ, Janthinâ, folio geniculato, minus.	703.	
— murale, Junceum, minus, Allii radicibus, paniculâ Janthinâ, non crispâ.	272.	} 1212
— arvense, Filicinâ duriori paniculâ, gracilius.	49.	
— arvense, Polypodii paniculâ crassiore.	50.	1213
— Eranthemum, seu <i>sp. sp. sp.</i> , Phalaroides, paniculatum, multiplici, & tenui Brizæ spicâ.	43.	1215
— Eranthemum, palustre, tenui & sparsâ Bryzæ paniculâ.	743.	1216
— Eranthemum, supinum, congestâ Bryzæ paniculâ.	744.	1214
— Phalaroides, sparsâ Bryzæ paniculâ, minus.	44.	1217
— Phalaroides, sparsâ paniculâ, minimum, angustifolium.	44.	1218
— tremulum, seu Phalaroides, minus latâ, sparsâ paniculâ.	16.	1219
— tremulum, seu Phalaroides, majus, erectâ paniculâ, rufum.	23.	1221
— tremulum, seu Phalaroides majus, erectâ paniculâ, citrinum.	23.	1222
— Phalaroides, majus, ferrugineâ nutante paniculâ.	15.	1220
— Phalaroides, minus, erectâ collectâque paniculâ.	15.	1223
— Phalaroides, majus, acerosâ erectâ, parvâ paniculâ.	9.	1224

	Icon.	Observ.
— Phalaroides, majus, acerosum, nutante spicâ.	24.	1225
— Phalaroides, minus, erectâ spicâ, obliquis aristis.	24.	1226
— Phalaroides, sparsâ & nutante Bryzæ paniculâ, obliquis aristis, minus.	84.	1227
— Bromoides, Festuceâ tenuique paniculâ, minus.	76.	1239
— Festuceum, Myurum, minori spicâ heteromallâ.	99.	1240
— Festuceum, Myurum, elatius, spicâ heteromallâ, gracili.	99.	1241
— hirsutum, angustifolium, perenne, Lini utriculis.	748.	498
— Avenaceum, longâ erectâque paniculâ, violaceâ.	96.	1230
— Avenaceum, tenui spicatâque paniculâ, albis utriculis.	96.	1231
— Avenaceum, latifolium, minus, sparsâ paniculâ.	95.	1232
— Avenaceum, angustifolium, paniculâ pyramidalî.	95.	1233
— Sparteum, Bromoides, brevioribus utriculis, nutante paniculâ.	17.	1234
— Sparteum, Bromoides, longioribus & erectis utriculis.	17.	1235
— Sparteum, Bromoides, paniculâ spicatâ, majoribus utriculis.	18.	1236
— Sparteum, Festuceum, seu <i>Aegylops</i> Sparteâ, villosa.	18.	1237
— exile, Junceum, mollius, Festuceâ paniculâ, radice rufâ.	100.	1242
— Sparteum, Cyperoides, echinatâ spicâ, nemorum, majus.	19.	1251
— Cyperoides, echinatâ & rarâ spicâ, nemorum, minus.	20.	1252
— Cyperoides, palustre, echinatâ spicâ, medium.	20.	1253
— Cyperoides, Typhinum, latifolium, minus.	1.	1256
— Cyperoides, latifolium, Typhâ pendulâ, longiore.	45.	1255
— Cyperoides, latifolium, Typhâ erectâ, minus.	113.	1257
— Cyperoides, angustifolium, Typhâ nutante, minus.	113.	1258
— pratense, Junceum, nutante, amplâ, sparsâ & bombycinâ paniculâ.	12.	1259
— Bufonium, glomeratis utriculis.	94.	497
— Bufonium, supinum, mollius, seu umbellatum.	93.	496
— Bufonium, erectum, latifolium.	263.	495
— Bufonium, erectum, angustifolium, majus.	264.	
— Bufonium, erectum, angustifolium minus.	263.	
— Junceum, Sorghi capitulis.	747.	492
— Junceum, Milii paniculâ.	747.	493
— paniculatum, latifolium.	1307.	1244
— paniculatum, angustifolium.	1308.	1245
Gribeque Polonorum Corvini.	1171.	1400

H

H edera quinquefolia, Virginiana.	227.	1372
— trifolia, racemosa, Canadensis.	228.	1369
Hedysarum congestis & utrinque lunatis siliquis.	1137.	853
— clypeatum, minus, suave rubens.	1180.	802
— triphyllum, purpureum, Canadense.	1140.	801
— minimum, trifolium, torosâ siliquâ.	257.	846
Helichrysum trifidis foliis, Hispanicum, majus.	189.	983
— trifidis foliis, Hispanicum, minus.	190.	984
— Hispanicum, maximum.	225.	982
Heliotropium medium, strigosius, Italicum.	219.	151
Hieracium purpureum, incisus foliis, montanum.	209.	1043
— purpureum, integris foliis, montanum.	210.	1042
— incanum, tomentosum, integro folio.	238.	1044
— seu Taraxacon tenuifolium, laxatile, Italicum.	237.	1041
Hippoglossum. Vide Hypoglossum.		
Horminum Creticum, comâ purpuro-violaceâ.	1233.	226
— sylvestre, majus, flore albo, integris foliis.	187.	235
— sylvestre, majus, hæmatodes, glabrum, flore cæruleo, Italicum.	185.	234
— sylvestre, majus, hastato folio, flore cæcio, Hispanicum.	186.	236
— sylvestre, hirsutum, Lampsanæ foliis, flore cæcio.	199.	225
— subrotundo folio, flore cæcio, Hispanicum.	200.	232
— sylvestre, inciso folio, flore cæcio, Italicum.	220.	219
— minus, Beronicæ folio, flore purpureo.	167.	230
— hæmatodes, minus, flore purpureo.	168.	231
— minus, subrotundo scabro folio.	207.	227

sylvestre,

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Observ. xiiij</i>
— sylvestre, minus, inciso folio, flore azureo.	208.	228
— Hispanicum, foliis Herbæ venti, flore cæruleo.	1317.	237
Hyacinthus Orientalis, parvo flore, polyanthos, serotinus, cæruleus.	175.	693
— cæruleo-violaceus, caule folioso.	176.	694
— purpureo-violaceus, serotinus, semiduplex, φυλλοφύεος, Italis comosus.	173.	695
— roseus, cæruleus, flore duplici.	174.	696
— Januario.	987.	697
— Passa Januario.	988.	698
— Italis Pellucino.	982.	699
— Medicæus, Capucino affinis.	985.	700
— rusticus.	986.	701
— Italis sancto Bernardo.	981.	702
— cæruleus, pleno flore, præcox; Italis Fiorentino.	169.	703
— cæruleus, plenissimo flore, serotinus, Italis Stradoppio.	170.	704
— tuberosus, albus, odoratissimus, autumnalis.	1213.	705
— stellatus, cæruleo-violaceus, campanulatus.	183.	780
— stellatus, cæruleus, Borraginis flore.	184.	781
Hyoscyamus Indicus, Solani folio, flore atropurpureo Corvini.	247.	108
— Creticus, sulfureo flore, medio atropurpureo.	248.	107
Hypocoum Clusii, tenuifolium, flore pallido.	352.	429
Hyppoglossum, seu bislingua.	249.	5
Hyppuris setaceus.	1123.	1338
Hyssopus montana, verticillata, major.	239.	261
— montana, verticillata, minor.	240.	262

I

J acea nigra, major, foliis integris.	1324.	932
— maritima, incana, capite purpureo, spinoso, major.	1217.	913
— marina, cinerea, capite spinoso, purpurea, media.	235.	914
— marina, incano folio integro, caule folioso, capite purpureo, spinoso, minor.	236.	915
— minor, Globulariæ folio, flore purpureo, Hispanica.	159.	936
— minima, Globulariæ folio, flore purpureo, Hispanica.	162.	937
— minor, Hieracii folio, capite spinoso, Hispanica.	160.	921
— minor, purpurea, parvis & integris foliis.	139.	939
— minor, Stæchadis citrinæ folio.	141.	942
— minima, tenuifolia, erecta, Hispanica.	161.	943
— tenuifolia, purpurea, Hispanica.	140.	947
— Hispanica, latifolia, nervis foliorum lanuginosis.	137.	959
— Intybacea, capite rubro, spinoso.	1218.	926
— purpurea, Intybacea, breviori folio.	390.	960
— rubra, foliis Intybaceis, capite μελανόκεντρο.	1219.	958
— pumila, supina, purpurea, integro folio.	142.	938
— pumila, tenuifolia, supina, capite brevi, spinoso.	181.	920
— pumila, tenuifolia, supina, capite brevi, non spinoso.	182.	944
— pumila, incana, cespitosa, latiusculis foliis.	177.	945
— pumila, incana, cespitosa, tenuifolia.	178.	946
— pumila, incana, tenuifolia, capite spinoso, erecta.	179.	918
— pumila, incana, tenuifolia, capite spinoso, supina.	180.	919
— pusilla, Oleæ folio, purpureis congestisque floribus.	1126.	1123
Jacobæa Doronici foliis & flore, montana.	229.	1087
— Cretica, incana, integro Limonii folio.	217.	1059
— Cretica, argentea, foliis incisis, seu Argentea Alpini.	218.	951
— Linifolia, Hispanica.	802.	1083
— Linifolia, Italica.	268.	1082
— major, Artemisiæ folio, incana, latifolia, non repens.	267.	1076
— incana, repens.	153.	1075
— Alpina, incana, minor.	262.	1078
— minor, Abrotani folio.	262.	1077
— maritima, minima, glabra, Senecionis folio, Italica.	261.	1079
— montana, integro, rotundo folio.	145.	1084

	Icon.	Observ.
—montana, integro, sublongo, folio.	146.	1086
—montana, croceo, amplo, singulari flore, spatulæ folio, elatior.	265.	1088
—montana, polyanthemos, flore aureo, foliis longis & integris, Italica.	266.	1089
—montana, Betonica folio.	801.	1085
Jondraba Alyssoides, spicata, lutea, major.	1219.	378
—Apula, Alyssoides, spicata.	253.	377
—Alyssoides, lutea, angustifolia.	230.	378
Jonthlaspi, seu Leucoium montanum, luteum, subrotundo Thlaspi utriculo, Italicum.	850.	399
—Alyssoides, angustifolium, luteum.	254.	379
Iris stellata, Cyclaminis radice, pullo flore.	1216.	791
Juncus repens, grumosâ & echinatâ spicâ.	114.	1254
—maritimus, spicâ subrotundâ, glumosâ.	203.	1246
—maritimus, minor, glumosâ & parvâ, fuscâque Phalaridis spicâ.	256.	1248
—maritimus, minor, graciliore spicâ.	256.	1247
—Graminis Cyperoidis radice, tenuifolius, elatior.	118.	499
—Gramineus, Cyperi radice rufâ & hirsutâ spicâ.	255.	500
—Gramineus, minimus, capillari folio, capite squamoso.	118.	1250
—minor, globoso, singulari capitulo, radice tomentosâ.	255.	1249
—repens, <i>δυσκλινος</i> , minor, botrioides.	114.	491
—maritimus, Sorgh; paniculâ utriculatâ.	203.	494
—cacumine, reflexo, minor, paniculâ majore.	204.	490
—cacumine reflexo, major, paniculâ minore.	204.	489
—bulbosus, maritimus, floridus, filiquosus.	271.	563

K

K Ali geniculatum, aphyllantes, gilvis paleaceis flosculis, Hispanicum.	215.	501
—geniculatum.	192.	1261
—Polygonoides, frutex polyspermos.	191.	505
—vermiculatum, albo & amplo Sedi rosei flore.	888.	507
—vermiculatum, albo, globoso flore.	119.	663
—vermiculatum, Hispanicum, incanum, fruticans.	205.	504
—vermiculatum, Hispanicum, viride, fruticans.	206.	503
—vermiculatum, fruticans, minori folio, Hispanicum.	216.	502
—Molluginis folio, umbellatum.	120.	508
—minus, tenuifolium, incanum, fruticosum, Siculum.	79.	506

L

L Agopus Creticus, incanus, marinus, spicâ rubente.	913.	1389
—angustifolia, minor, erectior.	901.	818
—altera, angustifolia, minor & verior, capite brevior.	902.	819
—minor, supinus, molli & compresso capite, flore albo.	859.	820
—minor, erectus, capite globoso, stellato, flore purpureo.	860.	813
Lamium purpureum, biflorum, Polonicum.	1220.	240
Lavandula serrato folio.	797.	283
—multifido folio.	798.	282
Lauro-cerasus.	873.	1377
Laurus Alexandrina, vera Dioscoridis & Theophrasti.	250.	6
Laurus latifolia, Indica.	877.	1358
Ledum folio Sampfuchi.	817.	549
Lens Brasiliensis, minor, flore subcæruleo.	194.	795
Leontopetalon vulgare.	1030.	609
—ramosum, polyanthes.	1029.	
Leontopodium verius Dioscoridis, Hispanicum.	296.	999
—legitimum Imperati.	1225.	123
Leucanthemum Alpinum, latifolium.	458.	100
—Alpinum, angustifolium.	458.	1101
—Alpinum, tenuifolium.	458.	1102
—fruticans, pinnatis superioribus Quamoclit foliis, imis vermiculatis & torosis	422.	1104

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Obfer.</i>	<i>XV</i>
Leucoium Alyssoides, umbellatum, montanum Fabii Columnæ.	253.	376	
— luteum, minus, fruticans.	1228.	402	
— minus, rotundifolium, flore purpureo; Chamæleucoium rotundifolium, minus, flore purpureo.	876.	414	
— purpureum, Bellidis folio, majus.	875.	415	
— minus, flore violaceo.	1127.	406	
— minus, purpureum, hamatis foliis.	1019.	409	
— minus, purpureum, angustifolium, longiori folio.	999.	410	
— minus, breviori folio, obsoleto flore.	999.	411	
— minus, angustifolium, luteum, Hispanicum.	1000.	412	
— minus, Lavandulæ folio, obsoleto flore, angustifolium.	803.	408	
— minus, fruticans, purpureum, Alyssi foliis.	804.	407	
— montanum, angustifolium, pallido flore.	884.	401	
— minus, marinum, subrotundo folio, purpureum.	1020.	404	
— luteum, minus, Hieracii folio.	1227.	375	
Libanotis tenuifolia, Fœniculi semine, Italica.	836.	640	
— tenuifolia, altera, Ferulæ folio & semine, Italica.	835.	637	
Lilac cærulea, laciniatis foliis.	903.	1365	
Lilio Martagon Canadense, luteum, maculis purpureis.	125.	778	
Lilio Narcissus vernus, angustifolius, flore purpurascente.	994.	783	
— Indicus, ruber, monanthos, Jacobæus Clusii, Robini.	1035.	785	
— Jacobæus, Indicus, phœniceus, polyanthos.	1036.	784	
— Indicus, saturè purpureus, polyanthos, Belladonaformos Italicorum.	1039.	786	
— Indicus, dilutè purpureus, Belladona Italis vulgarior.	1040.	787	
— Indicus, sphæriceus vulgò, polyanthos.	1037. 1038.	789	
— Indicus, polyanthos, coccineus, minor.	126.	788	
— Indicus, cruentus, <i>πλυσίμοι</i> , seu stamineus, flore singulari, squalioso Italis.	1041.	792	
Lilium convallium minus Casp. Bauhini; Unifolium Dodonæi, Gramen Parnassi Matthioli.	1212.	597	
Limonium incisum folio, Buglossi flore.	1124.	692	
— medium, Globulariæ folio, majus.	793.	686	
— medium, Globulariæ folio, minus.	794.	687	
— minus, Oleæ folio, <i>πλυνκλάδον</i> .	790.	689	
— minus, Oleæ folio lupino, alterum.	789.	688	
— minus, obtuso folio, viminibus foliosis.	806.	690	
— minimum, cordatum, seu folio retuso.	805.	691	
Linaria purpureo-violacea, major, non repens, Italica.	1021.	201	
Linum sylvestre, latifolium, flore albicante.	1002.	670	
— sylvestre, latis acutis foliis, flore amplo.	1007.	671	
— sylvestre, latifolium, vinoso amplo flore, Italicum.	1013.	672	
— sylvestre, montanum, acuto folio, flore albo.	1001.	673	
— Hispanicum, acutis foliis, amplo flore.	1014.	674	
— fruticans, leptophyllum, Hispanicum.	819.	675	
— sylvestre, acutis foliis, fruticans.	1008.	676	
— fruticans, oxyphyllum, Hispanicum.	330.	677	
— fruticans, angustis acutisque foliis.	1231.	678	
— sylvestre, fruticosum, crispum, Hispanicum, parvo flore albo.	795.	679	
— sylvestre, fruticans, trichodes, Thymi folio, polyanthos.	1003.	680	
— sylvestre, fruticosum, angustifolium.	1004.	681	
— sylvestre, album, oxyphyllum.	796.	682	
— montanum, luteum, Italicum.	820.	683	
— sylvestre, minus, flore cæcio, foliis verticillatis.	1226.	685	
— album, Blattariæ flore, semine discofo.	1234.	153	
Lolium aquaticum, acerosum; Phœnix aquatica.	906.	1166	
Lonchitis mollior, lanuginosa, Ceterach facie.	858.		
— mollior, lanuginosa, Ceterach facie, minor, Hispanica.	857.	1276	
— mas, seu latifolia, aspera, minor.	1121.	1263	
Lotus angustifolia, lutea, major.	879.	808	
— angustifolia, incana, pallida, minor.	880.	809	
— angustifolia, incana, spicata.	879.	810	
— coronatus, latifolius, siliquis nigris.	544.	804	
— hemorroidalis, flore albo & subrubescente.	1033.	803	

	Icon.	Obsev.
— Indicus, cæruleus, radice perenni.	1236.	811
— montanus, aureus, amplo Lupuli capite, annuus.	1024.	812
— pratensis, filiquosus, luteus, hirsutus.	1023.	805
— filiquosa, maritima, lutea, Cytisi facie.	1031.	807
Lunaria Borrytes.	252.	1278
Lupinus luteus, Italicus.	1032.	800
— Arabicus Ponæ, Mozambez di Angola herbariorum.	1235.	430
— quadrifolius, flore luteo, saturo, exoticus.	1215.	854
Lychnis coronata, alba, umbilico carneo.	1006.	650
— corollaria, umbellifera, Alpina, flore purpureo.	1005.	651
— sylvestris, hirsuta, purpurea, striato flore.	381.	652
— sylvestris, hirsuta, ij. Clusii, angustifolia.	1027.	653
— sylvestris, hirsuta, elatior, spicata, Lini colore.	1027.	654
— supina, hirsuta, spicatâ & nutante comâ, flore carneo.	1025.	655
— sylvestris, villosa, minor, purpurascens, latifolia.	1028.	656
— sylvestris, villosa, purpurea, minima, angustifolia.	1028.	657
— marina, hirsuta, purpurea, Leucocii folio.	1010.	658
— lutea, montana, Globulariæ capite & facie.	498.	659
— prælongis foliis & calyce.	382.	660
— fruticosa, angustifolia, minima, flore albo, Hispanica.	997.	661
— corniculata, major, seu latifolia.	1017.	664
— corniculata, minor, seu angustifolia.	1018.	665
— Ocymoides, muscosa, latifolia.	380.	666
— Ocymoides, muscosa, strictiore folio.	379.	667
— pumila, Caryophyllata, flore rubello, Italis hemorrhoidalis Al- drovandi.	998.	668
— Linifolia, torosis & laxioribus capitulis.	1009.	662
Lycium latifolium, Hispanicum.	995.	1349
— angustifolium, Hispanicum.	996.	1350
Lycopsis lato Plantaginis folio, Italica.	1026.	145
— angustifolia, minor, Hispanica.	1011.	147
— spatulæ folio, Hispanica.	1012.	146
— montana, cærulea, seu Buglossum minimum, montanum.	404.	150
Lyfimachia latifolia, spicata, lutea, Lusitanica.	989.	607
— angustifolia, spicata, lutea, Lusitanica.	990.	608
— lutea, corniculata, latifolia, Lusitanica.	1252.	606
— galericulata, spicata, purpurea, Canadensis.	1152.	238

M

M Alva Canadensis, luteo-purpureo, pleno flore, arborefcens.	585.	74
— rosea, sulfurea, folio anguloso, & folio Ficûs Tartarica.	585.	67
Malum Æthiopicum, fructu luteo; an Mandragora Theophrasti.	30.	165
— Æthiopicum, fructu cristato, striato, duro, coccineo.	1108.	159
Mandragora fœmina, flore cæruleo.	29.	1
Marrubium Hispanicum, rotundifolium, album, majus, seu latifo- lium.	767.	249
— album, sericeo, parvo & rotundo folio.	685.	263
— album, Hispanicum, majus.	686.	
— repens, flore albo, exoticum.	768.	252
— aquaticum, incanum, profundè incisis foliis.	154.	251
Marum Hispanicum, parvo, oblongo, obtuso folio.	689.	267
— Thymifolium, incanum, spicatum, crenato folio Pulegii odo- re, Hispanicum.	690.	268
— album, Hispanicum, minus, Dorychnii folio.	693.	356
— Hispanicum, nigrum, flore purpureo, Piperella Hispanis.	694.	354
— Sampfuchi folio, Hispanicum.	1224.	353
— tenuifolium, Thymi facie, Hispanicum.	771.	352
— nigrum, Hispanicum, flore purpureo, minor planta.	1223.	355
Melampyrum luteum, comâ cæruleâ Bauhini.	769.	216
— luteum, comâ albâ Bauhini.	769.	217
— minus, purpureum, Trixaginis folio.	1045.	218
Melanzana, seu Melongena fructu primùm albo, dein flavo.	1109.	164
Melilotus major, seu Cilicia filiquosa, inodora, luteo amplo flore.	543.	829

Melissa

Index Iconum Barrelieri.

	<i>Icon.</i>	<i>Obfer.</i>	<i>xvij</i>
Meliffa fylveftris, hirsuta, major, Italica.	1222.	264	
Mefpilus. Vide Oxianantha.			
Millefolium minus, album, Hispanicum.	1115.	1115	
— minimum, crispum, flore albo, Hispanicum.	1114.	1116	
Moly Liliū Indicum, rubrum.	1119.	794	
Mufcus fistulofus, corniculatus.	1277.	1286	
— Coralloides.	1277.	1307	
— Alcornis.	1277.	1285	
— Fœniculaceus.	1277.	1287	
— Pulmonarius, Fungoides.	1278.	1281	
— pyxidoides.	1278.	1284	
— cristatus.	1278.	1283	
— digitatus.	1278.	1282	
— fpicatus, capillaris.	1291.	1337	
— coralloides, Filicinus.	1276.	1327	
— coralloides, cristatus.	1276.	1328	
— coralloides, bifidus.	1276.	1329	
— coralloides, Fœniculaceus.	1276.	1330	
— coralloides, crispus.	1275.	1331	
— coralloides, bifidus, minor.	1275.	1332	
— Polygonoides, Salicorniæ folio, major.	1275.	1333	
— Polygonoides, Salicorniæ foliis, minor, feu bifidus.	1275.	1334	
— marinus, fruticans, leptophyllos, atropurpureus.	1289.	1326	
— marinus, niger, viscosus, vermiculatus, non crispus.	1297.	1317	
— marinus, latifolius, albicans, crispus, pilosus.	1300.	1318	
— marinus, angustifolius, fruticans, atropurpureus.	1299.	1319	
— fruticosus, aphyllantes, major.	1291.	1320	
— fruticosus, aphyllantes, minor.	1291.	1321	
— marinus, crispus, πακίκαυος, loricatus, nigricans.	1301.	1323	
— marinus, crispus, λεπτόκαυλος, virens, & gilvoluteus.	1302.	1322	
— marinus, crispus, niger, crasso & nudo caule.	1290.	1324	
— marinus, reticulatus.	1123.	1329	
— marinus, crispus, niger, λεπτόκαυλος, comosus.	1290.	1325	
Myagroides subrotundis ferratisque foliis, flore albo.	816.	386	
Myagrum supinum, album, Erucae foliis.	1252.	358	
Myrrhis Cicutaria, minor, perennis, polyrrhizos.	555.	625	
Myrrhi & Chamœleæ media plantula.	538.	1392	

N

N arcissus Suvertii, vulgò scagliofo, flore cruento, παλῆμον, feu stamineus Corvini.	1042.	792
Narcissus totus albus, maximus, calyce mediocri, ferotinus.	948.	711
— albus, sulfureus, maximus, mediocri calyce, ferotinus.	947.	712
— albo-sulfureus, calyce aureo, major, ferotinus.	965.	713
— albo-sulfureus, calyce luteo, oblongo.	966.	714
— albicans, calyce aureo, amplo, major.	932.	715
— albicans, calyce aureo, amplo, minor.	931.	716
— albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, major.	928.	717
— albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, minor.	927.	718
— fylvestris, pallidus, tubâ aureâ, major.	930.	719
— fylvestris, pallidus, tubâ luteâ, minor, vulgaris.	929.	720
— pallidus, calyce aureo, labiis inversis.	979.	721
— albicans, calyce aureo, labiis inversis.	980.	722
— fylvestris, albicans, oris tubæ luteis, minor.	924.	723
— fylvestris, pallidus, tubâ aureâ, minimus.	976.	724
— fylvestris, totus albicans, minor.	923.	725
— fylvestris, totus luteus, minor.	975.	726
— totus sulfureus, Anglici facie, flore singulari, Caietanus.	967.	727
— fylvestris, totus albus, luteis tubæ fimbriis, alter.	968.	728
— totus albus, nutans, amplâ tubâ.	953.	729
— totus albus, amplo nutante flore.	954.	730
— totus albus, nutante flore, longâ & angustâ tubâ.	945.	731
— albus, nutante flore, oblongâ & angustâ, pallidâ tubâ, minor.	946.	732

	Icon.	Observ.
— sylvestris, albicans, nutante flore, minor.	921.	733
— sylvestris, pallidus, tubâ aureâ, minor, serotinus.	922.	734
— pallidus, calyce aureo, flore pleno, maximus.	977.	735
— maximus, Tradescanti, flore pleno, calyce luteo, foliis sulfureis.	978.	736
— maximus, Tradescanti, totus luteus, flore pleno.	970.	737
— luteo-sulfureo flore pleno, minor, serotinus.	969.	738
— albicans, medio pallidus, major, amplo flore.	959.	739
— albus, calyce aureo, amplo, biflorus, major.	949.	740
— albus, calyce aureo, amplo, biflorus, minor.	950.	741
— latifolius, albus, mediocroceus, serotinus, amplo calyce, major; Vannec vulgò.	955.	743
— albus, calyce luteo, parvo, serotinus, minor; Vannec minor vulgò.	956.	745
— albicans, medio pallidus, medius, angustis florum foliis.	964.	747
— albo-sulfureus, calyce aureo, minori, maximus, serotinus.	960.	749
— albo-pallidus, calyce aureo, amplo, major Waldenec.	952.	750
— pallidus, calyce aureo, mediocri, serotinus, Waldenec medius.	951.	751
— albo-pallidus, calyce aureo, plano, roseus Waldenec.	933.	752
— albo-pallidus, calyce luteo, plano, stellatus Waldenec.	934.	753
— albicans, medio-pallidus, minor.	963.	754
— niveus, mediocroceus, maximus, roseus, serotinus.	972.	755
— niveus, mediocroceus, minor, roseus, serotinus.	971.	756
— niveus, mediocroceus, stellatus, major, calyce crispo & diviso, serotinus.	974.	757
— niveus, mediocroceus, stellatus, minor, serotinus.	973.	758
— latifolius, albo-pallidus, medioluteus, præcox.	925.	759
— præcocissimus, lacteus, calyce aureo.	943.	760
— albicans, calyce sulfureo.	940.	761
— latifolius, sulfureus, præcox, minor.	926.	762
— luteo pallidus, calyce intensè aureo.	944.	763
— latifolius, albicans, mediocroceus, amplo brevi calyce.	918.	742
— latifolius, albus, mediocroceus, pleno flore.	917.	744
— latifolius, albus, mediocroceus, calyce mediocri, præcox.	919.	746
— latifolius, sulfureus, maximus.	920.	748
— polyanthemus, præcox, sulfureus, maximus, calyce croceo, oris pallidis & fimbriatis.	936.	764
— polyanthemus, præcox, sulfureus, medius, stellatus, calyce croceo.	935.	765
— præcox, totus luteus, maximus, calyce aureo.	941.	766
— præcox, totus luteus, medius, stellatus, calyce aureo.	942.	767
— præcox, totus luteus, elatior, calyce aureo.	939.	768
— præcox, totus albus, major.	937.	769
— totus albus, minor, stellatus.	916.	776
— præcox, totus albus, medius.	938.	770
— præcox, totus albus, minor, roseus.	915.	771
— albus, mediocroceus, stellatus, majori calyce, serotinus, Romanus.	958.	772
— albus, mediocroceus, medius, stellatus, serotinus, Romanus.	962.	773
— albo-sulfureus, mediocroceus, stellatus, minor, serotinus, Romanus.	961.	774
— albus, mediocroceus, stellatus, parvo calyce, serotinus, Romanus.	957.	775
— autumnalis, luteus, minimus.	984.	707
— Persicus, luteus, vernus Corvini.	983.	790
— autumnalis, albus, latifolius.	993.	777
Nepetha montana, purpurea, major, sparsâ spicâ.	601.	289
— tuberosa, violacea, spicata, minor, Hispanica.	602.	290
— angustifolia, minor, Hispanica.	735.	293
— saxatilis, cærulea, minima, Hispanica.	736.	292
— tuberosa, spicata, purpurea, Hispanica.	1131.	291

	Icon.	Observ.
O		
O Cimum majus, vulgare.	1064.	296
— majus.	1071.	297
— majus, bullatum.	1072.	298
— majus, crispum, obtusè ferratum.	1053.	299
— majus, crispum, laciniatum.	1054.	300
— majus, crispum, profundè ferratum, maculatum, oblongâ spicâ.	1065.	301
— majus, crispum, profundè ferratum, verrucosum, brevi congestâque spicâ, subrubens.	1066.	302
— majus, crispum, leviter ferratum, verrucosum, brevi congestâque spicâ, viride.	1063.	303
— medium, vulgare.	1055.	304
— medium, non ferratum.	1056.	306
— medium, folio breviori, ferrato.	1056.	307
— medium, acuto & verrucoso folio.	1058.	308
— medium, crispo & verrucoso folio.	1058.	309
— medium, rubrum.	1057.	305
— medium, crispum, ferratum.	1060.	310
— minus, vulgare.	1069.	311
— minus, ferratum.	1067.	312
— minus, rotundifolium, rubrum.	1068.	313
— minus, crispum, ferratum.	1059.	314
— minimum, vulgare, folio acuto.	1077.	315
— minimum, rotundifolium.	1075.	316
— minimum, crispum, non ferratum.	1070.	317
Oenanthe Indica, semine cordato.	1240.	546
Onopyxus amplo capite, purpureus, angustifolius.	1116.	911
Ophioglossum latifolium, vulgare.	252.	1279
— angustifolium, minimum.	252.	1280
Oreoselinum rotundifolium, Hispanicum.	350.	611
Origanum Canadense, fistuloso flore, purpureo.	1221.	247
— inodorum, Polonicum.	1155.	1401
Ornithogalum luteo-virens, Indicum.	1118.	779
Orontium minus, villosum, angustifolium, flore purpurascens.	758.	200
— saxatile, Alsines folio, unctuosum & villosum, flore albo.	1102.	204
— saxatile, angusto Alsines folio villosum & unctuosum, flore albo.	1103.	205
— saxatile, Serpilli folio glabro, flore purpurascens.	1100.	196
— saxatile, Serpilli folio angustiore, villosum & unctuosum.	1101.	197
— saxatile, Thymi folio, flore rubello.	1313.	198
Oxalis, seu Acetosa Americana.	539.	1129
— seu Acetosa Americana, vesicaria.	1112.	1128
— tuberosa, Syriaca Aldini, flore luteo, reticulato, foliis maculatis Corvini.	1113.	610
Oxiacantha spinosa, minore folio; Mespilus anthedonoidis folio, minor.	563.	1380
— angustifolia, non spinosa; Hypericum fruticans, Canadense Robini.	564.	1376
P		
P Alma marina.	1292.	1336
Panax Heracleum, altè, acutè & tenuius incisus foliis, Italicum.	707.	632
— Heracleum, albo flore, altius incisus, acutioribusque foliis.	372.	633
— Heracleum, minoribus & rotundioribus foliis; An Laserpitium Lobelii.	708.	635
— <i>καρπίπος</i> , racemosa, Canadensis.	705.	596
Papaver Rhœas, flore carneo, pleno.	763.	473
— Rhœas, integro folio, Hispanicum.	1191.	474
— spinosum, flore luteo.	1141.	476
Penna marina, carnei coloris.	1273.	1313
— marina, coloris purpurei.	1273.	1314
— marina, spinosa, rubra.	1274.	1315
— marina, spinosa, grisea obsoleta.	1274.	1316

	Icon.	Obfer.
Pentaphyllum montanum, minus, luteo Tormentillæ flore, cineraceum.	709.	593
— minus, luteum, Alchimillæ facie, Hispanicum.	727.	594
Perfoliata minor, folio acuto.	1128.	621
Persea arbor semper virens, aromatica.	878.	1378
Petromarula, Rapunculum Creticum Imperati, Valerianæ foliis.	1154.	92
Peucedanum Italicum, longioribus foliis, seu majus.	78.	629
Picea <i>εξυπυλλος</i> , Polonica Corvini.	730.	1342
Pimpinella saxifraga, Hircina, major, foliis altè incisis, montana, Italica.	737.	617
— saxifraga, Hircina, minor, montana, foliis altè incisis.	738.	618
— Canadensis, maxima, longius spicata.	739.	166
— spinosa, seu Poterium quorumdam.	631.	168
— Agrimonoides, odorata.	632.	167
Pinus sylvestris, minor, cono parvo, Polonica Corvini.	729.	1343
— sylvestris, minor, Laricis strobilo; Larix Polonica Corvini.	500.	1344
Pithyusa minor, subrotundis & acutis foliis.	751.	58
— angustis acutisque Esulæ foliis, annua.	752.	59
— fruticans, angustis acutisque foliis, minima.	86.	63
Plantago angustifolia, ferrata, Hispanica.	749.	122
— angustifolia, lanuginosa, incana.	750.	121
— trinervia, latifolia, minor, incana, Hispanica.	745.	119
— major, spicâ foliosâ, Italica.	746.	120
— aquatica, angustifolia, Polonica Corvini.	1157.	586
Pneumonanthe Lobelii, Dodonæi, Clusii, Gerardi.	122.	} 14
— Cordi quoad figuram.	51.	
Polytricum aureum, majus.	251.	1288
Polium montanum, luteum; supinum, capite oblongo.	1082.	320
— montanum, luteum, tomentosum, dasyphyllum, ferratum.	1073.	321
— montanum, luteum, ferratis, angustioribus, incanis foliis.	1089.	322
— montanum, luteum, ferratis Amaraci foliis, comâ subluteâ.	1088.	323
— marinum, dasyphyllum, Gnaphalodes, flore albo.	1047.	324
— montanum, album, ferratum, latifolium, erectum, majus.	1079.	325
— montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, majus.	1074.	326
— montanum, Hispanicum, non crenatum, flore albo.	1049.	327
— montanum, erectum, crenatum, angustifolium, flore albo.	1050.	328
— montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, minus.	1078.	329
— montanum, album, angustifolium, ferratum, supinum, minus.	1091.	330
— Valentinum, fruticosum, angustifolium, flore albo.	1048.	331
— surrectum, majus, angustifolium, ferratum, incanum, tomentosum.	1096.	332
— montanum, album, non ferratum, longis angustisque foliis canescentibus.	1080.	333
— montanum, album, non ferratum, viride, longis angustisque foliis, caule incano.	1081.	334
— montanum, majus, erectum, Rorismarini folio, flore rubro.	1090.	335
— montanum, pumilum, rubrum, viride, Stæchadis foliis, caule tomentoso.	1092.	336
— montanum, pumilum, angusto viridique folio, caule incano.	1093.	337
— montanum, Gnaphalodes, incanum, flore rubro, supinum.	1083.	338
— saxatile, pumilum, ferratum, incanum, flore rubello.	1098.	339
— minus, erectum, angustis, crenatis brevibusque foliis, flore rubro.	1099.	340
— surrectum, minus, angustifolium, ferratum, è viridi canescens.	1097.	341
— saxatile, purpureum, ferrato Serpilli folio.	1061.	342
— saxatile, purpureum, non ferrato Serpilli folio, pressiori comâ.	1087.	343
— saxatile, minimum, Thymi folio, carneo flore.	1062.	344
— saxatile, purpureum, Chamædryoides, amplâ comâ.	1086.	345
— saxatile, Chamædryoides, rotundiori folio, supinum, rubrum.	1095.	346
— saxatile, Chamædryoides, oblongo folio, rubro exiguo flore.	1094.	347
Polygala montana, Italica, flore aureo.	721.	1385
Polygonatum latifolium, flore albo, majore, odorato.	711.	3
— latifolium, spicatum, flore albo, Virginianum.	711.	599
— latifolium, spicatum, majus, flore albo, Canadense.	712.	598

ramosum,

Index Iconum Barrelieri.

xxj

	Icon.	Obfer.
—ramosum, flore luteo, majus, seu latifolium & angustifolium, flore pallido, Canadense.	723.	603
—ramosum, perfoliatum, luteum, Alpinum.	719.	602
—latifolium, ramosum, flore albo, minore, Germanicum.	720.	601
—racemosum, flore albo, Canadense.	724.	600
Polygonum, angustifolium, majus.	546.	1141
—angustifolium, minus.	545.	1142
—aquaticum, majus.	773.	540
—aquaticum, minus.	773.	541
—fruticosum, erectum, Hispanicum.	713.	1146
—fruticans, supinum, majoribus foliis, Hispanicum.	716.	1147
—fruticans, supinum, Ericoides, cineritium, Thymi folio, Hispanicum.	714.	1149
—incanum, rotundifolium, Halimoides, fruticans, Hispanicum.	733.	1145
—supinum, fruticosum, verticillatum, foliis minimis, Hispanicum.	715.	1148
—fruticans, botrioides, majus, Hispanicum.	732.	1346
—fruticans, botrioides, Narbonense, minus, j. Clusii.	731.	1347
—fruticans, botrioides, Narbonense, minus, ij. Clusii.	731.	1347
—fruticans, aphyllum, crassioribus flagellis.	732.	1346
—fruticans, ἀφύλλον, corniculatum, minus.	1034.	1348
—fruticans, roseum, Thymi folio, Siculum.	1034.	506
—maritimum, minimum, Thymi folio.	559.	486
—maritimum, majus, incanum.	560.	1144
—rectum.	560.	1143
—montanum, niveum, roseum, majus, Hispanicum.	687.	1136
—montanum, roseum, minus, compactioribus foliolis, Hispanicum.	988.	1138
—montanum, niveum, polyanthes.	725.	1137
—montanum, niveum, minus.	726.	1135
Polypodium majus, serrato folio.	38.	1264
—majus, acuto folio, Viterbiense.	1110.	1265
—majus, acutioribus folis, Cordubense.	1111.	1266
Polytricum aureum, majus.	251.	1288
Portulaca Bætica, luteo flore, spuria, aquatica.	336.	478
Prunella odorata, Lusitanica, flore violaceo. <i>Vide Brunella.</i>	561.	269
Pulmonaria Gallorum, rotundifolia, lævior.	342.	1045
Pulsatilla trianthos, sulfurea, semine non papposo.	494.	582
Pyracantha sempervirens.	874.	1379
Pyrethrum alterum, minus cespitosâ radice, Anthemidis flore, Italicum.	522.	1105
Pyrola longo folio; flore albo, Polonica.	1156.	544

R

R Anunculus albus, Apenninus, Saniculæ majoris folio.	88.	581
—Alpinus, Coriandri folio, flore albo purpurascente.	456.	576
—aquaticus, albus, Fœniculi folio.	566.	585
—aquaticus, albus lato & Fœniculi folio, Italicus.	565.	584
—minor, Rutæ folio, flore simplici, grumosâ radice, Italicus.	1153.	578
—tenuifolius, luteus, grumosâ radice, Soractensis seu Italicus.	581.	577
—Tripolitanus, grumosâ radice, flore phœniceo Imperati.	582.	575
—minimus, Apulus Columnæ, luteus.	791.	579
Rapistrum maximum, monospermon, gemmâ luteâ, flore niveo.	387.	557
Rapunculum Alopecurum, flore albo, Italicum.	892.	88
—Teucris folio.	567.	78
—minimum, rotundifolium, verticillatum, flore purpureo-violaceo.	1133.	83
—coccineum, Americanum, vulgò Cardinalis Planta.	1148.	185
Rapunculus corniculatus, cæruleus, montanus, major, Italicus.	526.	89
—corniculatus, cæruleus, minor.	525.	89
—montanus, Gramineus, corniculatus.	523.	91
—lanceolatus, corniculatus.	523.	86
—calyculatus.	523.	87

	Icon.	Observ.
<i>Refeda minor</i> , incis foliis.	587.	869
— minor, alba, dentatis foliis.	588.	870
<i>Rhamnus marinus</i> , Coralloides.	1304.	1341
<i>Ros solis minor</i> , seu rotundifolius.	251.	487
— major, seu longifolius.	251.	488
<i>Rubia Cretica</i> , incana, Buxifolio, seu rotundifolia, incana.	519.	93
— marina, strigosior, flore rubello.	355.	127
— minor, quadrifolia, atro-virens.	547.	104
— minor, quadrifolia, incana.	548.	124
— lævis, Linifolia, Montis Virginis.	583.	99
— lævis, Linifolia, floribus albis.	336.	99
— minor, spicata.	520.	125
— spicata, latifolia Imperati.	549.	125
— spicata, angustifolia.	550.	126
<i>Rubiola montana</i> , major, Hispanica.	596.	1357
— montana.	595.	649
<i>Rubus non spinosus</i> , major, fructu nigro.	395.	1373
— non spinosus, fructu nigro, majori, Polonicus.	1250.	1374
<i>Ruta sylvestris</i> , Linifolia, Hispanica	1186.	545

S

S <i>Alicaria Corvini</i> , Thyrsoides, flore purpureo-violaceo, Virgæ aureæ folio.	1205.	539
<i>Sanamunda argentea</i> , latifolia.	221.	1352
— argentea, angustifolia.	222.	1354
— iij. Clusii: <i>Erica Alexandrina Lobelii</i> .	233.	1353
— vermiculata,	231.	1355
— media, angusto breviorique folio.	232.	1356
<i>Satureia spicata</i> , minor, tenui Laricis folio, Hispanica	1251.	272
<i>Saxifraga major</i> , Germanica, foliis altius incis.	243.	615
— rotundifolia, flore albo, annua, Italica.	242.	619
— viminea, albis nutantibusque umbellulis, Italica.	1184.	620
<i>Scabiosa montana</i> , integro folio, Hispanica, major.	165.	1031
— montana, integro angustoque folio, Hispanica, minor.	166.	1032
— montana, integro, subrotundo folio, Hispanica, minor.	163.	1033
— montana, integro folio subrotundoque, Hispanica, minima.	164.	1034
— peregrina, integris, seu Bellidis folio, altera.	223.	1040
— peregrina, integris & acutis foliis.	224.	1039
— alba, Succisæ folio, Polonica.	770.	1035
— sulfurea, incis folis, Polonica.	770.	1036
— cærulea, Javana Bontii.	826.	1025
— maritima, Rutæ caninæ foliis.	245.	1038
— angustifolia, glabra.	246.	1037
<i>Scordium spinosum</i> , odoratum, annuum.	202.	319
<i>Scrophularia montana</i> , maxima, latifolia, flore luteo.	273.	188
— aquatica, montana, mollior.	274.	189
<i>Sedum majus</i> , non denticulatum, flore purpureo, montanum.	394.	550
— montanum, roseum, minus, reticulatum.	391. 393.	551
— majus, non reticulatum, flore purpureo, montanum, angustifolium.	391.	552
— montanum, umbilicatum, incanum, minus, flore saturo purpureo.	374.	553
— roseum, ferratum longius radicat.	392.	555
— acuto folio.	392.	556
— curvo folio.	392.	557
— obtuso folio.	392.	558
— majus.	392.	559
— montanum, roseum, ferratum, flore purpureo.	373.	536
— montanum, roseum, flore guttato.	{ 1311. }	537
	{ 1309. }	
	& 1311.	
— montanum, roseum, ferratum, foliis subrotundis.	1310.	538
<i>Senecio montanus</i> , mollior, parvo pallido flore.	401.	1081

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obfer. xxij
— montanus, amplo, aureo flore.	402.	1080
Serpentaria digitata, vulgaris, fructu rubro.	147.	178
— digitata, major, Indica, fructu pallido.	148.	179
Seseli subrotundo Selini folio, flore luteo, Italicum.	241.	626
Sideritis hirsuta, brevi acutoque folio, albo flore.	1046.	253
— montana, Scordioides, glabra.	343.	256
— montana, Scordioides, tomentosa.	1160.	255
— montana, vermiculato folio.	344.	260
— montana, Hyssopifolia, major.	329.	258
— montana, Hyssopifolia, minor.	172.	259
— montana, trifido folio.	171.	257
Sisymbrium montanum, tenuifolium, flore muscoso, purpureo.	155.	416
— montanum, latifolium, flore purpureo.	156.	417
Solanum frutex, rotundifolium, Hispanicum.	1173.	2
— majus, vesicarium, coralloides.	149.	160
— vesicarium, minimum, baccà luteà.	1129.	163
— vesicarium, annuum, procumbens.	152.	162
— vesicarium, annuum, erectum.	151.	161
— majus, racemosum.	150.	595
— triphyllum, bulbosum, Canadense.	259.	434
Soldanella marina, longo sinuato folio, seu Convolvulus marinus, lactescens, Soldanellæ congener Imperati.	856.	33
Solidago maxima, Americana.	201.	1070
Sonchus maritimus, angustifolius, asper.	341.	1048
Sparthum marinum.	1292.	1340
Spartium latifolium, parvo flore.	1182.	1390
Sphondilium vulgare, flore albo.	371.	630
— vulgare, foliis acutè incis.	56.	631
— glabrum, montanum, albo flore.	55.	634
— minus, Syriacum.	349.	636
Stachys alba, latifolia, major.	297.	243
— alba, latifolia, minor.	280.	244
— alba, angusto Salviæ folio.	279.	245
— nigra.	298.	246
— fruticans, latifolia, tomentosa, flore ferrugineo.	1322.	223
— fruticosa, repens, flore purpureo.	405.	222
— fruticans, vulgaris, flore aureo, seu Verbascum Salvifolium, fruticosum, flore luteo Lobelii.	406.	221
— prælongo angustoque folio, flore luteo; Phlomis Lychnitis Clusii.	1321.	224
— Lychnoides, incana, angustifolia, flore aureo, Italica.	1187.	254
Stœbe Erucae folio, rubro Cyani flore, Italica.	504.	965
— angustifolia, Intybaceis dentatisque imis foliis.	307.	933
— fruticans, incana, Hyssopi folio, major.	305.	735
— fruticans, incana, brevi Hyssopi folio, capite tereti & cirroso.	306.	934
— Linifolia, capite spinoso.	308.	922
— major, Pineis foliis, luteo flore, capite spinoso.	316.	923
— minor, laxioribus & longioribus capitis squamis.	360.	957
— montana, nivea, capite Cardui, subrotundis foliorum lobis.	309.	953
— montana, incana, Muscata, acutis foliorum lobis, Acanaceo, purpureo flore.	310.	954
— montana, tenuifolia, villosa, Hispanica.	317.	950
— montana, glabra, flore albicante.	318.	949
— montana, tenuifolia, foliis & capite spinosis, Italica.	385.	924
— Pineæ, amplo capite.	138.	970
— Stœchadis folio, flore luteo.	315.	941
— tenuifolia, erectior, Hispanica.	359.	956
— tenuifolia, incana, parvo capite, Cretica.	347.	952
— tenuifolia, incana, magno capite, Italica.	348.	955
Stœchas citrina, globoso & amplo flore, Cretica.	814.	987
— citrina, spuria, longioribus foliis.	368.	977
Stœchas Arabica, caule folioso, flore albo, Hispanica.	301.	288
Stramonium longioribus aculeis.	1172.	109
Symphitum petræum Dioscoridis, Thymifolium.	331.	1402

T

Icon. Observ.

T Aiaoba Ari species, Brassica Brasil.	1084.	173
— altera Ari species, Brassica Brasil.	1085.	174
Tanacetum, inodorum, latifolium, magno Bellidis flore.	781.	1106
— inodorum, latifolium, crispum, magno Bellidis flore.	782.	1108
— inodorum, tenuifolium, magno Bellidis flore.	785.	1109
— inodorum, latifolium, Alpinum, magno Bellidis flore.	786.	1107
— inodorum, Leucanthemum, Alpinum.	991.	1119
— minus, albo Millefolii flore, odorum.	992.	1117
Teucrium cæcio & amplo Rorismarini flore, Boeticum Clusii.	512.	348
— fruticans, amplo & albo flore, Italicum.	895.	242
— fruticans, incanum, Creticum, flore purpureo.	896.	318
Thaliætrum Batrachoides, minus, flore albo, Italicum.	480.	572
Thapsia tenuifolia, lucido rigidoque folio, Hispanica.	556.	639
Thé frutex Chinenfis, Thia Japonensibus.	904.	1403
Thelephium angustifolium, minus, serratum, purpureum.	837.	560
— majus, subrotundo folio, floribus albicantibus.	838.	561
Thlaspi Alfine Teucrioidis folio, cordato pericarpio.	1015.	360
— Anglicum, flore albido Corvini.	894.	387
— aureo Leucoii flore, sylvestre, rotundifolium, majus.	883.	397
— Alysson, incanum, luteum, lunato utriculo.	908. 912.	392
— album, Leucoii flore & folio, Italicum.	911.	400
— biscutellatum, Hieracii folio, pallido flore.	900.	375
— biscutellatum, luteum, Anchusæ folio.	841.	380
— Creticum, perenne, flore albo.	214.	364
— Creticum, Iberidis folio, flore albo.	893.	366
— Creticum, montanum, luteum, Leucoii flore.	214.	370
— cordatum, minus, flore albo, insipidum.	815.	359
— flore albo, siliquâ triangulari, crenatâ.	846.	363
— fruticans, erectum, angustifolium, utriculis subrotundis, Hispanicum.	810.	390
— incanum, Mechliniense Corvini, flore albo.	893.	384
— Linifolium, minus, cineritium, flore albo.	908.	394
— Linifolium, minus, flore albo, virescens.	911.	395
— Linifolium, erectum, flore albo, turbinato utriculo, Italicum.	849.	373
— luteo Leucoii flore.	842.	398
— luteum, spanospermon.	899.	368
— Leucoii sylvestris facie, flore albo.	907.	388
— montanum, album, siliquâ hastatâ, acuto Globulariæ folio.	847.	372
— montanum, serrato Cepeæ folio, flore purpurascens, umbellato.	848.	365
— montanum, Bellidis folio, flore albo.	861.	367
— montanum, perenne, flore albo.	844.	388
— montanum, pingui folio, carneo flore, planâ & cordatâ siliquâ Gualdi.	845.	362
— minus, flore albo, subrotundo utriculo.	912.	393
— spinosum, Hispanicum.	808.	385
— supinum, minus, flore albicante.	894.	361
— fruticosum, semper virens, albo Cretici flore.	734.	364
— fruticosum, Leucoii marini minoris folio, flore albo.	1306.	371
— umbellatum, Nasturtii folio, flore albo.	1306.	344
— subrotundo folio, utriculo gruinali.	1305.	383
— supinum, minoribus foliis, congener Hispanico.	809.	391
— Thymi folio, rotundo utriculo, flore albo.	907.	389
— Virginianum, flore luteo.	843.	369
— Thymi folio, utriculo subrotundo, mucronato, Hispanicum.	807.	389
Thora Italica, seu Napellus minor, flore cæruleo.	610.	873
Thymbra spicata, verior, Hispanica.	1230.	281
Thymum cephalotum, Hispanicum.	302.	271
— Creticum, incanum, capitatum.	897.	270
— Creticum Ponæ, verticillatum.	898.	279
— Hircinum, Italicum.	887.	276

angusto

Index Iconum Barrelieri.

	Icon.	Obfer.	XXV
— angusto longiorique folio; an Serpillum Zygis Theophr.	777.	280	
— incanum, Camphoratum.	778.	277	
— angusto brevique folio.	780.	275	
— viridi tenuique folio.	779.	278	
— sylvestre, frondosum, oblongis foliis, Hispanicum.	787.	274	
Tithymalus Amygdaloides, major, tortuoso caule.	839.	38	
— Amygdaloides, minor, subglaber.	830.	39	
— Amygdaloides, minimus, glaber.	829.	40	
— bulbosus, Apios Fuchsi.	832.	46	
— dendroides, major & verior, Italicus.	910.	37	
— Lini folio, major, Italicus.	821.	60	
— marinus, latifolius, Italicus.	823.	49	
— marinus, rotundifolius, Italicus.	824.	48	
— marinus, folio retuso, Terracinensis.	833.	50	
— marinus, acuto Lini folio.	831.	53	
— marinus, ferratus, Italicus.	1202.	52	
— marinus, Myrtifolius, Italicus.	1203.	51	
— montanus, Esulæ folio, minor, Italicus.	822.	61	
— nemorosus, villosus, mollior.	198.	44	
— nemorosus, acutiori folio, dulcis.	834.	42	
— nemorosus, alter, foliis latioribus & firmioribus.	840.	43	
— Myrsinites, verior, pingui, crasso folio, è casto virens.	1200.	47	
— palustris, villosus, mollior, erectus.	885.	41	
— paralius, rubentibus & compressioribus foliis.	886.	56	
— dulcis, tuberosâ radice.	909.	45	
Trachelium Gramineum, minus, non crenatum, flore cæruleo.	924.	86	
— minus, Gramineum, cæruleo violaceum.	332.	85	
— majus, petræum, flore albo Ponæ.	890.	84	
— minus, petræum Ponæ.	889.	90	
— saxatile, Bellidis folio, cæruleum, Creticum.	813.	79	
Tragopogon montanum, angustifolium, flore ferrugineo, Italicum.	811.	1052	
— montanum, flore atropurpureo, Italicum.	812.	1053	
— Pinifolium, Hispanicum.	496.	1051	
— Resedæ minoris folio, erectum.	799.	1049	
— Resedæ minoris folio, supinum.	800.	1050	
Tragoriganum comosum, seu crispis & capillaribus foliis, Hispanicum.	772.	351	
— Dictamni capite, Hispanicum.	788.	273	
Tribulus terrestris minor, incanus, Hispanicus.	558.	562	
Trifolium acetosum, Americanum, rubro flore.	1139.	64	
— Alopecurum, majus, flore purpureo, stellato capite.	755.	814	
— Alopecurum, latifolium, spicâ longâ.	697.	815	
— Alopecurum, angustifolium, elatius.	698.	816	
— Alopecurum, spicâ globosâ.	1188.	817	
— arvense, supinum, verticillatum.	882.	828	
— Alphaltites, Canadense, siliquosum.	914.	433	
— Fragiferum, majus, repens, minori & rotundiori capite.	852.	825	
— Fragiferum, minus, oblongo capite, Italicum.	851.		
— luteum, capite rotundo, folliculoso, Italicum.	864.	826	
— minus, villosum, purpureum, capite parvo, echinato.	869.	823	
— minus, capite subrotundo, parvo, albo & echinato.	870.	822	
— montanum, luteo Tormentillæ flore, cineraceum.	710.	592	
— nemorosum, capite ovato, villosus, rubescens.	871.	821	
— peregrinum, alterum, flore luteo.	865.	432	
— siliquosum, flore violaceo, Lusitanicum.	866.	431	
— pratense, minus, purpureo Bellidis flore, capite globoso.	872.	824	
— luteum, cochleatum, echinatum, minus.	863.	847	
— pratense, supinum, καλαμῖς, seu capite humimerso.	881.	827	
Trixago Chamædryos foliis.	774.	206	
— altius ferratis foliis.	774.	207	

V

Valeriana Alpina, saxatilis, minor, flore albo.
— cærulea, Urticæ folio.

742. 131
683. 128
g

	Icon.	Obser.
—cærulea, altius inciso Urticæ folio.	684.	129
—bulbosa, suave olens, Italica Imperati.	867.	132
—tuberosa Imperati, seu Telephii radice.	825.	133
—montana, minor, integris foliis, Italica.	868.	130
—minor, Cornucopioides, alba, Indica.	741.	135
—minor, Cornucopioides, rubra, Hispanica.	741.	134
Verbena Indica, Myuros.	853.	287
—Lamii folio.	1146.	284
—nodiflora, Cretica, Julo longiore.	854.	286
—nodiflora, capite oblongo, seu Verbenaca nodiflora Imperati.	855.	285
Veronica mas, surrecta, elatior, seu Lysimachia spicata, cærulea.	891.	155
—mas, recta, latifolia, spicâ cæruleâ.	682.	156
—mas, recta, angustifolia, spicâ cæruleâ.	681.	157
Viola Martia, minor, flore violaceo.	695.	856
—Mariana, minor, cærulea, folio subrotundo, calyce corniculato.	759.	82
—montana, minima, flore albo, parvo.	760.	857
—montana, cærulea, tricolor, folio subrotundo, crenato.	692.	860
—montana, lutea, subrotundo, crenato folio.	691.	859
—tricolor, hortensis, violacea, alba, lutea incisus foliis.	696.	861
—tricolor, sylvestris, subrotundo folio, flore purpureo.	757.	862
—tricolor, sylvestris, angustifolia, flore albo.	757.	863
—tricolor, sylvestris, flore cæsis.	757.	864
—Hispanica, fruticans.	568.	858
Virga aurea angustifolia, cespitosa, exotica.	784.	1071
—montana, minor.	783.	1069
Vitis Cretica, alba, laciniatis foliis.	701.	1371
—Corinthiaca, alba, πολυφύλλος.	702.	1370

Y

Y Uca Indica, foliis Aloes, flore albo.	1194.	793
---	-------	-----

Z

Z Ea Briza barbata.	111.	1174
—Dioscoridis, mutica, μύσαυς, minor.	111.	1168

Quæ sequuntur ad Insecta marina pertinent.

	Icon.	Obser.
Astacus minor, villosis chelibus, Pediculi marini facie alter.	1288.	pag. 131
Cancer quadratus, lividus, μακρόκελος.	1286.	pag. 131
—minor, rhomboides, luteo rubens.	1287.	pag. 131
Concha σιντιορράκος, Cancellifera, Anatifera.	1296.	pag. 131
—μελανοσφάκος, Cancellifera, Anatifera altera Lobelii.	1296.	pag. 132
Conchæ turbinatæ.	* 1321. * 1322. * 1323.	pag. 132 & 133
Eruca echinata, marina, griseo fusca.	1284.	pag. 131
—echinata, marina, minor.	Ibid.	
Holothurium Uvâ marinâ, seu Ovis Sepiæ fœcundis septum.	1298.	pag. 129
—Idem Ovis Sepiæ sterilibus septum.	Ibid.	
Pagurus, niger, βρακύκλος, remipes.	1287.	pag. 131
Squilla Urfa minor, altera, remipes.	1288.	pag. 131
Stella marina, major, spinosior, fusca.	1281.	pag. 129
—marina, major, Aranciata, minoribus spinis echinata.	1285.	pag. 130
—marina, media, lætè rubens, spinosa.	1283.	pag. 130
—marina, minor, non spinosa.	1295.	pag. 130
—marina, λευκόκεμος, fimbriata.	1282.	pag. 130
—marina, λευκόκεμος, spinosa.	1282.	pag. 130
—marina, οφιδόκεμος, seu οφιδόκεμος.	2295.	pag. 131

FINIS.



PLANTÆ

PER GALLIAM, HISPANIAM ET ITALIAM

OBSERVATÆ,

ICONIBUS EXHIBITÆ

A R. P. JACOBO BARRELIERO;

VARIIS EARUMDEM APUD AUCTORES


APPELLATIONIBUS,

RARIORUMQUE DESCRIPTIONIBUS ADJECTIS.

I.



ANDRAGORA fœmina, flore cœruleo *Barr. Icon. 29.*
Mandragora fœmina *Clus. Histor. lxxxvj.* Mandragora
foliis asperis, fructu parvo, ovato & acuminato *Cor. Inst.*
R. Herb. 1. Mandragora flore subcœruleo, purpurascēte
C. B. Pin. 169. Raii Histor. 669. La Mandragore femelle.
Vires vide in *Hist. Raii l. c.* & in *Observ. Lob. pag. 138.*



2. Belladonna frutescens, rotundifolia, Hispanica *Inst. R. Herb. 77.* Sola-
num frutex, rotundifolium, Hispanicum *Barr. Icon. 1173.*



3. Polygonatum latifolium, flore albo, majore, odorato *Barr. Icon. 711.*
n. 1. Polygonatum floribus ex singularibus pediculis *I. B. 3. 529. Raii Hist.*
665. Le Seau de Salomon à fleur odorante. Icon. Barr. & descriptio ex J. Bauhino
l. c. sunt depromptæ. Vires vide in Hist. Raii pag. 667.



4. Ruscus aculeatus, rotundiore & ampliore folio. Brusca seu Ruscus
rotundifolius, vel Myrtacantha latifolia *Barr. Icon. 517. Le Houx-frelon, ou*
le petit Houx à feuilles larges. Varietas est Rusci vulgaris, à quo discrepat foliis
amplioribus & rotundioribus. Vires Rusci vide in *Hist. Raii 664.*

A

5. Ruscus

5. *Ruscus angustifolius*, fructu folio innascente *Inst. R. Herb.* 79. *Hippoglossum* seu *Bislingua* *Barr. Icon.* 249. *Bonifacia* sive *Bislingua* *J. B.* 1. 575. *Raii Hist.* 663.

6. *Ruscus latifolius*, fructu folio innascente *Inst. R. Herb.* 79. *Laurus Alexandrina* vera *Dioscoridis* & *Theophrasti* *Barr. Icon.* 250. *Laurus Alexandrina* *J. B.* 1. 574. *Col. part.* 1. 165. *Raii Hist.* 663. *Le Laurier Alexandrin.* *Vires* in *Hist. J. Bauh.* & *Raii l. c.* *Icon. Barr. ex Fab. Columnâ l. c.*



7. *Gentiana major*, vulgaris, pallido & parvo flore *Barr. Icon.* 63. *Gentiana major*, veterum *Clus. Hist.* 311. quoad *Iconem.* *La grande Gentiane à fleur pâle.* Varietas est *Gentianæ majoris*, luteæ *C. B. Pin.* 187. *Icon. Barr. ex Clusio* deprompta *l. c.* *Vires* recensentur apud *Schroderum*, & in *Hist. Raii* 716. *Ex Apenninis & Italiæ montibus* habuit *Barr.*

8. *Gentiana Alpina*, major, flore aureo & purpureo obsoleto *Barr. Icon.* 69. *Gentiana major*, alia *Camer. Epit.* 416. *Gentiana major*, pallido flore, punctis distincto *Clus. Hist.* 312. Hæc à superiori distinguitur foliis minoribus, acutioribus, alio virore nitentibus & rariora per intervalla cauli adnatis; Radice crassiore, & brachii quandoque crassitudinem æquanti, magis divaricatâ atque divisâ: caule ad summum cubitali; floribus denique minoribus nonnihil, ad oras tantum dissectis & denticulatis, verrucosis & nigro-purpureis maculis variegatis. In montibus *Delphinatûs* supra oppidum *Bourg-doyfan*, & circa *Gratianopolim* in monte *Charouffe*, atque in monte *Divi Hugonis* collegit *Barr.* Nos in monte *Grandson* supra *Cœnobium Majoris Carthusiæ* observavimus, necnon in celsioribus pratis *Vallis Barfilionensis.* *Icon. Barr. ex Camer. l. c.*

9. *Gentiana major*, purpureo flore *Clusii Barr. Icon.* 64. *Clus. Hist.* 312. *Gentiana major* purpurea *C. B. Pin.* 187. *Raii Hist.* 716. *La grande Gentiane à fleur purpurine.* *Icon. Barr. ex Clus. l. c.*

10. *Gentiana Asclepiadis folio* *Barr. Icon.* 70. *C. B. Pin.* 187. *Gentiana* 2. cæruleo flore *Clus. Hist.* 312. *Raii Hist.* 717. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.* In *Maurianâ* sæpius invenit *Barr.* præsertim in monte *Armillon* dicto. Copiosè & satis frequenter in editioribus pratis supra *Vapincum* & in *Valle Barfilionensi* nobis fuit obvia.

11. *Gentiana minor*, cruciata, flore cæruleo, erectior *Barr. Icon.* 65. *Gentiana* 111. cruciata *Clus. Hist.* 313. *Gentiana cruciata* *C. B. Pin.* 188. *Raii Hist.* 717. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.* *Vires* vide in *Hist. J. Bauh.* 3. 522. & in *Hist. Raii. l. c.*

12. *Gentiana minor*, cruciata, flore purpureo, supina *Barr. Icon.* 66. *Gentiana minor* *Camer. Epit.* 417. Varietas superioris. *Icon. Barr. ex Camer. l. c.* *Ex Apenninis & Æquicolorum montibus* habuit *Barr.*

13. *Gentiana cærulea*, punctata, annua *Pennæi*, xxi. *Clusii Barr. Icon.* 91. *Clus. Hist.* 316. *Gentiana palustris*, latifolia, flore punctato *C. B. Pin.* 188. *Raii Hist.* 721. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.* In pratis humidioribus *Vallis Barfilionensis* provenit, necnon circa *Vapincum*, præsertim in pratis montis *la Chapelanie* dicti. Hujus prima folia depinxit *Boccone* in *Musei sui part.* 2. *Tab.* 119. nomine *Gentianæ Pyrolæ folio.*

14. *Gentiana autumnalis*, angustifolia, major, *C. B. Pin.* 188. 6. spec. *Raii Hist.* 719. *Gentiana minima* *Mathioli Barr. Icon.* 51. n. 2. & *Math. Edit. Bauh.* 481. *Pneumonanthe Cordi* quoad figuram *Barr. Icon.* 51. n. 1. & *Cord. Hist.* 162. *Pneumonanthe Lobelii*, *Dodonæi*, *Clusii*, *Gerardi* *Barr. Icon.* 122. n. 1. *Lob. Icon.* 309. *Lob. Obs.* 166. *Dod. Pempt.* 168. *Clus. Hist.* 313. & *Ger. emac.* 438. *Gentianella* seu *Calathiana Viola* *Lugd. Hist. Barr. Icon.* 51. n. 11. *Lugd.* 824. *Gentianella* seu *Campanula pratensis* *Lugd. Hist. Barr. Icon.* 52. n. 1. *Lugd.* 824. Hæ quinque *Icones Barr. ex Authoribus citatis* sunt depromptæ. Tertia aliis anteponenda. 15. Gen-

15. *Gentiana autumnalis*, minor, annua, flore cruciato ad latera piloso, fugax *Barr. Icon. 121*. *Gentianella autumnalis*, foliis *Centaureæ minoris*, flore cæruleo *Eyft.* *Gentiana cærulea*, fimbriata, angustifolia, autumnalis *Columnæ Barr. Icon. 97. n. 1. Col. part. 1. 222. 5. spec. Raii Hist. 719*. *Gentiana cærulea*, oris pilosis *Inst. R. Herb. 81*. Icones *Barr. ex Hort. Eyft. & Col. l. c.* Sæpius nobis fuit obvia mensibus Augusto & Septembri circa Geneviam, tum etiam supra Vapincum secus fluvium *Drac* dictum, necnon in Valle Barfilionensi.

16. *Gentiana Alpina*, pumila, verna, minor *Inst. R. Herb. 81*. *Gentianella purpurea*, minima *Columnæ Barr. Icon. 97. n. 11. Col. part. 1. 22. & Raii Hist. 718*. Icon. *Barr. ex Col. l. c.*

17. *Gentiana Alpina*, pumila, brevi folio *Inst. R. Herb. 81*. *Gentianella fugax Clusii Barr. Icon. 103. n. 111. iv. Clus. Hist. 315. Raii Hist. 720*. *Gentiana minima Lob. Icon. 310. Adv. 131*. Icon. *Barr. ex Lob. l. c.*

18. *Gentiana utriculis ventricosus C. B. Pin. 188*. *Gentianella cærulea*, cordata *Columnæ Barr. Icon. 122. n. 11. Col. part. 1. 221. & Raii Hist. 721*. *Gentianella annua*, azureo flore *Barr. Icon. 48*. prior Icon. *Barr. ex Col. l. c.* altera ex *Corvino*.

19. *Gentiana autumnalis*, ramosa *C. B. Pin. 188. Raii Hist. 720*. *Gentianella autumnalis*, annua, cæruleo-purpurea, multiflora *Barr. Icon. 102. & Eyft. Icon Barr. ex Hort. Eyft.*

20. *Gentiana pratensis*, flore lanuginoso *C. B. Pin. 188. Raii Hist. 719*. *Gentiana fugax Clusii*, Bauhini, purpureo-cærulea *Barr. Icon. 510. n. 11*. *Gentianellæ species quibusdam*, an *Cordo Pneumonanthe*, aut *Gentiana fugax altera Clusii I. B. 3. 526*. Icon. *Barr. ex J. Bauh. l. c.*

21. *Gentiana pratensis*, flore brevior & majore *C. B. Pin. 188. Raii Hist. 720*. *Gentianella fugax*, Clusii, Bauhini, sub cærulea *Barr. Icon 510. n. 1. 111. Clus. Hist. 315. & I. B. 3. 526*. Icon *Barr. ex J. Bauh. l. c.*

22. *Gentiana Alpina*, pumila, *Centaurei minoris folio Inst. R. Herb. 87*. *Calathiana verna*, cæruleo-purpurea *Dalechampii Barr. Icon. 509. n. 1. Lugd. 824*. *Calathiana verna*, cæruleo-purpurea *Dalechampii Joan. Bauhini, Barr. Icon. 509. n. 11. I. B. 3. 527*. *Gentianella fugax, æstiva, stellata, cærulea, minor Barr. Icon. 103. n. 11*. *Gentianella fugax v. Clusii, flore cæruleo, colore elegantissimo I. B. 3. 527. Raii Hist. 720*. *Gentianella fugax æstiva, cærulea, minor Barr. Icon. 103. n. 1*. *Gentiana xi. sive fugax v. Clus. Hist. 316*. Icones *Barr. ex Authoribus citatis sunt depromptæ*.

23. *Gentiana Alpina*, pumila, flore aureo. *Gentianella fugax, Alpina, flore aureo Barr. Icon. 104*. Elegans hæc species suâ Icone non major, ramosa, & multis donata cauliculis erectis, firmis, in latera magis quàm in figurâ non-nihil expansis, glabris, rotundis, pallentibus & erumpentibus ex radice tenui, lignosâ, paucis fibris capillatâ, brevi & subluteâ. Folia humifusa stellatim disponuntur Myrtina quæ minora acutioraque fiunt dum summum ramorum assequuntur, per singula internodia bina. Flores lutei seu aurei, Campanulæ aut Calathi formâ, in quinas acutas altasque lacinias per oras divisi è Calyce virenti & in quinque radios scisso emergunt. E tubi fundo surgit pistillum ventricosum, semine prægnans, pallidis quinque staminibus apices aureos bifidos gerentibus stipatum. Tota planta amara est. Ex Alpibus circa oppidum *Bourgdoysan* sitis habuit. *Barr. Suspicio hanc delineasse & descripsisse ex plantâ siccâ*. Color enim albus florum, præsertim *Gentianarum*, exsiccatione in flavum & sub flavum facillè mutatur.

24. *Gentiana Alpina*, magno flore *I. B. 3. 523. Raii Hist. 718*. *Gentianella Helvetia*, amplo azureo flore *Barr. Icon. 47*. *Gentianella Alpina*, lato acuto folio, flore minus patulo, albo, cæruleo & cæcio. *Barr. Icon. 106*. *Gentianella Alpina*, lato, rotundiore folio, flore amplo reflexo, colore azureo *Barr. Icon. 105*. *Gentianella minor, purpurea, Violæ Marianæ flore Barr. Icon. 110. n. 11. Bocc. Mus. part. 2. 21. Tab. 6*. *Gentiana Helvetia Lob. Icon. 310. & Adv.*

130. Gentianella minor, ἀγαυὸς, Violæ & maximi convolvuli flore Barr. Icon. 110. n. 1. Gentianella minima, latifolia Lugd. 828. Icones Barr. ultimæ ex Lob. & Dalech. depromptæ l. c. Frequens est in Alpibus supra Gratianopolim, circa Camberiacum, & in Valle Barfilionensi. Multum ludit foliis suis modò rotundioribus, acutioribus modò, nunc angustis, nunc amplioribus.

25. Gentiana Alpina, pumila, verna, major Inst. R. Herb. 80. Gentianella minor, verna, cæruleo stellato flore Clusii Barr. Icon. 109. n. 1. Clus. Hist. 315. 3. species Raii Hist. 718. Gentianella Alpina, minor, verna, subrotundo folio, flore cæruleo Barr. Icon. 98. Gentianella minima, verna, flore cæruleo Eyst. Gentiana minor, cæruleo, stellato & per oras crenato flore Dalechampii Barr. Icon. 109. n. 11. Gentianella angustifolia Lugd. 829. Icones Barr. ex Authoribus citatis desumptæ. Nec minus variat hæc quàm proximè recensita. In Alpibus sæpiùs occurrit & circa Genevam.

26. Gentiana autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, major. Gentianella autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, major Barr. Icon. 101. n. 1. Gentianella elegantissima, Bavarica Camer. Hort. Tab. xv. Icon. Barr. ex Camer. l. c.

27. Gentiana autumnalis, Serpillifolia, Bavarica, minor. Gentianella autumnalis, Serpillifolia, flore crenato, Bavarica, minor Barr. Icon. 101. n. 11. Gentianella minor Camer. Hort. Tab. xv. Icon. Barr. ex Camer. l. c.



28. Convolvulus longifolius, azureus, niveo umbilico, supinus Barr. Icon. 322. Convolvulus peregrinus, cæruleus, folio oblongo C. B. P. 245. Prodr. 134. & Raii Hist. 727. Liseron de Portugal à fleur bleue.

29. Convolvulus longifolius, azureus, niveo umbilico, erectus Barr. Icon. 321. Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. 105. Africanus ejusdem Mus. part. 2. 76. Tab. 63. Varietas prioris. In Andalusia circa Cordubam reperit Barr.

30. Convolvulus minor, Spicæfolius, Hispanicus Barr. Icon. 311. Convolvulus minimus, Spicæfolius, vel Stachadis citrinæ aut Linariæ Lob. Adv. 274. Convolvulus Spicæfolius, angustifolius, radice repente Bot. Monsp. Humilis est Planta, nec repens, nec assurgens, sed in latus nonnihil inclinata, & subinde erecta, vix medium palmum alta, ex radicis cervice plura confertim emittens folia incana, tenui lanugine pubentia, spatulæ seu Limonii, Oleæ sed potiùs Sesamoidis majoris Hispanicæ Clusii formâ, molliora tamen, palmi quadrantem longa, quæ longissima, nonnihil contorta & convoluta, è quorum medio surgit brevis cauliculus, foliosus & ramosus, è cujus fastigiis & lateribus sese explicant flores Convolvuli majoris, sed minores, albi, stellâ carnei coloris foris radiati. Tota planta vix figurâ major. In Hispaniæ Montibus Mancie Aioræ oppido vicinis ad Orientem collegit Barr.

31. Convolvulus Marinus, repens, angusto & oblongo folio, flore purpurascens Barr. Icon. 1132. Folia huic incana pariter, sed latiora & acutiora. Radix alba, longa, lacteo succo turgens, sub arenis repens Soldanellæ modo, variosque per nodosa intervalla edens surculos carnosos, vix palmo altiores & repandos, & qui pauca in folia floresque abeunt. Flores mediocris sunt magnitudinis & ex albo-purpurascunt. Ad littus Maris Mediterranei juxta Centumcellas, vulgò Civitavechia Cornatum versùs in arenis serpit.

32. Convolvulus saxatilis, erectus, villosus, perennis, flore ex albo purpurascens, Hispanicus Barr. Icon. 470. Bocc. Mus. part. 2. 79. Tab. 70. Convolvulus argenteus, umbellatus, supinus Inst. R. Herb. 84. Campanula Lychnidea I. B. 2. 803. Raii Hist. 737. Tota villis hispida est & sericeo nitore albescit hæc planta, è Saxorum, rupium rimis erumpens, longâ & perenni gaudente radice, ex quâ sex aut septem, tenues, erecti modò, modò supini, villosi & argentei assurgunt cauliculi foliis Oleæ seu Spicæ vestiti, brevi & sericeâ lanugine incanis & molliusculis; cauliculi majores, vix palmum superant, desinuntque in fasciculum florum Convolvuli minoris & vulgaris, intùs alborum, foris è

è purpureo radiatorum. Pericarpium & semen ut aliis Convolvulis. In montibus campestribusque oppidi *Aioræ*, & in deserto *Mancia* Provinciæ Castiliæ novæ ad radices Montis Septentrionem versus, in confiniis Regni Valentini reperiēbat Barr. necnon in Catalauniæ locis aridis, deserto Montis Serrati.

33. Convolvulus maritimus, major, Italicus, sinuato & auriculato potius folio *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 37.* Soldanella marina, longo & sinuato folio seu Convolvulus marinus, lactescens, soldanellæ congener Imperati *Barr. Icon. 856.* Convolvulo marino *Imp. 671. Icon. Barr. ex Imp. l. c.* Alligatur Gramini spicato, sparteo, spicâ sericeâ ex utriculo prodeunte *Inst. R. Herb. 518.* Juxta mare in viâ Neapoli Puteolos ducente reperitur.

34. Convolvulus Beticæ Althææque foliis, repens, argenteus, flore purpureo *Barr. Icon. 312.* Convolvulus argenteus, Althææ folio, *C. B. Pin. 296. Raii Hist. 725.* Convolvulus Althææ folio *Clus. Hist. xlix.* Passim in Italiâ, locis incultis, Romæ in ascensu ad Montem Pincium prope Ecclesiam R. P. Minimorum. In Hispaniâ Beticæque Regno juxta Oppidum *Alhama*, observavit Barr. In Galliâ Narbonensi, Monte Cetio, sed frequentius in Gallo-Provinciâ circa Tolonam & Olbiam nobis occurrit.

35. Convolvulus quinquefolius, seu foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo Bauhini Prodrumi. *Barr. Icon. 319. C. B. Pin. 295. Prodr. 134. Raii Hist. 729.* Convolvulus multifidus, glaber *Inst. R. Herb. 84. Icon. Barr. ex Bauh. l. c.*

36. Convolvulus henneaphyllos, flore purpureo *Barr. Icon. 320.* Superioris varietas. Plantam pictam communicabat Barreliero Eques Corvinus.



37. Tithymalus dendroides, major & verior, Italicus *Barr. Icon. 910.* Tithymalus dendroides *J. B. 3. 675. Raii Hist. 864. Le Titimale, arbre.* In Regno Neapolitano juxta Terracinam urbem nascitur, ut monet Math.

38. Tithymalus Amygdaloides, major, tortuoso caule *Barr. Icon. 839.* Tortuoso caule donatur, multiplici, virente & nonnihil villosa. Folia sunt oblonga, Amygdalina, obtusè acuta, glabra, infernè glauca, supernè obscurius virentia, & transversim picta brevibus & è viridi albicantibus striis, lævia; duas uncias & semissem longa quæ majora & inferiora annotinaque, dodrantem uncia lata quæ ventricosiora, eò minora quò editiora. Flores per caulem disseminati, singularibus oblongisque pediculis innixi, sunt quadrilunares; eorum medio tria surgunt stamina virentia bifurcata, minutissimis & luteis onusta apicibus; fructus subrotundi.

39. Tithymalus Amygdaloides, minor, subglaber *Barr. Icon. 830.* Tithymalus sylvaticus, toto anno folia retinens *J. B. 3. 671. Raii Hist. 863.* A superiori distinguitur foliis angustioribus. In Monte *Guadagnolo* inter sylvas cæduas cum sequenti invenit Barr. Frequens in sylvis Galliæ. Subdulci est sapore, dum manditur, sed dein nonnihil linguam vellicantē.

40. Tithymalus Amygdaloides, minimus, glaber *Barr. Icon. 829.* Hujus folia multò minora, breviora & vix uncia unâ longiora, trientem uncia lata, extremâ parte latiuscula & obtusa, acutiora juxta exortum, & stricta, glabra, crassiuscula, carnosa, & minora quò altius erumpunt. Flores in summo caulium veluti in umbellam collecti, quadrilunati, lutei. Tota planta nullius est ferè saporis.

41. Tithymalus palustris, villosus, mollior, erectus *Barr. Icon. 885.* Radice nititur multifidâ, crassâ, fuscâ & perenni, è quâ multi, rotundi, rufescentes, hirsuti, sesquipedales ad summum surgunt caules foliis vestiti densioribus, surrectis, acutis, serratis, molliter hirsutis, subincanis & villosis. Flores & fructus quales cæteris. Forte Tithymalus incanus, hirsutus *C. B. Prodr. 133.* In locis paludosis cænosisque provenit, maximè circum Ostia Tyberina & in maritimis Galliæ.

42. *Tithymalus nemorosus*, acutiori folio, dulcis *Barr. Icon. 834*. E radice longâ, crassâ & gilvâ erumpunt plurimi caules rubri & glabri, quorum alii floridi, alii foliosi, qui foliosi, foliis vestiuntur Amygdaloidis sed longè minoribus, glabris, alternis, venosis & cæsi coloris: qui in flores desinunt, brevioribus, latioribus, rotundioribusque donantur foliis, iisque amplexicaulibus, umbellamque florum luteolorum, quadrilunatorum emittunt. Ex floris medio pericarpium exsurgit tricoccum, læve, inclinatum, stilo trifido armatum. Semina in pericarpio contenta ovata sunt, utrinque obtusâ instar Viciæ seminis. Tota planta lactescit, dulcescitque & subastringentis est saporis nec ingrati. Prope Pivernum Oppidum, vulgò *Piperno* in latio, viâ Appiâ quæ ducit Terracinam, in sylvæ declivi quâ itur ad Monasterium *Fossæ novæ*, Divi Thomæ Acquinatis obitu per celebre, fabuloso solo nascitur.

43. *Tithymalus nemorosus*, alter, foliis latioribus & firmioribus *Barr. Icon. 840*. Plures ex radice tenui surculos emittit rectos, pedales, ab imo ad summum foliosos; Folia illi duas uncias longa, dodrantem unciae lata, in exortu lata & amplexicaulia, in medio ventricosa, subacuta, surrecta firmaque. Latam in umbellam desinit caulis. Flores & fructus ut in præcedenti. Tota planta præcedenti lævior.

44. *Tithymalus nemorosus*, villosus, mollior *Barr. Icon. 198*. Tres aut quatuor pluresque etiam à tenui contortâ lignosâque radice cauliculos profert pedales & sesquipedales, villosos, è purpureo virentes, quos vestiunt duas quandoque uncias & amplius longa, semunciam lata folia villosa, mollia, infernè subineana, supernè lætè imò obscurè virentia & amplexicaulia & deorsum nutantia. Summum caulis desinit in umbellam tribus aut quinque radiis qui rursus in alios dividuntur, constantem, stellâque foliorum æquantium magnitudinem & formam eorum quæ sunt in caule, suffultam. Flores luteoli, in quatuor partes retusas divisi. Opacis in locis & sylvosis crescit in Italiâ.

45. *Tithymalus dulcis*, tuberosâ radice *Barr. Icon. 909*. & *Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 44*. *Tithymalus montanus*, non acris *C. B. Pin. 292. Raii Hist. 870*. *Tithymalus tuberosus*, Germanicus *C. B. Pin. 292. Le Timale doux*. Hujus radix cum est annosa aut in solo pinguiori crescit, latum in cespitem densis propaginibus arundinaceis, crassis, nodosis, grumosisque serpit; in novitiâ plantâ radix tenuior, tuberculis tamen nodosa. In Montibus Apenninis Italiæ & Alpium observavit *Barr.* Circa Genevam & sparsim per sylvas Galliæ occurrit.

46. *Tithymalus bulbosus*, Apios Fuchsi *Barr. Icon. 832*. Multos ex radice grumosâ, nigricante, scabrâ, rugosâ, non exactè rotundâ, pueri caput ferè adæquante, cauliculos edit penè lignosos, tribus quandoque pedibus longos, nonnihil curvos & inflexos, graciles & debiles, quibus folia hærent vix trientem unciae lata, tres circiter uncias longa, supernè obscuro virore nitentia, lævia, glabra, acuta, venâ niveâ secundum nervi medii longitudinem decurrente, infernè dilutiora & subincana. Summum caulis desinit in umbellam radiis quinque conflata. Flores virent & in quatuor partes retusas, ac subrotundas dividuntur. Aprili florebat Romæ in horto sancti Xysti. Apios dicitur Græcè, quòd radix sit pyriformis & turbinata, *Fuch. Hist. 132*. Ab Equite Corvino accipiebat *Barr.* Radicibus suis & foliis discrepat hæc species ab eâ quæ vulgò dicitur Apios *Math. Clus. Bauhin. & Bellon.*

47. *Tithymalus Myrsinites*, verior, pingui, crassò folio, è cæsi virens *Barr. Icon. 1200*. *Tithymalus Myrsinites*, latifolius *C. B. Pin. 290. Raii Hist. 865*. Figuram mutat dum flores fructusque profert; unde non mirum Icones authorum esse inter se dissimiles. In Asprensis & Sabinæ locis lapidosis & siccis crescit.

48. *Tithymalus marinus*, rotundifolius, Italicus *Barr. Icon. 824*.

49. *Tithymalus marinus*, latifolius, Italicus *Barr. Icon. 823*.

50. *Tithymalus marinus*, folio retuso, Terracinensis *Barr. Icon. 833*. Species hæc inter arenas quibus oppletus est & cumulus Portus Terracinensis oritur.

Foliis

Foliis donatur longis & angustis atque in extremo rotundis & retusis, vix quartâ uncia parte latioribus, & uncia longioribus, inferioribus idest quæ caulis partem infimam occupant, multò minoribus, magis retusis & vix semuncia longioribus. Caules plures edit palmares, succulentos, rubentes. Radix crassa, longa altèque in arenam demissa. Flores non vidit, nec fructus.

51. Tithymalus marinus, Myrtifolius, Italicus *Barr. Icon. 1203.*

52. Tithymalus marinus, ferratus, Italicus *Barr. Icon. 1202.*

53. Tithymalus marinus, acuto linifolio *Barr. Icon. 831.* Tithymalus Amygdaloides, angustifolius *Tabern. Icon. 591.* Hujus radix febrifuga censetur, Vomitus alvumque potentissimè ciet. Ex cortice radicum siccato paratur adversus febres remedium quod Regiæ liberalitati debemus. Datur autem ad dragm. semissem, & unâ vel alterâ hujus medicamenti dosi febres contumaces curantur. Frequens per Galliam & Italiam occurrit.

54. Tithymalus Myrti folio undulato. Esula minor, Myrti folia, longius radicata *Barr. Icon. 211.*

55. Tithymalus Epithymi fructu *Col. part. 2. 51. Raii Hist. 871.* Esula fruticans seu Pithyusa Romanorum *Barr. Icon. 197.* Corticem radicum pro Esulâ legitimâ accipiunt Pharmacopolæ Romani, inquit Barr. In colle Tiburtino meridiei obverso & urbi, ex alterâ fluvii parte inter saxa erumpit; sit exsiccatione ramorum spinosa. Nos verò in Valle Barsilionensi & præsertim circa oppidum SanStephanienſe in Dicecesi Niciensi invenimus.

56. Tithymalus paralius, rubentibus & compressioribus foliis *Barr. Icon. 886.* Tithymalus maritimus *C. B. Pin. 291. Raii Hist. 865.* Ad littus Maris & Insulæ Tiburtinæ colligebat Barr.

57. Tithymalus helioscopius *C. B. Pin. 291. Raii Hist. 869.* Esula rotundifolia, ferrata, carnosior *Barr. Icon. 212.* Romæ initio Aprilis in viâ quâ itur ad Sanctum Laurentium extra muros juxta sepes carnosiores reperiebat Barr.

58. Tithymalus annuus, supinus, folio rotundiore acuminato *Inst. R. herb. 87.* Pithyusa minor, subrotundis & acutis foliis *Barr. Icon. 751.* Peplis minor *J. B. 3. 670. Raii Hist. 869.*

59. Tithymalus annuus, Lini folio acuto *Bot. Monsp. Raii Hist. 868.* Pithyusa angustis acutisque Esulæ foliis, annua *Barr. Icon. 752.*

60. Tithymalus Linifolio, major, Italicus *Barr. Icon. 821.* Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis Pithyusa *C. B. Pin. 292. Raii Hist. 867.* Radice est tenui, albicante, tortuosâ & siccâ, in biennium & usque ad exanthemum seu potius baccarum maturitatem durante: flore marcescente tota sensim marcescit planta. Primo anno quo non floret, restibilis. Caule est recto, unico, ramoso, purpurascens, pedali & sesquipedali, foliis vestito angustis, liniformibus, latioribus quâ umbellæ viciniora sunt, utrinque glabris & lævibus. Caulis & ramuli in umbellas florum desinunt. Flores pallide lutei, quadrilunares, è quorum medio surgit bacca tricocca, nutans, virens, & tribus in summo apicibus capillata. Vires ejus vide in Hist. Raii l. c.

61. Tithymalus montanus, Esulæ folio, minor, Italicus *Barr. Icon. 822.*

62. Tithymalus sive Esula exigua *C. B. Pin. 291. Raii Hist. 868.* Esula minor, *πολλυλως*, aculeata *Barr. Icon. 85.*

63. Tithymalus minimus, angustis acutisque foliis, fruticans. Pithyusa fruticans, angustis acutisque foliis, minima *Barr. Icon. 86.* Semipalmaris ut plurimum est plantula, fruticans, erecta, unicaulis, ab imo ad summum dense ramosa, foliis vestita angustis, acutis, densâ satis serie circum caulem adnatis, alternis, & vix uncia longioribus. Flores non tantum in summo cauliculi, sed in plerisque ramulorum extremis observantur iisque succedunt bacca rotundæ, trifidæ seu tricocæ, virentes, nec Cannabino grano majores. Radix est parva, lignosa, contorta, albicans, annua & paucis fibris capillata. Siccus ad Barrelierum missus est ex agro Urbevetano.

64. Oxy



64. Oxys Americana, flore rubro, fibrosâ radice *Inst. R. herb. 89.* Trifolium acetosum, Americanum, rubro flore *Barr. Icon. 1139. & Bocc. Mus. part. 2. 63. Tab. 51.* Unico assurgit caule recto, rotundo, æquali, lævi, alternis ramis ab imâ parte ad verticem brachiato, alternisque foliis vestito. Folia terna uni adhærent pediculo unciam unam aliquandò longo, inæqualia, ad terram nonnihil demissa, glabra, lævia supernè, infernè lævi subtilissimoque tomento nonnihil albentia, subrotunda, inæqualibus venis exarata, mediâ unciâ vix latiora, vixque unciam longa quæ longiora & majora sunt. E sinu singulorum pediculorum oriuntur rami seu pediculi duas uncias longi, nudi, versùs extremum in duas partes divisi, è quibus plures florum gemmæ duplici serie & alternæ propendent. Flores è rubro carnei in quinque partes sinuosas, cordatas & retusas divisi, in umbilico crocei, & staminibus quinque luteis stipati. Floribus succedunt siliquæ angulosæ, striatæ, tenerimæ & ita elasticæ, ut tactu simplici disrumpantur, seminaque effundant rubescentia, Milio minora, tribus in loculis inclusa. Calyx est quinquefidus. Totius plantæ sapor acetosus est. Romæ in horto Sancti Xysti colebat Barr.



65. Apocynum minus, rectum, Canadense *Barr. Icon. 72. & Corn. 93.* Apocynum erectum, Canadense, angustifolium *Par. Bat. L' Apocin de Canada. Icon. Barr. ex Corn. l. c.*



66. Malva rotundifolia, Italica, flore amplo purpurascens *Inst. R. herb. 96.* Althæa virens, rotundifolia, flore amplo, purpurascens, Italica *Barr. Icon. 479. La Mauve d'Italie à grande fleur purpurine.* Foliis donatur Althææ formâ, sed virentibus, mollibus, lævibus & leni velut lanugine & bombicinâ tectis, supernè tamen dilutius virentibus, & pediculo duas uncias ut plurimum longo cauli hærentibus. Inferiora autem folia majora, rotundiora, magis sinuosa & quatuor uncias longa lataque, superiora minora, quinque cuspidibus, tribus quandoque acuminata, sensim angustiora brevioraque, quò altius surgunt. Caulis rotundus, albus, rectus, bicubitalis, ramosus. In summo caulium & ramorum flores enascuntur Malvæ, sed paulò ampliores, purpurascens, venis paulò obscurioribus radiati, in quinque vel sex lacinias ad basim usque dissecti, staminibus plurimis stipati apices albo-pallidos gestantibus. Semina Malvacea sunt calyce inclusa pentaphyllo quem trifidus sustinet caliculus. Radix ab uno capite multiplex, multisque fibris circum capillata, longa, mollis, pallida & lenta. Florebat Julio.

67. Malva Rosea, sulfurea, folio anguloso & folio Ficus, Tartarica *Barr. Icon. 586.* Malva Rosea, folio Ficus, flore luteo *H. R. Paris.*

68. Malva trimestris *Clus. Hist. xxiiij. Raii Hist. 598.* Alcea minor, variis foliis *Barr. Icon. 1201.* Florum lacinia magis ab invicem diductæ sunt, quam ut ex vivâ plantâ delineata esse videatur.



69. Althæa fruticans, incana, minore folio, Hispanica *Barr. Icon. 428.* Althæa frutescens, folio rotundiore, incano *C. B. Pin. 316.* Althæa frutex 1^a. *Clus. Hist. xxiiij. Raii Hist. 603. La Guimauve arbre.*

70. Althæa rugosior, rubro flore, Hispanica *Barr. Icon. 427.*



71. Alcea hirsuta, minima, flore cæsis, Hispanica *Barr. Icon. 1169,* Alcea villosa *J. B. 2. 1067. Raii Hist. 605.*

72. Mal-



72. Malacoides Betonica folio, *Inst. R. herb.* 98. Alcea Betonica folio, flore purpuro-violaceo *Barr. Icon.* 1189. Althæa Sida dicta quibusdam *J. B.* 2. 957. Malva Betonica folio. *Bocc. Rar. Plant.* 15. *Raii Hist.* 599.



73. Kermia Syrorum quibusdam *C. B. Pin.* 316. Althæa frutex, flore albo, rubro, carneo, purpuro-violaceo *Barr. Icon.* 491. Alcea arborescens, glabra, Kermia dicta *I. B.* 2. 957. Alcea Syriaca, arborescens, Kermia Syrorum Imperati *Barr. Icon.* 1176. *Imp.* 670. Icones *Barr.* desumptæ sunt ex Authoribus citatis.

74. Kermia Sinensis, fructu subrotundo, flore pleno *Inst. R. Herb.* 100. Malva Canadensis, luteo purpureo, pleno flore, arborescens *Barr. Icon.* 585. Rosa Sinensis, foliosa *Ferr. Fl.* 492. *Raii Hist.* 1069. La Rose de Cayenne à fleur double. In hortis colitur, ex Insulis Americanis allata, non autem è Canadensi tractu, ut arbitrabatur *Barr.*

75. Kermia vesicaria, vulgaris *Inst. R. Herb.* 101. Alcea Veneta seu vesicaria, trifolia, hirsuta, flore sulfureo, unguibus purpureis, *Barr. Icon.* 471. Alcea solisequa multis, Veneta *I. B.* 2. 1068. *Raii Hist.* 1067.

76. Kermia Africana, vesicaria *Inst. R. Herb.* 101. Alcea Africana seu vesicaria, trifolia, glabra, flore sulfureo cum unguibus purpureis *Barr. Icon.* 472. Kermia Africana, vesicaria, folio tripartito, flore purpureo *Inst. R. Herb.* 100. Alcea vesicaria Capitis bonæ spei *Mor. Hist. Oxon. part.* 2. 593. *H. R. Blef. & Raii Hist.* 1067. Ex horto Ser. Princip. Gastonis Aurelianensium Ducis semen habuit Barrelierus nomine Alceæ Promontorii bonæ spei.



77. Campanula montana, minor, angustifolia *Barr. Icon.* 487. Campanule de Montagne à feuilles étroites. Exigua hæc planta radice est tenui, longâ, sulfureâ, è quâ se erigunt sursum folia nullo pediculo nixa, angusta, acuta & duas circiter uncias longa, lanceolata. Caules tenues, glabri, foliis vestiti in summo minoribus & angustioribus unicum florem sustinent, Campanulatum, ad latus nutantem, tenui pediculo innixum, semunciâ breviorē & calyce comprehensum quinquesido, cujus radii angusti & ita longi, ut ad oras floris pertingant. Tota planta exilis est & glabra, vix palmi dodrantem alta. In Montibus Apenninis Aprutii & Amatricensium crescit.

78. Campanula Alpina, Teucris folio angulato *Inst. R. Herb.* 110. Rapunculum Teucris folio *Barr. Icon.* 567. Rapunculus Alpinus, Teucris folio rhomboidali *Bocc. Mus. part.* 2. 75. *Tab.* 81. *Raii Hist.* 3. 383. Campanula Drabæ minoris folio *C. B. Pin.* 94. *Prodr.* 36. Rapunculi genus folio ferrato rotundiore *I. B.* 2. 798. *Raii Hist.* 741. Radix huic alba, longa, crassiuscula, fibris à latere capillata, ex quâ caules exeunt tres aut quatuor alternis foliis Teucris pratenfis facie, ferratis, utrinque acutis muniti. In summis cauliculis sparguntur tres aut quatuor flores Campanulæ Persicæfoliæ formâ, nutantes, cærulei, sed minores multò, quinque acutis crenis per oras incisi, è viridi stellato calyce emergentes & tenui longoque pediculo innitentes. Lac defluit, dum læditur planta. Hæc à Bauhinianâ foliis tantum nutantibus discrepat. In Valle Barfiliensis, & in editioribus pratis supra Vapincum nascitur.

79. Campanula Cretica, saxatilis, Bellidis folio, magno flore *Inst. R. Herb.* 111. Trachelium saxatile, Bellidis folio, cæruleum, Creticum *Barr. Icon.* 813. *Bocc. Mus. part.* 2. 76. *Tab.* 64. Exotica hæc planta vix figurâ altior, læto virore nitens, glabra; foliis inferioribus Bellidis planè formâ, in ambitu leviter ferratis; è quorum medio surgunt caules breves, semipalmes, tortuosi, glabri, subpurpurascens, è rotundo compressi, foliosi & floribus onusti non

B

minoribus

minoribus Campanulæ Urticæ foliis, quaternis, aut quinis ab unâ parte, thyrsi modo ordinatis, inclinatis, nutantibus, cæruleis, aut saltem cæsi coloris, & è calyce quinquefido emergentibus. Calyx eorum abit in fructum hemisphericum, quinis nervis seu costis gilvis secundum longitudinem striatum. Semen tenue. Tota planta saporis est subdulcis. Saxatilis est, è Cretæ scopuliseducta.

80. Campanula saxatilis, rotundifolia, hispida, flore cæsius, amplo. Italica Barr. Icon. 453. Campanula parva, rotundifolia, flore cæruleo, pentagono, grandi Raii Hist. 741. Inter saxorum rimas erumpit radice albâ; foliis rotundis in extremo acutis, crenatis, parvis, oblongo pediculo articulatis, villosis, hispidis, canescentibus; è quorum medio emergunt caules alternis foliis vestiti, è rotundo in longum protensis & angustis quò altiùs in caules surgunt. E foliorum sinu prorumpunt flores semunciali pediculo fulti, singulares, ampli, in quinque partes latas & acutas divisi, hiantes & latè se explicantes, calyce comprehensi quinquefido, virenti, hispido, angustis acutisque radiis distincto. In medio floris insidet tumidus stylus multis circumseptus staminibus. Marcescente flore, calycis pars media tumidior fit & abit in fructum semine tenui & pulverulento turgidum. In Valle Ananiæ ad Austrum primo circiter lapide ab urbe in rupibus oritur, necnon in circuitu Carthusiæ Divi Bartholomæi Trifulti ad pedes Apenninorum ad Austrum.

81. Campanula minor, Alpina, foliis Cochleariæ Barr. Icon. 454. Ex albâ, tenui fibrosâque radice plurima in orbem spargit humi folia ferrata, subrotunda; quorum prima latiora, magis compressa, & rotundiora quàm superiora quæ acutiora, in medio concava, Cochleariæ modo & triunciali donata pediculo. Caules floresque non vidit; lacteo succo turgabant folia.

82. Campanula hirsuta, Ocimi folio caulem ambiente, flore pendulo Bocc. Rar. Plant. 83. Viola Mariana, minor, cærulea, folio subrotundo, calyce corniculato Barr. Icon. 759. Semen habuit Barr. à P. Boccone.

83. Campanula pentagonia, perfoliata Mor. Hist. Oxon. part. 2. 457. Bocc. Mus. part. 1. Tab. v. n. 8. Rapunculum minimum, rotundifolium, verticillatum, flore purpuro-violaceo Barr. Icon. 1133. Speculum Veneris perfoliatum, seu Viola pentagonia, perfoliata Raii Hist. 743.

84. Campanula Alpina, sphærocephalos C. B. Pin. 94. Trachelium majus, petræum, flore albo Ponæ Barr. Icon. 890. Pon. Bald. Ital. 161. Clus. Hist. cccxxxij. & Raii Hist. 734. Icon. Barr. ex Clus. l. c.

85. Campanula Alpina, Tragopogi folio C. B. Pin. 94. Trachelium minus, Gramineum, cæruleo-violaceum Barr. Icon. 332. Trachelium Tragopogi folio, montanum Fabii Columnæ I. B. 2. 802. Col. Phytob. 2. 25. & Raii Hist. 736. Folia huic leviter hirsuta, crenata & veluti dentata. Tota planta vix palmo altior. E montibus Aprutii Sulmonæ vicinis habuit Barr.

86. Campanula umbellata, foliis oblongis hispidis Inst. R. Herb. 110. Rapunculus lanceolatus, corniculatus Barr. Icon. 523. n. 11. Rapunculus sylvestris, umbellatus 1. Thal. Icon. viij. Trachelium Gramineum, minus, non crenatum, flore cæruleo Barr. Icon. 524. Prior Icon. Barr. ex Thal. l. c. Alteram ex plantâ vivâ sculpsit; hanc junio florentem in Apenninis Aprutii apud Amatricenses in Monte Cardito eruebat. Tota planta, inquit, vix palmo altior radice gilvâ, longâ, lactescente, perenni tereti cespitosâque nititur, ex quâ folia plurima erumpunt Graminea, tres quatuor vel quinque uncias longa, tenui lanugine hispida, in caule breviora. Flores Trachelii, cærulei.

87. Campanula pratensis, flore conglomerato C. B. Pin. 94. Rapunculus caliculatus Barr. Icon. 523. n. iij. Rapunculus sylvestris, umbellatus 2. Thal. Icon. viij. Icon. Barr. ex Thal. l. c.

88. Rapunculus spicatus, albus C. B. Pin. 92. Raii Hist. 743. Rapunculum alopecurum, flore albo, Italicum Barr. Icon. 892. la Raiponce. In Monte Pilato agri Lugdunensis aliisque Galliæ montibus provenit.

89. Rapun.

89. Rapunculus corniculatus, cæruleus, montanus, major, Italicus *Barr. Icon. 526*. Rapunculus corniculatus, cæruleus, minor *Barr. Icon. 525*. Rapuntium corniculatum, montanum *Col. part. 1. 224. Raii Hist. 744*. Rapunculus folio oblongo, spicâ orbiculari *C. B. Pin. 92. Icones Barr. ex Col. l. c. Ex Apenninis habuit Barr.*

90. Rapunculus Alpinus, corniculatus *C. B. Pin. 93. Prodr. 33. Trachelium minus, petraeum, Ponæ Barr. Icon. 889. Pon. Bald. Ital. 174. Clus. Hist. cccxxxvi. Icon. Barr. ex Pon. l. c.*

91. Rapunculus montanus, Gramineus, corniculatus, *Barr. Icon. 523. n. 1. Rapuntium angustifolium Col. part. 2. 26. Raii Hist. 745. Rapunculus folio Gramineo Inst. R. Herb. 113. Icon. Barr. ex Col. l. c. In monte Divæ Virginis apud Hirpinos in Regno Neapolitano observavit Barr.*

92. Rapunculus Creticus seu Pyramidalis altera *C. B. Pin. 93. Raii Hist. 737. Petromarula, Rapunculum Creticum Imperati, Valerianæ foliis Barr. Icon. 1154. & Imper. 668. Icon. Barr. ex Imp. l. c.*

93. Rubia Cretica, incana, Buxi folio, seu rotundifolia, incana *Barr. Icon. 519. Tota planta Rubiam sativam refert, sed tota albicat; folia ejus Buxo similia, supernè ex albo virentia, infernè incana, firma, rigida, plana, glabra, quina aut sena circum caulem adnascentia. Caules quadrati & geniculati. Flores fructusque non vidit: sicca enim planta è Promontorio vulgò Cap de Spada Insulæ Candia ad Barrelierum missa.*



94. Aparine minima, flore albo *Barr. Icon. 58. Radice pollet unicâ subtor-tuosâ, tres uncias longâ, mediocri, obsoletè rubente, raris fibris capillatâ, è cujus capite plures humi spargit cauliculos supinos, ramosos, exiles, infirmos, quadrangulos, geniculatos, striatos, asperos, qualis est tota planta, sex foliis verticillatim nascentibus per intervalla vestitos, brevibus, angustis & asperis. Ramorum extrema floribus comantur albis, exiguis, quadrifidis, & quandoque quinquefidis, quibus succedunt Lapposâ semina aspera, hirsuta, grisea, & gemina. Annua est planta cujus fere magnitudinem habes in figurâ. Crescit in arvis locisque incultis, circum Villam Sancti Pastoris supra Gallicani oppidum in Latio.*

95. Aparine villosa. Gallium villosum *Barr. Icon. 81. Gallium villosum, erectum. Boec. Mus. part. 2. 110. Tab. 86. Folia fert Molluginis, minora & breviora, Gallio vulgari albo latiora, mollia, villosa, cineracei coloris, stellatim & densè circa cauliculos disposita; cauliculi pariter lanuginosi & canescentes desinunt in densam spicatamque paniculam florum pallidorum, & ita cum foliis intermixtorum ut panicula cinerea potiusquam pallida videatur. Perennis est planta. Occurrit juxta fontem Lentisci in Valle quâ Valentiâ ad Carthusiam Portæ cœli iter est. Eandem aut saltem congenerem observabat Barr. in viâ quæ Barcinonæ ducit Girundam vulgò Gironnes, in Catalauniâ.*

96. Aparine supina, pumila, flore cæruleo *Inst. R. Herb. 114. Asperula flore carneo, acuto folio Barr. Icon. 541. n. 1. Rubia parva, flore cæruleo, se spargens I. B. 3. 719. Raii Hist. 483. Asperula cærulea, supina, latifolia Barr. Icon. 766. Ludit hæc planta foliis modo latioribus, modo strictioribus. Latiore folio gaudentem reperiebat apud Gabios juxta Gallicanum in vineis.*



97. Gallium arvense, flore cæruleo *Inst. R. Herb. 115. Asperula erecta, cærulea, incana, angustifolia Barr. Icon. 765. Rubia cærulea, erectior, elatiorve I. B. 3. 719. Raii Hist. 483.*

98. Gallium album, minimum, *αυανόσπερον Barr. Icon. 57. Exilis & humilis planta vix palmo altior, supina, ramosa, cujus radix tenuis, brevis, subrubens, fusca & annua; caules glabri, geniculati, foliis octo circiter angustissimis,*

B ij capillaribus,

capillaribus, femunciâ vix longioribus coronati, per intervalla ramosi, quorum extrema effusam in umbellam desinunt florum brevissimis & capillaribus pediculis insidentium, exiguum, alborum, quadriflorum, quibus succedunt semina gemina, scabra, nigricantia & exigua.

99. *Gallium album Linifolium*. *Rubia lævis*, *Linifolia*, floribus albis *Barr. Icon. 354*. *Rubia lævis*, *Linifolia*, floribus albis *Montis Virginis Bocc. Musf. part. 2. 83. Tab. 75*. *Rubia lævis*, *Linifolia* *Montis Virginis Barr. Icon. 583*. Tota planta glabra est, lævis, erecta. Folia sunt Lini sed longiora & nonnihil angustiora, glabra, lætè virentia, septem aut octo adnata circa caulem quadratum, pedalem & bipedalem, teretem, geniculatum. Cauliculi in ramos plurimos in summo dividuntur, plurimis onustos floribus candidis quibus succedunt semina gemina. Radix serpens, geniculata, luteola, tenuior quàm *Rubia vulgaris*. In saltibus nemoribusque *Montis Virginis Regni Neapolitani*, medio in monte nascentem vidit, quod florebat in horto *Conventus Divi Francisci de Observantiâ Tarvisii urbis ditionis Venetæ*. Nos in monte *Ventoso prope Avenionem Augusto mense florentem invenimus*: Ibique folia nonnihil angustiora sunt quàm in *Icone Barr.*



100. *Cruciata major*, villosa, flore *Molluginis albo Barr. Icon. 324*. *Cruciata* floribus paniculatim nascentibus *Inst. R. Herb. 115*. *Rubia* semine duplici, hispido, latis & hirsutis foliis *Bocc. Rar. Plant. 10*. In *Monte Pilato agri Lugdunensis*, *Julio mense florentem collegimus*.

101. *Cruciata minor*, glabra, flore *Molluginis albo Barr. Icon. 323*. *Rubia quadrifolia*, semine duplici hispido *I. B. 3. 718*. *Cruciata Lusitanica*, latifolia, glabra, flore albo *Inst. R. Herb. 115*. In *sylvâ Montelli observavit Barr.*

102. *Cruciata palustris*, alba *Inst. R. Herb. 115*. *Gallium aquaticum*, flore albo *Barr. Icon. 82*. *Gallium palustre*, album *C. B. Pin. 335. Raii Hist. 481*. Ludit foliis quinis aut senis, unde *Galliorum* familiæ potest adscribi.

103. *Cruciata marina*, villosa, minor, duriuscula *Barr. Icon. 542*. Ex radice rubescente, tenui & tenuissimis fibris secundum longitudinem capillatâ sex aut octo exeunt furculi tenues, villosi, quadrati, quatuor aut quinque ad summum uncias longi, crebris per singula internodia foliis quaterno numero decussatim vestiti. Folia vix quartam unciae partem longa, lineâ latiora, rigidiuscula, è viridi albicantia, hispida, oris secundum longitudinem nonnihil pronè convolutis & reflexis. Tota planta vix *Icone major* densis villis albescebat prorsus, necdum floruerat. In *littore Ostiensi* occurrebat *Barr.*

104. *Cruciata Alpina*, latifolia, lævis *Inst. R. Herb. 115*. *Rubia minor*, quadrifolia, atrovirens *Barr. Icon. 547*. *Rubia major*, quadrifolia, atrovirens *Bocc. Musf. part. 2. 83. Tab. 75*. *Rubia quadrifolia*, Italica, hirsuta *I. B. 3. 717*. Siccam plantam accepit *Barr.* Boccone *Iconem* suam à *Barreliero* mutuatus est, ramumque tantum *Rubia sylvestris Monspesulanæ, majoris I. B.* addidit.

105. *Cruciata muralis*, minima, montana *Col. part. 1. 297*. *Asperula obtusifolia Barr. Icon. 541. n. 11*. *Rubia quadrifolia*, verticillato semine *I. B. 3. 719*. *Valantia quadrifolia*, verticillata *Att. Acad. Reg. Paris. ann. 1706. 86*. Circa *Massiliam & Monspelim* crescit.



106. *Quamoclit* foliis tenuiter incisfis & pennatis *Inst. R. Herb. 116*. *Convolvulus pinnato folio*, muriceo Gelsemini flore *Barr. Icon. 60*. *Convolvulus pennatus exoticus*, *Quamoclit Col. part. 1. lxxij*. *Quamoclit* sive *Jasminum Americanum Clus. Cur. Poster. fol. 5. Raii hist. 730*. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.*



107. *Hyoscyamus Creticus*, sulfureo flore, medio atropurpureo *Barr. Icon. 248*.

248. *Hyoscyamus major*, albo similis, umbilico floris atropurpureo *Cor. Inst. R. Herb. 5. la Jusquiamé de Candie*. Circa Monspelium crescit. Vires vid. in *Hist. Raii 711.*

108. *Hyoscyamus Indicus*, Solani folio, flore atropurpureo *Corvini Barr. Icon. 247.* *Hyoscyamus Ægyptius*, Betæ folio, flore luteo, intus atropurpureo *Lippi*. Ex Indiâ delatum fuisse dicebat *Corvinus*, pictumque communicabat *Barreliero*. Ab aliquot annis in Horto Regio colimus, semine à D. *Lippi Medico* ex Ægypto ad nos missò. Sicque descripsérat *Lippi*. Caules ex radice longâ, albidâ, & fibrosâ promit bipedales, plurimos, parvi digiti cassitie, densos, succulentos, erectos, quibus adnascuntur folia alterna pediculo satis longo donata, Tabaci vel Betæ foliis satis similia, succulenta pariter, leviter crenata, uncias duas longa, vix fescunciâ latiora. Summis cauliculis flores enascuntur monopetali, anomali, extus virescentes, intus atropurpurei, lineis flavescensibus virgati & calyce inclusi, ut alii *Hyoscyami*. Calycem sustinent folia alterna pariter sed minora, breviorique nixa pediculo. In Ægypto cum iret ab oppido *Rossète* ad Cairum, collegit *Lippi*.



109. *Stramonium longioribus aculeis Barr. Icon. 1172.* *Stramonium ferox Bocc. Rar. Plant. 50. Raii Hist. 748.* Vires *Stramonii* vide in *Hist. Raii l. c.*



110. *Centaurium minus*, Vulgare, flore albo, latifolium *Barr. Icon. 424.* *Centaurium minus*, flore albo *C. B. Pin. 278. I. B. 3. 353. Raii Hist. 1092.* *La Petite Centaurée à fleur blanche.* Vires vide in *Hist. Raii 1093.*

111. *Centaurium minus*, angusto prælongoque folio, flore rubello *Barr. Icon. 435.* *Centaurium minus*, *Linariæ* folio longiori *Inst. R. Herb. 122.*

112. *Centaurium minus*, leptophyllum, polyanthes, accenso acutoque flore *Barr. Icon. 436. Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 43.* *Centaurium minus*, *Linariæ* folio breviori *Inst. R. Herb. 122.*

113. *Centaurium minus*, purpureum, angustifolium *Barr. Icon. 423.* *Centaurium minus*, *Linariæ* folio brevissimo *Inst. R. Herb. 122.* A vulgari differt foliis & floribus. Folia enim huic longa, angustiora & Liniformia, juxta radicem humifusa, vix dodrantem uncia longa, lineam lata, in extremo acuta, in caule bina, opposita decussatim, raraque per intervalla adnascencia, arrectaque. Cauliculi quinque vel sex, recti, teretes, quadranguli & semipedales. Flores quàm in vulgari triplo majores sunt & fere dodrantem uncia diametro suo æquantes. Sapor idem ac in vulgari.

114. *Centaurium minus*, ramosum *Barr. Icon. 1242.* *Centaurium minus*, spicatum, flore rubro *H. R. Par.* Pictum communicabat *Barreliero* *Eques Corvinus*.

115. *Centaurium luteum*, perfoliatum *C. B. Pin. 278. Raii Hist. 1093.* *Centaurium minus*, perfoliatum, luteum, umbellatum *Barr. Icon. 515. n. 1.* *Centaurium minus*, perfoliatum, luteum crassioribus capitellis *Barr. Icon. 516. n. 11.* *Centaurium minus*, perfoliatum, luteum, non umbellatum, rarioribus & crassioribus floribus capitellis *Barr. Icon. 516. n. 111.* Has tres varietates in *Maritimis Portûs Ostiensis* observabat *Barr.*

116. *Centaurium minus*, luteum, latifolium, non perfoliatum *Barr. Icon. 468.* Brevis, lignosâ pallenteque è radice cauliculum emittit biuncialem aut triuncialem, angulosum, foliis vestitum per intervalla binis, latis, oblongis, acutis, cœsis, è cœruleo virentibus, ut in perfoliato sed longè minoribus, nec perfoliatis, etsi latiusculâ basi caulibus hæreant. Flores aurei, stellati, quinquefidi, calyce comprehensi viridi & quinquefido. Floribus succedunt capsulæ angulosæ, pulverulento semine refertæ. Juxta pontem *Salarium* in collibus aridis ad Orientem secundum *Tyberim* & *Albulam*, quâ confluunt, positus *Romæ* florens eruebat *Barr.*

117. Centaurium minus, luteum, angustifolium, non perfoliatum Barr. Icon. 467.

118. Centaurium minus, luteum, Alsinoides, Polonicum Barr. Icon. 1156.
n. 1. Eques Corvinus communicavit Barreliero.



119. Plantago trinervia, latifolia, minor, incana, Hispanica Barr. Icon. 745. *Plantain d'Espagne*. Radice est crassiusculâ, longâ, raris fibris capillatâ, è quâ erumpunt multa folia incana, lanuginosa, argentea, trinervia, fescunciam longa, unciâ vix latiora. Spicæ parvæ & Plantagineæ. Tota planta vix Icone major, tota incana tenuique pubens lanugine. Hispaniæ est indigena.

120. Plantago major, spicâ foliosâ, Italica Barr. Icon. 746. Plantago Rofea Lob. Adv. 128. I. B. 3. 503. Ex agro Urbevetano ad Barrelierum missa.

121. Plantago angustifolia, lanuginosa, incana Barr. Icon. 750. Plantago villosa seu incana, lanuginosa C. B. Pin. 189. Plantaginis angustifoliæ, trinervia vulgari planè similis est, villis, lanugine & magnitudine solum discrepat. Prima enim hujus folia humifusa, crispa, contorta, latiora & breviora, albâque & longâ lanugine villosa, incana, & ita obducta ut nervi non appareant; quæ tamen lanugo in aliis è medio surgentibus foliis sensim rarior fit, foliaque angustiora, longiora, paulò virentiora, & glabriora seu minus villosa fiunt. Spica uncialis palmari nudoque adnata pediculo. Radix perennis, in varia capita divaricatur fibris albidis capillata. In pratis ad confluentes usque Tyberim & Albulam, protensis, juxta aquam Acetosam frequens post feniscea, Plantaginis vires vide in Hist. Raii 879.

122. Plantago angustifolia, serrata, Hispanica Barr. Icon. 749. Plantago angustifolia, serrata, Hispalensis C. B. Pin. 189. E radice crassâ cervice in multas crassiores & longas fibras divisâ & capillatâ, folia edit multa, angusta, trinervia, per oras acutè serrata, virentia, glabra, ex quorum medio spicæ nudæ Plantagineæ surgunt. Occurrit in Montibus de la Sierra Morina, non procul ab oppido Almadevar Castiliæ novæ, & circa Cordubam. Barr. Circa Hispalim observavit Clusius Cur. Post. fol. 34.

123. Plantago Cretica, minima, tomentosa, caule adunco Cor. Inst. R. Herb. 5. Leontopodium legitimum Imperati Barr. Icon. 1225. Imper. 672. Holosteum seu Leontopodium Creticum C. B. Pin. 190. Prodr. 98. & Raii Hist. 881. Icon. Barr. ex Imper. l. c.



124. Rubeola maxima, incana, latifolia. Rubia minor, quadrifolia, incana Barr. Icon. 548. Pedalibus quandoque altius assurgit cauliculis quadratis, albidis, geniculatis, glabris, non nihil tamen scabris, qui foliis per singula genicula vestiuntur per oras leviter scabris, incanis, quaternis & quinis, quorum quæ inferiora, majora, longiora & acutiora; & quæ summis cauliculis hærent, minora & rotundiora, quina & sena; singula dura, coriacea & firma. Ex medio extremæ foliorum umbellæ flos surgit singulari pediculo nixus, oblongus, ad oras divisus, & rubeus. Ex Apenninis Aequicolorum eruta in horto suo Romæ alebat Barr.

125. Rubeola latiore folio Inst. R. Herb. 130. Rubia minor, spicata Barr. Icon. 520. Rubia spicata, latifolia, Imperati Barr. Icon. 549. Imp. 666. I. B. 3. 727. & Raii Hist. 485. Icon. Barr. bis repetita & desumpta ex Imp. l. c.

126. Rubeola angustiore folio Inst. R. Herb. 130. Rubia spicata, angustifolia Barr. Icon. 550. C. B. Pin. 334. Prodr. 145. Circa Monspelium frequens occurrit.

127. Rubeola maritima Inst. R. Herb. 130. Rubia marina, strigosior, flore rubello Barr. Icon. 355. Rubia maritima C. B. Pin. 334. Dod. Pempt. 357. & Raii Hist. 485. In maritimis Valentiaæ flore rubello reperiebat. Barr. Icon. tamen ex Dod. l. c.



118. *Trachelium azureum*, umbelliferum *Pon. Bald. Ital. 44.* *Valeriana cærulea*, *Urticæ folio Barr. Icon. 683.* *Cervicaria Valerianoides*, cærulea *C. B. Pin. 95.* Romæ locis humidis umbrosis, & muris fontium gaudet in Monte Cælio. Oritur quoque in Regni Valentini deserto vulgo *la Murtha* sex circiter ab urbe Valentia leucis, locis humidis, juxta pontem Monasterio Divi Hieronymi vicinum, ibique flore est quandoque candido.

129. *Trachelium umbelliferum*, violaceum, foliis laciniatis *Inst. R. Herb.*
130. *Valeriana cærulea*, altius incisa, *Urticæ folio Barr. Icon. 684.* *Valeriana Urticæ folio*, flore violaceo *Corn. 23.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



130. *Valeriana montana*, minor, integris foliis, Italica *Barr. Icon. 868* *Valeriana Alpina*, foliis integris, radice repente, inodora *Raii Hist. 389.* Radice est crassa, in alias minores divisâ & perenni, è quâ multa & supina emit tit folia unciali pediculo annexa, crassiuscula, rotunda, & Cochleariæ rotundifoliæ formâ, in medio concava, quæ summum attingunt paulò longiora, acutiora, per oras integra, trinervia. In hortum translata caulem emisit do drantalem, vixque pedalem, è cujus geniculo tria folia aliis inferioribus lon giora & angustiora adnascebantur. Caulis in summo trifidam latamque in um bellam desinebat, quam duo folia angusta, minoraque fulciebant. Flores erant purpurascens & *Valerianæ sylvestri* majori prorsus similes. Ex Apenninis Aprutii que Montibus in hortum secum Romæ transtulerat Barr.

131. *Valeriana Alpina*, Saxatilis, minor, flore albo *Barr. Icon. 742.* *Valeriana Alpina*, *Scrophulariæ folio C. B. Pin. 164. Prodr. 87. & Raii Hist. 390.* In summis Apenninorum jugis umbrosis crescit Barr.

132. *Valeriana bulbosa*, suaveolens, Italica, Imperati *Barr. Icon. 867.* *Imp. 659.* *Valeriana Cretica*, Fili pendulæ radice *Inst. R. Herb. 131.* *Valerianæ bulbeuse de Candie.* *Icon. Barr. ex Imp. l. c.*

133. *Valeriana tuberosa* Imperati seu Telephii radice *Barr. Icon. 825.* *Imp. 656. I. B. 3. 204. & Raii Hist. 390.* *Icon. Barr. ex Imp. l. c.*



134. *Valerianella Cornucopioides*, flore galeato *Mor. Umb. Valeriana minor*, *Cornucopioides*, rubra, Hispanica *Barr. Icon. 741. n. 11.* *Valeriana peregrina*, purpurea *C. B. Pin. 164. Prodr. 87. & Raii Hist. 394.*

135. *Valerianella Cornucopioides* flore albo. *Valeriana minor*, *Cornuco pioides*, alba, Indica *Barr. Icon. 741. n. 1.* Prioris varietas.



136. *Buglossum Sylvestre Barr. Icon. 326.* *La Buglose sauvage.*

137. *Buglossum Sylvestre*, angustifolium *Barr. Icon. 325.*

138. *Buglossum Sylvestre*, minus, flore azureo, radice perenni, Italicum *Barr. Icon. 333.* Ex Umbriæ montibus habuit. Hujus & superiorum descriptio nes non invenimus in scriptis Barr.

139. *Buglossum angustifolium*, semine echinato *Inst. R. Herb. 134.* *Echioi des minus*, globoso echinato & singulari semine *Barr. Icon. 1246.* *Cynoglos sum minus C. B. Pin. 257. I. B. 3. 600.*

140. *Buglossum minus*, angustifolium, flore violaceo, albo umbilico, Ita licum *Barr. Icon. 1207.* *Buglossum Creticum*, majus flore cæruleo purpurante *H. R. Par. Circa Romam crescit.*

141. *Buglossum scorpioides*, hirsutum, flore cæruleo, Italicum *Barr. Icon. 403. & Bocc. Mus. part. 2. 163. Tab. 130.*

142. *Buglossum angustis dentatis foliis Inst. R. Herb. 134.* *Anchusa angustis*

stis dentatis foliis, Hispanica *Barr. Icon. 578. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 77.*

143. Buglossum fruticosum, Rorismarini folio *Inst. R. Herb. 134.* Anchusa lignosior Monspeliensium, flore violaceo *Barr. Icon. 1168.* Anchusa angustifolia *C. B. Pin. 255. Raii Hist. 496.*

144. Buglossum luteum, annuum, minimum *Inst. R. Herb. 134.* Echium luteum, minimum, Hispanicum *Barr. Icon. 1254.* Anchusa lutea, minor *I. B. 3. 583. & Raii Hist. 497.* Monspeli circa Cellam novam & in sterilibus, *la colombiere*, provenit. Buglossi vires vide in *Hist. Raii 493.*



145. Echium lato Plantaginis folio, Italicum. Lycopsis lato Plantaginis folio, Italica *Barr. Icon. 1026.* *La Viperine à feuilles de Plantain*, Radice nititur crassâ, brachiata, longâ, albâ & leviter interdum inæqualiterque rubente; ex quâ multa prodeunt folia sex aut octo, unciali pediculo quandoque longiori adnata, Plantaginis instar venis distincta, molli lanugine leviter hispida; è quorum medio caulis assurgit durioribus pilis & punctis nigris hirsutus & variegatus, quem folia alterna cingunt, angustiora, pediculo destituta, ad basim latiora & veluti amplexicaulia, non tamen ex toto caulem cingentia, sensim minora angustioraque. Summus caulis in tres aut quatuor florum thyrsos dividitur ut in Echiiis. Florum autem gemmæ antequam explicentur, lætâ purpurâ rubent, explicatæ purpureo-violaceo colore tinguntur, striis ab oris ad fundum ductis è cæruleo cæsiis, albicantibus, saturè & dilutè violaceis eleganter variantur. Flos explicatus tubulus est unciam quandoque longus, & semuncialis diametri, ad oras quinque crenis inæqualibus constans: Ex ejus fundo quinque enascuntur stamina rubentia, sursum reflexa, incurva, suis apicibus infernè nigricantibus & supernè cæsiis onusta; in medio stylus uncialis dilute rubeus & albescens. Maio mense florebat in agro Romano. Pro diversâ foli naturâ folia magnitudine variant, ut plurimum duas uncias lata, & tres longa præter pediculum qui in humi stratis & primis foliis uncialis & fescuncialis est longitudinis: Superiora longè breviora mollique pubent lanugine.

146. Echium maritimum, Insularum Stœchadum, flore maximo *Inst. R. Herb. 136.* Lycopsis spatulæ folio, Hispanica *Barr. Icon. 1012.* Lycopsis spatulæ folio, Hispanica & Sicala *Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 78.* Hujus & sequentium descriptiones non invenio.

147. Echium Rorismarini folio *Inst. R. Herb. 136.* Lycopsis angustifolia, minor, Hispanica *Barr. Icon. 1011. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 78.*

148. Echium foliis angustis & villosis *Inst. R. herb. 136.* Anchusa angustis, villosis foliis, Hispanica *Barr. Icon. 577. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 78.*



149. Pulmonaria flore parvo, carneo, intus reflexo. Buglossum Sylvestre, minus, flore carneo, parvo, retuso *Barr. Icon. 1253.* Crassâ & Buglossi radice donatur è fulvo nigricante, intus albâ, ramosâ & glutinosi saporis. Ex eâ surculi multi sursum exeunt rotundi, hirsuti, ramosi & pedales, è medio foliorum humifusorum emergentes; quæ folia Buglossi referunt faciem & colorem, minora, nec digito longiora aut latiora, juxta exortum angusta, in extremo obtusè ut plurimum acuta, plana, integra, nec dentata, nec sinuosa aut crispantia, pilis tamen hispida; ubi in caulem assurgunt, sensim breviora, ad basim latiora, & amplexicaulia, nonnihil obtusiora & alterna: Adultiore caule & in ramos floresque abeunte marcescunt caduntque inferiora. Flores in thyrsos densiores congesti, è virenti, brevi & quinquesido calyce emergentes carnei, in quinque lobulos rotundos superius dividuntur, quorum loborum summa in se intusque colliguntur, reflectuntur & in globum contrahuntur. Tubulum
floris

floris seu umbilicum occupant quinque flamina crassiuscula albaque, totidem apicibus rotundis albisque onusta. Deciduo flore superest stylus albus & supereminet. Nondum semen maturuerat, cum occurrit. Sub Æquinoctium Vernum Romæ florebat viâ quæ à Basilicâ sanctæ Mariæ Majoris recta ducit ad Basilicam sanctæ Crucis in Hierusalem, inter arbores in fossarum aggeribus, nec ullibi usquam observata.



150. Lithospermum palustre, minus, flore cæruleo *Inst. R. Herb. 137*. Lycopis montana, cærulea, seu Buglossum minimum, montanum *Barr. Icon. 404*. Echium scorpioides, palustre *C. B. Pin. 254*. *Raii Hist. 504*. Variat hæc planta in aridis vix Icone altior, in humidis & paludosis cubitalis est.



151. Heliotropium medium, strigosius, Italicum *Barr. Icon. 219*. Heliotropium majus, Siculum, amplo flore odorato *Bocc. Rar. Plant. 90*. *L'herbe aux Verrues à grande fleur.*



152. Cynoglossum montanum, minus, angustifolium, purpureum *Barr. Icon. 334*.



153. Omphalodes Lusitanica, Lini folio *Inst. R. Herb. 140*. Linum album, Blattariæ flore, semine discofo *Barr. Icon. 1234*. Linum umbilicatum *Park. Theat. 1687*. & *Raii Hist. 496*.



154. Anagallis Hispanica, latifolia, maximo flore *Inst. R. Herb. 142*. Cruciatâ montana, minor, flore cæruleo *Barr. Icon. 584*. *Le Mouron d'Espagne à grandes fleurs*. Hanc vivis coloribus depictam communicavit Barreliero Eques Corvinus.



155. Veronica mas, surrecta, elatior, seu Lysimachia spicata, cærulea *Barr. Icon. 891*. Veronica spicata, longifolia *Inst. R. Herb. 143*. Lysimachia spicata, cærulea *C. B. Pin. 246*. *Raii Hist. 845*. *La Veronique mâle, droite.*

156. Veronica mas, recta, latifolia, spicâ cæruleâ *Barr. Icon. 682*. Veronica spicata, latifolia *C. B. Pin. 246*.

157. Veronica mas, recta, angustifolia, spicâ cæruleâ *Barr. Icon. 681*. Veronica spicata, angustifolia *C. B. Pin. 246*. Veronicæ vires vide in *Hist. J. Bauh. 3. 284*. & in *Hist. Raii 845*.



158. Blattaria flore albo Corvini *Barr. Icon. 1249*. Blattaria flore albo *I. B. 3. app. 874*. *L'herbe aux Mittes à fleur blanche*. Pictam communicabat Barreliero Eques Corvinus.



159. Lycopersicon fructu striato, duro *Inst. R. Herb. 150*. Malum Æthiopicum, fructu cristato, striato, duro, coccineo *Barr. Icon. 1108*. Mala Æthiopica *Dod. Pempt. 459*. *Ger. Emac. 347*. & *Raii Hist. 673*.



160. Alkekengi fructu parvo, verticillato *Inst. R. Herb. 151*. Solanum majus, vesicarium, Coralloides *Barr. Icon. 149*. Solanum somniferum, verticillatum

C

C. B.

C. B. Pin. 166. & Raii Hist. 682. Le Coqueret à petites bayes rangées comme par anneaux le long de la tige.

161. Alkekengi Indicum, majus Inst. R. herb. 151. Solanum vesicarium, annuum, erectum Barr. Icon. 151. Solanum sive Halicacabum Indicum I. B. 3. 609. & Raii Hist. 681. Le Coqueret des Indes.

162. Alkekengi Virginianum, fructu luteo Inst. R. Herb. 151. Solanum vesicarium, annuum, procumbens Barr. Icon. 152. Alkekengi sive Halicacabum Virginense Park. Theat. 463. & Raii Hist. 681. Le Coqueret de Virginie.

163. Alkekengi Indicum, minimum, fructu virescente & luteo Inst. R. Herb. 151. Solanum vesicarium, minimum, baccâ luteâ Barr. Icon. 1129. & Bocc. Mus. part. 2. 63. Tab. 51. Solanum vesicarium, Indicum, minimum H. L. Bat. Fructus hujus primum viridis, dum maturefcit subluteus, Alkekengi vires vide in Hist. Raii 681.



164. Melongena fructu oblongo, luteo Inst. R. Herb. 151. Melanzana seu Melongena fructu primum albo, dein flavo Barr. Icon. 1109. Solanum pomiferum, fructu oblongo, luteo C. B. Pin. 167. Raii Hist. 670. La Mayenne ou Melongene à fruit long.

165. Melongena fructu rotundo Inst. R. Herb. 151. Malum Æthiopicum, fructu luteo; An Mandragora Theophrasti Barr. Icon. 30. Solanum Pomiferum, fructu instar Mali rotundo C. B. Pin. 617. La Mayenne à fruit rond.



166. Pimpinella maxima, Canadensis, longius spicata Barr. Icon. 739. Pimpinella maxima, Canadensis Corn. 174. La Pimprenelle de Canada. Icon. ex Corn. l. c.

167. Pimpinella Agrimonoides, odorata Barr. Icon. 692. & H. R. Par. Pimpinella Agrimonoides Mor. H. R. Blef. Bocc. Rar. Plant. 58. La Pimprenelle à feuille d'Aigremoine.

168. Pimpinella spinosa seu Poterium quorumdam Barr. Icon. 631. Poterium quibusdam seu Pimpinella spinosa I. B. 1. part. 2. 409. Pimpinella spinosa, seu semper virens Mor. Umb. 57. La Pimprenelle épineuse. Pimpinellæ vires vide in Hist. Raii 401.



169. Arum Ægyptiacum, vulgatum, rotundâ minorique radice Barr. Icon. 667. Arum multiflorum, Ægyptium Col. part. 2. 1.

170. Arum Ægyptium, rotundâ crassâque radice Barr. Icon. 668. Colocassia Ægyptia, florida Vesling. Observ. 38.

171. Arum Ægyptium, longâ radice Barr. Icon. 669. Colocassia macroriza, idest longâ radice P. Alp. Exot. 230.

172. Arum Ægyptium, transversâ & repente radice Barr. Icon. 670. Culcas, Faba Ægyptia P. Alp. Ægypt. 102.

173. Arum minus, Nymphææ foliis, esculentum Sloan. Cat. Plant. Jam. 62. & Raii Hist. 3. 577. Taiaoba Ari species, Brassica Brasiliensium Barr. Icon. 1084. Taiaoba Brasiliensibus Pison. 95. Marcgr. 35. Choux Caraïbe du Tertre.

174. Arum minus, esculentum, Sagittariæ foliis è viridi-nigricantibus Sloan. Cat. Plant. Jam. 63. Raii Hist. 3. 577. Taiaoba altera Ari species, Brassica Brasiliensium Barr. Icon. 1085. Taiaoba 2. Pison 95. Marcgr. 36.

175. Arum caulescens, Cannæ Indicæ foliis Plum. 45. fig. lxj. Aninga Iba Brasiliensium, Ari facie Barr. Icon. 282. Aninga Iba Marcgr. 106. Aninga Pison. 103. Ex autoribus citatis Icones suas desumpsit Barr.

176. Arum palustre, Arundinacæ radice H. L. Bat. Dracunculus palustris, Polonicus Corvini Barr. Icon. 574. Dracunculus palustris Dod. Pempt. 331. Pi-
ctum

Ætium communicabat Eques Corvinus. Dodonæi figura accuratior eâ Barrelieri.

177. Arum Scorzonera folio *Inst. R. Herb. 160.* Arisarum angustifolium, majus *Barr. Icon. 284.* Arisarum angustifolium *I. B. 2. 787. Clus. Hist. lxxiiij & Raii Hist. 1211.* In sylvis umbrosis Italiæ crescit, flos sæpius atropurpureus. *Icon. Barr. ex Clus. & J. Bauh. l. c. Ari vires vide in Hist. Raii 1208.*



178. Dracunculus polyphyllus *C. B. Pin. 195. & Raii Hist. 1211.* Serpentaria digitata, vulgaris, fructu rubro *Barr. Icon. 147. La Serpentaire.* Vires vide in *Hist. Raii l. c. & apud. J. Bauh. tom. 2. 789.*



179. Serpentaria digitata, major, Indica, fructu pallido *Barr. Icon. 148.* Hiucca seu Mismaib *Hernand. 378. Icon. Barr. ex Hernandez Historiâ l. c.*



180. Arisarum serpentinum, rotundiore folio, radice globosâ, Italicum *Barr. Icon. 573.* Globosâ est radice seu olivari, verrucosâ, circularibus lineis fasciatâ, juxta verticem exiguis albisque fibris capillatâ, aliisque crassioribus & transversis quibus repit & sese propagat. Folia subrotunda sunt, Violæ figurâ, sed carnosiora, circulari sulco circum oras prætexta, atrovirentia, nervo medio obliquisque venis variè distincta & rugosa, inter quæ surgit palmaris pediculus colubrinis maculis variegatus, vaginam sustinens fescuncialem, parvum digitum crassam, è pallido & atropurpureo secundum longitudinem striatam, pictam & cucullatam, & quâ parte hiat pistillumque emittit, deorsum reflexam & obtusam. Pistillum seu Phallus luteus est non rectâ assurgens, sed cum inflexo deorsum cucullo deorsum inflexus, in summo sensim crassiusculus, in imo ad basim versus flosculis pallidis in orbem comosus, qui marcido phallo in uvam rubellam abeunt superioribus congenerem. Tota planta acris est, mordax & urens. Itinere Romano ad Centum cellas, vigesimo ab urbe Miliali, juxta hospitium quod trans arcem *Poli* ditionis Ducis Braciani, ponti lapideo adjacet, reperiebat *Barr.*

181. Arisarum latifolium, Colubrinum, repens *Barr. Icon. 1130.* Radice nititur grumosâ, inæquali & serpente, albo-sordidâ foris, intus albâ, ex cujus tuberibus folia duo aut tria erumpunt, oblonga, utrinque obtusa duplici sulco circum oras exarata, multis venis & nervis in medio distincta, in supernâ facie saturè, in infernâ lætiùs virentia, palmari pedalique donata pediculo junceo, lævi, rotundo, sub terrâ albo, infirmo & tortuoso, extra terram firmiori, erecto & usque ad medium, serpentum instar, maculato, in reliquâ parte ad foliorum usque insertionem viret. Florem nudus pariter ad cucullum usque variegatus sustinet cauliculus unâ aut alterâ uncia ad summum foliis altior. Vaginatus seu Cucullatus flos ab imâ sui parte ad summum usque ex albo & purpureo viridi secundum longitudinem est striatus, in summo tamen obsoletiori purpurâ discriminatur; parsque superior latiori hiatu diducta est, nec tam inflexa quàm in superiori. Pistillum seu Phallus unciam longus, atropurpureus, sensim usque ad extremum crassior & obtusior, foris incurvus & propendens, non adeò tamen inflexus ac superior. Ad pistilli medium excrescit uva ex confertis acinis rubris constans ut in cæteris. Novembri florebat in horto Barrelieri, & ex Apenninis Trisultique Montibus attulerat.

182. Arisarum latifolium, minus, repens, cespitosum *Barr. Icon. 1150.* Arisarum flore in tenuem caudam abeunte *Inst. R. Herb. 161.* Arisarum minus, proboscideum *Bocc. Mus. part. 2. 61. Tab. 50.* Radice est tenui, tuberosâ, longâ, tereti, albo-sordidâ, lineis transversis fasciatâ & annulatâ, flexuosâ, serpente, ad latera ramosâ & latè se propagante, fragili, vix pennâ anserinâ crassiore, tenuibus fibris depactâ; per singula nodorum germina (quæ frequentia satis)

folia edit tria aut quatuor ad summum, pediculo semipedali donata; infra terram albo, supra viridi, rotundo, succulento & tenui; lata, triangularia, acuta, amplo & longo sinu quâ pediculo hærent, bisulca, tenuia, lætè virentia, lævia, Violæ foliis vix paulò majora, nullo circum oras sulco exarata, mollia & facile marcentia. Sub foliis latet pusilla vagina digitum minimum vix crassa, semuncialis, ad basim rotunda, ex albo & atropurpureo striata, in summo atropurpurea, & deorsum inflexa, quæ in caudam tenuem aliquando uncias quatuor & amplius longam abit. Pistillus semunciam longus, quadrantem uncie latus deorsum nutat, fungosus, violaceus; hujus pistilli pars infima abit in uvam acinis rotundis, albis refertam, superioribus similem. Facies cuculli interior è colore violaceo & purpureo niter, exterior obsoletiore languescit, venis magis atris striata & sulcata. Folia lætè splendent & cum pediculo vix quinque unciis longiora. Sapor isti acerrimus. In Apenninis altioribus obvia.

183. Arisarum dulce, non lactescens, minus, Brasilianum *Barr. Icon. 283. Taiaoba 3. Marcgr. 36. Pison. 95.*

184. Arisarum majus, Caulescens, aquaticum, Brasilianum *Barr. Icon. 281. Aninga Iba Pison. 103. Arum arborescens, Sagittariæ foliis Plum. 44. fig. lx. Ex Pifone hæc ultimas deprompsit Icones Barr.*



185. Rapuntium maximum, coccineo, spicato flore *Col. in Rech. 880. Raii Hist. 746. Rapunculum coccineum, Americanum, vulgò Cardinalis planta Barr. Icon. 1147. La Cardinale couleur de feu.*



186. Bignonia Americana, Fraxini folio, flore amplo, phæniceo *Inst. R. Herb. 164. Gelseminum Clematites, flore igneo, amplo, seu Virginianum Barr. Icon. 59. Gelseminum hederaceum, Indicum Corn. 102. & Raii Hist. 1768. Le Jasmin de Virginie.*



187. Digitalis VerbasCIFolia, purpurea, minor, perennis, Hispanica *Barr. Icon. 1183. Digitalis Hispanica, purpurea, minor Inst. R. Herb. 165. Digitalis angusto VerbasCI folio, montana Bocc. Mus. part. 2. 107. Digitalis VerbasCIFolia Ejusd Tab. 85. La Digitale d'Espagne à petites fleurs rouges. Hæc in singulis suis partibus vulgari minor. Vires Digitalis vide in Hist. Raii 767.*



188. Scrophularia montana, maxima, latifolia, flore luteo *Barr. Icon. 273. Scrophularia flore luteo C. B. Pin. 236. Prodr. 112. & Raii Hist. 765. La Scrophulaire à fleur jaune.*

189. Scrophularia aquatica, montana, mollior *Barr. Icon. 274. Scrophularia Betonica folio Inst. R. Herb. 166. Scrophulariæ vires vide in Hist. Raii 765.*



190. Antirrhinum latifolium, pallido, amplo flore *Barr. Icon. 655. & Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab. 41. Varietas Antirrhini flore luteo. Le Musle de Veau à fleur pâle.*

191. Antirrhinum majus, angustifolium, amplo flore purpureo, Romanum *Barr. Icon. 638. Antirrhinum Hispanicum, altissimum, angustissimo folio Inst. R. Herb. 168. A vulgari distinguitur foliis multò angustioribus, vix sextantem uncie latis, quâ parte latiora sunt, idest in medio ad utrumque extremum acutis, duas uncias longis, per ramos plurimis, densis & alternis. Caulis in multos densosque dividitur ramos, quorum extrema in longam florum purpureorum spicam*

spicam desinunt. Floris color varius, modò albus, modò lacteus, purpureus, vel vinosus. In Italiâ agroque Romano observabat Barr. Turnefortius & D. Goiffon in Hispaniâ collegerunt.

192. Antirrhinum majus, saxatile, angustissimis foliis, flore purpurascente, minori Barr. Icon. 637. Folia huic tenuiora, strictiora & capillacea. Flos minor.

193. Antirrhinum minus, albo, amplo flore Barr. Icon. 656. Antirrhinum medium, flore albo, patulo V. Lusit. Ex radice annuâ, albâ, contortâ, divisâ, minore caulem edit pedalem quandoque cubitalem, unicum, rectum, ramosum, tenui lanugine pubescentem quâ radici jungitur; ut enim altius assurgit, totus glaber est, nitidè lætèque virens, alternis, angustis & duas tresve uncias longis foliis vix sextantem uncia latis, quandoque latioribus nonnihil & longioribus vestitus. E foliorum alis secundum caulem & in extremis ramis flores oriuntur longo pediculo donati, nivei, rictu lineis purpureis striato cui aureus hæret pulvis; minores quàm in præcedentibus, & majores quàm in sequentibus. Floribus succedunt fructus Calvariam Vitulinam referentes semineque prægnantes tenui. Sapor toti plantæ acerbus & nonnihil astringens. Sub Arcem Vaticanam ad Septentrionem in pratis & alibi in agro Romano occurrit.

194. Antirrhinum minus, flore carneo, elatius Barr. Icon. 652. Antirrhinum arvense, majus C. B. Pin. 212. & Raii Hist. 760. In Vineis Romanis colligebat Barr. frequens etiam in Vineis Galliæ.

195. Antirrhinum minus, flore carneo Barr. Icon. 651. Varietas prioris.

196. Antirrhinum saxatile, Serpilli folio glabro, flore purpurascente. Orontium Saxatile, Serpilli folio glabro, flore purpurascente Barr. Icon. 1100. Hujus & sequentium descriptiones non invenio.

197. Antirrhinum saxatile, Serpilli folio angustiore, villoso & unctuosio. Orontium saxatile, Serpilli folio angustiore, villoso & unctuosio Barr. Icon. 1101.

198. Antirrhinum saxatile, Thymi folio, flore rubello. Orontium saxatile, Thymi folio, flore rubello, Barr. Icon. 1313.

199. Antirrhinum saxatile, villosum, folio Origani glutinoso Barr. Icon. 598.

200. Antirrhinum minus, villosum, angustifolium, purpureum. Orontium minus, villosum, angustifolium, flore purpurascente Barr. Icon. 758. Annua & exilis planta palmo non major, caule recto, ramoso, folioso; foliis angustis, uncia non majoribus, villosis, ad singulos ramulorum nodos binis & ternis. Cuilibet ramulo insidet flos purpureus uncialis tenui fultus pediculo. Flori succedit fructus Antirrhinis superioribus rotundior & est rostri minus prominentis. In Vineis Pontis Milvii & juxta Tyberim Junio & Augusto floret.



201. Linaria purpuro-violacea, major, non repens, Italica Barr. Icon. 1021. Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin. 213. & Raii Hist. 756. La Linairé odorante à fleur couleur de pourpre.

202. Linaria annua, purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus Bot. Monsp. Chamælinaria violacea, Italica Barr. Icon. 1162. Linaria cærulea, calcaribus longis I. B. 3. 461. In agro Romano sparsim occurrit Barr.

203. Linaria Hispanica, Nummulariæ folio villoso Inst. R. Herb. 169. Antirrhinum saxatile, minus, Origani folio viscoso & villoso, flore albo amplo Barr. Icon. 597.

204. Linaria saxatilis, Alsines folio villoso Inst. R. Herb. 169. Orontium saxatile, Alsines folio, unctuosio & villoso, flore albo Barr. Icon. 1102.

205. Linaria saxatilis, Polygoni folio villoso Inst. R. Herb. 159. Orontium saxatile, angusto Alsines folio villoso & unctuosio, flore albo Barr. Icon. 113. Linariæ vires vide in Hist. Raii 754.



206. Pedicularis Chamædryos folio. Trixago Chamædryos foliis Barr. Icon. 774. n. 1. *Pédiculaire à feuille du petit Chesne.*

207. Pedicularis maritima, folio oblongo, ferrato *Inst. R. Herb. 172.* Trixago altiùs ferratis foliis Barr. Icon. 774. n. 11. Antirrhinum album, ferratis foliis I. B. 3. 437. *Raii Hist. 770.*

208. Pedicularis versicolor, spicata *Inst. R. Herb. 172.* Aleætorophos Italica, versicolor, spicata Barr. Icon. 666. Ex radice annuâ, lignosâ, rufescente & in varias fibras divisâ caulis surgit unicus, rectus firmusque & quadratus, pedalis & sesquipedalis, foliis vestitus binis & oppositis ex adverso, alternoque situ cruciatim & uncix intervallo à se invicem sejunctis, nullo pediculo nixis, ad basim latioribus, & amplexicaulibus, oblongis, angustis, obtusè & altiùs ferratis, rugosis, sulcatis, quorum crenæ inæquales, & incurvæ. E caulis vertice & è foliorum alis flores eminent spicæ in modum denso & alterno situ congesti, pro plantæ mole magni, personati, in duo labia hiantes; quorum labium superius in duos lobos divisum, inferius in tres lacinias incisum est, mediâ laciinâ lateralibus minore. Versicolores ut plurimum sunt isti flores, labiis scilicet inferioribus albis aut luteis, galeâ vero rubellâ, interdum pallidè aut è pallido albentes, modo candidi. Stylum oblongum deorsum inflexum concomitantur quatuor stamina trientem uncix longa, suis armata apicibus flori concoloribus & albicantibus. Floribus succedunt pericarpia oblonga, globosa, è lateribus compressa, acuminata foliisque duobus cristatis sulcatis, & inæqualibus obvoluta, & tenui semine referta flavicante. Tota planta tenui canescit lanugine & nonnihil est viscosa & suaveolens. Sapore est amaro & acri. Maio & Junio mensibus floret in incultis locis circa Romam. Flores separati in Icone Barr. inversi sunt.

209. Pedicularis lutea, viscosa, ferrata, pratensis *Inst. R. Herb. 172.* Aleætorolophos Italica, luteo-pallida Barr. Icon. 665. Euphrasia lutea, latifolia, palustris *Raii Hist. 772. & Synops. 162.* A superiori distinguitur floribus & caule huic quandoque ramoso. Tota planta viscidior, magis glutinosa & acriuscula. In agro Romano circa Pontem Salarium sub finem Junii florere cœperat. Barr. Nos in Normanniâ circa urbem *Saint-Lô*, & in Britannîâ Armoricâ Septembri in pratis paludosis & humentibus invenimus.

210. Pedicularis Alpina, Asphodeli radice, flore albo. Aleætorolophos montana, flore albo Barr. Icon. 469. Aleætorolophos montana, flore albo, luteo *Bocc. Mus. part. 1. Tab. viij n. 2.* Filipendula montana, flore Pediculariæ C. B. *Pin. 163. Raii Hist. 771.* In Editoribus Moroni montibus Junio florebat, flores modò purpurei, modò albi.

211. Pedicularis serotina, purpurascente flore *Inst. R. Herb. 172.* Euphrasia sylvestris, major, purpurea Barr. Icon. 276. n. 11. & Col. part. 1. 202. Euphrasia pratensis, rubra C. B. *Pin. 234. & Raii Hist. 772.* Icon Barr. ex Col. l. c.

212. Pedicularis purpurea, annua, minima, verna *Inst. R. Herb. 172.* Euphrasia vulgaris, latifolia, atropurpurea Barr. Icon. 276. n. 111. Euphrasia purpurea, minor. C. B. *Pin. 234. Prodr. 111. Bot. Monsp. & Raii Hist. 774.*

213. Pedicularis alba, annua, minima, verna *Inst. R. Herb. 172.* Euphrasia vulgaris, vera, flore albo Barr. Icon. 276. n. 1. Superioris varietas.

214. Pedicularis minima, polyclonos, humifusa. Euphrasia rotundifolia, forte Alsine, an Anthylloides rotundifolium? Barr. Icon. 275. Anthylloides rotundifolia, sicula, Euphrasiæ floribus rubentibus *Bocc. Mus. part. 2. 34. Tab. 24.* Nec hujus nec sequentis descriptionem invenio.

215. Pedicularis Hispanica, vermiculato folio. Euphrasia vermiculato folio, Hispanica Barr. Icon. 1204. & *Bocc. Mus. part. 2. 76. Tab. 63.*



216. *Melampyrum luteum*, comâ cæruleâ, Bauhini *Barr. Icon. 769. n. 1.* *Melampyrum cæruleâ* comâ *C. B. Pin. 234. & Raii Hist. 775.* Circa Gratianopolim provenit, in Sylvulâ juxta Eremum Sancti Augustini, & eundo ad *Sapet*, viâ quæ ducit ad Majorem Carthusiam.

217. *Melampyrum luteum*, comâ albâ Bauhini *Barr. Icon. 769. n. 2.* *Melampyrum comâ albâ C. B. Pin. 234.* *Melampyro affinis*, *Parietaria cærulea* quorundam, comâ penitus candidâ, *I. B. 3. 440.* Prioris varietas.

218. *Melampyrum minus*, purpureum, *Trixaginis folio Barr. Icon. 1045. & Bocc. Mus. part. 2. 63. Tab. 51.* Descriptum non invenio.



219. *Ageratum minus*, saxatile, flore albo *Barr. Icon. 1192.* *Ageratum ferratum*, *Alpinum*, glabrum, flore albo *Inst. R. Herb. app. 651.* Varietas *Agerati purpurei* *Lugd. 1184.*



220. *Anblatum* flore è rufo candicante, sive *Anblatum Cordi Cor. Inst. R. Herb. 48.* *Dentaria major*, ἀφύλλος *Orobanches facie Barr. Icon. 80.* *Orobanche radice dentatâ*, major *C. B. Pin. 88. & Raii Hist. 1229. Cord. Hist. 89.*



221. *Phlomis fruticosa*, *Salviæ folio Inst. R. Herb. 177.* *Stachys fruticans*, vulgaris, flore aureo, seu *Verbascum Salvifolium*, fruticosum, flore luteo. *Lobellii Barr. Icon. 406.* *Verbascum latis salviæ foliis C. B. Pin. 240. & Raii Hist. 511.*

222. *Phlomis fruticosa*, *Lusitanica*, flore purpurascente, foliis acutioribus *Inst. R. Herb. 178.* *Stachys fruticosa*, repens, purpureo flore *Barr. Icon. 405.* A superiori discrepat radice tenuiori, repente, lateque se furculis propagante; furculis magis contortis, sparsis, humilioribus, mollioribus & flexilioribus; foliis rugosioribus, strigosioribus, magis asperis, ex basi latiori in acumen tenuius desinentibus, supernè virentibus, infernè canescentibus: floribus porrò minoribus, purpureis, & paucioribus numero. Junio Julioque mensibus florebat in Regni Valentini deserto Murrhenfi.

223. *Phlomis fruticosa*, candidissima, flore ferrugineo *Inst. R. Herb. 178.* *Stachys fruticans*, latifolia, tomentosa, flore ferrugineo *Barr. Icon. 1322.* Fruticat hæc duorum cubitorum & amplius altitudine, lignosis virgultis. Caules ejus quadrati, denso tomento hispidi, & nivei, ut & folia quæ ad singulos nodos bina ex adverso opposita & decussatim ordinata, triplo majora quàm in superiori, *Betonicæ* vel potius *Stachydis latifoliæ* formâ, è rotundâ sinuosâque circa pediculum quo cauli adhærent, basi, in longum acumen obtusum se explicantia, tres quandoque uncias lata, & quatuor longa, sed adeò crassâ densoque tomento farta rectaque, ut panni lacinias lævissimas mollissimasque potius diceres quàm folia. Floris magnitudinem naturalem habes in Icone expressam; color ejus est è luteo gilvus seu ferrugineus & obsoletus. Pictor pediculum filiorum longiorem facit, brevi enim hærent folia pediculo. In Regni Valentini fruticosis saltibus ad radices Montium viâ quæ *Aiorâ* *Setabitam* ducit, Maio florebat.

224. *Phlomis Lychnitis Clus. Hist. xxvij.* *Stachys prælongo angustoque folio*, flore luteo; *Phlomis Lychnitis Clusii Barr. Icon. 1321.* *Verbascum angusto Salviæ folio C. B. Pin. 240. & Raii Hist. 511.*



225. *Horminum sylvestre*, hirsutum, *Lampfanæ folio*, flore cæcio *Barr. Icon.*

Icon. 199. Horminum sylvestre, latifolium, verticillatum *C. B. Pin. 238. Raii Hist. 546. L'Hormin.*

226. Horminum Creticum, comâ purpuro-violaceâ *Barr. Icon. 1233.* Horminum comâ purpuro-violaceâ *I. B. 3. 309.* Flores in Icone Barrelieri majores sunt quàm solent, unde pro exoticâ plantâ habuit.

227. Horminum minus, subrotundo, scabro folio *Barr. Icon. 207* Radix illi tortuosa, crassâ nonnihil, fissaque & in alias tenuiores divisa. Folia ima atrovirent, subrotunda, rugosa, per oras crenata hispidaque sunt, in supremo caule longiora. Summis è caulibus quadrangulis parvos edit flores violaceos, & aliorum formâ. Sub finem Augusti florebat in agro Romano viâ Lauretanâ, secundùm rivulum quem vulgò *Aquam transversam* vocant, non procul à pratis per quæ in Tyberim mergitur, & alibi passim in glareosis locis provenit.

228. Horminum sylvestre, minus, inciso folio, flore azureo *Barr. Icon. 208.* Horminum sylvestre, lavandulæ flore *C. B. Pin. 239. & Raii Hist. 545.* Folia huic humi decumbentia, rugosa, atrovirentia, longa & per oras sinuosa ac crenata. Flores cœrulei modò, modò cœruleo-violacei, nunc albi. Radix longa, nonnihil crassa, fusca & corticosa. Romæ in agrorum viarumque marginibus frequens.

229. Horminum sylvestre, inciso folio, cæsis flore, Italicum *Barr. Icon.*

220. Horminum Verbenæ laciniis, angustifolium *Triumf. 66.* Radice potitur longâ, crassâ, multiplici, nigrâ, corticosâ, scabrâ & lignosâ, quæ ex capite multa fundit humi folia parva, lætè virentia, sinuosa, dentata; quorum prima ferè integra & Salviæ formâ, alia verò altiùs incisa & sinuosa, longissima vix parvo digito longiora. Cauliculi quadrati & villosi desinunt in thyrsum florum brevem è tumidis, virentibus, striatis, per oras radiatis patentibusque conflatum, calycibus, è quibus flores prodeunt exigui, cæsi, quorum pars superna cœrulea est, inferna verò albida. In Icone habes ferè magnitudinem totius plantæ. Mense Aprili florebat solo glareoso & arenoso in Campaniâ Romanâ, Romæ pariter viâ ad tres fontes Divo Paulo sacros. Hieme (inquit *Triumf. l. c.*) faciem mutat; parvula enim & abortiva minores crassiores magisque hirsutos edit caules, æstate verò elatiores majoresque.

230. Horminum minus, Betonicæ folio, flore purpureo *Barr. Icon. 167.* Horminum minus, Betonicæ folio, flore purpureo Bauhini Prodr. *Bocc. Mus. part. 1. Tab. v. n. 13.* Multa fert. humifusa folia Betonicæ formâ & magnitudine, crenata, in extremo obtusa, longo hærentia pediculo, rugosa, glabra, è quorum medio duo aut tres sursum assurgunt cauliculi recti, quadrangulares, cruciatim binis & binis secundùm longitudinem distincti foliis & florum verticillis ex alis foliorum emergentibus, quorum ex calycibus enascuntur flores purpurei. *Horminum Betonicæ folio Bauh. Prodr.* flore est albo. Vid. Prodr. 115.

231. Horminum hæmatodes, minus, flore purpureo *Barr. Icon. 168.*

232. Horminum subrotundo folio, flore cæsis, Hispanicum *Barr. Icon. 200. & Bocc. Mus. part. 2. 30. Tab. 13.* Folia huic lata, subrotunda, rugosa, aspera hispidaque, in ambitu ferrata, nonnihil sinuosa circa pediculum; caules nonnihil villosi, quadranguli, cubito majores, in quorum extremis spica verticillata infidet. Flores cæsi sunt coloris seu ex albo cœrulei, quibus succedunt semina quatuor rotunda, contenta in fundo calycis rigidi, asperi, villosi, patente orâ, fundoque angusto & in quatuor acumina divisi. Tota planta suave olet. In Hispaniâ, Valentia apud Patres Ordinis FF. Prædicatorum observavit *Barr.* Hormini sclareæque vires vide in *Hist. Raii 543.*



233. Sclarea laciniatis foliis *Inst. R. Herb. 179.* Æthiopis laciniatis, foliis *Barr. Icon. 188.* Ab Æthiopide *Dod. Pempt. 148.* & Æthiopide laciniato folio *C. B. Prodr. 115.* differt foliis amplioribus, profundius incisis & sinuosis, semen habuit ex horto Reg. Blæf.

234. *Sclarea Asphodeli radice* *Inst. R. Herb. 179.* Horminum Sylvestre majus, hæmatodes, glabrum, flore cæruleo, Italicum *Barr. Icon. 185.* Radicem habet crassam, tortuosam, lignosam, longam & divaricatam; folia palmi dodrantem longa, circa basim & pediculum quatuor aut quinque uncias lata, glabra, rugosa, sed lato virore nitentia, sanguineis tamen maculis nullâ lege aut ordine sparsim cruentata, in caule sensim minora & angustiora, per oras leviter dentata, in extremo acuta; flores magni cærulei. In colle arenoso quâ itur à Basilicâ Divi Pauli ad tres fontes, in descensu, meridiem versus invenit Barr.

235. *Sclarea Syriaca*, flore albo *Inst. R. Herb. 179.* Horminum sylvestre, majus, flore albo, integris foliis *Barr. Icon. 187.*

236. *Sclarea maxima*, Bœtica, annua, floribus dilutè cæruleis *Inst. R. Herb. 179.* Horminum sylvestre, majus, hastato folio, flore cæcio, Hispanicum *Barr. Icon. 186.* Ex radice longâ, brachiata & corticosâ caules promit quadratos bicubitales & tricubitales, foliis vestitos palmum longis & amplioribus quandôque, juxta basim latis & sinuosis, angulosis auritisque, in longam & acutam cuspidem desinentibus, inæqualiter in ambitu ferratis & crispantibus, palmari juxta radicem articulatis pediculo, in caule breviori. Flores fert tres aut quatuor, modò plures, ex singulis spicæ verticillis enascentes, pediculo fultos, cæcios aut dilutè cæruleos, in duas partes scissos, quarum superior, longior & falcata, inferior verò trifida. Stylus pariter falcatus, staminibus geminis stipatus. Calyx striatus, villosus, acuminibus quinque dentatus. Semina ut in aliis. Inter urbem *Almagro* & *Almadovar* Oppidum Castiliæ novæ observavit Barr. cum è Castiliâ in Bœticam tenderet.

237. *Sclarea folio lanceolato*, Hispanica. Horminum Hispanicum, foliis *Herbæ venti*, flore cæruleo *Barr. Icon. 1317.* Folia fert semipalmum longa, & ampliora, duas uncias lata, quandôque angustiora in caule scilicet, *Herbæ venti* Lobelii foliorum formâ, scabra, aspera, hispida, per oras serrata, lanceolata & unciali nixa pediculo. Caules quadranguli, floribus ornati verticillatim nascentibus, cæruleis, quorum magnitudinem & formam habes in Icone expressam. Radix longa & lignosa. Tota planta Horminum olet, nec ingratum spirat odorem. In Regno Valentino septem leucis ab urbe Valentia, ad Austrum in loco mari vicino, quem vulgò *la Murtha* vocant, locis aridis & desertis occurrit Barr.



238. *Dracocephalon Americanum* *Breyn. Prodr. 1. 34.* *Lyfimachia gale-riculata*, spicata, purpurea, Canadensis *Barr. Icon. 1152.* *Pseudodigitalis* foliis dentatis, Persicæfoliis. *Bocc. Rar. Plant. 11. Raii Hist. 769.*



239. *Brunella latifolia*, Italica, flore carneò *Barr. Icon. 562.* *La Brunelle d'Italie à fleur couleur de chair.* Ex multis, tenuibus & filamentosis radicibus folia oriuntur plurima, in orbem humifusa, latifolia, oblonga, obtusè turbinata, ad basim latiora & circa pediculum sinuosa, glabra, lævia & obscuro virore nitentia, inter quæ erumpunt supini & repandi subindè cauliculi alias etiam fibrosas radices juxta genicula humi agentes, binis ex adverso vestiti foliis, & in ramos divisi, è foliorum alis exeuntes, quorum summa desinunt in capitula spicata, quàm in vulgari Brunellâ nonnihil breviora, sed satis similia. Flores dilutè sed latè è carneò rubent, è glutosis utriculis emergentes; subamari & astringentis saporis. Romæ juxta mœnia à Portâ Pincianâ ad Piani protensa umbrosis locis gaudet, & in viâ ad sublacum Oppidum, superatis montibus, sesqui milliari infrâ, ad nemoris oras obvia. Brunellæ vires vide in *Hist. Raii 552.*



240. Galeopsis purpurea, latifolia. Lamium purpureum, biflorum, Polonicum *Barr. Icon. 1220.*

241. Galeopsis angustifolia, flore variegato *Inst. R. Herb. 185.* Cannabis spuria, angustifolia, variegato flore, Polonica *Barr. Icon. 1158.* Utrumque Barreliero communicabat Eques Corvinus.

242. Galeopsis Hispanica, frutescens, Teucrii folio *Inst. R. Herb. 186.* Teucrium fruticans, amplo & albo flore, Italicum *Barr. Icon. 895.* Lamium fruticosum, non maculatum, Creticum *Zan. 112. Fig. xlvj Raii. Hist. 561.* In sepulchris antiquis, & in Hippodromi Romani ruinis viâ Appiâ, & ad ostia Tyberina reperitur, nec non circa Terracinam ad radices cujusdam Arcis antiquæ, ducentis ab urbe passibus.



243. Stachis alba, latifolia, major *Barr. Icon. 297.*

244. Stachis alba, latifolia, minor *Barr. Icon. 280.*

245. Stachis alba, angusto salviæ folio *Barr. Icon. 279.*

246. Stachis nigra *Barr. Icon. 298.* Hæc Stachides descriptas non invenio in scriptis Barrelieri.



247. Leonurus Canadensis, Origani folio *Inst. R. Herb. 187.* Origanum Canadense, fistuloso flore purpureo *Barr. Icon. 1221.* Origanum fistulosum, Canadense *Corn. 14. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



248. Pseudodictamnus actabulis Moluccæ *C. B. Pin. 222. Raii Hist. 558.* Dictamnus falsus, verticillatus, pericarpio choanoide, Creticus *Barr. Icon. 129.*

249. Pseudodictamnus Hispanicus, amplissimo folio candicante & villoso *Inst. R. Herb. 188.* Marrubium Hispanicum, rotundifolium, album, majus, seu latifolium *Barr. Icon. 767. & Bocc. Mus. part. 2. Tab. 123.* Marrubium subrotundo folio *Ejusd. Mus. part. 2. 167. Le faux Dictame d'Espagne à feuilles blanchâtres & velues.*

250. Pseudodictamnus Creticus, verticillatus, odoratus. Dictamnus Creticus, verticillatus, odoratus *Barr. Icon. 130.* Folia huic quàm in superioribus crassiora, tomentosa, nivei planè candoris, brevi adnata pediculo, bina ex adverso opposita, cordata, vix dodrantem uncia lata, nonnihil longiora, subrotunda, mollia, lævia, nullis venis aut nervis signata. Cauliculi incanâ lanugine pubescunt, quadrati, fragiles, ex quorum extremis verticillatæ exeunt denso ordine spicæ albentes, hispida, & lanugine adeò densâ tectæ, ut vix verticillorum divisio & utriculorum seu calycum numerus & situs dignoscantur, nisi propius ope microscopii inspiciantur. Calyces ut in Pseudodictamno per oras in quinque acumina radiati, denso bombyce hispidi, ex quibus flores emergunt labiati, albi, faucibus dilutè violaceis. Recens odoratus dicitur; Siccus tamen nihil sapit. E Cretâ Siccum ramulum accepit *Barr.*



251. Lycopus foliis in profundas lacinias divisus *Inst. R. Herb. 191.* Marrubium aquaticum, incanum, profundè incisis foliis *Barr. Icon. 154.*



252. Sideritis latifolia, repens, flore albo. Marrubium repens, flore albo, exoticum

exoticum *Barr. Icon. 768.* Fibrosâ è radice humi statim fundit folia, spargitque in gyrum varios ramos quadrangulos, hirsutos, in alios ramulos divisos, binos ex adverso è foliorum alis enascentes. Folia erumpunt per ramos opposita, Melissæ satis similia, sed minora & breviora, nonnihil obtusâ, obtusèque per oras crenata, propè pediculum sinuosa, quinque ut plurimum nervis, seu sulcis exarata, rugosa & scabra, pediculo nixa in imis foliis biunciali, in editioribus sensim breviora. Flores albi sunt in rictum hiantes labiatum, quorum superius labium bifidum est, contortum & retrò sursumque reflexum, à latere singularibus lineis purpureis brevibusque pictum; inferius verò integrum, planum & sursum nonnihil antrorsumque incurvum est, ac pallefcit. Fauces interiores atro purpureis maculis sunt variegatæ. E rictu florum quatuor stamina exeunt purpurea suis atro-purpureis onusta apicibus. Flores ut in vulgari Sideritidi spicatum & verticillatum ex foliorum alis nascuntur. Semen illi parvum, rotundum & nigrum. Vivam plantam communicabat Barreliero Eques Corvinus.

253. Sideritis hirsuta, brevi acutoque folio, albo flore *Barr. Icon. 1046.* Hujus & sequentis descriptionem non invenio.

254. Sideritis Cretica, tomentosa, candidissima, flore luteo *Cor. Inst. R. Herb. 12.* Stachis Lychnoides, incana, angustifolia, flore aureo, Italica *Barr. Icon. 1187.* La Crapaudine de Candie à fleur jaune.

255. Sideritis montana, Scordioides, tomentosa *Barr. Icon. 1160.* Sideritis foliis hirsutis, profundè crenatis. *C. B. Pin. 233. & Raii Hist. 553.*

256. Sideritis montana, Scordioides, glabra *Barr. Icon. 343.* A superiori distinguitur glabritie & lævi nitore quo virent folia, cauliculis quoque altioribus & magis ramosis erectioribusque.

257. Sideritis montana, trifido folio *Barr. Icon. 171.* Folia huic Hyssopo similia, sed in extremo singulari utrinque dente ferrata, seu tricuspidata, dodrantem uncia longa, lineam lata; Flores in spicam verticillatam congeruntur. Cætera ut in vulgari Sideritide.

258. Sideritis montana, Hyssopifolia, major *Barr. Icon. 329.* Distinguitur à Sideritide Alpina, Hyssopifolia Bauhini foliis integris; à sequenti foliis multò longioribus.

259. Sideritis montana, Hyssopifolia, minor *Barr. Icon. 172.* A lignosâ radice, è saxorum rimis erumpente lignosos ramososque edit furculos inæquales, nodosos, obliquos, & nonnihil supinos, in alios tenuiores ramulos divisos, incanos, quadratos, nodosos, erectos, quaternos & quinos, ex eodem ferè exortu emergentes, foliis vestitos Hyssopi planè formâ, arrectis, acutis, vix semunciam longioribus, angustisque sensim, juxta extremum minoribus, binis ex adverso oppositis & integris. Flores in spicam verticillatam congesti sunt, ex calycibus acutis & ferratis emergentes.

260. Sideritis montana, vermiculato folio *Barr. Icon. 344.* Sideritis Hispanica, foeditissima, glabra, flore purpurascens, & comâ canescente *Inst. R. Herb. 192.* A superioribus discrepat foliis minoribus, angustioribus, acutioribusque; eorum namque majora vix semunciam longa, medium lineæ, aut lineam lata, per oras æqualia, in caulibus dodrantalibus, aut semipalmariibus lignosis, quadratis, incanâ lanugine pubentibus, ramosis & geniculatis bina opposita & decussatim ordinata; è quorum alis minora germina densis magisque canescentibus foliis congesta sursum cum foliis sese erigunt. Extrema Surculorum, per internodia satis laxa, verticillati cingunt flores labiati, purpurascens, ex calycibus duris aculeatisque emergentes.

261. Sideritis Hispanica, erecta, folio angustiore *Inst. R. Herb. 191.* Hyssopus montana, verticillata major *Barr. Icon. 239. & Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 67.* Folia huic in erectis, gracilibus, angulosis incanisque furculis Lavandulæ similibus, rara & semuncialia per intervalla, bina & opposita, angusta, obtusè acuta, è viridi canescentia & semunciam longa. Extrema Sur-

culi desinunt in tres aut quatuor verticillos inter se discretos & latiusculos, è quorum calycibus flores purpurascèntes & labiati erumpunt.

262. Sideritis Hispanica, erecta, angustiore folio, minor. Hyssopus montana, verticillata, minor. *Barr. Icon. 240.* Surculi huic vix semipalmares, lignosi, tenuiores tamen & infirmiores, foliis vestiti parvis & incanis, formâ superiorem referentibus. Florum verticilli floresque minores sunt quàm in præcedenti. Has omnes Sideritidis species ex plantâ siccâ plerumque descripsit & depinxit Barr.



263. Marrubium album, sericeo parvo & rotundo folio *Barr. Icon. 685.* & *Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 69.* Marrubium album, Hispanicum, majus *Barr. Icon. 686.* Marrubium Hispanicum, supinum, foliis sericeis, argenteis *Inst. R. Herb. 192. Le Marrube d'Espagne a feuilles soyeuses & argentées.*



264. Melissa sylvestris, hirsuta, major, Italica *Barr. Icon. 1222.* & *Bocc. Mus. part. 2. 166. Tab. 117.* Melissa Italica, hirsuta *ejusd. Mus. part. 1. Tab. viij.* Melissa Romana, hirsutior *Mor. H. R. Bles. auct. 286.* Melissa sylvestris, hirsutior, minus odorata *Raii Hist. 571. La Melisse d'Italie velue & moins agreable.* A vulgari distinguitur foliis multò latioribus, hirsutioribus, & minus grætè olentibus. Porro altiùs surgit. In Hetruriâ propè Liburnum portum copiosa est. Melissæ vulgaris vires vide in *Hist. Raii 570.*



265. Calamintha montana, præstantior, flore purpureo *Barr. Icon. 398.* & *Bocc. Mus. part. 2. 45. Tab. 40.* Calamintha magno flore *C. B. Pin. 229.* & *Raii Hist. 569. Le Calament de Montagne à fleur purpurine.* Vide vires in *Hist. Raii l. c.*

266. Calamintha Pulegii odore, minor, Italis Mentuccia minore ò Neptella *Barr. Icon. 1166.* Hujus & sequentis descriptionem non invenio.

267. Calamintha parvo, oblongo obtusoque folio. Marum Hispanicum, parvo, oblongo, obtuso folio *Barr. Icon. 689.*

268. Calamintha incana, Ocimi foliis *C. B. Pin. 228. Raii Hist. 569.* Marum Thymifolium, incanum, spicatum, crenato folio, Pulegii odore, Hispanicum *Barr. Icon. 690.* & *Bocc. Mus. part. 2. 61. Tab. 50.*



269. Clinopodium Lusitanicum, spicatum & verticillatum *Inst. R. Herb. 195.* Prunella odorata, Lusitanica, flore violaceo *Barr. Icon. 561.* Bugula odorata, Lusitanica *Corn. 46. Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



270. Thymus capitatus, qui Dioscoridis *C. B. Pin. 219.* & *Raii Hist. 519.* Thymum Creticum, incanum, capitatum *Barr. Icon. 897. Le Thim de Crete.*

271. Thymus capitatus, Hispanicus. Thymum cephalotum, Hispanicum *Barr. Icon. 302. Thim d'Espagne.* Pedalis est suffrutex lignosus & perennis, subincanus, à superiori discrepans foliis viridibus & capitulis multò minoribus. Flores edit purpurascèntes. Circa Hispalim Novembri mense collegit Barr.

272. Thymus capitatus, Hispanicus, congestis foliis. Satureia spicata, minor, tenui Laricis folio, Hispanica *Barr. Icon. 1251.* Surculi huic recti, quadrati, albicantes, rariores, in rectos oppositosque ut plurimùm ramos divisi, quos angusta & quadrantem uncia longa, Laricis more congesta folia, rara per intervalla vestiunt. Spicæ huic breves & minores quarum flores non vidi. Sapor illi acris & ad Thymbram montanam aliquantulum accedens.

273. Thymus Lusitanicus, cephalotos, squammis capitulorum amplioribus *Inst.*

Inst. R. Herb. 196. *Tragoriganum Dictamni capite*, Hispanicum *Barr. Icon.* 788. & *Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 43.* Suffrutex est elegans lignosus, drontalis, tortuosus, glaber, nodosus, rufescens, in ramos rotundos, tenues, binos, oppositos per singula internodia & erectos, foliis vestitos binis, oppositis, angustissimis, sed sensim latiusculis cum altius & ad caput floremque assurgunt; infra verò vix lineas duas lata, acuta incanaque & tenuia; superiora autem latiora multa & glabra spicam squammatam referunt, ex cujus squammis flores & semina emergunt. Camphoræ saporem & odorem planta sicca retinet. In Regno Valentino observabat Barr.

274. *Thymus Lusitanicus*, cephalotos, maritimus, glaber & lucidus *Inst. R. Herb.* 196. *Thymum sylvestre*, frondosum, oblongis foliis, Hispanicum *Barr. Icon.* 787. Caules huic lignosi, tortuosi, supini, nonnihil rubentes, vix semipalmares quibus hærent folia oblonga, acuta, rigida, glabra & ad rubrum vergentia, licet in exortu alba tenuique canescant lanugine, Laricis modò congesta, & opposita, ex singulis ramulorum germinantium ocellis erumpentia. Flores videre non contigit rigente tunc hyeme. Aridis & petrosis Regni Valentini locis gaudet.

275. *Thymus cephalotos*, minor, breviori folio. *Thymum angusto* brevique folio. *Barr. Icon.* 780. Crassioribus, lignosis, tortuosisque fruticat furculis rotundis, in alios ramulos incanos, tomentosos tenuioresque divisos, è quibus oriuntur folia confertim congesta, teretia, ex albo virentia, angustissima, vix sesquilineam longa. Florentem videre non contigit, acris est saporis & Mastichen referentis. In Regno Valentino occurrebat.

276. *Thymus virens*, odore Hirci, Italicus. *Thymum hircinum Italicum* *Barr. Icon.* 887. *Thymi vulgaris* modò fruticat, sed humilior & ramosus. Folia edit angusta, utrinque virentia, bina opposita, ex quorum alis alia denso ordine congeruntur. Cauliculi nonnihil rufescunt. Flores fert summis in cauliculis sex aut octo simul congestos, *Thymi formâ*, ex albo carneos & majusculos. Tota planta validi est odoris & ad camphoram, aut potius ad hircinum accedentis; saporis planè acris & mordicantis. Maio florebat in monte quodam propè castrum Terracinæ.

277. *Thymus incanus*, Hispanicus, odore Camphoræ. *Thymum incanum*, camphoratum *Barr. Icon.* 778. Huic surculi sunt recti, glabri, rufescentes, tenues; quibus hærent folia quàm in præcedentibus longiora, erecta, canescentia, minus crassa & carnosa, utrinque acuta & pediculo donata. Majores surculi in tenues, rectos, nudos & decussatim ordinatos ramulos desinunt, quorum in summo inæqualiter insident capitella globosa, ut ex superstite ramulo licuit conjicere. Ramulum appingo tantùm ut magnitudinem ostendam. Acris est saporis, & odoris Camphorati. In Regno Valentini collibus saxosis Februario colligebat Barr.

278. *Thymus viridi* tenuique folio, Hispanicus. *Thymum viridi* tenuique folio *Barr. Icon.* 779. *Vulgari Thymo* folia edit nonnihil longiora, acutiora, & *Serpillo* ferè æqualia, glabris albicantibusque adnata cauliculis lignosis, inflexis ex parte superiore, mollioribus, ac in spicam angustam desinentibus. Flores hujus non vidi, utpote Februario mense decerpti. Acrioris est saporis & odoris Mastichen referentis. In Regno Valentino dum *Origuale Carboneras* peteret, paulò supra oppidum *Slerana* observabat Barr.



279. *Thymbra legitima* *Clus. Hist.* 358. *Raii Hist.* 519. *Thymum Creticum* *Ponæ*, venticillatum *Barr. Icon.* 898. *Pon. Bald. Ital.* 104.

280. *Thymbra Hispanica*, *Coridis* folio *Inst. R. Herb.* 197. *Thymum angusto* longiorique folio; *An Serpillum Zygis* *Theophrast. Barr. Icon.* 777. *Serpillum sylvestre*, *Zygis Dioscoridis* *Clus. Hist.* 358. *Raii Hist.* 523. Regni Valentini indigena est.

281. *Thymbra spicata*, verior, Hispanica *Barr. Icon. 1230*. *Hyssopum montanum*, Macedonicum, Valerandi Dourez *I. B. 3. part. 2. 276*. Surculosa est lignosa, sesquipalmaris, recta, quadrata, rubescens, læviter hirsuta, per intervalla nodosa, imâ sui parte ramulos edente teneros, oppositos, *Thymbrae* foliis vestitos triente uncia vix longioribus, quæ ciliaribus pilis per oras hispida obscurè virentes desinunt iidem in breves florum spicas verticillatas. In surculis majoribus folia majora, uncialia, duas lineas lata, ciliaribus pilis destituta, acuta, mollia, atrovirentia; minora verò quæ spicam glumosam constituunt fescunciâ longam & semunciâ crassam, ciliaribus pilis hircescunt & verticillatim disponuntur. Ex eorum alis flores purpurei emergunt. Acuti est odoris & acerrimi saporis.



282. *Lavandula multifido folio* *Barr. Icon. 798. Clus. Hist. 345. & Raii Hist. 513*. *Lavandula folio dissecto* *C. B. Pin. 216. La Lavande à feuille découpée*. In limitibus Regni Valentini paulò infra locum vulgò dictum *La Venta del Campillo*, supra *Origualam* reperiebat *Barr.*

283. *Lavandula folio serrato*. *Barr. Icon. 797*. *Lavandula foliis crenatis* *Inst. R. Herb. 198. Stachas folio serrato C. B. Pin. 216. & Raii Hist. 514*. In Piceni collibus frequens. *Lavandulae* vires vide in *Hist. Raii l. c.*



284. *Verbena Lamii folio* *Barr. Icon. 1146*. *Verbena Urticæfolia*, Canadensis *H. R. Par. Raii Hist. 536. Quauh Chian Hernand. 399. La Verveine de Canada à feuille d'Ortie*.

285. *Verbena nodiflora*, capite oblongo, seu *Verbenaca nodiflora* *Imperati Barr. Icon. 855. Imp. 673. Verbena nodiflora C. B. Pin. 269. Prodr. 125. & Raii Hist. 536*. Planta est sui generis. *Icon. Barr. ex Imp. l. c. In Regno Valentino Valentiam inter & mare, loco dicto là decà, crescit.*

286. *Verbena nodiflora*, Cretica, Julo longiore *Barr. Icon. 854*. Hæc à præcedenti distinguitur ramis firmioribus, Julisque longioribus & nutantibus. Ex Candiâ ramus depictus ad *Barrelierum* missus.

287. *Verbena Indica*, Myuros *Barr. Icon. 853. Verbena Indica Bont. Hist. 150. Raii Hist. 536. Icon. Barr. ex Bont. l. c. Verbenæ vires vide in Hist. Raii l. c.*



288. *Stachas Arabica*, caule folioso, flore albo, Hispanica *Barr. Icon. 301*. Varietas *Stachados purpureæ*.



289. *Cataria Hispanica*, *Betonicae folio angustiori, flore cæruleo* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha montana, purpurea, major, sparsâ spicâ Barr. Icon. 601. & Bocc. Mus. part. 2. 46. Tab. 36. Mentha Cataria, latifolia C. B. Pin. 228. & Raii Hist. 549. Cataire d'Espagne*. In monte *Seuse* supra *Vapincum* nobis occurrit.

290. *Cataria Hispanica*, supina, *Betonicae folio, tuberosâ radice* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha tuberosa, violacea, spicata, minor, Hispanica Barr. Icon. 602. Menthastrum iij, tuberosâ radice Clus. Hist. xxxiiij.*

291. *Cataria Lusitanica*, erecta, *Betonicae folio, tuberosâ radice* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha tuberosa, spicata, purpurea, Hispanica Barr. Icon. 1131. & Bocc. Mus. part. 2. 44. Tab. 36.*

292. *Cataria Lusitanica*, *Betonicae folio, minor, radice fibrosâ* *Inst. R. Herb. 202. Nepetha saxatilis, cærulea, minima, Hispanica Barr. Icon. 736.*



& *Bocc. Mus. part. 2. 46. Tab. 36.* Pedalis est Planta è rupium fissuris erumpens, cujus prima folia sunt subrotunda, sinuata, in ambitu parum crenata, superiora oblonga, acutiora & magis sinuosa. Caulis quadratus, pallidè vi-rens, foliis binis ex adverso nascentibus vestitus, ramosus, ramis in spicam ex foliis & verticillis florum conflata definentibus. Flores sunt cærulei. Totà Planta odore gravi prædita est, & ad Moldavicam accedenti.

293. *Cataria minor, Alpina Inst. R. Herb. 202.* *Nepetha angustifolia, minor, Hispanica & Italica Bocc. Mus. part. 2. 75. Tab. 61.* *Mentha Cataria, minor Alpina C. B. Pin. 228. & Prodr. 110. La Cataire des Alpes.* In Monte Ventoso prope Avenionem frequens. *Cataria* vires vide in *Hist. Raii 549.*



294. *Betonica Alpina, incana, purpurea Barr. Icon. 340.* Vulgarem foliorum formâ repræsentat, nisi quòd illa latiora amplioraque sint, & densâ incanâque lanugine pubeant. Flores edit pariter purpureos, sed in spicam crassiore congestos. In monte *la Bouvine* dicto, supra Cœnobium majoris Carthusiæ observavit Barr.

295. *Betonica montana, lutea Barr. Icon. 339.* *Betonica montana, lutea, latifolia Bocc. Mus. part. 2. 82. Tab. 72.* *Horminum Alpinum, luteum, Betonica spicâ Raii Hist. 547.* Folia huic quàm vulgari latiora, magis subrotunda, villosa, incanâ densâque lanugine pubentia. Caules similiter pubescunt & sustinent spicam florum è luteo-pallidorum, quam in vulgari brevior, sed crassior. In Apenninis montibus invenit Barr. nos supra Cœnobium majoris Carthusiæ. *Betonica* vires vide in *Hist. Raii 551.*



296. *Ocimum majus, vulgare Barr. Icon. 1064.* *Ocimum Caryophyllatum, majus C. B. Pin. 226.* *Basilica major Trag. Hist. 31. Le Basilic ordinaire.* Pedale est ramosum, foliis vestitum utrinque acutis, oblongis, fescunciâ plus minusve latis, infrequenter ferratis, colore è viridi pallentibus. Flores albi, è spicis semipalmaribus satis remissis erumpentes. Variat colore viridi, interdum atrorubente. Porro aliàs glabrum, aliàs hirsutum. *Icon. Barr. ex Trag. l. c.* Vires vide in *Hist. Raii 541.*

297. *Ocimum majus Barr. Icon. 1071. & Cam. Epit. 308.* Folia edit oblonga, *Amaranthi* aut *Citrii* æmula, tres uncias circiter longa, duas lata, crassa, pinguis, humida, rugosa, sinuosa, lævia, pallidè virentia, splendida, leviter ferrata, statimque caulem in orbem ambientia denso exortu ac velut umbraculum imitantia, rariùs per caulem sparsa, sed potius in imo collecta & expansa. Caulis vix palmo altior, spicis ferè palmaribus, flagelli in modum dispositis, digitum crassis & hirsutis stipatus. Flos albidus, quandòque purpurascens. Odor totius plantæ ad Citreum accedit. Sæpiùs viret, rariùs purpurascit.

298. *Ocimum majus, bullatum Barr. Icon. 1702.* *Ocimum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225.* Superiori simile est, sed folia huic paulò longiora, latiora, bullata, rugis profundis sulcata, sursum convexa, infernè concava, ac veluti crispata, uncias tres lata, & septem longa. Caulis & odor qualis superiori. In hortis Romanis colebatur. *Barr.*

299. *Ocimum majus, Crispum, obtusè ferratum Barr. Icon. 1053.* *Ocimum maximum, latifolium, maculatum C. B. Pin. 225.* A superioribus distinguunt folia profundè ferrata, crispa & plerumque maculata; à sequenti folia rotundiora & minus profundè incisa; spicæ autem longiores sunt.

300. *Ocimum majus, crispum, laciniatum Barr. Icon. 1054.* *Ocimum foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus, maximum H. L. Bat. Le Basilic*

à feuilles de Chêne. Ex radice albâ, satis crassâ, fibris plurimis capillatâ asurgit caulis quadratus, pedalis, foliis onustus variè sparsis, duas tresve uncias latis, tres aut quatuor uncias longis, altiùs ferratis & incisiss, dentatis, oris secundùm longitudinem circumvolutis, Cymbæ in modum complicatis & excavatis, crispis, rugosis & quasi verrucosis, acutis & è viridi obscurè nitentibus. E foliorum alis & extremis ramis per genicula exeunt spicæ palmares rarioribus & laxioribus verticillorum ordinibus compositæ. Flores albi; semen ut in aliis.

301. Ocimum majus, crispum, profundè ferratum, maculatum, oblongâ spicâ *Barr. Icon. 1065.* Ocimum Indicum *Clus. Hist. 350.* A superiori discrepat foliis nec ita crispis, rugosis, & verrucosis, sed atropurpureâ maculâ conspersis. *Icon. Barr. ex Clus. l. c.*

302. Ocimum majus, crispum profundè ferratum, verrucosum, brevi congestâque spicâ, subrubens *Barr. Icon. 1066. Mor. Hist. Oxon. part. 3. 406. Tab. 20. sect. 11.* Hujus duplex varietas observatur maculati & non maculati. Maculatum caules & spicas fert purpurascens; non maculatum verò virides. Utriusque caulis vix pedalis, ramosus, rarioribus vestitus foliis oblongis, obtusiùs acutis, omninò crispis, velut in globum vel bullam convolutis, in ambitu profundè incisiss, sursum deorsumque complicatis, longo infirmoque innixis pediculo. Spicæ breves & conglobatæ. Flos albus. Odor ejus aliis persimilis. Variat quandòque foliis brevioribus, & minus profundè incisiss & ferratis. Romæ ob elegantiam Fœminam dicunt.

303. Ocimum majus, crispum, leviter ferratum, verrucosum; brevi congestâque spicâ, viride *Barr. Icon. 1063. & Mor. Hist. Oxon. part. 3. 406.* Huic folia nonnihil longiora, læviùs ferrata, & virentia. Florum Calyces hirsuti, & quatuor veluti dentibus ferrati.

304. Ocimum medium, vulgare *Barr. Icon. 1065.* Ocimum vulgatiùs *C. B. Pin. 225.* Folia edit è viridi albertia, nitentia, crassiuscula, levius vel profundius ferrata. Magnitudinem eorum habes in Icone expressam. Flos albus, spica verò viridis.

305. Ocimum medium, rubrum *Barr. Icon. 1057.* Superiori consimile, sed majus & pedale. Folia nonnihil majora, magis ferrata, rugosa, inæqualia, unâ cum caule & spicis hispidis ex atro purpurascunt virentque. Flores rubent.

306. Ocimum medium, non ferratum *Barr. Icon. 1056.* Foliis tantùm non ferratis à præcedentibus discrepat. Modò viret, modò ex atro purpurascit.

307. Ocimum medium, folio breviori, ferrato *Barr. Icon. 1056.* Folia huic subrotunda, acuminata, sed breviora.

308. Ocimum medium, acuto & verrucoso folio *Barr. Icon. 1058.* Majora illi folia, subrotunda & in oblongum acumen desinentia, duas uncias longa, fescunciam lata, nonnihil crispantia, verrucosa & lætè virentia. Flores albi in brevibus spicis congesti. Dodrantalis est planta, cujus hic ramum damus. Variat quoque foliis, caule, spicis floribusque purpurascentibus.

309. Ocimum medium, crispo & verrucoso folio *Barr. Icon. 1058.* Foliis est rotundioribus, minus acutè acuminatis, leviter ferratis, magis crispis, verrucosis, rugosis, bullatis, quæ maculis variant atropurpureis, inæqualiter & sine ordine utrinque penetrantibus. Caules, spicæ & flores purpurascunt. Spicæ, quàm in superiori, longiores; rarioribus tamen verticillis conflata.

310. Ocimum medium, crispum, ferratum. *Barr. Icon. 1060.* Folia fert minora, crispa, oblonga, utrinque acuta, altiùs ferrata quàm in Icone exprimitur, quàm in superioribus mediis magis crispantia, magis convoluta & ita in se supernè complicata, ut cymbam eleganter effingant.

311. Ocimum minus, vulgare *Barr. Icon. 1069.* Ocimum parvum *Lugd. 681. Le petit Basilic.* Palmare & dodrantale est ramis foliisque densè luxurians parvis,

vis, vix tres lineas longis, & quatuor latis, utrinque acutis, crassis, pingui-
bus, planis, non ferratis & viridibus. Ramuli in exiles spicas abeunt, singu-
las, raris verticillis ac proinde floribus onustas. Flores albi, nec majores præ-
cedentibus.

312. Ocimum minus, ferratum *Barr. Icon. 1067*. Ocimum minimum *J. B. 3. 247. Le petit Basilic*. Folia huic ferrata, villosa; Caules pariter hirsuti. Variat quandoque foliis angustioribus.

313. Ocimum minus, rotundifolium, rubrum *Barr. Icon. 1068. Le petit Basilic violet*. Folio donatur rotundo, quatuor lineas lato, non ferrato, per oras fursum reflexo, crispo & concavo, è rubro virenti, per ramos crebriore. Flores & spicæ rubescunt.

314. Ocimum minus, crispum, ferratum *Barr. Icon. 1059*. Illi folia majora, semunciam ferè lata, paulò longiora, acuta, reflexa, crispa, in se convoluta, in modum calceoli aut scaphæ subrotundæ complicata, cava, retusa, profundè ferrata, saturius virentia, per ramos confertim nascentia, & oblongo adnata pediculo. Flores albi, parvi, hinc inde ex incerto raroque verticillorum ordine emergentes. Gravioris & nonnihil camphorati est odoris.

315. Ocimum minimum, vulgare, folio acuto *Barr. Icon. 1077*. Ocimum minimum *C. B. Pin. 225*. Glomeratim frutescit ad dodrantis altitudinem, dilutèque viret, foliis vestitum per crebra ramulorum densissimorum genicula binis, oppositis, Serpilli vel Amaraci minoris formâ, sed acutioribus, planis, & carnosis, non ferratis.

316. Ocimum minimum, rotundifolium *Barr. Icon. 1075*. Circinnata hujus folia, nonnihil cava & crispa, minora tamen, tenuiora, per ramos magis congesta & virentia. Rami, caules & spicæ pallidè virent, quandoque at-
ro-
rubent.

317. Ocimum minimum, crispum, non ferratum *Barr. Icon. 1070*. Huic crispa sunt folia, concava, acetabuli vel cochlearis formâ, oris integris & nonnihil complicatis, subrotunda, variè circa ramos contorta, & pediculis crispantibus annexa. Tota planta viret, splendetque non pallido, sed obscuriori nitore. Flores albi. Odor ejus nonnihil gravis.

Ocimorum hæc varietates eleganter expressit *Barr.*



318. Chamædrys fruticosa, Cretica purpureo flore *Inst. R. Herb. 205*. Teucrium fruticans, incanum, Creticum, flore purpureo *Barr. Icon. 896*. Teucrium Creticum *Clus. Hist. 348*.

319. Chamædrys multifida, spinosa, odorata *V. Lusit.* Scordium spinosum, odoratum, annuum *Barr. Icon. 202*. Scordium spinosum, odoratum *Corn. 123. Icon. Barr. ex Corn. l. c.*



320. Polium montanum, luteum, supinum, capite oblongo *Barr. Icon. 1082*. Polium montanum *ij. Clus. Hist. 361*. Tota planta tomentosa est & incana; folia per oras ferrata, plana, & latiora quàm in aliis speciebus; coma florum oblonga, lutea. Flores pariter lutei. Varietas est Polii montani lutei *C. B. Pin. 220*. Vires vide in *Hist. Raii. 524*. In Regno Valentino reperiebat *Barr.*

321. Polium montanum, luteum, tomentosum, dasyphyllum, ferratum. *Barr. Icon. 1073*. Cespitosa est planta, supina, gnaphalodès seu tomentosa, ramosa, densâ circa radices lanugine è pallido albicans, ramosque subinde emittens quatuor uncias altos, densis crebrisque vestitos foliis longis, angustis, ferratis, densâ mollique lanugine hispidis, adeoque densis ut sibi cohærere folia videantur. Neque enim tantum summis caulium insident corymbi:

E

Sed

Sed ex lateralibus furculorum internodiis & ex foliorum latiorum alis corymbi lutei emergunt quos pictor foliis merfit.

322. Polium montanum, luteum, ferratis, angustioribus, incanis foliis. *Barr. Icon. 1089.* Cauliculos edit incanos, firmos, lignosos, incanâ lanugine pubescentes, primùm procumbentes, subinde repandos humique radices agunt & foliis per intervalla satis laxa binis ex adverso nascentibus ab imo ad summum vestiuntur, incanis, angustis, ferratis seu crenatis, & angustioribus quàm in sequenti. In extremo comam ferunt luteam, rotundam & lanuginosam. In regno Valentino frequens est.

323. Polium montanum, luteum, ferratis Amaraci foliis, comâ subluteâ *Barr. Icon. 1088.* Polium Hispanicum, luteum, Majoranæ foliis *Inst. R. Herb. 207.* Cauliculis nititur firmioribus, luteâ lanugine pubentibus, quibus, latiora per intervalla, folia bina ex adverso posita & decussatim ordinata hærent subrotunda, & Amaraci aut Majoranæ formâ ac magnitudine, in summo caule majora triplò quàm in exortu, ubi vix Thymi magnitudinem attingunt, per oras crenata; plana, rugosa, venosa Chamædryos instar, incanâ pubentia lanugine & subvirentia. Summo ex cacumine quod frondosum est crassum & luteum, exeunt florum comæ pariter luteæ, quas proximè involvunt calycis modò folia lutescentia. Odor ejus gravis, non ingratus; sapor tamen ingratus & amarissimus. Circum *Alcaras* in montibus crescit.

324. Polium marinum, dasiphyllum, Gnaphalodes, flore albo *Barr. Icon. 1047.* Polium maritimum, erectum, Monspeliacum *C. B. Pin. 221.* Denso humilique est stipite, ramis erectis, albâ densâque lanugine pubentibus; foliis latioribus Polio montano albo vulgari. In maritimis Regni Valentini juxta Valentiam, in Galliâ Narbonensi ad radicem montis Ceti, & in littore quod Terracinâ ducit Circæum observavit *Barr.*

325. Polium montanum, album, ferratum, latifolium, erectum majus. *Barr. Icon. 1079.* Multiflorum est & ramosum; lateque per ramos sparsi comæ Corymbi, magis tamen conglobati, compacti minoresque quàm in sequentibus.

326. Polium montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, majus *Barr. Icon. 1074.* Supinum est, Corymbisque majoribus quàm in superiori. In Hispaniâ, Italiâ & Galliâ Narbonensi frequens.

327. Polium montanum, Hispanicum, non crenatum, flore albo *Barr. Icon. 1049.* Folia huic nonnihil angustiora, sed oris est integris & non ferratis.

328. Polium montanum, erectum, crenatum, angustifolium flore albo *Barr. Icon. 1050.* Foliis crenatis, comâ florum ampliore, & floribus majoribus à superiore distinguitur.

329. Polium montanum, album, ferratum, latifolium, supinum, minus *Barr. Icon. 1078.* Cauliculis est supinis & radices humi agentibus. Folia angustiora, quàm in *montano*, *supino*, *majore*. Corymbi florum ampliores quàm in *latifolio erecto*, & per extrema ramorum sparsi.

330. Polium montanum, album, angustifolium, ferratum, supinum, minus *Barr. Icon. 1091.* Humi procumbit repandis furculis; folia fert parva, angusta, ferrata, vix quartam unciae partem longa, lineam unam aut alteram lata.

331. Polium Valentinum, fruticosum, angustifolium, flore albo *Barr. Icon. 1048.* Tenuissimis sed firmis, ramosis, erectis, incanis nititur cauliculis quos tenuia, angusta, albidâ lanugine pubentia, ferrata simulque congesta vestiunt folia. Extrema ramulorum & caulium desinunt in capitulum conglobatum, albicans, parvum, floribus decoratum parvis, & albis. Eleganter fruticat palmaris & sesquipalmaris, Planta surrecta tota. In Valentini Regni loco dicto *la deça* provenit.

332. Polium surrectum, majus, angustifolium, ferratum, incanum, tomentosum

tosum *Barr. Icon. 1096*. Lignosâ è radice in palmares, pedales, tomento canescentes assurgit cauliculos densis foliis Laricis vel Stoechados Arabicae in modum turmatim dispositis, angustis vix sextam unciae partem latis, brevibus pariter, utrinque crenatis & supernè convolutis ac candicantibus. Acerrimi est odoris.

333. Polium montanum, album, non ferratum, longis angustisque foliis canescentibus *Barr. Icon. 1080*. Polium Hispanicum, Linariae canescentibus foliis, flore albo *Inst. R. Herb. 207*. Praeangusta & semunciam longa huic folia, nec crenata, incanâ lanugine, unâ cum ramis erectis pubentia. Coma rotunda, ampla & alba.

334. Polium montanum, album, non ferratum, viride, longis angustisque foliis, caule incano *Barr. Icon. 1081*. Polium Hispanicum, Linariae foliis brevioribus, flore albo *Inst. R. Herb. 207*. Surrectis & firmis donatur surculis incanâ lanugine pubentibus; foliis angustis & Rorismarini, sed longè minoribus, quàm in superiori brevioribus, paulò latioribus, integris, virentibus, nec ferratis. Coma in summo corymbacea & globosa. Radix lignosa, fibris hinc inde propendentibus. In praecelsis montibus Carthusiae cui nomen à *Porta Caeli*, Boream versus, quatuor leucis ab urbe Valentia invenit *Barr.*

335. Polium montanum, majus, erectum, Rorismarini folio, flore rubro *Barr. Icon. 1090*. Polium Hispanicum, maritimum, frutescens, Rorismarini folio, flore rubro *Inst. R. Herb. 207*. Hoc sequentium maximum, è radice satis crassâ & lignosâ plures caules ramosi, firmi, lignosi, tomentosi & incani, recti assurgunt: densis, (Pictor rarioribus pinxit, ut operi parceret) Rorismarini foliis, sed brevioribus, angustioribus & magis incanis lanuginosisque, dodrantem unciae longis, lineam latis, Pinastris modo vestiuntur. Horum singula extrema in florum purpureorum globosè & densè congestorum Corymbum desinunt. Odore est gravi, gustu acri & amaro. Circa initia Januarii, mediâ viâ ab oppido *Montfort* ad oppidum *Elda*, in colle fabuloso ante descensum ad planitiem *florebo* dictam in Hispaniis occurrebat *Barr.*

336. Polium montanum, pumilum, rubrum, viride, Stoechados folio, caule tomentoso *Barr. Icon. 1092*. Polium Hispanicum, montanum, pumilum, Rorismarini folio, flore rubro *Inst. R. Herb. 207*. Elegantissima hæc species vix Icone major, è singulari radice lignosâ & nonnullis fibris à lateribus capillatâ in pumilum fruticem statim surgit ramosum, incano densoque bombice tumentem, firmum foliisque vestitum densis, compressis, arrectis, viridibus, Stoechados Arabicae formâ, supernè virentibus, infernè canescentibus, Pini in modum congestis. Cauliculi & ramuli in thyrsus subrotundum florum carneorum densè & glomeratim congestorum desinunt. Pictor supremos ramos in se nonnihil inflexos, caulesque bombace niveo tumentes, foliis densis rectos non satis expressit. Odore est præditum suaviore quàm *Polium vulgare luteum*.

337. Polium montanum, pumilum, angusto, viridique folio, caule incano *Barr. Icon. 1093*. Fruticulus est Thymi modo lignosus & cespitosus. E radice satis lignosâ, mediocriter crassâ & longâ, fibris capillatâ & subrufâ in pluresque alias divisâ furculi plures exoriuntur ramosi, tortuosi, tenui tomento albicantes, juxta radicem foliis minùs canescentibus, sordidioribus vestitis superioribus verò densis, binis & ex adverso oppositis ut in aliis, angustissimis, semunciam longis quæ longissima, non crenatis & supernè læto virore nitentibus. Singuli furculi in rotundam florum è dilutâ purpurâ jucundè rubentium comam desinunt, multâ lanugine hispida farctisque florum calycibus, & quandoque in papulas vermiculo fœtas tumentibus. Odore grato & sapore amaricante præditum est. In montibus Carthusiae à *Porta Caeli* infra Valentiam provenit.

338. Polium montanum, Gnaphalodes, incanum, flore rubro, supinum

Barr. Icon. 1083. Polium montanum, 1. purpureo flore, V. *Clus. Hist. 362.* Supina est Plantula, cujus ramuli sunt repandi, vix duas uncias alti, tomento denso & holoserico tecti, folia *vulgari albo* similia, crenata, dense & confertim nascentia, incana, mollia & lanuginosa. Florum latè rubentium Corymbi ex foliorum alis secundum cauliculorum longitudinem & in extremis ramulorum enascuntur, quod huic peculiare est. Pictor macilentiores, glabrioresque fecit caules. Crescit in Castiliæ novæ provinciâ *la Mancha* dictâ, in deserto arido inter locum vocatum *el Pofico* & *Chinchillo* oppidum. Necnon in Regni Valentini montibus præsertim juxta Villam Divi Petri, Monasterii Ord. FF. Prædicatorum.

339. Polium saxatile, pumilum, ferratum, supinum, incanum, flore rubello *Barr. Icon. 1098.* E fissuris rupium cespitat, densis, supinis, tortuosis, lignosis, brevibus, imâ parte rufescentibus, supernâ incanis vestitum foliis, ramulis variè sibi complexis & in alios divisus capitat frutescens, vix tres uncias altum. Ramulis annectuntur folia satis crebra, majora alia latioraque, alia minora & angustiora, omnia tamen crenata, ferrata, & angustiora potius quàm latiora. Ramorum summitates paucos flores ferunt in brevem parvâque comam & purpurascensem collectos. Radix lignosa & tortuosa saxifque demersa. Suavissimo flagrat odore, sapore autem donatur amariusculo. E rupibus montium Regni Valentini, in deserto Murrhensi erumpit.

340. Polium minus, erectum, angustis, crenatis brevibusque foliis, flore rubro *Barr. Icon. 1099.* Radix hujus lignosa, teres, paucis fibris capillata, subrufa, nonnihil tortuosa lignosaque, è cujus summo plures erecti, lignosi, incani surgunt ramuli vix fescunciales, quibus angustissima brevissimaque, & vix sesquilineâ longiora, densa satis & erecta hærent folia, crenata & incana. Flores in summo globosam in comam congesti & rubelli. Iisdem locis occurbat ac superius. Idem fermè sapor & odor.

341. Polium surrectum, minus, angustifolium, ferratum, è viridi canescens *Barr. Icon. 1097.* E rupium fissuris pariter erumpit, & è lignosâ radice plures emittit furculos densissimis foliis & crebris, crenatis, & quàm in superiori paulò longioribus, ferratis, oris convolutis vestitos. Huic folia caulesque non ita canescunt ut superiori, cui tamen congener & simile est. Folia majora ad rubrum nonnihil vergunt. Flores illi quoque rubelli.

342. Polium saxatile, purpureum, serrato Serpilli folio *Barr. Icon. 1061.* Hæc elegans species folia edit serrata, crassa, villosa, incana, & crenata; è rupium rimâ sparsis supinisque viticulis Serpilli more pendens, vel saxis incumbens. Viticulorum extremis capitella crassa pro plantæ magnitudine hærent. Flores latè & ex albo rubent. Folia supernè virent, infernè tomentosa, albida & serrata, quod non satis expressit Pictor. E Regno Valentino oriundum ut & sequentia.

343. Polium saxatile, purpureum, non Serrato serpilli folio, pressiori comâ *Barr. Icon. 1087.* Polium Hispanicum, Serpilli folio, flore purpurascente *Inst. R. Herb. 270.* Folia huic Serpilli, nusquam crenata. Florum capitella parva angustiora, sursum arrecta & compressa. Flores minores, pauciores & similiter rubentes. Ortu, habitu, natalibus, &c. superiori convenit.

344. Polium saxatile, minimum, Thymi folio, carneo flore *Barr. Icon. 1062.* Polium Hispanicum, Thymi folio, purpurascente flore *Inst. R. Herb. 207.* Folia hujus minora, supernè virentia, infernè albicantia, brevioribus, supinis & subinde erectis viticulis lignosis, pediculo latiusculo alligata. Flores carnei in breve capitellum sunt congesti.

345. Polium saxatile, purpureum, Chamædryoides, amplâ comâ *Barr. Icon. 1086.* & *Bocc. Mus. part. 2. 75. Tab. 61.* Supina est planta è rupium commissuris, lignosâ prorumpens radice, saxa latè vestiens, albi, viridis & purpurei coloris varietate elegans. Viticulos tenues, lignosos edit folia pariter juxta exortum minora, & Thymo paria, sed serrata, sensim majora & latiora quò altiùs

altiùs surgunt, Chamædryos formâ, minora tamen & breviora, omnia supernè viridia, infernè albicantia. Corymbus florum magnus pro plantæ modo; Flores rubent.

346. Polium saxatile, Chamædryoides, rotundiori folio, supinum, rubrum *Barr. Icon. 1095. & Bocc. Mus. part. 2. 76. Tab. 62.* Polium Hispanicum, Chamædryos folio, purpurascens flore *Inst. R. Herb. 206.* E saxorum rimis pendet sarmentis tenuibus, ramosis & longis. Folia ejus majora quàm in præcedenti, profundius serrata, in exortu rotundiora, in progressu sensim oblongiora & obtusè acuminata, Chamædryos foliis non absimilia, sed rotundiora, densâ serie & alatum per ramos disposita, supernè virentia, infernè canescentia. Florum Corymbi minores laxioresque sunt, quàm in præcedenti. Flores obscuriùs purpurascunt. Sapor non tam amarus. Junio florebat in deserto Murrhenfi, & Montibus altissimis, non longè à Mari, & à Cœnobio Eremitarum Divi Hieronymi in Regno Valentino.

347. Polium saxatile, Chamædryoides, oblongo folio, rubro exiguo flore *Barr. Icon. 1094.* In longos, ramosos, flexuosos, supinos, incanâ lanugine hispido spargitur viticellos foliis vestitos, quàm in utroque præcedenti, longioribus, angustioribus, ad Chamædryos folia magis accedentibus, subtus incanis, supernè lætè virentibus, minus densè per caulem positis. Florum capitella brevia, minora & compressa, quæ pictor non expressit. Flores rubent. Color, odor & sapor idem qui aliis. Eodem loco ac superius occur-
rebat.

Has elegantes Poliorum species recensent Turnefortius in *Inst. R. Herb. l. c.* & Morissonus in *Hist. Oxoniens. par. 3. 355. & 356.*



348. Teucrium cæsius & amplo Rorismarini flore, Boeticum Clusio *Barr. Icon. 512.* Teucrium Boeticum *Clus. Hisp. 229. Hist. 348. & Raii Hist. 526.* In Italiâ juxta Terracinæ portum frequens.



349. Bugula *Dod. Pempt. 135.* Bugula media, flore cæruleo *Barr. Icon. 338. La Bugle.* Vires vide in *Hist. Raii 575.*

350. Bugula minima, glabra, flore cæruleo. Bugula minima, glabra, flore azureo *Barr. Icon. 337.* Hujus descriptionem non invenio in scriptis *Barr.*



Sequentes plantæ imperfectiores sunt quàm ut possint ad sua genera reduci. Ex plantâ siccâ floribusque destitutâ delineavit *Barr.*

351. Tragoriganum comosum, seu crispis & capillaribus foliis, Hispanicum *Barr. Icon. 772.* Tragoriganum brevi circinnato folio *Bocc. Mus. part. 2. 163. Tab. 124.*

352. Marum tenuifolium, Thymi facie, Hispanicum *Barr. Icon. 771.*

353. Marum Sampsuchi folio, Hispanicum *Barr. Icon. 1224.*

354. Marum Hispanicum, nigrum, flore purpureo, Piperella Hispanis *Barr. Icon. 694.* Marum Hispanicum, nigrum *Bocc. Mus. part. 2. 166. Tab. 117.* Piperellam vocant, quod diutiùs odorem suum gravem servet. In Regni Valentini aridis Valentiam inter & Aioram urbes Maio, Junio mensibus cum flore reperiebat *Barr.*

355. Marum nigrum, Hispanicum, flore purpureo, minor planta *Barr. Icon. 1223.*

356. Marum album, Hispanicum, minus, Dorychnii folio *Barr. Icon. 693.* Palmares edit furculos, foliis Thymi vel potius *Dorychnii Monspeliaci*, inca-

nis, mollique lanugine canescentibus vestitos. Flores verticillatim & spicatim summis in ramulis colliguntur. Saporis est acris, mordacis & Camphorati.



357. Rapistrum maximum, μονοσπερμόν, gemmâ luteâ flore niveo Barr. Icon. 387. Rapistrum maximum, rotundifolium, monospermon Corn. 147. Icon. Barr. ex Corn. l. c.



358. Myagrum supinum, album, Eruca foliis Barr. Icon. 1252. Myagro similis, flore albo I. B. 2. 895. Myagrum monospermum, minus C. B. Pin. 109. & Prodr. 52. In pratis ad Anienis confluentiam in Tyberim, viâ quâ itur ad Pontem Salarium provenit.



359. Thlaspi cordatum, minus, flore albo, insipidum Barr. Icon. 815. Thlaspi arvense, perfoliatum, majus C. B. Pin. 106. & Raii Hist. 832. Frequens per Galliam.

360. Thlaspi Alfine Teucroidis folio, cordato pericarpio. Barr. Icon. 1015. Varietatem hanc cum superiori Romæ observabat Barr.

361. Thlaspi supinum, minus, flore albicante Barr. Icon. 894. n. 11. Thlaspi Allium redolens Mor. Hist. Oxon. part. 2. 297. Scorodonthlaspi Ulissis Aldrovandi I. B. 2. 932. & Raii Hist. 834.

362. Thlaspi montanum pingui folio, carneo flore, planâ & cordatâ siliquâ Gualdi Barr. Icon. 845. Thlaspi parvum, saxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. Raii Hist. 833. In Monte Capouladon circa Monspelium, & circa Gratianopolim in deserto R. P. Augustianorum provenit.

363. Thlaspi flore albo, siliquâ triangulari, crenatâ Barr. Icon. 846. & Bocc. Mus. part. 2. 79. Tab. 70. Hujus descriptionem non invenio in scriptis Barr.

364. Thlaspi fruticosum, sempervirens, albo Cretici flore Barr. Icon. 734. Thlaspi Creticum, perenne, flore albo Barr. Icon. 214. n. 11. Thlaspi montanum, sempervirens C. B. Pin. 106. Humilis est frutex frequentibus ab ipsâ radice virgultis lignosis, ramosis, densum in cespitem se erigens, quem alterna raraque vestiunt folia oblonga, angusta, in extremo rotunda, glabra, carnosâ, medio nervo sulcata, nitide virentia. Extremos ramos comant umbellæ à multis floribus candidis congestis quales in Thlaspi Cretico, sed minores, compactæ, quæ sensim in spicam attolluntur. Singulis porro in umbellis flores supra viginti numerantur, tetrapetali, ad marginem majores, petalis tamen inæqualibus constantes, quorum duo majora seu exteriora, interiora duo sextuplo minora sunt. Floribus succedunt pericarpia ovata, mucronata, rarò maturantia. Semper viret: sub initia Februarii flores edit, qui ad finem Junii durant. Elegans hæc planta vix palmo altior latè procumbentibus viminibus stipatur.

365. Thlaspi montanum, serrato Cepeæ folio, flore purpurascente, umbellato Barr. Icon. 848. Thlaspi Alpinum, folio rotundiore, carnosâ, purpurascente flore Inst. R. Herb. 212. Radicem habet longam & crassiusculam ex quâ plures erumpunt furculi rotundi, carnosi, supini & postea repandi ac surrecti foliis vestiti alternis crassis, succulentis, crenatis & Cepeæ formâ. Flores purpurascens atque in umbellam dispositi summa cauliculorum obtinent; floribus succedunt pericarpia turbinata. Habes seorsim floris fructus & folii magnitudinem, & totius plantæ molem in Icone Barr. Maio florebat in deserto Carthusiæ Trisultinæ, & Montibus Appenninorum vicinis. Augusto mense nobis occurrit in Monte Ventoso, & in Montibus Vallis Barfilionensis.

366. Thlaspi Creticum, Iberidis folio, flore albo Barr. Icon. 893. n. 1. Thlaspi

Thlaspi Creticum quibusdam, flore albo *I. B. 2. 924.* Pictum communicabat Barreliero Eques Corvinus, floresque ejus staminibus apicibusque carere asse-
rebat. Sequentes species imperfectæ sunt.

367. *Thlaspi montanum*, Bellidis folio, flore albo *Barr. Icon. 861.* E Car-
thusiæ Trisultinæ deserto duodecim ab urbe Ananiâ milliaribus distante, Maio
florentem habuit. Si villosum exprimeretur, referret optimè *Thlaspi villosum*,
capsulis hirsutis C. B. Prodr. 47.

368. *Thlaspi luteum*, *σπασσασπυόν* *Barr. Icon. 899. & Corn. 8. Icon. Bar. ex*
Corn. l. c.

369. *Thlaspi Virginianum*, flore luteo *Barr. Icon. 843.* Ab Equite Corvino
accepit cum sequenti.

370. *Thlaspi Creticum*, montanum, luteum, Leucoii flore *Barr. Icon.*
214. n. 1.

371. *Thlaspi fruticosum*, Leucoii marini minoris folio, flore albo *Barr.*
Icon. 1306. n. 11. I. B. 2. 931. & Lob. Obser. 109. Icon Barr. ex Lobel. l. c.

372. *Thlaspi montanum*, album, siliquâ hastatâ, acuto Globulariæ folio
Barr. Icon. 847. & Bocc. Mus. part. 2. 36. Tab. 64. In deserto Carthusiæ
Trisultinæ provenit.

373. *Thlaspi linifolium*, erectum, flore albo, turbinato utriculo *Barr. Icon.*
849. & Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 69.



374. *Nasturtium sylvestre Dalechampii Lugd. 655.* *Thlaspi umbellatum*,
Nasturtii folio, flore albo *Barr. Icon. 1306. n. 1. Thlaspi umbellatum, Nasturtii*
folio, Monspeliacum C. B. Pin. 106. & Raii Hist. 835. Barr. Icon ex Dalech. l. c.



375. *Thlaspidium Monspelienſe*, Hieracii folio hirsuto *Inst. R. Herb. 214.*
Thlaspi biscutellatum, Hieracii folio, pallido flore *Barr. Icon. 900.* *Thlaspi*
clypeatum Clus. Hist. cxxxiiij. Raii Hist. 836. *Leucoium luteum*, minus, Hie-
racii folio *Barr. Icon. 1227.* Prior *Icon. Bar. ex Clus. l. c.*

376. *Thlaspidium montanum*, umbellatum. *Leucoium Alyssoides*, umbel-
latum, montanum Fabii Columnæ *Barr. Icon. 253. n. 11. Col. part. 1. 286. &*
Raii Hist. 836. Icon. Barr. ex Col. l. c.

377. *Thlaspidium Apulum*, spicatum *Inst. R. Herb. 215.* Jondraba Apula,
Alyssoides spicata Barr. Icon. 253. n. 1. & Col. part. 1. 285. Barr. Icon ex Col. l. c.

378. *Thlaspidium hirsutum*, calyce floris auriculato *Inst. R. Herb. 214.* Jon-
draba *Alyssoides*, spicata, lutea, major *Barr. Icon. 1219.* *Leucoium monta-*
num, flore pedato *Col. part. 2. 61.* Jondraba *Alyssoides*, lutea, angustifolia
Barr. Icon. 230. Prior *Icon. Barr. ex Col. l. c.*

379. *Thlaspidium montanum*, angustifolium, glabrum *Inst. R. Herb. 215.*
Jonthlaspi Alyssoides, angustifolium, luteum *Barr. Icon. 254.* Caules huic
palmares & pedales, subrubescences, in summo ramosi, folia angusta oblon-
ga, in extremo obtusa & latiora, scabra, leviterque pilis hispida. Flores non
vidit Barr. In Montibus Umbriæ & Aprutii provenit.

380. *Thlaspidium Anchusæ folio Inst. R. Herb. 215.* *Thlaspi biscutellatum*,
luteum, *Anchusæ folio Barr. Icon. 841. & Bocc. Mus. part. 2. 122. Tab. 167.*
Foliis donatur *Anchusæ*, surrectis, tres uncias longis, sextam uncia partem
vix latis, hispidis, subincanis, è mediocri radice erumpentibus. Ex eorum
medio caulis surgit rectus, nudus, glaber, teres, tenuis, semipalmaris, florum
luteorum thyrsus sustinens, quibus evanidis succedunt utriculi gemini, cir-
culares, discosi, plani, semen compressum & discosum includentes. In Hispa-
niâ crescit.



381. *Cochlearia Aremorica Barr. Icon. 1305. n. 1. H. R. Par. Thlaspi hede-*
raceum

raceum. *I. B.* 2. 933. Cochleariæ vires vide in Hist. Raii 822. Icon. Barr. ex *I. Bauh.* l. c.



382. *Lepidium humile*, incanum, arvense *Inst. R. Herb.* 216. *Draba* seu *Arabis latifolia*, flore albo *Barr. Icon.* 213. n. 1. *Draba angustifolia*, *Babylonica*, flore albo *Barr. Icon.* 213. n. 2. *Draba multis*, flore albo *I. B.* 2. 939. & *Raii Hist.* 821.



383. *Bursa Pastoris montana*, *Globulariæ folio* *Inst. R. Herb.* 216. *Thlaspi subrotundo folio*, utriculo gruinali *Barr. Icon.* 1305. n. 11. *Thlaspi foliis Globulariæ* *I. B.* 2. 926.



384. *Alysson fruticosum*, incanum *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi incanum*, *Mechliniense Corvini*, flore albo *Barr. Icon.* 893. n. 11. *Thlaspi Mechliniense* *Lob. Icon.* 217.

385. *Alysson fruticosum*, aculeatum *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi spinosum*, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 808. *Thlaspi fruticosum*, spinosum *C. B. Pin.* 108. & *Raii Hist.* 824.

386. *Alysson Veronicæ folio* *Inst. R. Herb.* 217. *Myagroides subrotundis ferratisque foliis*, flore albo *Barr. Icon.* 816. *Draba minima* *Col. part.* 1. 272.

387. *Alysson segetum*, foliis auriculatis, acutis, fructu majori *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi Anglicum*, flore albido *Corvini* *Barr. Icon.* 894. n. 1. *Myagrum Turcicum* *I. B.* 2. 893.

388. *Alysson maritimum* *Inst. R. Herb.* 217. *Thlaspi montanum*, perenne, flore albo *Barr. Icon.* 844. *Thlaspi leucoii sylvestris facie*, flore albo *Ejusd. Icon.* 907. n. 1. *Nasturtium vel Thlaspi maritimum* *I. B.* 2. 927. & *Raii Hist.* 829.

389. *Alysson incanum*, *Thymi folio*, flore albo, *Hispanicum*. *Thlaspi Thymi folio*, utriculo subrotundo, mucronato, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 807. & *Bocc. Mus. part.* 2. 75. *Tab.* 62. *Thlaspi Thymi folio*, rotundo utriculo, flore albo *Barr. Icon.* 907. n. 11. *Crassiusculâ radice*, lignosâ, scabrâ, nodosâ, compactâ, pallidâ, fibris capillatâ nonnullis & brevi; è quâ plures exeunt lignosi, tortuosi surculi, ramosi, qui in alterum annum perdurant, novosque ex se emittunt è lateribus surculos quos folia parva, oblonga, incana, pubescentia, vix Thymo majora ejusque formâ, præsertim quæ juxta radicem germinant, alterno situ vestiunt. Flores in summis cauliculis vix Icone majoribus spicatim assurgunt exigui, albi, quadrifolii; his succedunt pericarpia rotunda, mucronata, compressa, & bivalvia, quæ septo intermedio in duo loculamenta dividuntur, semine plano, rufo & rotundo referta. Tota planta canescit pusilla, lignosa & perennis. Hujus plantæ duas damus figuras, primam elatiorem cum pericarpis, alteram minorem vix florentem. Habet ortum in Hispaniâ. Valentia Madritum eunti, *Pajoso* inter & urbem *Rechen* occurrat.

390. *Alysson incanum*, fruticosum, erectum, *Hispanicum*. *Thlaspi fruticans*, erectum, angustifolium, utriculis subrotundis, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 810. & *Bocc. Mus. part.* 2. 78. *Tab.* 67. Foliis superiori hoc simillimum, sed nonnihil longiusculis, quæ in cauliculis surrectis firmisque rara & alterna incanâque pubent lanugine. Cauliculi virides, glabri, in spicam florum & seminum desinunt. Flores albi, tetrapetali, quibus succedunt utriculi mucronati superius concavi, inferius convexi, in duo loculamenta septo intermedio divisi, semina ut in superiori. Tota fruticat planta incanis

canis foliis, lignosis & subvirentibus cauliculis, radice crassiusculâ, lignosâ & subfuscâ; è quâ, cauliculis imis in parte superiore, hyemis frigore corruptis, nova sequenti anno germina exeunt. In Hispaniâ nascitur.

391. Alysson incanum, supinum, brevioribus foliis. Thlaspi supinum, minoribus foliis, congener Hispanico *Barr. Icon. 809*. Superiore congener & simillimum, at non fruticat, supinis repandis surrectisque subinde cauliculis lutescentibus seu rufis, foliisque paulò brevioribus, tomentosis & nivei candoris discrepat. Radix huic longa, tenuis, rufescens, ramosa, perennis, nec suis cauliculis brevior. Cauliculi paulò habitiores, crassiores, sparsim & inæqualiter nivei & tomento ita pubentes, ut glabri & rufescentes minus appareant.

392. Alysson incanum, luteum, serpilli folio, minus *Inst. R. Herb. 217*. Thlaspi Alysson incanum, luteum, lunato utriculo *Barr. Icon. 908. n. 11. & 912. n. 11*. Thlaspi Alysson dictum, campestre, minus *C. B. Pin. 107. & Rati Hist. 829*.

393. Alysson incanum, Polygoni folio. Thlaspi minus, incanum, flore albo, subrotundo utriculo *Barr. Icon. 912. n. 1*. Radice pollet mediocri, lignosâ, subflavâ, è quâ multi surgunt erecti, firmi & lignosi cauliculi palmi dodrantem alti, ab imo foliis Lini, sed longè minoribus vestiti, iisque incanis, tomentosis, vix dodrantem uncie longis, præangustis, acutis; quorum adulatorum ima florescunt. Cauliculi in longam spicam abeunt. Flores albi, exigui, tetrapetali quibus succedunt pericarpia subrotunda seu ovata & mucronata, in duo loculamenta divisa, maturo semine faciliè decidentia. Tota planta vix quatuor uncias alta dum flores edit, post exanthemum ad sex uncias crescit. Sapor illi subacris. Ab Alyssò maritimo non multum distat, si non idem.

394. Alysson cineritium, flore albo. Thlaspi linifolium, minus, cineritium, flore albo *Barr. Icon. 908. n. 1*. In cespitis formam humi se spargit cauliculis multis luxurians supinis villosis, ramosis, subinde in se collectis & erectis, quos vestiunt folia Lini acuta, alterna, glabra, virentia, carnosâ, unciam vix longiora, & quintam uncie partem lata. Cauliculorum ramorumque summa Thyrsi florum alborum ornantur, qui subinde longam in spicam pericarpiorum acutorum protenduntur, ubi defloruerunt. Perennis est planta, cujus radix alba, tenuis & multifida. Semen rufum, ovatum & saporis subacris. Maio flores fructusque ferebat Terracinæ viâ quâ itur Piperinum, colles inter & paludem.

395. Alysson Lini folio, flore albo, virescens. Thlaspi Linifolium, minus, flore albo, virescens *Barr. Icon. 911. n. 1*. Radicem habet subgilvam, mediocriter crassam, paucis fibris capillatam, plures furculos emittentem virentes quibus hærent folia Lini angusta, alterna, acuta, unciam quandoque longa, vix octavam uncie partem lata, subvillosa, nonnihil canescentia, tenera & mollia. Flores exigui, albi in comam congesti, quibus succedunt pericarpia, plana, semine plano, rufescente, exiguo referta. In plantâ siccâ nullus manifestus sapor. In Hispaniâ collegit *Barr.*



396. Alyssoides Creticum, incanum. Alyssum Creticum, incanum, orbiculatis siliquis *Barr. Icon. 862*. Alyssum incanum, erectum, siliquâ utriculatâ *Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 66*. Ex Insulâ Cerigo ramus siccus ad Barrelierum missus est, in quo tamen nec floris seminisve formam observare potuit.

397. Alyssoides subrotundo folio & serrato. Thlaspi aureo leucii flore, sylvestre, rotundifolium, majus *Barr. Icon 883*. Hujus & sequentis descriptionem non invenio.

398. Alyssoides subrotundo folio, Leucii flore. Thlaspi luteo Leucii flore

F

Barr.

Barr. Icon. 842. & Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 68. Boccone nomen hujus ad sequentem transtulit.

399. Alyssoides montanum, luteum, subrotundo Thlaspi utriculo. Jonthlaspi seu Leucoium montanum, luteum, subrotundo Thlaspi utriculo *Barr. Icon. 850. & Bocc. Mus. part. 2. 78. Tab. 67.* *Leucoii vulgaris lutei* radicem & surculos habet ramosos, quorum qui annotini, plures emittunt ramos tortuosos foliis alternis vestitos oblongis, acutis, semuncia angustioribus, duas uncias & amplius longis, in exortu præangustis, è cæsis virentibus; glabris, lævibus quoque, in summo frondosam laramque in umbellam se explicant. Ex hac foliorum umbellâ primo vere novitii emergunt caules qui aliis foliis, sed brevioribus & ad basim latioribus, rarioribus, arrectis, laxa per intervalla induti desinunt in comam florum luteorum & *Leucoii vulgaris* formâ, quibus succedunt pericarpia adeò adhuc tenera ut formam semenque exactè observare non potuerim. Plantæ sapor glutinosus & subacris. Sub finem Maii florebat in monte Gualdo in Umbriâ.



400. Lunaria Leucoii folio, flore albo, Italica. Thlaspi album, Leucoii flore & folio, Italicum *Barr. Icon. 911. n. 11.* Surculosa & ramosa est ad pedis cubitque altitudinem caules attollens, sæpius tamen infirmos & in terram inclinatos. Folia ejus *Leucoii hortensis*, sed minora longè & vix tres uncias longa, quadrantem uncia lata, tenuia, mollia, è viridi subincana, mollique pube ut & cauliculi, lanuginosa. Flores summis in caulibus in subrotundam umbellam congesti, albi sunt & formâ *Leucoii albi hortensis*, sed duplo minores, & calyce virenti comprehensi. Floribus succedunt oblongi lanceolati, mucronati utriculi plani & compressi, semunciam ferè longi, cum matura sunt semina, sextâ uncia parte latiores, sæpè tumidis lateribus. Semina in singulis utriculis fena duplici serie disposita, eaque exigua, rotunda, plana & rufescentia. In Campaniâ Romanâ locis incultis provenit.



401. Leucoium montanum, angustifolium, pallido flore *Barr. Icon. 884.* Leucoium angustifolium, Alpinum, flore sulfureo *H. R. Par. A* *Leucoia luteo vulgari* discrepat foliis multò longioribus & angustioribus; tum etiam flore sulfureo & pallido. Circa Gratianopolim reperitur in montibus. Pictor flores pessimè, & ad libinem pinxit.

402. Leucoium luteum, minus, fruticans *Barr. Icon. 1228.*

403. Leucoium Hesperidis folio *Inst. R. Herb. 221.* Brassica sylvestris, albedo flore, nutante filiquâ *Barr. Icon. 353.* Turrata major Plateau *Clus. Hist. cxxvj.*

404. Leucoium minus, marinum, subrotundo folio, purpureum *Barr. Icon. 1020.* Hujus descriptionem non invenio. Leucoii vires vide in *Hist. Raii 782.*



405. Hesperis sylvestris, inodora *C. B. Pin. 202.* Cacalia verior, Urticæ folio, purpurascens Leucoii flore *Barr. Icon. 357.* *La Juliane qui n'a point d'odeur.* *Cacalia* congener est; sed folia ejus glabra, oblonga, Urticæ formâ, longiusculo donata pediculo juxta quem sinuosa sunt, in extremo acuta, per oras serrata, multis rotundis & implexis venis exarata, tenuissimæ texturæ, in plantâ siccâ pellucida, quò altius surgunt & umbellam versùs ascendunt angustiora. Summus caulis rubescit, leviter pubescens, in umbellam florum desinens dilutè purpureorum, quibus succedunt filiquæ rectæ, purpureæ, fusiformes, oblongæ, utrinque tenues, in medio nonnihil ventricosæ, exiguo onustæ capitello & tenui semine foetæ. Radix ejus ut aliis congeneribus, crassiuscula

crassiuscula & fibris dense capillata. In montibus Apenninis collegit Barr.

406. *Hesperis maritima*, supina, exigua *Inst. R. Herb.* 223. *Leucoium minus*, flore violaceo *Barr. Icon.* 1127. *Leucoium marinum*, parvum, folio virente crassiusculo *I. B.* 2. 877.

407. *Hesperis Sicula*, frutescens, filiquâ tricuspidi *Inst. R. Herb.* 223. *Leucoium minus*, fruticans, purpureum, *Alyssi foliis* *Barr. Icon.* 804. *Leucoium minus*, fruticans, purpureum, montanum, crucigerum *Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. III.* Fruticosa est cujus radix perennis, cauliculi lignosi, plures ab eâdem exorti radice, recti, firmi, crassi, teretes, rotundi, albâ lanugine puberuli, dodrantes, crebris foliis vestiti, Lini formâ seu potius *Alyssi marini Clusii*, semunciam longis, angustis, in extremo rotundis, alternis, nullo pediculo adnatis, niveo pariter tomento pubescentibus, arrectis, crassiusculis, nullisque nervis, nisi mediâ lineâ eâque vix eminente striatis & sulcatis. Caulium ramorumque extrema plures umbellatim congesti ornant flores tetrapetalo purpurei, oblongo calyce & brevi pediculo fulti.

408. *Hesperis Lavandulæ folio*, obsoleto flore. *Leucoium minus*, *Lavandulæ folio*, obsoleto flore, angustifolium *Barr. Icon.* 803. & *Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. III.* Dodrantis pariter & tenera, cinereâ lanugine obducitur. Folia ejus angusta, acuta, longa, integra, *Lavandulæ* figurâ, sed duplo angustiora & tenuiora, unciam vix longa & alterna. Flores obsoletè rubent, petalisque constant angustis. In montibus supra *Orgon* oppidum in Galloprovinciâ occurrit.

409. *Hesperis purpureo flore*, hamatis foliis. *Leucoium minus*, purpureum, hamatis foliis *Barr. Icon.* 1019. A superiori distinguitur foliis utrinque uncinatis & flore purpureo. Varietas sequentis.

410. *Hesperis Sicula*, *Coronopi folio*, filiquâ tricuspidi *Inst. R. Herb.* 223. *Leucoium minus*, purpureum, angustifolium, longiori folio *Barr. Icon.* 999. n. 1. *Leucoium montanum*, crucigerum, *Coronopi folio* *Bocc. Mus. part. 2. 147. Tab. III.* Folia huic longiora, latiora & tribus aut quatuor dentibus sinuosa, instar *Cyani* aut *Leucoii maritimi majoris*.

411. *Hesperis altera Coronopi folio* breviora. *Leucoium minus*, breviori folio, obsoleto flore *Barr. Icon.* 999. n. 11. Superioris varietas. Folia breviora, angustiora & paucioribus dentibus serrata. Flores obsoletè purpurascunt.

412. *Hesperis Hispanica*, angustifolia, luteo flore. *Leucoium minus*, angustifolium, luteum, *Hispanicum* *Barr. Icon.* 1000. & *Bocc. Mus. part. 2. 148. Tab. III.* Tenui & albicante ex radice decem aut duodecim edit folia ferè capillacea, unciam aut fescunciam longa, tenuia, glabra, & virentia; è quorum medio surgit cauliculus rectus, striatus, glaber, semipalmaris, raris foliis alternis situ vestitus. Flores in summo fert umbellæ in modum, complures, congestos, leucoideos, quibus succedunt filiquæ quarum semen non vidi.



413. *Turritis vulgaris*, ramosa *Inst. R. Herb.* 224. *Draba angustifolia*, major *Barr. Icon.* 270. *Draba angustifolia*, media & minima *ejusdem Icon.* 269. n. 1. & 11. *Bursa pastoris*, sive *Pilosella filiquosa* *I. B.* 870. & *Raii Hist.* 800.

414. *Turritis annua*, verna, flore purpurascente *Inst. R. Herb.* 224. *Leucoium minus*, rotundifolium, flore purpureo; *Chamaeleucoium rotundifolium*, minus, flore purpureo *Barr. Icon.* 876. *Leucoium maritimum*, latifolium, flore caruleo purpurante *I. B.* 2. 880. & *Raii Hist.* 781.

415. *Turritis annua*, *Bellidis folio* flore purpurascente. *Leucoium purpureum*, *Bellidis folio*, majus *Barr. Icon.* 875.



416. *Cardamine annua*, exiguo flore *Inst. R. Herb.* 224. *Sisymbrium montanum*,
F ij

tanum, tenuifolium, flore muscoso purpurascens *Barr. Icon. 155*. Sifymbrii Cardamine species quædam insipida *I. B. 2. 886*. & *Raii Hist. 815*. Umbrosis humidisque locis montium Apenninorum & Trifulti in Umbriâ gaudet.

417. Cardamine glabra, Chelidonii folio *Inst. R. Herb. 225*. Sifymbrium montanum, latifolium, flore purpureo *Barr. Icon. 156*.

418. Cardamine sylvestris, minor, Italica *Barr. Icon. 455*. Cardamine iv. Dalechampii *Lugd. 659*. Nasturtium aquaticum, minus *C. B. Pin. 104*. & *Raii Hist. 815*.

419. Cardamine aquatica, Cotyledonoides flore albo *Barr. Icon. 1163*. Cardamine montana, Afari folio *Inst. R. Herb. 225*. Nasturtium montanum, Afari foliis *Par. Bat.* In Pomptinis paludibus Latii non longè à *sermonetta* ad radices collis in aquis limpidis frequens est, necnon juxta Pontem Terracinæ. Nos in Alpibus & in valle Barfilionensi vidimus.



420. Eruca cærulea, in arenosis crescens *C. B. Prodr. 40*. Erysimum tertium, præcox, flore carneo *Barr. Icon. 196*.

421. Eruca viminea, Iberidis folio, luteo flore *Barr. Icon. 131*. Eruca minimo flore, Monspelienfis *I. B. 2. 862*. Juxta Tyberis margines eundo à ponte Milvio ad portam à *Populo* dictam Romæ provenit, necnon supra muros circa Parisios.

422. Eruca sylvestris, minor, lutea, Burfæ pastoris folio, Italica *Barr. Icon. 1016*. *La Roquette sauvage, à feuilles du Tabouret*. Descriptionem non reperi.

Sequentes imperfectæ sunt & difficile ad sua genera referri possunt, quia tamen Erucae nomine indigitantur, ad calcem Erucarum posuimus.



423. Eruca minima, hirsuta, floribus albis. Erucula hirsuta, floribus albis *Barr. Icon. 195. n. 1*. & *Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 80*. Ex radice crassiusculâ, lignosâ, melinâ & in capita divisâ folia oriuntur tenuiter & profundè incisâ, Echii modò hispida, numerosa, vix biuncialia; cauliculus è foliorum medio surgit glaber, rotundus, vix major quàm in figurâ, flores sustinens albos. Pictor perperam fecit caulem hirsutum. Inter *Chinchilla* & *Aiora* oppidum in confiniis Regni Valentini crescit.

424. Eruca minima, flore rubello. Eruca flore rubello, Hispanica *Barr. Icon. 195. n. 2*. & *Bocc. Mus. part. 2. 85. Tab. 80*. Radix illi tenuis, longa & fibrosa quæ promit folia pingua, vix uncialia, & sextâ unciae parte latiora, per oras leviter dentata & nonnihil sinuosa. Ex eorum medio cauliculus surgit tenuis, vix uncialis, quandoque folio uno aut altero vestitus & qui fert florem singularem, parvum & purpureum. In amplâ & maritimâ planitie *la deçà* dictâ Valentiam inter & mare reperiebat *Barr.*

425. Eruca maxima, Canadensis, lutea *Barr. Icon. 706*. & *Corn. 15. Icon. Barr. ex Corn. l. c.*

426. Eruca minor, Bulbi Napique radice, filiquâ rotundâ *Barr. Icon. 1198. n. 1. quid?*

427. Eruca minima, oblongâ & hastatâ filiquâ *Barr. Icon. 1198. n. 11. quid?* Erucae vires vide in *Hist. Raii 806*.



428. Sinapi Hispanicum, pumilum, album *Inst. R. Herb. 227*. Eruca sylvestris, flore albo, Italica *Barr. Icon. 132*. Annua est planta, cujus radix lignosa, albicans & contorta; Folia *Erucae hortensis*, sed nonnihil hispida & scabra, in profundiores acutioresque lacinias incisâ. Caules erecti, ramosi, minoribus foliis vestiti, hirsuti. Flores promit albos, rariùs rubentes, qui expansi semunciam ferè ampli, quibus succedunt filiquæ longæ, teretes, in summo

mo tenui capitello ornata. Sapore prædita est acriusculo & ad Erucam accedente. Floret Martio & Aprili in vineis Campaniæ Romanæ & per vias frequens. Sinapi vires vide in Hist. Raii 803.



429. Hypecoon tenuiore folio *Inst. R. Herb.* 230. Hypecoum Clusii, tenuifolium, flore pallido *Barr. Icon.* 352. Hypecoi altera species *C. B. Pin.* 172. & *Raii. Hist.* 1328. In agro Aquilexientiensi provenit.



430. Sinapistrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo minus, non spinosum *H. L. Bat.* Lupinus Arabicus Ponæ, Mozambex di Angola Herbariorum *Barr. Icon.* 1235. *Pon. Bald. Ital.* 102. & *Raii Hist.* 859.

431. Sinapistrum Lusitanicum, triphyllum, flore rubro, filiquis corniculatis *Inst. R. Herb.* 232. Trifolium filiquosum, flore violaceo, Lusitanicum *Barr. Icon.* 866. *Raii Hist.* 860.

432. Sinapistrum peregrinum, triphyllum, flore luteo. Trifolium peregrinum, alterum, flore luteo *Barr. Icon.* 865.

433. Sinapistrum Canadense, triphyllum, filiquâ crassiore. Trifolium Asphaltites, Canadense, filiquosum *Barr. Icon.* 914. Trifolium Asphaltion, Canadense *Corn.* 131. Lotus sylvestris ex Codice Cæsareo *Dod. Pempt.* 572. *Icon. Barr. ex Corn.* l. c.



434. Herba Paris Canadensis, bulbosa, triphylla. Solanum triphyllum, bulbosum Canadense *Barr. Icon.* 259. & *Corn.* 167. *Icon. Barr. ex Corn.* l. c.



435. Amaranthus major, purpureus, crispis paniculis, semine rufo *Barr. Icon.* 658. *Amarante.*

436. Amaranthus major, incurvâ & obsoletè rubrâ paniculâ, semine albo *Barr. Icon.* 657.

437. Amaranthus major, coccineus, sparsis & longioribus thyrsi flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 642.

438. Amaranthus purpureus, crassioribus setis, nutante crispâ Jubâ, semine nigro *Barr. Icon.* 641.

439. Amaranthus æstivus, majoribus, coccineis nutantibusque flagellis, semine pallido *Barr. Icon.* 659.

440. Amaranthus major, purpuro-violaceus, erectis congestisque spicæ flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 649.

441. Amaranthus major, purpuro-violaceus, tenuibus, transversis spicarum flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 650.

442. Amaranthus major, virentibus spicarum paniculis, semine nigro *Barr. Icon.* 648.

443. Amaranthus tricolore folio, è viridi pallidis flosculis *Barr. Icon.* 647. *Amaranthus tricolor Lob. Icon.* 252.

444. Amaranthus purpuro-violaceus, tenuibus setis, nutante & crispâ jubâ, semine nigro *Barr. Icon.* 645.

445. Amaranthus coccineus, thyrsoides, semine nigro *Barr. Icon.* 646.

446. Amaranthus ferotinus, major, purpuro-violaceus, tenuioribus spicis & flagellis, semine nigro *Barr. Icon.* 640.

447. Amaranthus ferotinus, major, purpureus, oblongâ sparsâque spicâ, semine nigro *Barr. Icon.* 639.

448. Amaranthus major, præcox, nutantibus, roseis flagellis, semine carneo *Barr. Icon.* 664.

449. *Amaranthus major*, serotinus, arborefcens, nutantibus, roseis flagellis, semine carneo *Barr. Icon. 663.*
450. *Amaranthus major*, præcox, crassâ congestâ & coccineâ spicâ, semine albo *Barr. Icon. 662.*
451. *Amaranthus serotinus*, medius; purpureâ, crassâ, congestâque spicâ, semine pallido *Barr. Icon. 661.*
452. *Amaranthus major*, purpureus, rarioribus thyrsorum flagellis, semine nigro *Barr. Icon. 677.*
453. *Amaranthus præcox*, incurvis, crassioribus, coccineisque flagellis, semine albo *Barr. Icon. 660.*
454. *Amaranthus præcox*, minor, coccineis, erectis flagellis, semine albo *Barr. Icon. 678.*
455. *Amaranthus minor*, coccineus, paniculâ tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ *Barr. Icon. 506.*
456. *Amaranthus minor*, pallidus, paniculâ tumidiore, singulari, spicatâ, cristatâ *Barr. Icon. 505.*
457. *Amaranthus minor*, aureus, pyramidalis, flagellis hispidis, crispis & cristatis *Barr. Icon. 476.*
458. *Amaranthus minor*, luteo-paleaceus, pyramidalis, flagellis erectioribus, cristatis *Barr. Icon. 475.*
459. *Amaranthus minor*, aureus, latâ & cristatâ paniculâ *Barr. Icon. 507.*
460. *Amaranthus minor*, coccineo-purpureus, latâ cristatâque in globum paniculâ *Barr. Icon. 508.*
461. *Amaranthus minor*, purpureo-violaceus, amplâ, latâ, globosâ, crispâ & cristatâ paniculâ *Barr. Icon. 478.*
462. *Amaranthus minor*, luteo-purpureus, pyramidalis, longis, sparsis & cristatis flagellis *Barr. Icon. 477.*
463. *Amaranthus minor*, simplici paniculâ, semine nigro *Barr. Icon. 643.*
464. *Amaranthus minor*, coccineus, simplici & nutante paniculâ, semine albo *Barr. Icon. 644.*
465. *Amaranthus minor*, serotinus, obsoletè rubente spicâ, semine nigro *Barr. Icon. 671.*
466. *Amaranthus minor*, atro purpureus, cristatis spicis *Barr. Icon. 672.*
467. *Amaranthus minor*, coccineus, sparsis thyrsi flagellis, semine rufo *Barr. Icon. 653.*
468. *Amaranthus minor*, serotinus, purpureo-violaceus, crassioribus & rarioribus spicæ flagellis, semine nigro *Barr. Icon. 654.*
469. *Amaranthus minor*, violaceo-purpureus, brevi, congestâ acutâ spicâ *Barr. Icon. 679.*
470. *Amaranthus viridi* spicâ, Indicus, minor *Barr. Icon. 680.*
471. *Amaranthus minor*, spicâ singulari, albo-purpureâ luteâque, lunatis circum caulem foliis *Barr. Icon. 1195. & Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 66.*
- Horum denominatio, qualem dedit Barr. non visa est egere longiori descriptione, quippequi in Icone satis eleganter distincti sint. Præterea genus istud ita formis variat, ut singuli vix possint ad species ab authoribus enumeratas referri.



472. *Polygoni* vel *Linifolia* per terram sparsa, flore scorpioidis *I. B. 3. 379. Turnef. Hist. Plant. circa Paris. Nascent. 127. Anthyllis Linifolia*, flore albo, *Polygonoides Barr. Icon. 532. Circa Parisios frequens.*



473. *Papaver Rheas*, flore carneo pleno *Barr. Icon. 763. Cocquelicoc à fleur double & couleur de chair. Papaveris Rhœados vires vide in Hist. Raii 855.*

474. Papaver Rheas, integro folio, Hispanicum *Barr. Icon. 1191. & Bocc. Mus. part. 2. 77. Tab. 65.* Papaver ertaticum, foliis non dissectis. *Inst. R. Herb. 239.*

475. Papaver Alpinum, saxatile, Coriandri folio *Inst. R. Herb. 239.* Argemone lutea Ponæ *Barr. Icon. 764. & Pon. Bald. Ital. 100.* Icon. *Barr. ex Pon. l. c.* In Monte Ventoso vulgò *le Mont Ventou*, in ascensu ad facellum crescit.



476. Argemone Mexicana *Inst. R. Herb. 239.* Papaver spinosum, flore luteo *Barr. Icon. 1141.* Papaver spinosum *C. B. Prodr. 92. Le Pavot épineux.*



477. Granadilla Hispanis, Flos passionis Italici *Col. in Rech. 889.* Clematis trifolia, flore Melanthii clavato, Granadilla Monardi, Maracot Peruvianis *Barr. Icon. 1243. La fleur de la Passion.*



478. Alsine lotoides Sicula *Bocc. Rar. Plant. 21.* Portulaca Boetica, luteo flore, spuria, aquatica *Barr. Icon. 336.* Totâ Æstate & Autumno floret ad ripas *Quadalquivir* circa Hispalim.

479. Alsine Verna, glabra *Bot. Monsp.* Chamelinum gramineo seu acuto folio *Barr. Icon. 1165. n. 11.* Pusilla est planta Iconi ferè par. Flos ejus candidus, tetrapetalos, calyce ex albovirescente comprehensus; flori succedit utriculus ovatus, semine tenui ruffo & subrotundo foetus. In Italiâ occurrit Monspelii, Lugduni & circa Parisios provenit.

480. Alsine perennis, tenuifolia. Anthyllis Lychnoides, perenni radice *τεικοφυλλός* seu minor *Barr. Icon. 531.* Radicem habet perennem, lignosam, & fragilem, ex quâ septem aut octo surgunt cauliculi tenuissimi, erecti, glabri & nodosi, quorum singulis internodiis opposita, graminea, tenuissima & acuta insident folia. Summi cauliculi in ramos divisi sustinent flores albos, pentapetalos, calyce pariter pentapetalo & virescente comprehensos. Floribus succedunt utriculi plano & oblongo semine turgidi. A sinistris habes calycem cum flore depictum qualis microscopio conspicitur.

481. Alsine tenuifolia, flore albo, inverso, Hispanica. Anthyllis recta, trichophyllos, inverso flore albo, Hispanica *Barr. Icon. 533.* A superiori cauliculis albicantibus & tenui pube obsitis discrepat, tum etiam floribus pentapetalis, albis; deorsum sursumque reflexis: stamina quinque aurea suis apicibus onusta fundum floris occupant. Evanido flore calycis petala dimittuntur, ut utriculum semine foetum complectantur.

482. Alsine tenuifolia, minima, flore albo. Anthyllis trichophyllos, lychnites, minima, flore albo *Barr. Icon. 530.* Vix triuncialis est planta exili, albidâ, brevi & annuâ radice, è quâ plures assurgunt cauliculi tenuissimi, geniculati, nodosi, binis ex adverso nascentibus foliis ad singula internodia instructi, in summo comosi, floresque exiguos, albos edunt calyce comprehensos pentapetalo. Floribus decussis supersunt pericarpia subrotunda, pulverulento & exili semine turgida. Calycis & floris habes delineationem qualis ope microscopii videtur.

483. Alsine annua, seu minor, angustifolia, flore albo. Anthyllis lychnites, annua, seu minor, angustifolia, flore albo *Barr. Icon. 580.* Ex radice tenui, annuâ, albidâ & in multas fibras juxta partem inferiorem capillatâ cauliculos edit duodenos, aliquando plures, geniculatos, tenues, glabros, repandos & in summo ramosos, foliis instructos binis ex adverso nascentibus, capillaribus, latè virentibus, è quorum alis & extremis ramis flores singulares emergunt semunciali & capillari pediculo adnati, perexigui, pentapetali,

tali, albi, quibus tandem succedunt utriculi semine turgidi. Excisus à dextris ramulus calycis & fructus formam accuratiorē ad microscopium delineatam ostendit, à sinistris verò ramulus excisus nativæ est magnitudinis.

484. *Alfine* *Spergulae* facie, media *C. B. Pin. 251. Anthyllis Polygonoides, angustifolia Barr. Icon. 579.*

485. *Alfine* *maritima*, incana, minima. *Anthyllis Alfinefolia*, incana, marina, minima *Barr. Icon. 529.* Cauliculos hæc edit erectos, ad quatuor uncias, aut procumbentes, humifusos & serpentes, *Alfines* vel potius *Thymifoliis* binis ex adverso oppositis, utrinque acutis & brevi tenuique pediculo nixis vestitos. Flores albi, parvi, calycibus suis comprehensi, per caulium alas aut extrema sparguntur, quos pericarpia sequuntur exigua, oblonga, semine pulverulento & nigro turgida. Ad sinistram habes naturalem rami magnitudinem, cujus pars à dextris depingitur qualis videtur ope microscopii. Folia quandoque nonnihil majora sunt quàm in *Icone* depinguntur, & obscurè virent; albida villosa & lychnidea apparent.

486. *Alfine* *maritima*, minima, *Thymi folio*. *Polygonum maritimum*, minimum, *Thymifolio Barr. Icon. 559.* Longâ crassiusculâ, subfuscâ divaricatâque potitur radice, ex quâ furculi plurimi oriuntur, humi sparsi in circum, geniculati, tenues, crebris alternisque *Thymi foliis* ad singula internodia instructi; è quorum alis singulis singulares erumpunt flores adeò parvi ut visum fugiant, suo pedicello & calyce donati, albi, interdum etiam carnei, pentapetali, quorum petala integra sunt & subrotunda. Folia floresque magis congeruntur versus extremitates furculorum. Habes in *Icone* plantæ formam & magnitudinem naturalem. Ad latera juxta asteriscum folium & florem ut microscopio apparebant, appingi curavi. Infra *Ostia Tyberina* ad litus maris solo firmiore provenit.



487. *Ros* *solis minor*, seu *rotundifolius Barr. Icon. 251. n. 1. Ros* *solis folio subrotundo C. B. Pin. 354.*

488. *Ros* *solis major*, seu *longifolius Barr. Icon. 251. n. 11. Ros* *solis folio oblongo C. B. Pin. 357. Vires vide in Hist. Raii 1100.*



489. *Juncus* *cacumine reflexo*, major, paniculâ minore *Barr. Icon. 204. n. 11. Le Jonc.*

490. *Juncus* *cacumine reflexo*, minor, paniculâ majore *Barr. Icon. 204. n. 1.*

491. *Juncus* *repens*, ἀρροχῆρον, minor, botrioides *Barr. Icon. 114. n. 1. Juncus* *parvus*, cum pericarpis rotundis *I. B. quoad Iconem 2. 522.* Radice potitur *Scirpi* serpente, tenui, nigricante & multis fibris capillatâ, quæ tenues; in imo atrorubentes caules seorsim non simul congestos emittit sesquipedales, enodes, ad basim foliis junceis angustis, pedalibus, acutis, infirmâ tamen acie, è cœsio virentibus, eâ parte quâ caulem aspiciunt non nihil concavis & canaliculatis convolutis, in longam paniculam desinentes nutantem, racemosam, tenuibus, & rotundis pericarpis fusco phœniceis, vix *Brassicæ* semine majoribus gravem, nullo tamen folio paniculam superante. In pratis supra pontem *Milvium* ad dextram *Tyberis* collegit *Barr.*

492. *Juncus* *Sorghii capitulis*. Gramen junceum, *Sorghii capitulis. Barr. Icon. 747. n. 1.*

493. *Juncus* *Milii paniculâ*. Gramen junceum, *Milii paniculâ Barr. Icon. 747. n. 11.*

494. *Juncus* *maritimus*, *Sorghii paniculâ utriculatâ Barr. Icon. 203. n. 11. Juncus* *acutus capitulis Sorghii C. B. Pin. 11. Raii Hist. 1302. Hujus capita exprimi*

exprimi curavimus, quoniam utriculi semine minuto & anguloso, ac flavescente turgent. Inter Caricta littoris Ostiensis provenit.

495. Juncus palustris, humilior, erectus *Inst. R. Herb. 246.* Gramen Bufonium, erectum, latifolium *Barr. Icon. 263. n. 1.* Gramen Bufonium, erectum, angustifolium, majus *ejusdem Icon. 264.* Gramen Bufonium, erectum, angustifolium, minus *ejusdem Icon. 263. n. 11.* Holosteum Mathioli *Lob. Icon. 18.* Gramen nemorosum, caliculis paleaceis *C. B. Pin. 7. Raii Hist. 1309.* Plurimum ludit hic Juncus ratione loci, undè supinus, erectus, latifolius vel angustifolius crescit; quas variationes exprimit Barr.

496. Juncus palustris, humilior, repens *Inst. R. Herb. 246.* Gramen Bufonium, supinum, mollius seu umbellatum *Barr. Icon. 93.*

497. Juncus palustris, humilior, capsulis triangulis & glomeratis. Gramen Bufonium, glomeratis utriculis *Barr. Icon. 94.* Gramen Junceum, capsulis triangulis, minimum *Raii Hist. 1307.* Superioribus est congener, radices habet fibrosas, albidas, paulòque crassiores & longiores, ex quibus surgunt culmi nonnihil inclinati & supini, foliaque emergunt juncea, firma, angusta, acuta & in extremo nonnihil arcuata. Culmi binis aut tribus foliis uncialibus vestiti abeunt in umbellam trium aut quatuor radiorum inæqualis longitudinis. Ramos fulciunt folia supposita, quorum in alis & ad extrema ramulorum utriculi multi, atrorubentes in echinatum caput, Pisi magnitudine, glomerantur, mucronati, læves, & splendidi. In paludosis Tyberis, viâ Ostiensi, tertio ab urbe lapide, & circa pontem Milvium observavit Barr. Circa Parisios quoque crescit.

498. Juncus nemorosus, latifolius, major *Inst. R. Herb. 246.* Gramen hirsutum, angustifolium, perenne, Lini utriculis *Barr. Icon. 748. n. 11.* Gramen nemorum Dalechampii *Lugd. 429.* Holosteum *Math. edit. Valgrif. Ital. in fol. 1018. Lugd. 1188.* Radice nititur cespitosâ, perenni, fuscâ, fibrosâ & tenui, quæ folia promit angusta, sesquipalmum longa, pilis lanuginosis, oblongis, crispis & mollibus villosa, nec culmis breviora. Culmi sesquipalmes, rotundi, glabri desinunt in paniculam latè sparsam, cujus flores petalis sex stellatim ordinatis constant, utriculo rotundo, rufo semine turgido medium eorum occupante. Maturo semine decidunt petala hæc floris seu glumæ, & in tres lobos scinditur utriculus.

499. Juncus Graminis Cyperoidis radice, tenuifolius, elatior *Barr. Icon. 118. n. 1.*

500. Juncus Gramineus, Cyperi radice, rufâ & hirsutâ spicâ *Barr. Icon. 255. n. 11.* Utriusque descriptiones desunt.



501. Kali geniculatum, aphyllantes, gilvis paleaceisque flosculis, Hispanicum *Barr. Icon. 215.* Kali fruticosum, Hispanicum, Tamarisci folio *Inst. R. Herb. 247.* Hujus & sequentium descriptiones non invenio.

502. Kali vermiculatum, fruticans, minori folio, Hispanicum *Barr. Icon. 216.* Kali fruticosum, Hispanicum, Capillaceo folio villosa *Inst. R. Herb. 247. La Soude d'Espagne velue.*

503. Kali vermiculatum, Hispanicum, viride, fruticans *Barr. Icon. 206.*

504. Kali vermiculatum, Hispanicum, incanum, fruticans *Barr. Icon. 205.*

505. Kali Polygonoides, frutex polyspermon *Barr. Icon. 191. & Bocc. Mus. part. 2. 83. Tab. 73.*

506. Kali minus, tenuifolium, incanum, fruticosum, Siculum *Barr. Icon. 79.* Kali Siculum, lignosum, floribus membranaceis *Bocc. Rar. Plant. 59.* Polygonum fruticans, roseum, Thymi folio, Siculum *Barr. Icon. 1034. n. vj.* Ramos hosce duos accepit à P. Boccone. Priorem sine flore, posteriorem cum floribus.

507. Kali vermiculatum, albo & amplo Sedi rosei flore *Barr. Icon. 888.*
 Kali floridum, repens, Aizoides, Neapolitanum *Col. part. 2. 72.*
 508. Kali Molluginis folio, umbellatum *Barr. Icon. 120. & Bocc. Mus. part. 2. 167.* Caules edit palmares & pedales, lignosos, albidos & villosos, æqualiter in ramos oppositos dividuntur, densis vestiti foliis Molluginis, virentibus, nec semunciâ longioribus, crebro sed alterno situ verticillatim cauliculos ambientibus. Extrema caulium in umbellam desinunt, sed flores fluctusque jam deciderant, cum occurrit. Sapor ejus virosus est. In Hispaniâ invenit.



509. Helianthemum Alpinum, folio Pilosellæ minoris Fuchsi *I. B. 2. 18.* Cistus Oleæ folio, villosus, flore aureo, Italicus *Barr. Icon. 365.* Thymi in modum fruticat humilis & sesquipalmaris planta, radicibus & caudicibus lignosis, tortuosis, atrofuscis & ramosis, foliis luxurians crebris, congestis, Oleæ formâ, oppositis, longis, angustis, utrinque acutis, supernè è viridi cinereis, infernè incanis, villosis, & albidâ pube hispidis, uncialibus, tres lineas latis, sed in caule minoribus. Cauliculorum summa quinque aut sex flores aurei, pentapetali, quorum petala cordata sunt, comant, & quibus succedunt fructus tricapsulares. Tota planta longiusculâ canescit pube.
 510. Helianthemum Serpilli folio villosus, flore pallido, Italicus *Barr. Icon. 366.* Folia huic minora, breviora, minus hirsuta; flores minores, pallidi & per cauliculos inordinatè sparsi. Tota planta lignosa est & fruticosa, vixque quatuor aut quinque uncis altior.
 511. Helianthemum angusto Serpilli folio, villosus, flore aureo, Italicus *Barr. Icon. 488.* Cistus angusto Serpilli folio, villosus, flore aureo, Italicus *Barr. Icon. 488.* Lignosum fruticosumque istud cauliculos edit vix quinquunciales, tortuosos, foliis instructos Serpilli, sed angustioribus, per intervalla binis, & utrinque è cinereo virentibus, supernè tamen obscurioribus, & in summo quinis aut senis floribus glomeratis aureisque comosos. Tota planta villosa & hispida est nec minus, quàm prima species, licet obscurius virescat.
 512. Helianthemum folio Thymi incano *I. B. 2. 19. Raii Hist. 1016.* Chamæcistus incanus, Tragorigani folio, Hispanicus *Barr. Icon. 415.* Perennis est planta, vix suâ figurâ major, lignosa, furculosa, totaque canescens, Thymi modo & magnitudine implexa, ramis humifusis, repandis & sursum reflexis, quibus bina ex adverso, alternatim & geniculatim hærent folia *Tragorigani angustifolii*, hoc est quadrantem uncie longa, & vix lineam lata; In singulorum ramulorum extremis tres aut quatuor ad summum in comam congesti panduntur flores, quibus succedunt pericarpia globosa, trifida, maturo semine in tres dehiscentia cellulas.
 513. Helianthemum Thymi folio glabro *Inst. R. Herb. 249.* Chamæcistus angusto Thymi folio, Hispanicus *Barr. Icon. 416.* A superiori discrepat foliis glabris, læto virore nitentibus, brevioribus & Thymo longè angustioribus.
 514. Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum sparsum *I. B. 2. 18.* Chamæcistus brevi vermiculatoque folio, minor Hispanicus *Barr. Icon. 446.* Cistus minor, &c. *ejusd. Icon. 286.* Humifusa est planta & glabra, Hispaniæ, Italiæ Galliæque Narbonensis indigena. *Icon. Barr. bis repetita.*
 515. Helianthemum tenuifolium, glabrum, erectum, flore luteo *I. B. 2. 18. Raii Hist. 1015.* Chamæcistus luteus, vermiculato folio, major *Barr. Icon. 445.* Fruticosum est, furculique ejus erecti, ramosi, lignosi & teretes, quos alterna vestiunt folia virentia, vermiculata, crassiuscula, plana tamen, modò brevia, modò oblonga; Flores fert luteos, paucos, quorum fructus ut in aliis tricapsulares. Tota planta glabra est & perennis. Circa Eremum R. P. Augustin. propè Gratianopolim crescit, nec non in Italiâ & in Galliâ Narbonensi.

516. *Helianthemum Massiliense*, Coridis folio *Inst. R. Herb. 250*. Cistus Thymi folio, saxatilis, Italicus *Barr. Icon. 290*. Radix huic longa, lignosa, fusca & perennis: folia Thymo longiora, inodora, subcinerea, & præangusta. Flores aurei, terni aut quaterni summis ramulis innascentes, calycibus virentibus & subhispidis comprehensi. Fructus subrotundi & mucronati semine tenui turgebant. Tota planta Thymo ferè similis. Junio florebat in maritimis Arcis Ostiensis, locis saxosis & arenosis. Massiliæ ad radices montis *Redon* provenit.

517. *Helianthemum Thymi folio*, luteum, majus. *Chamæcistus luteus*, Thymi folio, *Polyanthos*, seu major *Barr. Icon. 443*. Crebra fert folia, quorum alia majora, longiora, quadrantem unciae ut plurimum longa, Thymo tenuiora & pubescentia; surculi erecti ramosi, lignosi & brevi lanugine tecti flores ferunt in summo luteos, pediculo oblongo insidentes, plures & laxo satis ordine sparsos. Fructus tricapsulares: semen subrufum & Milio minus ac tenuius. Radicem habet lignosam & tortuosam.

518. *Helianthemum Thymi folio*, luteum, minus. *Chamæcistus luteus*, Thymi folio *ὀλίπανθος* seu minor *Barr. Icon. 444*. Omnibus suis partibus superiori minus est. Folia duplò minora & breviora; flores modò singulares, modò bini aut terni. Pumila est planta, radices tamen crassas lignosas & tortuosas habens.

519. *Helianthemum Thymifolium*, flore rubello, Hispanicum. *Chamæcistus mas*, flore rubello, Thymi foliis *Barr. Icon. 328*. Surculos edit erectos, ramosos, lignosos, breves, vix palmi quadrante altiores, incanos, densis & alternis vestitos foliis Thymi; id est quadrantem unciae longis, qui in summo flores tres aut quatuor rubellos sustinent. Hæc planta Hispaniæ indigena est.

520. *Helianthemum luteum*, rugosis foliis, Hispanicum. *Chamæcistus luteus*, toroso folio, Hispanicus *Barr. Icon. 439*. *Bocc. Mus. part. 2. Tab. 74*. Lignosum & humile est, ramosum, crebris foliis oblongis, angustis, acutis, supernè ad nervum usque convolutis oris, quasi vermicularis, & contortis funium toris constarent. Flores & fructus ut in aliis.

521. *Helianthemum luteum*, Thymi durioris folio. *Chamæcistus luteus*, Thymi durioris folio *Barr. Icon. 441*. Figurâ non est major, fruticans cujus surculi in tenues lignososque ramos dividuntur *Thymique durioris* foliis oppositis binis rarisque vestiantur. Flores lutei, numerosi latè se spargunt.

522. *Helianthemum luteum*, imis foliis Serpilli. *Chamæcistus luteus*, imis Serpilli foliis *Barr. Icon. 440*. Cauliculi hujus recti, teretes, tenui albescunt lanugine. Ima folia Serpilli, latiuscula, nonnihil longiora, acuta, supernè nigricantia, infernè incana; superiora verò longiora, unciam vix longa, & lineam lata, *Rorismarini* foliis æmula ex quorum alis alia minora angustissima acutaque prorumpunt. Flores fert in summo cauliculorum luteos, quibus succedunt pericarpia tricapsularia seminibus minutis foeta.

523. *Helianthemum luteum*, imis Thymi foliis. *Chamæcistus luteus*, imis Thymi foliis *Barr. Icon. 442*. Superiори consimile, sed incanâ magis albescit lanugine. Folia verò ima Thymo vulgari angustiora, nonnihil longiora, superiora verò præcedentis foliis paria, *Lavandulæ* aut *Rorismarini* formâ, minora tamen & angustiora. Flores & fructus ut in superiori.

524. *Helianthemum Thymi folio*, flore ferrugineo. Cistus minor, Thymi folio, flore ferrugineo *Barr. Icon. 285*. Supina edit virgulta quæ sursum se reflectunt, pluribusque divisa ramulis lignosis, quibus viridia, glabra, alterna, *Thymique* folia alligantur, & in extremis enascuntur flores vinosi planè & & eleganter rubentes. In colle sabuloso prope pontem *Milvium* observavit *Barr.* Nos in Comitatu *Niciensi* circa oppidulum vulgò *la Tour*.

525. *Helianthemum Hispanicum*, *Halimi folio* amplissimo, incano & nervoso *Inst. R. Herb. 250*. Cistus *Halimi folio*, flore luteo, amplo, maximus,

Hispanicus *Barr. Icon. 292*. Frutex est sex cubitos & amplius altus, lignosus, per ramos binis & oppositis foliis vestitus, quàm in majore Halimo majoribus, longioribus, molli brevique lanugine incanis, semunciam longis, drantem uncia latis, imâ parte & juxta exortum rotundis, in processu longioribus, & in acumen desinentibus, nullo ferè pediculo adnatis, venis secundum longitudinem, maximè circum oras ductis, striatis. Flores in extremis ramis plures, uncia ampliores, lutei, molles & delicates enascuntur, qui citò evanescunt. Maio mense florebat in montibus dictis *Serra Morrena*, qui Boeticam à Castiliâ disjungunt. Ibique variae Cisti & Helianthemi species proveniunt.

526. Helianthemum Halimi folio, flore luteo, majore, Italicum. Cistus Halimi folio, flore luteo majore, Italicus *Barr. Icon. 291*. Superiori *Hispanico* frutex est minor, trës aut quatuor cubitos tantum altus. Folia ejus utrinque acuta & minora quàm in *Hispanico*, ut & flores. In littore maris juxta Terracinam, viâ quâ itur ad Divum Felicem densè ramosum hunc fruticem observabat Barr.

527. Helianthemum, Halimi minoris folio. Cistus Halimi minoris folio *Barr. Icon. 287*.

528. Helianthemum Halimi minoris folio, Hispanicum. Cistus Halimi minoris folio, Hispanicus *Barr. Icon. 1316*.

529. Helianthemum Halimi minoris folio, minus. Cistus Halimi minoris folio, minor *Barr. Icon. 289*.

530. Helianthemum Halimi minoris foliis in verticillos compactis. Cistus humilis, compactis in verticillos minoris Halimi foliis *Barr. Icon. 327*. & *Bocc. Mus. part. 2. 76. Tab. 64*.

531. Helianthemum frutescens, folio Majoranæ incano *Inst. R. Herb. 249*. Cistus incanus, Majoranæ folio, Hispanicus *Barr. Icon. 313*.

532. Helianthemum Lavandulæ folio *Inst. R. Herb. 249*. Cistus Lavandulæ latifoliæ folio *Barr. Icon. 288*.

533. Helianthemum Lavandulæ folio angustiori. Cistus lavandulæ folio, thyrsoides *Barr. Icon. 293*.

534. Helianthemum angusto Rorismarini folio. Cistus angusto Libanotis folio, flore singulari *Barr. Icon. 294*.

535. Helianthemum supinum, Hyssopi foliis villosis. Chamæcistus supinus, Hyssopi foliis villosis *Barr. Icon. 818*. & *Bocc. Mus. part. 2. Tab. 10*. Vires Helianthemi vide in Hist. Rai 1014.

Has elegantes Helianthemi species in Hispaniâ præsertim collegit Barr. Nulla enim regio harum tam ferax est.



536. Saxifraga Sedi folio longiore & angustiore ferrato. Sedum montanum, ferratum, roseum, flore purpureo *Barr. Icon. 373*. Varietas sequentis.

537. Saxifraga Sedi folio angustiore, ferrato *Inst. R. Herb. 252*. Sedum montanum, roseum, ferratum flore guttato *Barr. Icon. 1311. n. 1*. Umbilicus veneris minor 1. & 2. *Tabern. Icon. 847*. Variat hæc planta foliis modò brevioribus, modò longioribus, quæ variationes exprimuntur in tabulis Barrelieri 1. 2. & 3. id est *Icon. 1311. 1309. & 1312*.

538. Saxifraga foliis subrotundis, ferratis *Inst. R. Herb. 252*. Sedum montanum, roseum, ferratum, foliis subrotundis *Barr. Icon. 1310*.



539. Salicaria Corvini, thyrsoides, flore purpuro-violaceo, Virgæ aureæ folio *Barr. Icon. 1205*. Ab Equite Corvino habuit Barr.

540. Salicaria Hyssopi folio latiore *Inst. R. Herb. 253*. Polygonum aquaticum, majus *Barr. Icon. 773. n. 1*. Hyssopifolia aquatica *I. B. 3. 792*. Pumila

mila est planta humi procumbens, longis & flexuosis cauliculis latè se spargens, cujus radix alba, tenera, in internodiis fibrosa & capillata. Folia uncialia ut plurimum quæ majora sunt, Liniformia, lætiùs virentia, medioque nervo striata. Flores ex foliorum alis emergunt pentapetali, purpurei, unguibus petalorum albidis, tribus saturatæ purpuræ lineis & juxta fauces quinque staminibus purpurascens, cum apicibus aureis, decorati. Flos longè major sequenti, & sapor hebetior. Juxta serpentes aquarum rivulos, humidis etiam locis Romæ & in Campaniâ Romanâ provenit.

541. *Salicaria minima*, tenuifolia *Inst. R. Herb.* 254. *Polygonum aquaticum*, minus *Barr. Icon.* 773. n. 11. *Hyssopifolia minor*, vel potius *Thimifolia*, maritima *J. B.* 3. 792. Annua est plantula surrecta, quæ radice potitur tenui, albo-sordidâ in varios ramos fibrillasque divisâ, è quâ cauliculus striatus & quasi alatus rectusque surgit in varios ramos decussatim divisus, quibus folia angusta vix semuncialia, obtusè rotunda, è viridi nonnihil albida & subcinerea alternatim adhærent. Ex eorum alis flores parvi purpurascens, Gallii floribus vix majores, sursum erecti, brevi pediculo oblongoque calyce impositi erumpunt singulares, quibus evanidis nonnihil intumescunt calyces ad latera striati, quatuor aut quinque dentibus extuberantibus coronati. Junio florebat in uliginosis pratis viâ Lauretanâ, primo à ponte Milvio milliari.



542. *Hypericum saxatile*, *Ericoides*, glauco folio. *Coris lutea*, *Ericoides*, fruticans, Hispanica *Barr. Icon.* 351. & *Bocc. Mus. part. 2. Tab.* 74. Nec hujus, nec sequentis descriptionem invenio.

543. *Hypericum montanum*, folio lato, ramosum. *Androsæmum montanum*, minus *Barr. Icon.* 490. & *Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab.* 144. *Hyperici vires* vide in *Hist. Raii* 1018.



544. *Pyrola longo folio*, flore albo singulari, Polonica *Barr. Icon.* 1156. n. 11. *Pyrola Alfines* flore, Europæa *C. B. Prodr.* 100. *Alfinanthemon Thal. Sylv. Harc. & Olhaf. Elench. Plant. Dant.* A Corvino habuit *Barr.*



545. *Ruta sylvestris*, Linifolia, Hispanica *Barr. Icon.* 1186. & *Bocc. Mus. part. 2. 82. Tab.* 73. Descriptam non invenio in scriptis Barrelieri. *Vires Rutæ* vide in *Hist. Raii* 875.



546. *Garidella foliis tenuissimè divisis* *Inst. R. Herb. app.* 565. *Oenanthe Indica*, semine cordato *Barr. Icon.* 1240. *Nigellastrum raris & Fœniculaceis foliis H. R. Monsp.* Pictam communicabat *Eques Corvinus*. Ramus tantum medius optimè delineatus, laterales malè.



547. *Cistus latifolius*, magno flore *Barr. Icon.* 1315. Nec hujus, nec sequentium descriptiones invenio.

548. *Cistus Ledum*, salviæ folio, Hispanicus *Barr. Icon.* 314.

549. *Cistus Ledon*, Majoranæ foliis. *Ledum folio Sampsuchi* *Barr. Icon.* 817. *Hypocistidis*, *Ladanique vires*, usus, & colligendi modum vide in *Hist. Raii* 1008.



550. *Sedum majus*, non denticulatum, flore purpureo montanum *Barr. Icon.* 394. *Sedum majus*, montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus *C. B. Pin.* 283. *Raii Hist.* 688. *La grande Joubarbe des montagnes*. Montibus Apenninis gaudet, necnon in valle Barfilionensi. *Vires Sedi* vide in *Hist. Raii* 687.

551. *Sedum montanum*, roseum, minus, reticulatum *Barr. Icon. 391. n. 2.*
 & 393. *Sedum montanum*, tomentosum, minus *Inst. R. Herb. 262.* Sempervivum rubrum, montanum, *Gnaphalodes Col. part. 1. 291.* Hujus elegantis plantæ primus mentionem fecit Fabius Columna l. c. sed quia, inquit Barr. non satis distincta Columnæ Icon, aliam exhibere volui. Frequentem inveniebat in supercilio collium qui juxta lacum ad radicem summi montis Neursini positum, in latâ planitie obversâ pago quem *Castelluco* vocant, ad meridiem inter scopulorum rimas. Nos in editioribus montibus supra *Vapincum* & vallis *Barfiliationensis* copiosum vidimus.

552. *Sedum majus*, non reticulatum, flore purpureo, montanum, angustifolium *Barr. Icon. 391. n. 11.* *Sedum Alpinum*, subhirsutum, folio longiore *H. R. Par.* Folia huic angustiora, vix semunciam longa & sesquilineâ latiora, tenui pubentia lanugine, pingua, acuta, numerosâ serie & imbricatim in singulis ocellis imposita. Ex *Aprutii* montibus habuit Barr.

553. *Sedum montanum*, umbilicatum, incanum, minus, flore saturatè purpureo. *Barr. Icon. 374.* Minores huic quàm superioribus ocelli in globum clauduntur foliis in se coeuntibus, incanâque prorsus lanugine conteguntur. Ut in caulem assurgit vix Icone majorem, rara secundum ejus longitudinem sparguntur folia. Flores in summo caulis in umbellam se explicant superiorum formâ, stellati, sed minores, ad oras ciliaribus pubentes villis, petalis mediâ lineâ saturè violaceâ secundum longitudinem striatis: stamina in umbilico plurima surrecta, purpurea, suis onusta apicibus. Crescit in jugis *Amatricensium* in *Aprutio*.

554. *Sedum montanum*, *Cepææ* folio, flore albido. *Cepææ montana* minor albido flore *Barr. Icon. 1170.* Albenti fragilique è radiculâ plures humi fundit, teretes, carnosos repandosque cauliculos foliis plurimis, carnosis, oblongis & *Cepææ* vel *Rosæ* in modum collectis coronatos. Flores per caules triunciales dispersi albescunt, iisque succedunt pericarpia ex quinque vaginulis seu corniculis compacta, semine minuto & nigricante facta. Florebat Junio in montibus *Eremitæ D. Bartholomæi Romam* inter & oppidum *Ananiam*.

555. *Sedum roseum*, ferratum, i, longiùs radicans *Barr. Icon. 392.* Nec hujus, nec sequentium descriptiones invenio in scriptis Barrelieri. Videntur prima esse germina *Sedi* aut *saxifragæ folio serrato*, nec possunt ad sua genera rectè reduci, cum floribus careant, ac proinde notis characteristicis destituantur.

556. *Sedum roseum*, ferratum, ii, acuto folio *Barr. Icon. 392.*

557. *Sedum roseum*, ferratum, iii, curvo folio *Barr. Icon. 392.*

558. *Sedum roseum*, ferratum, iv, obtuso folio *Barr. Icon. 392.* *Palmaria Tabern. Icon. 842.*

559. *Sedum roseum*, ferratum, v, majus *Barr. Icon. 392.*



560. *Anacampseros minor*, purpurea *I. B. 3. 682.* *Telephium angustifolium*, minus, ferratum, purpureum *Barr. Icon. 837.* *Telephium purpureum*, minus *C. B. Prodr. 133.* *L'Orpin ou Reprise à fleur purpurine.*

561. *Anacampseros Lusitanica*, hæmatodes, maxima, flore albido *Inst. R. Herb. 264.* *Telephium majus*, subrotundo folio, floribus albicantibus *Barr. Icon. 838.* *L'Orpin ou Reprise de Portugal à fleur blanchâtre.* Vires vide in *Hist. Rai 690.* *Lusitanica* adhibetur *Anacampseros* in hæmoptisi, unde nomen inditum hæmatodes.



562. *Tribulus terrestris*, minor, incanus, *Hispanicus Barr. Icon. 558.* *A Tribulo terrestri vulgari*, qui frequens est in Italiâ, Campaniâ Romanâ, Romæque juxta vias & muros horti *Matthæorum* viâ *Appiâ*, foliis distinguitur densius

densius compressis, obtusioribus, villis porrò & canitie quibus tota planta obducitur: In vulgari enim glabra & atrovirentia sunt folia. In agro Madritensi Castiliæ novæ tantummodo observabat Barr. Vulgaris tamen Monspeli, dum erumpit, incanus videtur, hinc Hispanicum à vulgari non distinguendum censerem.



563. Juncago maritima. Juncus bulbosus, maritimus, floridus, filiquosus Barr. Icon. 271. Hyacinthi parvi facie, Gramen triglochin I. B. 2. 508. Raii Hist. 1308. Tota planta glabra est, ex radice bulbosâ Allii modo & fibrosâ sena aut octona emittit folia juncea, cylindracea, nonnihil tamen compressa & carinata, erecta acutaeque, ex quorum medio exurgit cauliculus seu culmus rotundus, teres, nudus, rufescens, in laxiorem desinens spicam florum tetrapetalorum, tumentium & globosorum, ex albo viridique rubescentium, quorum medium occupat pistillum quod abit in fructum trigonum, trifariam dehiscens. In maritimis ad Ostia Tyberina Aprili florentem reperiēbat Barr. Nos in maritimis Galliæ Narbonensis & Monspeliensis agri. A Juncagine palustri perennibus distinguitur radicibus.



564. Geranium minus, Saniculæ folio, albo flore Barr. Icon. 87. Foliis pollet Saniculæ feminae, id est, Astrantie, glabris, lucidis, dilutius tamen virentibus & minoribus, sed similiter per oras serratis, in quinos æquales lobos altius divisus & semunciali pediculo hærentibus. Caules illi ramosi quos folia alterna vestiunt appendicibus angustis & acutis stipata quæ caulium genicula complectuntur. Flores quinque petalis sinuosis seu cordatis constant calyce virenti comprehensi. Stamina decem suis onusta apicibus luteis pistillum ambiunt quod abit in fructum quinis seminibus compositum acu suâ munitis, & quæ maturo semine in spiram torquetur. Ex agro Urbevetano missum fuit.

565. Geranium Batrachioides, flore purpureo, reflexo, Italicum. Barr. Icon. 39.

566. Geranium hæmatodes, purpureum, parvo flore, Italicum Barr. Icon. 67. Varietas videtur Geranii hæmathodis, sive flore sanguineo, flores duplo minores, foliaque ejus majora vix uncialia. In sylvis cædis Aprutii reperit Barr.

567. Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo majori Barr. Icon. 40. & Bocc. Mus. part. 2. 82. Tab. 72. Radice nititur perenni, digito crassiori & in plures alias divisâ, è luteo rubescente, multaque in capita se spargente, ex quibus plurima erumpunt folia humifusa, uncialia, subhirsuta & minora quàm in Geranio Columbino vulgari; ex eorum medio plures eriguntur cauliculi pediculis foliorum vix crassiores, villosi, foliis nudi & in summo ramosi, vix tres uncias alti, quibus insident flores vulgari Columbino triplo majores, è purpurâ dilutâ rubentes. Magnitudinem naturalem habes è ramo exciso. Florebat Junio in pratis Neursinorum montium. Planta vix Icone major: at in horto translata longè ampliora folia, caulesque proferebat, & Junio, Julio, Augustoque flores dabat. Nos in monte Ventoso propè Avenionem reperimus.

568. Geranium Myrrhinum, tenuifolium, amplo flore purpureo Barr. Icon. 1245. A Geranio Cicutæ folio minori & supino C. B. Pin. 319 discrepat radice crassiusculâ, perenni, longâ, crassâ & divisâ quæ multa edit folia humifusa, Myrrhidis æmula, tenuia, ad nervum incisa, semipalmum longa, foliolis quasi composita semuncialibus. Ex eorum medio surgunt cauliculi supini modò, modò erecti, nudi, qui tres quatuorve flores sustinent semuncialis diametri, purpurâ accensâ rubescentes, & longè ampliores quàm in minori Geranio Cicutæ folio, petalis in extremo rotundis. Acus unciales floribus succedunt.

cedunt. Romæ per vias & agrorum margines frequens; Floretque Martio, nec odoris saporisve est ingrati.

569. Geranium Creticum, minus, five alterum, villosum *Barr. Icon. 492.* Geranium Chrysanthemi Cretici folio, Neapolitanum *Bocc. Mus. part. 2. 93. Tab. 83.* Folia promit *Ranunculi vulgaris* formâ, in tres lobos ad pediculum & nervum usque planè scissa, subrotundos, per oras ferratos, aliquandò altius incisos & sinuosos, sèna aut quaterna, humifusa, pediculis triuncialibus hærentia, & è radice longâ tenui & in fibras desinente erumpentia. Ex eorum medio caulis assurgit geniculatus, crassior & palmaris, cujus singula internodia binis & oppositis instruuntur foliis sensim minoribus & tenuioribus (ut in Icone Boccone exprimitur) & in extremo ex foliorum alis prodeunt flores singulares aut bini, pediculis fulti, purpuro-violacei & paulò minores quàm in *Geranio fusco* aut *Gratia Dei*. Fructus rostrum Gruinum repræsentat; acusque fructu maturo in spiram contorquentur.

570. Geranium Creticum, maximum Corvini *Barr. Icon. 1167.* Geranium latifolium, acu longissimâ *C. B. Pin. 319. Raii Hist. 1056.*

571. Geranium noctu odorum, Indicum *Barr. Icon. 68.* Geranium triste *Corn. 110.*



572. Thalictrum Batrachoides, minus, flore albo, Italicum *Barr. Icon. 480. & Bocc. Mus. part. 2. 84. Tab. 79.* Thalictrum montanum, præcox *Inst. R. Herb. 271.* Ranunculus præcox, iij, Thalictri folio *Clus. Hist. 233.* In sylvâ Blæsensi in Galliâ provenit, necnon in Delphinatu non procul Gratianopoli in Querceto viâ quâ itur ad Herbiscum rurale palatium Episcopi Gratianopolitani, & in sylvâ montis Arverni Etruriæ in declivi ad ortum juxta viam. In Icone damus floris & siliculæ formam & justam magnitudinem, inquit Barrelierus. Florebat Romæ Martii initio in horto sancti Xyfti, semen initio Maji maturefcebat, quod in binis aut ternis ad summum siliculis loculatis, compressis, planis, falcatis, latiusculis; flori succedentibus continebatur rotundum, & rufum ut annotavit Clusius l. c. Siliculæ nimium ampliata mihi videntur, fortè pictoris negligentia.



573. Helleborus niger, trifolius *Ald. Hort. Farnes. 92. Raii Hist. 698.* Elleboraster Indicus, trifolius *Barr. Icon. 1143.* Vires Hellebori vide *Hist. Raii 697.*



574. Anemone latifolia, flava 1. Clusii *Barr. Icon. 792. Clus. Hist. 248.* Anemone Cyclaminis seu Malvæ folio, lutea. *C. B. Pin. 173. L'Anemone a fleur jaune.*



575. Ranunculus Tripolitanus, grumosâ radice, flore phœniceo Imperati *Barr. Icon. 582. & Imper. 673. La Renoncule du Levant à fleur simple. Icon. Barr. ex Imper. l. c.*

576. Ranunculus Alpinus, Coriandri folio, flore albo purpurascens *Barr. Icon. 456.* Ranunculus Alpinus, folio Coriandri *Pon. Bald. Ital. 197.* Ranunculus Rutaceo folio, flore suavè rubente *C. B. Pin. 181. Icon. Barr. ex Pon. l. c.* In Alpibus Delphinatûs ad radices cristæ editæ montis *de Lens*, oppido *Bourgdoysan* imminentis provenit.

577. Ranunculus tenuifolius, luteus, grumosâ radice, Soractensis, seu Italicus *Barr. Icon. 581.* Ranunculus Chærophyllos, Asphodeli radice *C. B. Pin. 181.*

578. *Ranunculus minor*, Rutæ folio, flore simplici, grumosâ radice, *Italicus Barr. Icon. 1153. n. 11.*

579. *Ranunculus minimus*, *Apulus Columnæ*, luteus *Barr. Icon. 791. Col. part. 1. 316.* *Ranunculus arvensis*, parvus, folio trifido *C. B. Pin. 179.*

580. *Ranunculus Ceratophyllos*, seminibus falcatis in spicam adactis *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 440.* *Cratæogonum pumilum*, luteum, Absinthii foliis, *Hispanicum Barr. Icon. 375.* *Cratæogonum Hispanicum Ejusd. Icon. 376. n. 11.* *Melampyrum luteum*, perpussillum *Lob. Adv. 10. & Raii Hist. 583.* *Monspeli eundo ad Boutonetum*, & in Hispaniâ inter segetes Castiliæ veteris verè floret, brevique perit.

581. *Ranunculus albus*, *Apenninus*, *Saniculæ majoris folio Barr. Icon. 88.* *Ranunculus flore albo*, *Alpinus*, major *I. B. 3. App. 860.* Sæpius nobis fuit obvius in Alpibus, in valle Barfilionensi, in monte Pilati supra Lugdunum, & apud Sebennas in monte Calcaris, vulgò *l'Esperon.*

582. *Ranunculus montanus*, hirsutus, humilior, *Narcissi flore C. B. Pin. 182.* *Pulsatilla trianthos*, sulfurea, semine non papposo *Barr. Icon. 494.* *Ranunculi montani ij. species altera Clus. Hist. 235. & Raii Hist. 590.* In Herbidis pratis summorum jugorum Apennini montis in Aprutio apud Amatricenses reperiebat Barr. Nos in Editioribus pratis humidis vallis Barfilionensis, præsertim circa oppidum *l'Arche* copiosum vidimus. Flos albus est qui exsiccatu sulfureus evadit. Folia & semina in Icone Barr. optimè, flos verò malè expressus.

583. *Ranunculus Fœniculaceis foliis*, *Hellebori nigri radice H. R. Monsp.* *Elleborus Ferulaceus Lobelii*, *Buphtalmum Dodonæi*, fortè *Pulsatilla lutea Corvini Barr. Icon. 1178.* *Helleborus niger*, tenuifolius, *Buphtalmi flore C. B. Pin. 186.*

584. *Ranunculus aquaticus*, albus, lato & *Fœniculi folio*, *Italicus Barr. Icon. 565.* *Ranunculus aquaticus*, folio rotundo & capillaceo *C. B. Pin. 180.* *Raii. Hist. 586.* Frequens per Galliam & Italiam in fossis pratorum, lacubus, & rivulis.

585. *Ranunculus aquaticus albus*, *Fœniculi folio Barr. Icon. 566.* *Ranunculus aquatilis omninò I. B. 3. 781. & Raii Hist. 586.* In Palustribus *Pompianis viâ Appiâ*, circa oppidum *Sermonetta*, observabat Barr. Nec minùs frequenter per Galliam occurrit.

586. *Ranunculus aquaticus*, *Plantaginis folio angustiore Inst. R. Herb. 293.* *Plantago aquatica*, angustifolia, *Polonica Corvini Barr. Icon. 1157.* A Corvino habuit.



587. *Clematidis cærulea*, erecta *C. B. Pin. 300.* *Clematis cærulea*, *Pannonica Barr. Icon. 397. & Clus. Hist. 123.*



588. *Caryophyllata Alpina*, minima, flore aureo *Barr. Icon. 399.* *Caryophyllata Alpina*, minima, 1. *Pon. Bald. Ital. 203.* *Caryophyllata Alpina*, minor *C. B. Pin. 322.* *La Benoite des Alpes.* In summis Alpium pratis, præsertim in deserto majoris *Carthusiæ* supra *Gratianopolim* in *Delphinatu* obvia est.

589. *Caryophyllata Alpina*, tenuifolia, incana, flore luteo, longiùs radicata *Barr. Icon. 400. & Bocc. Mus. part. 2. 160. Tab. 128.* *Caryophyllata Alpina*, minima. 2. *Pon. Bald. Ital. 205.* *Caryophyllata Alpina*, *Aprii folio C. B. Pin. 322.* *Icon. Barr. ex Pon. Bald. l. c.* In monte *de Lens* supra oppidum *Bourgdoysan* in *Delphinatu* eruebat Barr. Nos inter saxa montis *Touren* in valle Barfilionensi collegimus. *Caryophyllatæ vires* vide in *Hist. Raii 607.*



590. *Fragaria* flore pleno, fructu rubello *Barr. Icon. 89.* *Fragaria* fructu rotundo, suavissimo, flore duplici *H. R. Par. Le Fraiser à fleur double.* A vulgari distinguunt flores pleni & numerosis petalis foeti. Fructus ejus nonnihil vulgari majores, grumosiore, rotundiores, optimi saporis & suavè rubentes; eodem tempore maturescunt.

591. *Fragaria* spinoso fructu *Barr. Icon. 90.* *Fragaria* fructu hispido *Ger. Emac. 998. & Raii Hist. 609.* Fructus hujus spinulis undique horrent & Echini modo, duris, incurvis, è fusco viridibus, brevibus & inter acinos fructuum enascentibus facilèque delabentibus; adeò ut nisi mudentur à spinis, deglutiri non possint, sed demptis spinulis suaviter comedantur. Vespasiano Robino debetur.

592. *Fragaria* sterilis, sylvestris, sericea seu incana *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 187.* *Trifolium montanum*, luteo *Tormentillæ* flore, cineraceum *Barr. Icon. 710.* *Fragariæ* affinis, sericea, incana *C. B. Prodr. 139.* In montibus Gallo-provinciæ nobis fuit sæpiùs obvia, necnon propè Valentiam urbem Delphinatùs juxta vias. *Fragariæ* vires vide in *Hist. Raii 610.*



593. *Quinquefolium minus*, cineraceum, luteo flore. *Pentaphyllum montanum*, minus, luteo *Tormentillæ* flore, cineraceum *Barr. Icon. 709.* Nec hujus, nec sequentis descriptionem invenio.

594. *Quinquefolium minus*, luteum, Hispanicum. *Pentaphyllum minus*, luteum, *Alchimillæ* facie, Hispanicum *Barr. Icon. 727.* *Quinquefolii* vires vide in *Hist. Raii 611.*



595. *Phytolacca Americana* majori & minori fructu *Inst. R. Herb. 299.* *Solanum majus*, ramosum *Barr. Icon. 150.* *Solanum racemosum*, Americanum *Raii Hist. 662.* *Mechoacanæ* loco radices hujusce plantæ in potionibus purgantibus & Electuariis solutivis usurpant Chirurghi Acadiensis & Canadensis.



596. *Aralia Canadensis* *Inst. R. Herb. 300.* *Panax xg. p. 1105*, racemosa, Canadensis *Barr. Icon. 705. & Corn. 75.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*



597. *Smilax unifolia*, humillima *Inst. R. Herb. app. 564.* *Lilium convallium minus* Bauhini, *Unifolium Dodonæi*, *Gramen Parnassi Mathioli* *Barr. Icon. 1212.* *Unifolium Dod. Pempt. 205.*

598. *Smilax spicata*, *Polygonati folio* *Inst. R. Herb. app. 564.* *Polygonatum latifolium*, spicatum, majus, flore albo, Canadense *Barr. Icon. 712.* *Polygonatum spicatum*, fertile *Corn. 34.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.*

599. *Smilax* quæ *Polygonatum spicatum*, sterile *Corn. 32.* *Polygonatum latifolium*, spicatum, flore albo, Virginianum *Barr. Icon. 711. n. 11.* *Icon. Barr. Ex Corn. Hist. l. c.* Fructum rotundum, superiori dissimilem & minorem ei tribuit *Barr.*

600. *Smilax racemosa*, *Polygonati folio* *Inst. R. Herb. app. 564.* *Polygonatum racemosum*, flore albo, Canadense *Barr. Icon. 724.* *Polygonatum racemosum* *Corn. 36.* *Icon. Barr. ex Corn. l. c.*

601. *Smilax perfoliata*, ramosa, flore albo. *Polygonatum latifolium*, ramosum, flore albo, minus, Germanicum *Barr. Icon. 720.* *Polygonatum ramosum* *Dod. Pempt. 346.* *Icon. Barr. ex Dod. l. c.* In Delphinatùs montibus reperit *Barr.*

602. *Smilax Alpina* perfoliata & ramosa, flore luteo. *Polygonatum* ramosum, perfoliatum, luteum, *Alpinum* *Barr. Icon. 719.* A *Polygonato* ramoso sequenti distinguitur fructus formâ, modò legitima sit *Icon. Barr.* In monte *Divi Hugonis*, deserto majoris *Carthusiæ* necnon circa oppidum *Bourgdoysan* in tractu *Alvariensi* collegisse asserit.



603. *Polygonatum* ramosum, flore luteo, majus seu latifolium & angustifolium flore pallido, *Canadense* *Barr. Icon. 723.* *Polygonatum* ramosum, flore luteo, majus *Corn. 39.* *Icon. Barr. ex Corn. Hist. l. c.* Planta est sui generis nullique proprio adhuc adscripta. Utrumque *Polygonatum* latifolium scilicet & angustifolium in *Horto Regio* possidemus, suntque distinctæ species, ut monet *Cornutus.*



604. *Agrimonia odorata* *Camer. Hort. Agrimonium odoratum Barr. Icon. 611.* *Eupatorium odoratum C. B. Pin. 321. Raii Hist. 400. L' Aigremoine odoriferante.* Gaudet montibus *Latii & Sabinarum*, ac sylvis editioribus *Italiæ*, necnon collibus *Tiburtinis* secundum *Albulam.* Vires vide in *Hist. Raii l. c.*



605. *Agrimonoides* semine glabro *Barr. Icon. 612. Agrimonoides Col. part. 1. 145. & Raii Hist. 400.*



606. *Onagra latifolia*, floribus amplis *Inst. R. Herb. 302. Lysimachia lutea, corniculata, latifolia, Lusitanica Barr. Icon. 1232.*

607. *Onagra angustifolia* *Inst. R. Herb. 302. Lysimachia latifolia, spicata, lutea, Lusitanica Barr. Icon. 989.*

608. *Onagra angustifolia*, caule rubro, flore minore *Inst. R. Herb. 302. Lysimachia angustifolia, spicata, lutea, Lusitanica Barr. Icon. 990.*



609. *Leontopetalon* foliis costæ ramosæ innascentibus *Cor. Inst. R. Herb. 49. Leontopetalum vulgare Barr. Icon. 1030. Leontopetalum ramosum, Polyanthos. Ejusd. Icon. 1023. Leontopetalon Dod. Pempt. 69.*

610. *Leontopetalon* foliis costæ simplici innascentibus *Cor. Inst. R. Herb. 49. Oxalis tuberosa, Syriaca Aldini, flore luteo, reticulato, foliis maculatis Corvini Barr. Icon. 1113. Chrysogonum Dioscoridis Lugd. app. 28. A Corvino plantam hanc vivis coloribus pictam habuit Barr. sed malè quidem delineatam.*



611. *Apium Lusitanicum, rotundifolium Inst. R. Herb. 305. Oreoselinum rotundifolium, Hispanicum Barr. Icon. 350.*



612. *Cicuta montana, tenuifolia Barr. Icon. 1161. La Cigue de montagne.* Caule, foliis, floribus, umbellis & semine vulgari similis est, sed huic folia longè tenuiora, lucida, atrovirentia & foetida sunt. Semen in umbellis globosum, subacutum, & striatum. Flores albicant. Julio florebat, semen Augusto maturescebat. Vires *Cicutæ* vide in *Hist. Rai 450.*



613. Bulbocastanum alterum, caule firmiore *Barr. Icon. 244*. Bulbocastanum majus, Apii folio *C. B. Pin. 162*. & *Raii Hist. 440*. *La Terre noix*. Usus vide in *Hist. Raii l. c.*



614. Sium aromaticum, Sison Officinarum *Inst. R. Herb. 308*. Ammi Sii vel Laveris folio, flore albo, semine nigro *Barr. Icon. 1190*. Sison sive officinarum Amomum *J. B. 3. part. 2. 107*.



615. Tragoselinum majus, umbellâ candidâ *Inst. R. Herb. 309*. Saxifraga major, Germanica, foliis altius incisus *Barr. Icon. 243*. Saxifraga hircina, major *J. B. 3. part. 2. 109*. *Le Boucage*.

616. Tragoselinum majus, alterum *Inst. R. Herb. 309*. Daucus 3. Lugdunensis Historiæ *Barr. Icon. 1199*. & *Lugd. 717*.

617. Tragoselinum majus, foliis dissectis. Pimpinella saxifraga, hircina, major, foliis altè incisus, montana, Italica *Barr. Icon. 737*.

618. Tragoselinum minus *Inst. R. Herb. 309*. Pimpinella saxifraga, hircina, minor, montana, foliis altè incisus *Barr. Icon. 738*.

619. Tragoselinum annuum, rotundifolium, Italicum. Saxifraga rotundifolia, flore albo, annua, Italica *Barr. Icon. 242*. & *Bocc. Mus. part. 2. 85*. *Tab. 80*. Apium peregrinum, foliis subrotundis *C. B. Prodr. 81*.

620. Tragoselinum Italicum, minus, umbellis nutantibus. Saxifraga viminea, albis nutantibus umbellulis, Italica *Barr. Icon. 1184*. Vires & usus Pimpinellæ saxifragæ vide in *Hist. I. Bauh. l. c.* & in *Hist. Raii 445*.



621. Buplevrum perfoliatum, longifolium, annuum *Inst. R. Herb. 310*. Perfoliata minor, folio acuto *Barr. Icon. 1128*. Perfoliata humilis, Alpina *Bocc. Mus. part. 2. 76*. *Tab. 63*. *La Perce-feuille annuelle*.

622. Buplevrum 3. minimum Fabii columnæ *Barr. Icon. 1248*. & *Col. part. 1. 85*. & *247*. Buplevrum angustissimo folio *C. B. Pin. 278*.

623. Buplevrum fruticosum, angustifolium, Hispanicum *Barr. Icon. 1255*. Buplevrum Hispanicum, arborecens, gramineo folio *Inst. R. Herb. 310*. Caulem edit cubitalem, erectum, ramosum, crassiusculum, firmum, abs radice crassâ, Fœniculaceâ perennique emergentem, quot annis pereuntem, ita ut novus enascatur, tortuosus, geniculatus, angustis & fescunciam quandoque longis, acutis, longumque in mucronem desinentibus, firmis, striatis, glabris, amplexicaulibus, pallidè virentibus foliis alternis instructus, in ramos plures surrectos divisus, cujus extrema comantur umbellâ florum luteorum seu herbaceorum & *Buplevri*, sed parvorum, vixque apparentium; quibus succedunt semina tenuia & oblonga. Sapore acri & valido præditum & odore Panacis. In Regni Valentini aridioribus incultis glareosisque locis viget. Vires & usus Perfoliatæ vide apud Schroderum, Camerarium & Simonem Pauli.



624. Chærophyllum sylvestre, alterum, geniculis tumentibus *H. R. Par. Daucus Selinoides*, tuberosis geniculis, Illyridis semine *Barr. Icon. 1177*. Myrrhis sylvestris, Cretica, nodosa, seminibus asperis *Raii Hist. 432*. Versaliis observavit D. Vaillant Plantarum Prodemonstrator.



625. Myrrhys Cicutaria, minor, perennis, *πολυρριζὸς* *Barr. Icon. 555*. Cicutaria bulbosa, esculenta *Bocc. Mus. part. 2. 171*. *Tab. 123*.

626. Myrrhis Pastinacæ foliis latè virentibus *Cor. Inst. R. Herb.* 22. Sefeli subrotundo Selini folio, flore luteo, Italicum *Barr. Icon.* 241. Daucus Siculus, Pastinacæ foliis *Zan. Hist.* 78. *Tab.* 30. & *Raii Hist.* 444.



627. Imperatoria atro-purpurea, Canadensis. Angelica atro-purpurea, Canadensis *Barr. Icon.* 1319. & *Corn.* 199. *L'Angelique à tige rouge.* *Icon Barr.* ex *Corn.* l. c.

628. Imperatoria lucida, Canadensis *Inst. R. Herb.* 317. Angelica lucida, Canadensis *Barr. Icon.* 1320. & *Corn.* 197. *Icon Barr.* ex *Corn.* l. c.



629. Peucedanum Italicum, longioribus foliis, seu majus *Barr. Icon.* 78. Peucedanum majus, Italicum *C. B. Pin.* 149. *I. B.* 3. *part.* 2. 36. & *Raii Hist.* 416. *La Queue de Pourceau.*



630. Sphondylium vulgare, flore albo *Barr. Icon.* 371. Sphondylium quibusdam, sive Branca Ursina Germanica *I. B.* 3. *part.* 2. 160. & *Raii Hist.* 408. *La Berce.*

631. Sphondylium vulgare, foliis acutè incisfis *Barr. Icon.* 56. Sphondylium hirsutum, foliis angustioribus *C. B. Pin.* 157. & *Prodr.* 83.

632. Sphondylium sive Panax Heracleum, tenuiùs incisfis foliis, Italicum. Panax Heracleum altè, acutè, & tenuiùs incisfis foliis Italicum, *Barr. Icon.* 707. & *Bocc. Mus. part.* 2. *Tab.* 99. Folia promit aspera, hispida, longo adnata pediculo, in tenuissimas acutafque lacinias divisa & per oras acutè ferrata. Caulis altus, rectus, striatus, hirsutus, subrubens, rara & alterna per intervalla foliis minoribus instructus, in summo brachiatus & divisus umbellas albas sustinet. Semen acre, odorum & mordax. Radix & cætera ut aliis Sphondyliis. In præaltis montibus deserti Camaldulensis in Etruriâ, humidis & umbrosis locis provenit.

633. Sphondylium seu Panax Heracleum, alterum, foliis tenuissimè incisfis. Panax Heracleum, albo flore, altiùs incisfis, acutioribusque foliis *Barr. Icon.* 372. Varietas est superioris ratione culturæ.¹

634. Sphondylium glabrum, montanum, albo flore *Barr. Icon.* 55. Sphondylium Alpinum, glabrum *C. B. Prodr.* 83.

635. Sphondylium rotundioribus & minoribus foliorum lobis. Panax Heracleum, minoribus & rotundioribus foliis; an Laserpitium Penæ & Lobelii? *Barr. Icon.* 708. Laserpitium *Lob Adv.* 313. *quoad Iconem.* In montibus Æquicolorum observavit *Barr.*



636. Tordylium maximum *Inst. R. Herb.* 320. Sphondylium minus, Syriacum *Barr. Icon.* 349. Caucalis major *Clus. Hist.* ccj.



637. Ferula minor, ad singulos nodos umbellifera *Inst. R. Herb.* 321. Libanotis tenuifolia, altera, Ferulæ folio & semine, Italica *Barr. Icon.* 835. Libanotis Ferulæ folio & semine, Italica *Bocc. Mus. part.* 2. 171. *Tab.* 123.

638. Ferula durior, seu rigidis & brevissimis foliis *Barr. Icon.* 77. & *Bocc. Mus. part.* 2. 84. *Tab.* 76.



639. Thapsia tenuifolia, lucido rigidoque folio, Hispanica *Barr. Icon.* 556. Thapsia Apii folio, Lusitanica, foetidissima, flore albo *Inst. R. Herb.* 322.



640. *Ligusticum Italicum*, *Ferula* folio brevior. *Libanotis tenuifolia*, *Fœniculi semine*, *Italica* *Barr. Icon. 836.* & *Bocc. Mus. part. 2. 171. Tab. 123.* Ex radice longâ, tereti, annulosâ, fuscâ, intus albâ, acris saporis & odoris, digitum crassâ, folia erumpunt tenuia, longa, *Ferulacea* aut *Cachryos* formâ, sed exilioribus costis & nervis quibus hærent turmatim congestæ foliorum lacinia, pedalia, ac in caule sensim minora. Caulis tenuis, nec parvo digito crassior, sesquicubitalis, erectus, angulosus, striatus alternisque foliis veluti floccis basi suâ caulem amplexantibus instruitur, & desinit in umbellam luteam duplicis ordinis, quam fulciunt membranacea quædam & fusca folia. Semina oblonga per latera æqualia, in summo nonnullis apicibus minutis coronata, sapore suavi & aromatico prædita sunt. In Moroni montis ascensu, quâ parte dumis regitur, & itur ad jugi supercilium saxosum quod vulgò *Saltus Ursi* dicitur, invenit *Barr.*



641. *Daucus Mathioli*, minor, *tenuifolius* *Barr. Icon. 1241.* quid?



642. *Eryngium planum*, cæruleum, campestre, *Polonicum Corvini* *Barr. Icon. 1174.* *Eryngium latifolium*, planum *C. B. Pin. 386.* & *Raii Hist. 384.*

643. *Eryngium minimum*, trifidum, *Hispanicum* *Barr. Icon. 36.* *Bocc. Mus. part. 2. 81.* & *Tab. 71.*

644. *Eryngium pumilum*, amethystinum *Barr. Icon. 376. n. 111.*

645. *Eryngium pumilum*, polyrrhizon *Barr. Icon. 1247.* *Eryngium planum minus* *C. B. Pin. 386.* *Eryngium pusillum*, planum *Moutoni Clus. Hist. clviij.*

646. *Eryngium umbellatum*, *Hispanicum* *Barr. Icon. 35.* quid?



647. *Caryophyllus minor*, fœtidus, purpuro-violaceus *Barr. Icon. 495.*

648. *Caryophyllus montanus*, umbellatus, floribus variis, luteis ferrugineis, *Italicus* *Barr. Icon. 497.* Radice nititur rufescente, tortuosâ, ex quâ cauliculi foliaque enascuntur *Caryophyllo hortensi* paria. Flores in umbellam congeruntur *Armerio Clusii* magnitudine & formâ, petalis quinque constantes in extremo ferratis, aliis è luteo venustè pallentibus, paleaceis aliis, aut obsoletis & nonnihil è ferrugineo rubentibus. Florebat Julio in jugis Moroni montis in Aprutio propè Sulmonem.

649. *Caryophyllus saxatilis*, *Ericæfolius*, umbellatis corymbis *C. B. Prodr. 105.* & *Bot. Monsp. Rubeola montana* *Barr. Icon. 595.* & *Bocc. Mus. part. 2. 60. Tab. 47.* Aridis montibus Alcaras & Monspeli in monte *Capouladon* observavit *Barr.* sed quia nondum floruerat, *Rubeolam* fore existimavit.



650. *Lychnis coronata*, alba, umbilico carneo *Barr. Icon. 1006.* *Lychnis coronaria* vulgò *I. B. 3. 340.*

651. *Lychnis corollaria*, umbellifera, Alpina, flore purpureo *Barr. Icon. 1005.* & *Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab. 42.* *Lychnis umbellifera*, montana, *Helvetica Zan. 128.* & *Raii Hist. 993.* In montibus editioribus vallis *Barfilionensis* agrique *Vapensis* provenit.

652. *Lychnis sylvestris*, hirsuta, purpurea, striato flore *Barr. Icon. 381.* *Lychnis sylvestris*, lanuginosa, major *C. B. Pin. 206.* & *Raii Hist. 995.* Bipedalis erat & florebat Junio in collibus incultis & glareosis vicinis ad aquam *Traversam*, Septentrionem versus viâ quæ Româ *Viterbum* ducit.

653. *Lychnis sylvestris*, hirsuta II. *Clusii*, angustifolia *Barr. Icon. 1027. n. 11.*

n. 11. Clus. Hist. 288. *Lychnis sylvestris*, angustifolia, caliculis turgidis, striatis *C. B. Pin. 205.*

654. *Lychnis sylvestris*, hirsuta, elatior, spicata, Lini colore *Barr. Icon. 1027. n. 1.* *Lychnis sylvestris*, alba, spicâ reflexâ *Bot. Monsp.*

655. *Lychnis supina*, hirsuta, spicatâ & nutante comâ, flore carneo *Barr. Icon. 1025.* Icone non est major, imò quandoque minor. Hanc ex aggere saxeo Lacûs Pontani, viâ quæ Româ Gallicanum ducit, eruebat *Barr.*

656. *Lychnis sylvestris*, villosa, minor, purpurascens, latifolia *Barr. Icon. 1028. n. 111.* *Lychnis sylvestris*, hirsuta, annua, flore minore, carneo *Mor. Hist. Oxon. part. 2. 541.* Annua est, cujus radix crassiuscula, alba & contorta, & caulis sesquipalmaris quandoque, geniculatus, crassiusculus, villosus, rubescens, foliis vestitus per singula internodia binis & decussatim positus, hirsutis, & mollibus, quorum inferiora per extrema obtusè rotunda sunt, superiora sensim acutiora fiunt & strictiora. Flores in summo caule in spicam adacti, uno versu nutantes ferè è foliorum alis erumpunt purpurei, aliquandò ex purpurâ albescentes, parvi, petalis per extrema rotundis, inordinatè explicatis, & calyce nervoso, striato, ex atro obsoleto rubescente, villisque rubentibus hispido & oblongo comprehensi.

657. *Lychnis sylvestris*, villosa, purpurea, minima, angustifolia *Barr. Icon. 1028. n. vj.* Ex radice albâ, oblongâ, tenui, duriusculâ, contortâ, raris fibris capillatâ enascuntur tres aut quatuor cauliculi humi sparsi, vix palmares, comam sursum arrigentes ex ternis aut quaternis conflatam floribus, singulis suo foliolo angusto & acuto fultis, unâ duntaxat serie nutantibus & dispositis. Flores pentapetali, purpurascens, unguibus niveis. Pistillum ab initio cum calyce in fructum tumidum, cortice duro, membranâ laxiore, rubescente, hispida, lineis rubris striatâ vestito. Folia angustiora & longè minora sunt quàm in superiori. In Campaniâ Romanâ circa urbem locisque incultis inter Gramina frequens.

658. *Lychnis marina*, hirsuta, purpurea, Leucoii folio *Barr. Icon. 1010.* Lignosâ, longâ, tereti in paucas fibras easque longas divisâ, albâ, glabrâ annuâque est radice, ex cujus capite multa, longa, basi angustâ, in extremo latiora, obtusa, subrotunda folia hirsuta, vix fescunciam longa erumpunt, in caule verò majora. Caulis crassus, vix dodrante longior, nodosus, multâ & incanâ lanugine hispido, quem uncialia folia bina ex adverso opposita complectuntur, minora dum ad spicam accedunt, ex quorum alis flores enascuntur *Lychnidis*, purpureis petalis cordatis, quinque, staminibusque pari numero & purpureis compositi, ac calyce comprehensi villosi, striati, nervoso qui post exanthemum intumescit, durum oblongum capitulum semine turgidum exhibens. Juxta maris littora arenosa Valentia Junio florebat.

659. *Lychnis lutea*, montana, Globulariæ capite & facie *Barr. Icon. 498.* *Lychnis lutea*, Globulariæ capitulo *Bocc. Mus. part. 2. 75.* *Lychnis lutea*, montana, Globulariæ capite & facie *Ejusd. Tab. 62.* Globularia lutea, montana *Col. part. 1. 153.* Icon. *Barr.* ex *Col. l. c.* Folia tamen depinxit sinuosa. Boccone rubram pro luteâ posuit.

660. *Lychnis prælongis* foliis & calyce *Barr. Icon. 382.* Radice potitur albicante, crassiusculâ & brachiatâ, fibris aliquot capillatâ & perenni, è cujus capite sursum surgunt folia tres uncias longa, vix quintam uncia partem lata, acuta, glabra, in caule longè minora, breviora, angustiora, & ut ad summum attingunt caulem ferè capillaria, vixque semunciam longa. Flores in summo quini aut seni, petalis quinque sinuosis constantes, purpurascens, prælongo calyce comprehenduntur. Semen nondum ediderat. Aridis saxosisque Thuscia locis gaudet.

661. *Lychnis fruticosa*, angustifolia, minima, flore albo, Hispanica *Barr. Icon. 997.*

662. *Lychnis Linifolia*, torosis & laxioribus capitulis *Barr. Icon. 1009*. Pedales & sesquipedales edit cauliculos teretes, rotundos, glabros, rectos, firmos quos in internodiis folia vestiunt bina opposita, angusta, longa, acuta & *linariæ* formâ. Flores non vidi, capita tunc supererant *Lychnidea*, dura, cartilaginea, in plures toros seu nervos rufescentes secundum longitudinem distincta, ex albo gilva, per oras acutè serrata, è basi angustâ sensim se explicantia in Calathi aut Campanæ formam.

663. *Lychnis Hispanica*, Kali folio, multiflora *Inst. R. Herb. 338*. Kali vermiculatum, albo globoso flore *Barr. Icon. 119. & Bocc. Mus. part 2. Tab. 122*. Multos profert cauliculos cubitales, rectos, lignosos, geniculatos, subincanos, glabros, nitentes & ramosos. Folia in singulis geniculis bina, vermiculata, unciam longa, acuminata, surrecta, quaterna quandoquè & quina ex adverso opposita, & albo-pallida. Flores albi in globum congesti, pentapetali & parvi, petalis constant rotundis, quinque brevibus staminibus cum aureis seu phœniceis apicibus & pistillo exili. Calyx floris quinquefidus, subincanus, lineis virentibus striatus. Habes in Icone flores duos depictos quales ex microscopio inspiciuntur, globum quoquè floris naturalis magnitudinis. Amari est saporis, & linguam vellicantis. Delectatur saxosis & glareosis torrentum alveis exsiccatis in Hispaniâ.

664. *Lychnis corniculata*, major, seu latifolia *Barr. Icon. 1017*. Varietas est sequentis ratione foli pinguioris vel culturæ.

665. *Lychnis corniculata*, minor, seu angustifolia *Barr. Icon. 1018*. *Lychnis corniculata*, minor, seu angustifolia, saxatilis *Bocc. Mus. part. 2. 50. Tab. 43*. *Lychnis minima*, rigida *Cherleri I. B. 3. 352. & Raii Hist. 997*. Circa Monspelium, in Galloprovinciâ & Etruriâ occurrit. Aridis locis pusilla est, quæ major in solo pinguiori.

666. *Lychnis Ocymoides*, muscosa, latifolia *Barr. Icon. 380. Pon. Bald. Ital. 199*. *Lychnis Alpina*, pumila, folio gramineo, sive *Muscus Alpinus*, *Lychnidis* flore *C. B. Pin. 206*. *Lychnis Alpina*, minima *Raii Hist. 1004*. *Icon. Barr. ex Pon. l. c.*

667. *Lychnis Ocymoides*, muscosa, striatiore folio *Barr. Icon. 379*. Inter saxa jugorum editiorum vallis Barsilionensis, juxta oppidum vulgò *l'Arche*, cespitem viridem ac elegantem exhibet.

668. *Lychnis pumila*, Caryophyllata, flore rubello, Italis hæmorrhoidalis Aldrovandi *Barr. Icon. 998*. Polygono angustissimo folio, affinis *C. B. Pin. 281*. Prælongâ, palmari, quandoquè majori est radice & sæpè multiplici, crassiusculâ, paucis fibris capillatâ, albicante seu gilvâ, lentâ & nervosâ. Ab ejus capite ampliusculum & in multos furculos diviso densum promit cespitem lætè virentem multis tenuibus foliis, angustissimis, venâ mediâ sulcatis & striatis, obtusè acutis, glabris & nitentibus, unciam ut plurimum longis ac mediâ lineâ vix latioribus. Multis luxuriat cauliculis quandoquè palmariibus, ramosis, geniculatis, glabris, nitidis, ad quorum singula genicula bina oriuntur foliola opposita & minora. Flores *Lychnidei* è calyce minori viridi & in quinque radios acutos stellato emergunt, petalisque constant quinque sinuosis, recurvis, albis, interdum carneis venis radiatim striatis *Malvarum* modo, staminibus pariter quinque cum suis apicibus luteis. Evanido flore succedit utriculus cartilagineus, in summo mucronatus & maturo semine in quinque radios se explicans: semen verò minutum, subruffum, ovatum, *Papaverino* minus, ternum aut quaternum exponit. Totâ æstate, autumnoque floret denso cespite semper lætè virens, unctuosâ viscidaque. Sapore subamaro, & nonnihil ad Napum crudum accedente. Hæmorrhoidibus sanandis miræ esse efficacis fertur.

669. *Lychnis* quæ *Saponaria concava*. *Gentiana concava*, Anglica *Gerardi Barr. Icon. 92. Ger. Emac. 435*. *Saponaria concava*, Anglica *C. B. Prodr. 103. & Raii Hist. 999*. Lusu *Saponariæ vulgaris*.



670. *Linum sylvestre*, latifolium, flore albicante *Barr. Icon. 1002. Le Lin à feuilles larges, & à fleur blanchâtre.*

671. *Linum sylvestre*, latis, acutis foliis, flore amplo *Barr. Icon. 1009. Linum sylvestre, cæruleum, folio acuto C. B. Pin. 107.*

672. *Linum sylvestre*, latifolium, vinoso amplo flore, *Italicum Barr. Icon. 1013.*

673. *Linum sylvestre*, montanum, acuto folio, flore albo *Barr. Icon. 1001.*

674. *Linum Hispanicum*, acutis foliis, amplo flore *Barr. Icon. 1014.*

675. *Linum fruticans*, leptophyllum, *Hispanicum Barr. Icon. 819.*

676. *Linum sylvestre*, acutis foliis, fruticans *Barr. Icon. 1008.*

677. *Linum fruticans*, oxyphyllum, *Hispanicum Barr. Icon. 330.*

678. *Linum fruticans*, angustis acutisque foliis *Barr. Icon. 1231.*

679. *Linum sylvestre*, fruticosum, crispum, *Hispanicum*, parvo flore albo *Barr. Icon. 795.*

680. *Linum sylvestre*, fruticans, trichodes, *Thymi folio*, polyanthos *Barr. Icon. 1003.*

681. *Linum sylvestre*, fruticosum, angustifolium *Barr. Icon. 1004.*

682. *Linum sylvestre*, album, oxyphyllum *Barr. Icon. 796.*

683. *Linum montanum*, luteum, *Italicum Barr. Icon. 820. Linum sylvestre, luteum, foliis subrotundis C. B. Pin. 214.*

684. *Linum pratense*, floribus exiguis *C. B. Pin. 214. Raii Hist. 1076. Chamælinum subrotundo folio Barr. Icon. 1165. n. 1. Linum sylvestre, catharticum Ger. Emac. 560. Lini vires vide in Hist. Raii 1702.*

685. *Linum sylvestre*, minus, flore cæcio, foliis verticillatis *Barr. Icon. 1226. & Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab. 42. Palmaris annuaque est planta, cujus radix tenuis, longiuscula, contorta, dura, albida, rarisque fibris capillata. Cauliculi rotundi, ramosi, modò raris, modò frequentibus & verticillatim nascentibus, acutis, vix unciam longis, erectis vestiuntur foliis. Summis cauliculorum ramis insident flores è cæruleo violacei, imò cæcii, pentapetali, vix se explicantes, & calyce quinquefido comprehensi. Floribus succedit fructus tumidus, durus, rotundus, striatus, in summo mucronatus, seminibus foetus decem exiguis, oblongis, tumidis, Milio longioribus, sed compressioribus, lævibus, lucidis, coloris olivæ, seu viridi obsoletis, quæ singula singulis delitescunt loculis. Viam Lateranensem inter & Appiam circa fontem Aquæ sanctæ, non longè à vineis, in arvis incultis provenit.*



686. *Limonium medium*, *Globulariæ folio*, majus *Barr. Icon. 793. Palmaris est planta, cujus caules aliorum more flores purpurascens ferunt. Foliis magnitudinem naturalem habes in Icone expressam. Valentia ad littora maris cum sequenti occurrit.*

687. *Limonium medium*, *Globulariæ folio*, minus *Barr. Icon. 794. Tenuiori licet crassiusculâ nititur radice & fibrosâ, è quâ folia enascuntur minora & breviora; caules huic longiores, pedales, tortuosi & multum ramosi. Flores non vidi.*

688. *Limonium minus*, *Oleæ folio supino*, alterum *Barr. Icon. 789. Hujus radix modicè tortuosa, è cujus capite quindecim aut sexdecim parva, acuta Oleæ folia terræ incumbencia, vix uncia longiora erumpunt, ac ex eorum medio caulis surgit vimineus, erectus, ramosus, flores sustinens ut in aliis. In Valentini littoris planitiè, quæ vulgò Là-deçà dicitur provenit.*

689. *Limonium minus*, *Oleæ folio*, *πολύκλαζον Barr. Icon. 790. Istud foliis donatur paulò minoribus, rigidioribus, firmioribus, minusque mucronatis; radice multiplici, cespitosâ, lignosâ, subrusâ, tortuosâ, crassâ; caule*
I pedali,

pedali, crassiori, majori, in varios ac plurimos ramos latè sparsos diviso, fragili, vimineo, paniculatimque flores edenti cæsius & aliorum formâ. In Castiliæ novæ amplâ fabulosâque valle, quâ Valentia Madritum itur propè oppidum *Tarancon* dictum Septembri florebat.

690. *Limonium minus*, obtuso folio; viminibus foliosis *Barr. Icon. 806*. Ex radice crassiusculâ, fibrosâ, nigrâ, tortuosâ, vix duas uncias longâ parva exeunt octo vel novem folia nec unciâ longiora, in extremo rotunda, humi & in orbem fusa, ac crassiuscula. Cauliculi viminei, ramosi, dodrantes foliis acutis per intervalla vestiuntur. Flores nondum ediderat, cùm occurrit in littore Valentino.

691. *Limonium minimum*, cordatum seu folio retuso *Barr. Icon. 805*. *Limonium maritimum*, minus, folio cordato *C. B. Pin. 192. Prodr. 99*. Ad radices altæ præruptæque rupis quæ portum Oppidi *la Cîutat* dicti, Massiliam inter & Tolonam respicit, viget.

692. *Limonium incisum* folio, Buglossi flore *Barr. Icon. 1124*. *Limonium peregrinum*, foliis *Asplenii* *C. B. Pin. 192*.



693. *Hyacinthus Orientalis*, parvo flore, polyanthos, serotinus, cæruleus *Barr. Icon. 175. La Jacinte à fleur simple*.

694. *Hyacinthus cæruleo-violaceus*, caule folioso *Barr. Icon. 176*. *Hyacinthus Orientalis*, caule folioso *C. B. Pin. 45*.

695. *Hyacinthus purpureo-violaceus*, serotinus, semiduplex, *φύλλοποιος*, Italis comosus *Barr. Icon. 173. Jacinte à fleur double*. Floret Februario & initio Martii.

696. *Hyacinthus roseus*, cæruleus, flore duplici *Barr. Icon. 174*. Exquisiti est odoris, & floret circa æquinoctium vernum.

697. *Hyacinthus flore pleno*, è cæruleo & violaceo rubente. Hy. Januario *Barr. Icon. 987*.

698. *Hyacinthus flore pleno*, è cinereo violaceo & rubro variegato. Hy. Passa Januario *Barr. Icon. 988*. Tardiùs floret quàm superior.

699. *Hyacinthus flore pleno*, majore, obscurè violaceo cinereo. Hy. Italis Pellucino *Barr. Icon. 982*.

700. *Hyacinthus flore pleno*, oblongo & cæruleo-violaceo. Hy. Medicæ, Capucino affinis *Barr. Icon. 985*. A superioribus distinguitur tubo florum longiore.

701. *Hyacinthus flore pleno*, oblongo, abortivo & cinereo violaceo. Hy. Rusticus *Barr. Icon. 986*. Flores hujus difficilè se explicant, viridique colore maculantur.

702. *Hyacinthus flore pleno*, oblongo, obscurè violaceo. Hy. Italis sancto Bernardo *Barr. Icon. 981*. Majori quàm superior foliorum foeturâ flores tumescunt.

703. *Hyacinthus flore pleno*, cæruleus, præcox, Italis Fiorentino *Barr. Icon. 169*. Floret Februario.

704. *Hyacinthus cæruleus*, plenissimo flore, serotinus, Italis Stradoppio *Barr. Icon. 170*. Multiplici foliorum foeturâ flores ejus rosam exhibent, sed præ pondere ad maturitatem non perveniunt. Circa æquinoctium Martium floret.

705. *Hyacinthus tuberosus*, albus, odoratissimus, autumnalis *Barr. Icon. 1213*. *Hyacinthus Indicus*, tuberosus, flore *Hyacinthi Orientalis* *C. B. Pin. 47. & Raii Hist. 1164. La Tubereuse*.



706. *Colchicum autumnale*, angustifolium, album: an *Hermodactylus verus*? *Barr. Icon 304*. *Colchicum candido flore*, Anglicum *Lob. Icon. 143. Le Colchique à fleur blanche*.

707. Colchicum autumnale, luteum, minimum. Narcissus autumnalis, luteus, minimus *Barr. Icon. 984.* Narcissus autumnalis, minor *Clus. Hist. 164.*



708. Crocus vernus, latifolius, flore violaceo, diluto, Italicus, maximus *Barr. Icon. 384.* *Le Saffran d'Italie à feuilles larges.* Bulbum non vidi ex quo characterismus deprehenditur. Flos illius Croci expansus diametro suo uncias quatuor assequitur, quinquefidus, subcæruleus seu potius coloris Lini, tenuibus striis versus oras reflexis virgatus, unguibus luteis, quinque staminibus cum apicibus stiloque stipatus præter filamenta quædam Croci. Pedalia edit folia Colchici, arcuata, carinata, amplexicaulia, in imo duas uncias lata, sensimque ad extremum usque in acumen desinentia. E Thufciâ accepit.

709. Crocus autumnalis, flore albo, verus *Barr. Icon. 303.* Crocus autumnalis, montanus, angustifolius, flore argenteo *H. R. Par.*

710. Crocus vernus, minor, violaceus, medio purpureo flore, Italicus *Barr. Icon. 383.* Crocus vernus, angustifolius magno flore *C. B. Pin. 67.* Crocus vernus, angustifolius, *1. Clus. Hist. 207.* Viâ ad Ostia Tyberina, juxta semitas in herbidis reperitur.



711. Narcissus totus albus, maximus, calyce mediocri, serotinus *Barr. Icon. 948.* *La Narcisse blanche, ou totus albus.*

712. Narcissus albus, sulfureus, maximus, mediocri calyce, serotinus *Barr. Icon. 947.*

713. Narcissus albo-sulfureus, calyce aureo, major, serotinus *Barr. Icon. 965.*

714. Narcissus albo-sulfureus, calyce luteo oblongo *Barr. Icon. 966.* *La Narcisse jaune pâle.*

715. Narcissus albicans, calyce aureo, amplo, major *Barr. Icon. 932.*

716. Narcissus albicans, calyce aureo, amplo, minor *Barr. Icon. 931.*

717. Narcissus albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, major *Barr. Icon. 928.*

718. Narcissus albicans, calyce aureo, pressiori, croceis oris, minor *Barr. Icon. 927.*

719. Narcissus sylvestris, pallidus, tubâ aureâ, major *Barr. Icon. 930.*

720. Narcissus sylvestris, pallidus, tubâ luteâ, minor, vulgaris *Barr. Icon. 929.*

721. Narcissus pallidus, calyce aureo, labiis inversis *Barr. Icon. 979.*

722. Narcissus albicans, calyce aureo, labiis inversis *Barr. Icon. 980.*

723. Narcissus sylvestris, albicans, oris tubæ luteis, minor *Barr. Icon. 924.*

724. Narcissus sylvestris, pallidus, tubâ aureâ, minimus *Barr. Icon. 976.*

725. Narcissus sylvestris, totus albicans, minor *Barr. Icon. 923.*

726. Narcissus sylvestris, totus luteus, minor *Barr. Icon. 975.*

727. Narcissus totus sulfureus, Anglici facie, flore singulari, Caietanus *Barr. Icon. 967.*

728. Narcissus sylvestris, totus albus, luteis tubæ fimbriis, alter *Barr. Icon. 968.*

729. Narcissus totus albus, nutans, amplâ tubâ *Barr. Icon. 953.*

730. Narcissus totus albus, amplo nutante flore *Barr. Icon. 954.*

731. Narcissus totus albus, nutante flore, longâ & angustâ tubâ *Barr. Icon. 945.* Narcissus oblongo calyce *C. B. Pin. 53.*

732. Narcissus albus, nutante flore, oblongâ & angustâ pallidâ tubâ, minor *Barr. Icon. 946.*

733. Narcissus sylvestris, albicans, nutante flore, minor *Barr. Icon. 921.*