

JORNAL
DE
SCIENCIAS MATHEMATICAS E ASTRONOMICAS


PUBLICADO

PELO


DR. F. GOMES TEIXEIRA

Professor na Academia Polytechnica do Porto,
antigo Professor na Universidade de Coimbra,
socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, etc.

VOLUME XI



COIMBRA
IMPRENSA DA UNIVERSIDADE
1892



DOIS THEOREMAS DE GEOMETRIA ELEMENTAR

POR

FRANCISCO DA PONTE HORTA

Demonstrou-se em Geometria analytica, no estudo das propriedades da parabola, que a circumferencia circumscreta ao triangulo formado por tres tangentes a essa curva passa pelo foco. Parece-me porém de algum interesse dar a esta proposição uma feição mais abstracta e geral, facilitando o seu ingresso na Geometria elementar, enunciando-a e demonstrando-a do seguinte modo:

Se tres circumferencias de circulo se interceptarem no mesmo ponto, e as suas tres outras intersecções estiverem em linha recta, digo que os centros d'estas circumferencias estarão n'outra circumferencia que passará pelo ponto commun das tres primeiras.

Seja M a intersecção commun das tres circumferencias C, C' e C''; e B, A e B' as tres intersecções restantes.

Tire-se por A (intersecção comprehendida entre C e C') uma transversal parallela á linha dos centros das circumferencias que se intersectam em A, a qual cortará as mesmas circumferencias em E e E'. Se tirarmos a recta CC', C'C'', MC e MC'' ter-se-ha produzido o triangulo OC'C'', cortado pela recta MC antiparalela a C'C''.


Com efeito, por serem eguaes os angulos BAE e B'AE', ter-se-ha $\widehat{BE}^0 = \widehat{B'E'}^0$, e por conseguinte $\widehat{MB}^0 = \widehat{MB'}^0$, e logo

..

$MCO = OC''C'$; concluindo-se o existirem os quatro pontos M, C, C' e C'' na mesma circumferencia ω .

Reciprocamente, se de tres vertices d'um quadrilatero inscriptivel, como centros, descrevermos circumferencias que passem pelo quarto vertice, digo que as outras tres intersecções d'estas circumferencias estarão em linha recta.

Sejam por sua ordem CM, C'M, C''M as tres circumferencias dadas e sejam B e A respectivamente as intersecções da 1.^a e 2.^a, e da 1.^a e 3.^a, e supponha-se que a 3.^a não encontra a 2.^a na intersecção B' d'esta com a recta AB, mas que corta esta recta em B₁ ou B₂; descreva-se então nova circumferencia C''₁ por A, M, B'. A primitiva circumferencia C'' e a actual C''₁ teem ambas os respectivos centros na recta CC'' perpendicular á corda MA, situados á direita d'ella; e visto que ambos esses centros estão na circumferencia ω (propos. diret.), já cortada pela dita perpendicular á esquerda de MA; segue-se que esta circumferencia será cortada por uma recta em tres pontos C, C'' e C''₁, o que é absurdo.



BIBLIOGRAPHIA

L. C. Almeida. — *Primeiras noções sobre o calculo das quantidades geometricas.* — Coimbra, 1892.

Contem este opusculo a theoria das operações sobre quantidades geometricas e a da representação d'estas quantidades por numeros imaginarios. A exposição d'estas doutrinas é feita com a maior clareza e simplicidade, de modo a poderem ser comprehendidas pelos alumnos dos Lyceus.

Contém ainda o mesmo opusculo as demonstrações do theorema fundamental da Algebra que se baseam nas theorias n'elle estudadas.

E. Mosnat. — *Problèmes de Géométrie analytique,* t. II. — Paris, 1892.

Deu-se na pag 21 do t. x d'este jornal noticia do vol. I d'esta boa collecção de problemas. No presente volume o auctor occupa-se ainda da Geometria analytica plana, appresentando a este respeito 699 problemas, uns com as respectivas soluções e outros simplesmente enunciados. Os assumptos a que estes problemas se referem são aquelles que são exigidos aos candidatos ás Escholas Polytechnica e Normal de Paris.

Estes assumptos sendo entre nós estudados numa cadeira do primeiro anno dos cursos superiores de Mathematica, recomendaremos esta collecção de problemas aos alumnos que frequentam esta cadeira.

Ed. Weyr. — *Sur l'intégrale elliptique de troisième espèce (Bulletin da Academia bohemia de Praga, t. II).*

N'este bello artigo o auctor determina os integraes definidos

$$\int_0^K \frac{k^2 sna \ cna \ dna \ sn^2 x}{1 - k^2 sn^2 a \ sn^2 x} dx, \quad \int_K^{K+iK'} \frac{k^2 sna \ cna \ dna \ sn^2 x dx}{1 - k^2 sn^2 a \ sn^2 x},$$

obtendo por um meio novo dois resultados importantes devidos ao sr. Hermite.

R. Guimarães. — *Nota sobre la construccion de una normal a una ellipse (El Progreso matematico, t. II).*

Expoisão de um meio facil de traçar a normal á ellipse, cujos eixos são a e b , pelos pontos cujas distancias ao centro são $a+b$ e $a-b$, e demonstraçao de que existe um ponto na circumferencia de raio $a-b$ tal que a normal traçada por elle passa pelo ponto de desvio maximo.

G. de Longchamps. — *Le calcul des séries convergentes (El Progreso matematico, t. II).*

N'este artigo tracta o sr. Longchamps de resolver, em alguns casos, o problema que consiste em determinar o numero de termos de uma serie convergente dada que é necessario tomar para ter a somma da serie com uma approximaçao determinada.

P. Günther. — *Das Additionstheorem der elliptischen Functionen (Journal für die reine und angewandte Mathematik, t. 109).*

P. Günther.—*Ueber die eidentigen Functionen von zwei durch eine algebraiche Gleichung verbundenen Veränderlichen* (Item).

O auctor d'estes dois bellos trabalhos falleceu em Berlin em 27 de setembro de 1891, tendo apenas 24 annos de idade. Estas duas memorias foram publicadas depois da sua morte.

Ed. Weyr.—*Construction von Osculationskegelschnitten der durch krumme projectivische Reihen und Büschal erzeugten Curven* (*Bulletin da Academia bohemia de Praga*, t. II).

—*Zur Theorie der Flächen, welche eine Schar von Kegelschnitten enthalten* (*Monatshefte für Mathematik und Physik*, t. II).

G. Vivanti.—*Notice historique sur la théorie des ensembles* (*Bibliotheca mathematica*, 1892).

H. Burkhardt.—*Zur Reduction des Problems der Geraden der allgemeinen Fläche dritter Ordnung auf das Transformationsproblem der hyperelliptischen Functionen p=2.* (*Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen*, 1892).

L. Königsberger.—*Ueber die Irreductibilität der algebraischen partiellen Differentialgleichung* (*Sitzungsberichte der k. bayer Akad. der Wiss.*, t. XXI).

J. Bergbohm.—*Neue Intégrationsmethoden auf Grund der Potenzial, Logarithmal und Numeralrechnung*, Stuttgart, 1892.

*J. Bergbohm.—Neue Rechnungsmethoden der hoheren Mathematik.
—Stuttgart, 1892).*

R. Mehmke.—Ueber eine allgemeine Construction der Krümmungsmittelpunkte ebener Curven und eine neue Begründung der Fundamentalsatze der Flächentheorie (Rivista di Matematica, t. II).

*J. A. Serrasqueiro.—Tratado de Geometria Elementar, 8.ª edição,
Coimbra, 1892.*

*— Tratado Elementar de Arithmetica, 11.ª edição, Coimbra,
1892.*

G. T.

SUR LA CONIQUE OSCULATRICE DES LIGNES PLANES

PAR

GEMINIANO PIRONDINI

(à Parme)

I

Equation de la conique osculatrice

Rapportons une ligne plane quelconque L au système d'axes formé par une de ses tangentes (axe des ξ) et par la normale correspondante (axe des η) et soient : ξ, η les coordonnées d'un point quelconque ; s et ε l'arc et le rayon de courbure de L ; ϵ l'inclinaison d'une tangente quelconque sur l'axe des ξ . On a les formules :

$$\rho = \frac{ds}{d\varepsilon}; \quad d\xi = \cos \varepsilon \cdot ds; \quad d\eta = \sin \varepsilon \cdot ds; \quad \frac{d\eta}{d\xi} = \tan \varepsilon;$$

et à l'origine A des axes, où l'on a $\varepsilon = 0$, on peut écrire :

$$(1) \begin{cases} \frac{d}{d\xi} = 0; \quad \frac{d^2\eta}{d\xi^2} = \frac{1}{\rho}; \quad \frac{d^3\eta}{d\xi^3} = -\frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{ds}; \\ \frac{d^2\eta}{d\xi^4} = \frac{3}{\rho^3} + \frac{2}{\rho^3} \left(\frac{d\rho}{ds} \right)^2 - \frac{1}{\rho^2} \frac{d^2\rho}{ds^2}. \end{cases}$$

Une conique quelconque K, tangente à la courbe donnée L à l'origine A des axes, a pour équation :

$$(2) \quad Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dy = 0,$$

A, B, C, D étant des constantes et les coordonnées x, y étant comptées suivant les axes des ξ et des η respectivement.

Si l'on dérive successivement l'équation (2) quatre fois par rapport à x , en remarquant que l'on a :

$$x=0, \quad y=0, \quad \frac{dy}{dx}=0$$

à l'origine A, on trouve que la première des équations dérivées est vérifiée par identité et les autres suivantes deviennent :

$$(3) \quad \begin{cases} D \frac{d^2y}{dx^2} + A = 0; & D \frac{d^3y}{dx^3} + 3B \frac{d^2y}{dx^2} = 0; \\ D \frac{d^4y}{dx^4} + 3C \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)^2 + 4B \cdot \frac{d^3y}{dx^3} = 0, \end{cases}$$

les dérivées étant évaluées à l'origine A.

Les quantités A, B, C, D peuvent être déterminées de façon, à rendre au point A :

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{dy}{dx}; \quad \frac{d^2\eta}{d\xi^2} = \frac{d^2y}{dx^2}; \quad \frac{d^3\eta}{d\xi^3} = \frac{d^3y}{dx^3}; \quad \frac{d^4\eta}{d\xi^4} = \frac{d^4y}{dx^4}$$

ce qui, en force des (1), (3), nous donne :

$$\frac{A}{D} = -\frac{1}{\rho}; \quad \frac{B}{D} = \frac{1}{3} \frac{\rho'}{\rho}; \quad \frac{C}{D} = \frac{3\rho\rho'' - 2\rho'^2 - 9}{9\rho}.$$

En prenant $D = 9\rho$, on peut dire que l'équation de la conique osculatrice à une ligne plane quelconque (courbes dont le contact mutuel est du quatrième ordre) est la (2), A, B, C, D étant définis comme il suit :

$$(4) \quad A = -9; \quad B = 3\rho'; \quad C = 3\rho\rho'' - 2\rho'^2 - 9; \quad D = 9\rho.$$

Cette conique est donc une ellipse, une parabole ou une hyperbole suivant que la quantité

$$3\rho\rho'' - 2\rho'^2 - 9$$

est, au point considéré, $< 0, = 0, > 0$.

APPLICATION. — D'après ce qui vient d'être dit,

$$3\rho\rho'' - 2\rho'^2 - 9 = 0$$

est l'équation différentielle de la courbe dont toute conique osculatrice est une parabole.

Et puisque par le calcul habituel on obtient :

$$\int \frac{d\rho}{\sqrt{a\rho^{\frac{2}{3}} - 9}} = s + b,$$

a et b étant des constantes, on voit que la ligne cherchée est elle-même une parabole (*); les coniques osculatrices coïncident donc, dans ce cas, avec la ligne osculée.

Les points où la conique osculatrice d'une ligne plane est une parabole sont donc des points isolés; et sur la courbe donnée, dans le voisinage d'un de ces points, les coniques osculatrices sont d'un côté des ellipses et de l'autre des hyperboles.

Par exemple sur la chaînette :

$$\rho = \frac{s^2}{a} + a$$

il y a seulement le point $s = a\sqrt{\frac{3}{2}}$ où la conique osculatrice est une parabole; dans les autres points cette conique est une ellipse ou une hyperbole suivant que :

$$s < a\sqrt{\frac{3}{2}}, \text{ ou } s > a\sqrt{\frac{3}{2}}.$$

II

Centre de la conique osculatrice

Si la conique osculatrice est une ellipse ou une hyperbole, le centre est à distance finie; en désignant par x_0 , y_0 ses coordonnées par rapport à la tangente et à la normale au point de contact, on a :

$$x_0 = -\frac{BD}{B^2 - AC}, \quad y_0 = \frac{AD}{B^2 - AC},$$

(*) Cesaro — Sur deux classes remarquables de lignes planes — N. Annales de Mathématiques, 1888.

c'est-à-dire à cause des (4) :

$$(5) \quad x_0 = \frac{3\rho\rho'}{9 + \rho'^2 - 3\rho\rho''}, \quad y_0 = \frac{9\rho}{9 + \rho'^2 - 3\rho\rho''}.$$

Prenons pour direction positive de l'axe des y celle qui va du point de contact au centre de courbure et pour direction positive de l'axe des x la direction de la courbe suivant laquelle le rayon de courbure augmente. On voit alors que le centre de la conique osculatrice à la ligne plane L est placé, par rapport à la tangente de L , du côté de la concavité ou de la convexité, et, par rapport à la normale de L , du côté où le rayon de courbure croît ou diminue, suivant que cette conique est une ellipse ou une hyperbole.

Lorsque la conique osculatrice est une parabole, le centre est à l'infini sur la droite passant par le point de contact et inclinée à la tangente de la ligne osculée de l'angle φ défini par l'équation :

$$\tan \varphi = \frac{y_0}{x_0} = \frac{3}{\rho'}.$$

APPLICATION. — Si l'on exclut de notre considération le cercle, la première des (5) nous apprend qu'il ne peut pas être $x_0 = 0$; la normale à la courbe osculée n'est donc jamais un axe de la conique osculatrice.

Nous allons voir, avec plus de généralité, s'il y a des lignes où les axes des coniques osculatrices sont inclinés d'un angle constant sur les tangentes des lignes osculées. Si θ est l'inclinaison d'un axe de la conique sur l'axe des x , on a :

$$\tan(2\theta) = \frac{2B}{A-C} = \frac{6\rho'}{2\rho'^2 - 3\rho\rho''},$$

d'où il suit :

$$3 \tan(2\theta) \cdot \rho\rho'' - 2 \tan(2\theta) \cdot \rho'^2 + 6\rho' = 0.$$

Lorsque $\rho''=0$, l'équation que l'on vient d'écrire donne :

$$\rho = 3 \cot(2\theta) \cdot s;$$

toute spirale logarithmique appartient donc à la famille des lignes dont il s'agit; et si l'on désigne par i l'inclinaison constante de cette courbe sur les rayons vecteurs issus du pôle, on a :

$$\cot \theta = \frac{\cot i \pm \sqrt{9 + \cot^2 i}}{3}.$$

Si ρ'' n'est pas = 0, on obtient à l'aide d'un calcul usuel :

$$\frac{k}{3} \tan(2\theta) \int \frac{d\rho}{\rho^{\frac{2}{3}} + k} = s + a,$$

k et a étant des constantes arbitraires.

1.^{er} CAS. — Si $k < 0$, en remplaçant k par $-k^2$, on a après une quadrature :

$$\rho^{\frac{1}{3}} + k \log \sqrt{\frac{\rho^{\frac{1}{3}} - k}{\rho^{\frac{1}{3}} + k}} = b - \frac{\cot(2\theta)}{k^2} \cdot s,$$

b étant une constante.

2.^{eme} — Si $k < 0$, on remplace k par k^2 et un procédé analogue au précédent nous donne :

$$\rho^{\frac{1}{3}} - k \cdot \text{arc.} \tan \left(\frac{\rho^{\frac{1}{3}}}{k} \right) = b + \frac{\cot(2\theta)}{k^2} \cdot s,$$

b étant une constante.

Le problème proposé est donc résolu dans toute sa généralité.

CAS PARTICULIER. — Si $\theta = \frac{\pi}{4}$, l'équation différentielle du problème se réduit à :

$$3\rho\rho'' = 2\rho'^2,$$

d'où par intégration :

$$\rho = (as + b)^3,$$

a et *b* étant des constantes.

III

Axes de la conique osculatrice

L'équation de la conique osculatrice rapportée à ses axes est :

$$Mx^2 + Ny^2 + P = 0,$$

M, *N*, *P* étant liés par les relations :

$$M + N = A + C; \quad MN = AC - B^2; \quad P = Dy_0,$$

et y_0 étant donné par la deuxième des (5).

Si donc on pose :

$$\mathbf{t} = \sqrt{-\frac{M}{P}}, \quad \mathbf{l} = \sqrt{-\frac{N}{P}},$$

on obtient :

$$(6) \begin{cases} \frac{1}{a} = \frac{1}{9\rho} \sqrt{\frac{9 + \rho'^2 - 3\rho\rho''}{2} (18 + 2\rho'^2 - 3\rho\rho'' - \sqrt{36\rho'^2 + (2\rho'^2 - 3\rho\rho'')^2})} \\ \frac{1}{b} = \frac{1}{9\rho} \sqrt{\frac{9 + \rho'^2 - 3\rho\rho''}{2} (18 + 2\rho'^2 - 3\rho\rho'' + \sqrt{36\rho'^2 + (2\rho'^2 - 3\rho\rho'')^2})} \end{cases}$$

Lorsque la conique osculatrice est une ellipse, on a :

$$9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'' > 0; \quad 18 + 2\rho'^2 - 3\rho\rho'' = (9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'') + (9 + \rho'^2) > 0$$

$$(18 + 2\rho'^2 - 3\rho\rho'')^2 > 36\rho'^2 + (2\rho'^2 - 3\rho\rho'')^2,$$

ce qui démontre que a et b sont des quantités réelles et de plus :

$$a > b;$$

$2a$ est donc le grand-axe de l'ellipse osculatrice et $2b$ le petit-axe.

Si la conique osculatrice est une hyperbole, on a :

$$9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'' < 0$$

et conséquemment :

$$(18 + 2\rho'^2 - 3\rho\rho'')^2 < 36\rho'^2 + (2\rho'^2 - 3\rho\rho'')^2,$$

c'est-à-dire :

$$18 + 2\rho'^2 - 3\rho\rho'' < \sqrt{36\rho'^2 + (2\rho'^2 - 3\rho\rho'')^2}.$$

L'expression de a est donc réelle et celle de b est imaginaire ;

$2a$ est par conséquent l'axe réel de l'hyperbole osculatrice et $2b\sqrt{-1}$ la longueur réelle de l'axe imaginaire.

APPLICATIONS — 1) a et b soient des constantes.

Les (6) nous donnent :

$$(7) \quad \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{(9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'') \{(9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'') + (9 + \rho'^2)\}}{81\rho^2}.$$

$$(8) \quad ab = \frac{27\rho^2}{(9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'')^{\frac{3}{2}}},$$

d'où, en éliminant $9 + \rho'^2 - 3\rho\rho''$,

$$\rho' = 3\sqrt{\left\{\left(\frac{ap}{b^2}\right)^{\frac{2}{3}} - 1\right\}\left\{1 - \left(\frac{bp}{a^2}\right)^{\frac{2}{3}}\right\}}.$$

On obtient par intégration :

$$s + \text{const} = \frac{1}{3} \int \frac{d\rho}{\sqrt{\left\{\left(\frac{ap}{b^2}\right)^{\frac{2}{3}} - 1\right\}\left\{1 - \left(\frac{bp}{a^2}\right)^{\frac{2}{3}}\right\}}}$$

c'est-à-dire l'équation intrinsèque des coniques (*).

Donc «entre les lignes planes il n'y a que les coniques dans les-

(*) Cesaro — *Mémoire* cité.

quelles toutes les coniques osculatrices soient égales entre elles ; et dans ce cas les coniques osculatrices coïncident avec la courbe osculée».

2) Si les coniques osculatrices sont des ellipses ayant une surface constante, la (8) nous donne :

$$(9) \quad 9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'' = m\rho^{\frac{4}{3}}$$

m étant une constante ; cette équation différentielle peut se rendre linéaire du premier ordre par une transformation visible. Une intégration effectuée sur l'équation transformée, nous donne :

$$(10) \quad 9 + \rho'^2 + m\rho^{\frac{4}{3}} = n\rho^{\frac{2}{3}},$$

n étant une nouvelle constante.

La (9) réduit la (7) à l'autre :

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{m\rho^{\frac{4}{3}}(9 + \rho'^2 + m\rho^{\frac{4}{3}})}{81\rho^2}$$

qui, par l'application de la (10), devient :

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{mn}{81}.$$

Les conditions :

$$ab = \text{const}, \quad \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \text{const}$$

nous apprendent que la conique osculatrice est toujours égale à soi-même ; en appliquant donc le théorème précédent, on a :

«*Si les coniques osculatrices d'une ligne plane sont des ellipses*

à surface constante, cette ligne est elle-même une ellipse; et dans ce cas les coniques osculatrices coïncident avec la courbe osculée».

3) Si la conique osculatrice à une ligne plane est toujours une hyperbole équilatère, on a:

$$\frac{a^2}{b^2} = -1,$$

c'est-à-dire, à cause des (6):

$$3\varphi'' - 2\varphi'^2 - 18 = 0.$$

Cette équation, par un procédé très connu, donne

$$\int \frac{d\varphi}{\sqrt{m\varphi^{\frac{4}{3}} - 9}} = s + \text{const}, \quad (m = \text{const})$$

qui représente une hyperbole équilatère (*).

Donc «entre les lignes planes il n'y a que l'hyperbole équilatère dans laquelle toutes les coniques osculatrices soient des hyperboles équilatères; et dans ce cas les coniques osculatrices coïncident avec la courbe osculée».

4) Si la conique osculatrice est une ellipse et l'on désigne par S sa surface, on a à cause de l'équation (8):

$$S = \frac{27\pi\varphi^{\frac{2}{3}}}{(9 + \varphi'^2 - 3\varphi\varphi'')^{\frac{3}{2}}}.$$

Si donc le rapport de la surface du cercle osculateur à celle de

(*) Cesaro — Mémoire cit.

l'ellipse osculatrice est une constante k , on a l'équation :

$$(11) \quad 3\rho\rho'' - \rho'^2 = a$$

dans laquelle :

$$(12) \quad a = 9 \left(1 - \sqrt[3]{k^2} \right).$$

L'équation (11), par un calcul très facile, donne :

$$(13) \quad \int \frac{dp}{\sqrt{\frac{2}{mp^3} - a}} = s + b,$$

m et b étant des constantes.

1^{er} CAS. — Si $a > 0$, c'est-à-dire $k < 1$, la constante m est positive ; en la remplaçant par m^2 et en effectuant la quadrature (13), on a :

$$(14) \quad m \rho^{\frac{1}{3}} \sqrt{m^2 \rho^{\frac{2}{3}} - a} + a \cdot \log \left(m \rho^{\frac{1}{3}} + \sqrt{m^2 \rho^{\frac{2}{3}} - a} \right) = \frac{2m^3}{3} s + b.$$

2^{eme} CAS. — Si $a = 0$, c'est-à-dire $k = 1$, la constante m doit être positive ; en la remplaçant par m^2 , la (10) nous donne :

$$(15) \quad \rho = (cs + b)^{\frac{3}{2}}$$

c et b étant des constantes.

3^{eme} CAS. — Si $a < 0$, c'est-à-dire $k > 1$, posons :

$$(16) \quad A = -a = 9 \left(\sqrt[3]{k^2} - 1 \right)$$

et l'équation (13) devient :

$$\int \frac{d\rho}{\sqrt{A + m\rho^{\frac{2}{3}}}} = s \text{ const}$$

$\alpha)$ — Si $m < 0$, on peut la remplacer par $-m^2$ et alors, en effectuant la quadrature, on a :

$$(17) \quad m\rho^{\frac{1}{3}}\sqrt{A - m^2\rho^{\frac{2}{3}}} + A \cdot \text{arc. tang} \left(\frac{\sqrt{A - m^2\rho^{\frac{2}{3}}}}{m\rho^{\frac{1}{3}}} \right) = b - \frac{2m^3}{3}s.$$

$\beta)$ — Si $m = 0$, on a :

$$(18) \quad \rho = \sqrt{A} \cdot s + b.$$

$\gamma)$ — Si $m > 0$, on peut la remplacer par m^2 , ce qui donne :

$$(19) \quad m\rho^{\frac{1}{3}}\sqrt{A + m^2\rho^{\frac{2}{3}}} - A \log \left(m\rho^{\frac{1}{3}} + \sqrt{A + m^2\rho^{\frac{2}{3}}} \right) = \frac{2m^3}{3}s + b.$$

En résumant, des lignes planes dans lesquelles les coniques osculatrices sont des ellipses ayant un rapport constant $\frac{1}{k}$ aux cercles osculateurs il y en a une seule famille (celle représentée par (14), a étant donné par (12)) si $k < 1$; une seule famille (celle représentée par (15)) si $k = 1$; trois familles (celles représentées par (17), (18), (19), A étant donné par (16)) si $k > 1$.

La (18) nous apprend que les spirales logarithmiques appartiennent à la famille des lignes dont il s'agit; pour ces courbes

le rapport $k (> 1)$ est lié à l'angle constant i sous lequel les spirales coupent les rayons vecteurs issus du pôle par la relation :

$$\cot i = 3\sqrt[3]{k^2 - 1}.$$

IV

Propriétés caractéristiques de quelques lignes particulières

1) Si A est le point de contact, C_1, C_2 les centres de première et de deuxième courbure de la ligne osculée et C le centre de la conique osculatrice, la condition que les points C_1, C_2, C soient en ligne droite est $y_0 = \rho$, y_0 étant donné par la deuxième équation (5).

Cela nous offre :

$$3\rho\rho'' - \rho'^2 = 0,$$

équation que l'on peut dériver de la (11) en y supposant $a = 0$, ce qui conduit aux lignes représentées par (15).

Donc «les lignes planes dans lesquelles les centres de première et de deuxième courbure et le centre de la conique osculatrice sont en ligne droite, sont caractérisées par la propriété que la conique osculatrice est toujours une ellipse ayant la même surface du cercle osculateur. Ces lignes sont représentées, en coordonnées intrinsèques ρ, s , par l'équation (15)».

2) Soit C_3 le centre de troisième courbure de la ligne osculée et les points C_2, C_3, C soient en ligne droite. Puisque C_2 est, par rapport à la normale de la ligne L, du côté où les rayons de courbure diminuent, on doit avoir $x_0 = -\rho_1$, x_0 étant donné par la première des (5) et ρ_1 étant le rayon de courbure de la ligne donnée.

Et puisque $\rho_1 = \rho\rho^1$, il résulte :

$$3\rho\rho'' - \rho'^2 = 12,$$

équation que l'on dérive de la (11) en posant $a = 12$.

Donc «les lignes planes dans lesquelles les centres de première et de deuxième courbure et le centre de la conique osculatrice sont en ligne droite sont douées de la propriété que la conique osculatrice est toujours une hyperbole. Ces lignes sont représentées en coordonnées intrinsèques ρ, s , par l'équation (14) pourvu que l'on y suppose $a = 12$ ».

3) Si dans l'équation de la conique osculatrice on posé $x = 0$, on a pour y deux valeurs :

$$y_1 = 0, \quad y_2 = \frac{18\rho}{9 + 2\rho'^2 - 3\rho\rho''}.$$

Il suit que l'équation :

$$(20) \quad 3\rho\rho'' - 2\rho'^2 + 9 = 0,$$

que l'on obtient en posant $y_2 = \rho$, représente les lignes planes dans lesquelles les coniques osculatrices passent par le centre de courbure.

L'équation de ces lignes est donc :

$$(21) \quad \int \frac{d\rho}{\sqrt{\frac{9}{2} + m\rho^{\frac{4}{3}}}} = s + \text{const},$$

m étant une constante.

Si à la condition du passage de la conique osculatrice par le centre de courbure on ajoute l'autre que cette conique soit une ellipse ayant un rapport constant au cercle osculateur, on a le système des équations (14), (20) d'où, en retranchant et intégrant :

$$\rho = 3\sqrt[3]{2 - \sqrt[3]{k^2}} \cdot s + \text{const},$$

la constante k étant donnée par l'égalité:

$$(22) \quad k = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

En appliquant donc ce que l'on a vu à la fin du § III, on a le théorème:

« La famille de lignes planes dans lesquelles les coniques osculatrices sont des ellipses passant par le centre de courbure et ayant un rapport constant $\frac{1}{k}$ aux cerdes de courbure est constituée par les spirales logarithmiques coupant les rayons vecteurs issus du pôle sous l'angle i tel que $\cot i = \frac{3}{\sqrt{2}}$. Pour ces lignes le rapport constant k est donné par (22).

REMARQUE. — Les équations (20), (21) nous donnent:

$$3\rho\rho'' - \rho'^2 - 9 = \rho'^2 - 18 = m\rho^{\frac{4}{3}} - \frac{27}{2}.$$

Si donc $m < 0$, la conique osculatrice est toujours une ellipse; si $m = 0$, on tombe sur les spirales logarithmiques que l'on vient de déterminer et conséquemment la conique osculatrice est toujours une ellipse; si $m > 0$, la conique osculatrice est une ellipse, une parabole ou une hyperbole suivant que la quantité $m\rho^{\frac{4}{3}} - \frac{27}{2}$ est, au point de contact, < 0 , $= 0$, > 0 .

4) Soit ε l'inclinaison de la tangente au point de contact sur la droite AC_2 joignant A au centre C_2 de deuxième courbure; si l'on remarque que le rayon ρ_1 de deuxième courbure est lié à ρ par la relation $\rho_1 = \rho\rho'$, on a:

$$\tan \varepsilon = \frac{\rho}{\rho_1} = \frac{1}{\rho'}.$$

Et si l'on élimine x entre l'équation de la conique osculatrice et l'équation:

$$x = \rho' y$$

de la droite AC_2 , on a pour y deux valeurs:

$$y_1 = 0, \quad y_2 = \frac{18\rho}{18 + 5\rho'^2 - 3\rho\rho''}.$$

Il suit que l'équation:

$$(23) \quad 3\rho\rho'' - 5\rho'^2 + 9 = 0,$$

que l'on obtient en posant $y_2 = \varepsilon$, représente les lignes planes dont les coniques osculatrices passent par le centre de deuxième courbure. L'équation de ces lignes est donc:

$$(24) \quad \int \frac{d\rho}{\sqrt{\frac{9}{5} + m\rho^{\frac{10}{3}}}} = s + \text{const},$$

m étant une constante.

Les lignes pour lesquelles sont vérifiées les équations (11), (23) sont représentées par l'équation

$$\rho = \frac{3}{2} \sqrt[3]{2 - \sqrt[3]{k^2}} \cdot s + \text{const},$$

k étant défini par l'égalité:

$$(25) \quad k = \left(\frac{6}{5} \right)^{\frac{3}{2}};$$

si donc on a présent les dernières considérations du § III, on a:

«La famille de lignes dans lesquelles les coniques osculatrices sont des ellipses passant par le centre de deuxième courbure et ayant un rapport constant $\frac{1}{k}$ aux cercles osculateurs, est constituée par les spirales logarithmiques coupant les rayons vecteurs issus du pôle sous l'angle i tel que $\cot i = \frac{3}{\sqrt{5}}$. Pour ces lignes le rapport constant k est donné par (25)».

REMARQUE. — Les équations (23), (24) nous donnent:

$$3\rho\rho'' - \rho'^2 - 9 = 4m\rho^{\frac{10}{3}} - \frac{54}{5}.$$

Si donc $m < 0$, la conique osculatrice est une ellipse; si $m = 0$, on obtient les spirales logarithmiques que l'on a déterminé, et par conséquent la conique osculatrice est une ellipse; si $m > 0$, la conique osculatrice est une ellipse, une parabole ou une hyperbole suivant que la quantité $4m\rho^{\frac{10}{5}} - \frac{54}{5}$ est, au point de contact, < 0 , $= 0$, > 0 .

V

Application à la spirale logarithmique

L'équation intrinsèque de la spirale logarithmique L coupant les rayons vecteurs issus du pôle sous l'angle constant i peut s'écrire;

$$\rho = s \cdot \cot i;$$

et puisque on en dérive:

$$3\rho\rho'' - \rho'^2 - 9 = -(9 + \cot^2 i) < 0,$$

on conclut que les coniques osculatrices sont des ellipses.

Si ξ, η sont les coordonnées d'un point quelconque de la ligne Δ lieu des centres des coniques osculatrices de L , les équations (5) donnent:

$$\xi = x + \frac{3s \cdot \cot^2 i}{9 + \cot^2 i} \cos \alpha + \frac{9s \cdot \cot i}{9s \cdot \cot^2 i} \cos \lambda;$$

$$\eta = y + \frac{3s \cdot \cot^2 i}{9 + \cot^2 i} \cos \beta + \frac{9s \cdot \cot i}{9 + \cot^2 i} \cos \mu,$$

$(\cos \alpha, \cos \beta), (\cos \lambda, \cos \mu)$ étant les cosinus directeurs de la tangente et de normale de L .

En désignant donc par σ l'arc de Δ , on a:

$$(26) \quad \frac{d\sigma}{ds} = \frac{4 \cot i}{\sqrt{9 + \cot^2 i}}$$

$$\frac{d\xi}{d\sigma} = \frac{\cot i \cos \alpha + 3 \cos \lambda}{\sqrt{9 + \cot^2 i}}, \quad \frac{d\eta}{d\sigma} = \frac{\cot i \cos \beta + 3 \cos \mu}{\sqrt{9 + \cot^2 i}}$$

$$(27) \quad \begin{cases} \frac{d^2\xi}{d\sigma^2} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\cot i \cos \lambda - 3 \cos \alpha}{4 \cot i}, \\ \frac{d^2\eta}{d\sigma^2} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\cot i \cos \mu - 3 \cos \beta}{4 \cot i}; \end{cases}$$

et si ρ_1 est le rayon de courbure de Δ , les (27) donnent:

$$\rho_1 = \frac{4 \cot i}{\sqrt{9 + \cot^2 i}} \cdot \rho = \frac{4 \cot^2 i}{\sqrt{9 + \cot^2 i}} \cdot s,$$

c'est-à-dire, à cause de la (26):

$$\rho_1 = s \cdot \cot i.$$

Donc «le lieu des centres des ellipses osculatrices d'une spirale logarithmique L est une nouvelle spirale logarithmique Δ égale à la primitive et ayant le même pôle».

Si A, A_0 sont deux points correspondants des lignes L, Δ ; δ la distance AA_0 et φ l'inclinaison de AA_0 sur la tangente de L , on a, à cause des (5):

$$\delta = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \frac{3 \cot i \cdot s}{\sqrt{9 + \cot^2 i}}; \quad \tang \varphi = \frac{y_0}{x_0} = 3 \tang i,$$

d'où l'on dérive:

$$\delta = s \cdot \cot i \cdot \sin \varphi = \rho \cdot \sin \varphi.$$

Le point A_0 est donc la projection orthogonale du centre de courbure sur la droite AA_0 ; et puisque les droites comme AA_0 sont inclinées d'un angle constant sur L , on a:

«Les droites joignant les points d'une spirale logarithmique L aux centres correspondants des ellipses osculatrices sont les tangentes à la spirale Δ lieu de ces centres».

Puisque les formules (6) et celle donnant la surface de l'ellipse

osculatrice deviennent dans notre cas :

$$(28) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{a} = \frac{(9 + \cot^2 i)^{\frac{3}{2}} (\sqrt{9 + \cot^2 i} - \cot i)^{\frac{1}{2}}}{9 \cot i} \cdot \frac{1}{s}; \\ \frac{1}{b} = \frac{(9 + \cot^2 i)^{\frac{3}{2}} (\sqrt{9 + \cot^2 i} + \cot i)^{\frac{1}{2}}}{9 \cot i} \cdot \frac{1}{s}; \end{array} \right.$$

$$S = \frac{27}{(9 + \cot^2 i)^{\frac{3}{2}}} \cdot \pi \rho^2,$$

on conclut : «Les ellipses osculatrices d'une spirale logarithmique sont semblables entre elles; le rapport de leur surface à celle du cercle osculateur est la constante $27 (9 + \cot^2 i)^{-\frac{3}{2}}$ ».

(Voir, pour cette dernière propriété, la fin du § III).

Considérons le triangle AA₀B dont les sommets sont le point de contact A, le centre A₀ de l'ellipse osculatrice et le point B où la tangente AT est coupée par l'axe de l'ellipse ayant l'inclinaison θ sur la tangente. Puisque (§ II) :

$$(29) \quad \tan(2\theta) = \frac{6\rho'}{2\rho'^2 - 3\rho\rho''} = 3 \cdot \tan i$$

et l'inclinaison φ de la droite AA₀ sur la tangente est définie de la manière suivante (§ V)

$$\tan \varphi = \tan(TAA_0) = 3 \cdot \tan i,$$

il résulte :

$$\varphi = 2\theta;$$

et cela démontre que le triangle AA₀B est isoscèle sur la base BA₀.

Si donc on remarque que la droite AA_0 est tangente à la spirale Δ et que, dans une ellipse, la tangente, dont le point de contact est à la même distance du centre et des traces de cette tangente sur les axes de la conique, est parallèle à la droite joignant les extrémités du cadran elliptique qui contient le point de contact, on arrive aux propriétés suivantes: «*Dans la spirale logarithmique les axes de l'ellipse osculatrice sont inclinés d'un même angle constant sur les tangentes de la ligne donnée et du lieu des centres de ces ellipses*».

«*Si à un point quelconque d'une spirale logarithmique on construit l'ellipse osculatrice, la tangente commune à ces lignes, au point de contact, est parallèle à la droite joignant les deux sommets de cette conique entre lesquels est placé le point de contact*».

Si nous revenons un instant au cas d'une ligne quelconque L , et l'on conserve aux symboles φ et δ la même signification qu'auparavant, on a:

$$\tan \varphi = \frac{y_0}{x_0} = \frac{3}{\rho'}; \quad \delta = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \frac{3\rho \sqrt{9 + \rho'^2}}{9 + \rho'^2 - 3\rho\rho''}.$$

La condition $\delta = \rho \cdot \sin \varphi$, revenant à l'autre:

$$\frac{9 + \rho'^2}{(9 + \rho'^2 - 3\rho\rho'')^2} = \frac{1}{9 + \rho'^2},$$

donne $\rho'' = 0$, cas de la spirale logarithmique.

Si l'on rappelle l'expression de $\tan(2\theta)$ du § II, on voit que la condition $2\theta = \varphi$ équivaut à l'autre:

$$\frac{6\rho'}{2\rho'^2 - 3\rho\rho''} = \frac{3}{\rho'},$$

ce qui entraîne l'équation $\rho'' = 0$ de la spirale logarithmique.

Donc «la propriété que dans la spirale logarithmique le centre de la conique osculatrice est la projection orthogonale du centre de

courbure sur le diamètre de la conique passant au point de contact, et l'autre que les axes de la conique osculatrice ont la même inclinaison sur la tangente de cette conique au point de contact et sur le diamètre passant par ce point, appartiennent exclusivement à la spirale logarithmique».

VI

Une propriété générale de la spirale logarithmique
et ses applications

Si x_1, y_1 sont les coordonnées d'un point quelconque de la ligne L_1 que l'on obtient de la spirale logarithmique L

$$\varphi = s \cdot \cot i$$

en menant par ses points des droites inclinées de l'angle constant φ à la courbe L et en prenant sur ces droites des portions ks proportionnelles à l'arc s , on a:

$$(30) \quad \begin{cases} x_1 = x + ks (\cos \alpha \cos \varphi + \cos \lambda \sin \varphi); \\ y_1 = y + ks (\cos \beta \cos \lambda + \cos \mu \sin \varphi), \end{cases}$$

$(\cos \alpha, \cos \beta)$, $(\cos \lambda, \cos \mu)$ étant les cosinus directeurs de la tangente et de la normale de L .

Si s_1 est l'arc de L_1 et l'on pose:

$$(31) \quad m = \sqrt{(1 + k \cos \varphi - k \sin \varphi \cdot \tan i)^2 + k^2 (\sin \varphi + \cos \varphi \cdot \tan i)^2}$$

on obtient:

$$ds_1 = mds$$

$$(32) \quad \begin{cases} \frac{dx_1}{ds_1} = \frac{1}{m} \left\{ (1 + k \cos \varphi - k \sin \varphi \cdot \tan i) \cos \alpha + k (\sin \varphi + \cos \varphi \cdot \tan i) \cos \lambda \right\} \\ \frac{dy_1}{ds_1} = \frac{1}{m} \left\{ (1 + k \cos \varphi - k \sin \varphi \cdot \tan i) \cos \beta + k (\sin \varphi + \cos \varphi \cdot \tan i) \cos \mu \right\} \\ \frac{d^2x_1}{ds_1^2} = \frac{1}{m^2} \left\{ (1 + k \cos \varphi - k \sin \varphi \cdot \tan i) \cos \lambda - k (\sin \varphi + \cos \varphi \cdot \tan i) \cos \alpha \right\} \frac{1}{\rho} \\ \frac{d^2y_1}{ds_1^2} = \frac{1}{m^2} \left\{ (1 + k \cos \varphi - k \sin \varphi \cdot \tan i) \cos \mu - k (\sin \varphi + \cos \varphi \cdot \tan i) \cos \beta \right\} \frac{1}{\rho}. \end{cases}$$

Puisque les dernières équations nous donnent:

$$\rho_1 = m\rho = s_1 \cdot \cot i,$$

on conclut que L_1 est une spirale égale à L ; la construction géométrique donnant L_1 nous apprend à son tour que les deux spirales L , L_1 ont le même pôle.

Soient A_1 et A_2 les points de L_1 qui correspondent au point A de L , suivant que l'on regarde les lignes L et L_1 dans la dépendance qui dérive de la construction géométrique précédente ou bien dans la dépendance qui dérive de leur égalité. Soient: O le pôle commun; OAB , OA_1B_1 , OA_2 les rayons vecteurs; AC , A_1C_1 les tangentes et AA_1D la droite joignant A à A_1 .

On a:

$$\angle BAC = i; \quad \angle CAA_1 = \varphi; \quad \angle OAA_1 = \pi - (i + \varphi).$$

Puisque les cosinus directeurs de AA_1D sont les multiplicateurs de ks dans les (30) et ceux de la tangente A_1C_1 sont donnés par

les (32), on a :

$$\cos(C_1A_1D) = \frac{k + \cos\varphi}{m},$$

d'où :

$$C_1A_1D = \text{arc.} \cos \left(\frac{k + \cos\varphi}{m} \right).$$

Il résulte donc :

$$AA_1O = B_1A_1D = i + \text{arc.} \cos \left(\frac{k + \cos\varphi}{m} \right)$$

et

$$(33) \quad AOA_1 = \varphi - \text{arc.} \cos \left(\frac{k + \cos\varphi}{m} \right).$$

Si $R = R_0 \cdot e^{\cot i} \cdot \omega$ est l'équation polaire de L , et (R_1, ω_1) , (R_2, ω_2) les coordonnées polaires des points A_1, A_2 , on a :

$$R_1 = R_0 e^{\cot i \cdot \omega_1}, \quad R_2 = R_0 e^{\cot i \cdot \omega_2},$$

d'où, en remarquant que $R_2 = OA_2 = OA$:

$$\frac{OA}{OA_1} = \frac{OA_2}{OA_2} = e^{\cot i (\omega_2 - \omega_1)}.$$

Et puisque :

$$\frac{OA}{OA_1} = \frac{1}{m}, \quad \omega_2 - \omega_1 = A_1OA_2,$$

il résulte :

$$(34) \quad A_1OA_2 = -\tan i \cdot \log m.$$

Si donc on pose $\chi = \text{AOA}_2$, les équations (33), (34) donnent:

$$(35) \quad \chi = \varphi - \tan i \cdot \log m - \text{arc. cos} \left(\frac{k + \cos \varphi}{m} \right).$$

Par conséquent «si l'on mène des droites inclinées de l'angle constant φ aux tangentes d'une spirale logarithmique L , et sur ces droites on prend des distances proportionnelles à l'arc de L , le lieu L_1 des extrémités est une nouvelle spirale logarithmique égale à L et ayant le même pôle. On obtient la spirale L_1 dans sa position en faisant tourner L autour du pôle, suivant la direction dans laquelle les rayons vecteurs augmentent, d'un angle χ donné par (35), m étant défini par (31)».

APPLICATIONS. — S'il s'agit du lieu Δ des centres des ellipses osculatrices de L , on a:

$$\delta = AA_1 = \frac{3 \cot i}{\sqrt{9 + \cot^2 i}} \cdot s; \quad \tan \varphi = 3 \cdot \tan i,$$

puis $k = \frac{3 \cot i}{\sqrt{9 + \cot^2 i}}$; $m = \frac{4 \cot i}{\sqrt{9 + \cot^2 i}}$.

La rotation χ que l'on doit donner à la spirale L autour de son pôle, pour obtenir Δ dans sa position, est donc donnée par l'équation:

$$(36) \quad \chi = \text{arc. tan} (3 \tan i) + \tan i \cdot \log \left(\frac{\sqrt{9 + \cot^2 i}}{4 \cot i} \right).$$

Il suit de là que la condition nécessaire et suffisante pour que les spirales Δ , L coïncident, est que l'inclinaison i de la courbe donnée L sur les rayons vecteurs issus du pôle soit une racine

réelle de l'équation:

$$\text{arc . tang} (3 \tan i) + \tan i \cdot \log \left(\frac{\sqrt{9 + \cot^2 i}}{4 \cot i} \right) = 0.$$

Si L_1 est la spirale lieu des centres de courbure de L , la distance entre deux points correspondants de ces lignes est

$$\rho = s \cdot \cot i;$$

on a donc dans ce cas:

$$k = \cot i, \quad \varphi = \frac{\pi}{2}, \quad m = \cot i$$

et conséquemment:

$$x = \frac{\pi}{2} + \tan i \cdot \log (\tan i).$$

Si l'on identifie cette équation à la (36), on voit que la spirale Δ lieu des centres des ellipses osculatrices de L coïncide avec la spirale L_1 lieu des centres des cercles osculateurs, lorsque l'inclinaison i est une racine réelle de l'équation:

$$\text{arc . tang} (3 \tan i) + \tan i \cdot \log \left(\frac{\sqrt{9 + \cot^2 i}}{4} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

Le théorème précédente conduit à une foule d'autres conséquences très intéressantes; par exemple les lieux des deux foyers de l'ellipse osculatrice, les lieux des quatres sommets de cette conique, les courbes enveloppées par les deux axes, celles enveloppées par les deux directrices, etc., sont des spirales logarithmiques égales à la primitive et ayant le même pôle. Il n'y a aucune difficulté à déterminer la rotation à laquelle on doit assujettir la courbe donnée pour obtenir chacune des autres.

• •

VII

La spirale logarithmique considérée comme l'enveloppe de ses ellipses osculatrices

Je me propose de déterminer les conditions sous lesquelles on doit déplacer une ellipse variable, pour que elle soit, à chaque instant, la conique osculatrice de la spirale logarithmique enveloppée. Soient:

$$\rho_1 = \sigma \cdot \cot i, \quad \rho = s \cdot \cot i$$

les équations des spirales égales Δ , L, dont la première est parcourue par le centre de l'ellipse mobile et la deuxième est enveloppée par cette conique. La (26) réduit les (28) aux autres:

$$(37) \quad \left\{ \begin{array}{l} a = \frac{9\sigma}{4(9 + \cot^2 i)^{\frac{1}{4}} \sqrt{\sqrt{9 + \cot^2 i} - \cot i}}, \\ b = \frac{9\sigma}{4(9 + \cot^2 i)^{\frac{1}{4}} \sqrt{\sqrt{9 + \cot^2 i} + \cot i}}. \end{array} \right.$$

Si l'on désigne par ε l'inclinaison d'un des axes de l'ellipse osculatrice sur la spirale logarithmique Δ , une propriété démontrée au § V nous apprend que ε n'est autre chose que l'angle θ de la formule (29); on a donc:

$$(38) \quad \tan \varepsilon = \frac{\sqrt{9 + \cot^2 i} - \cot i}{3}.$$

Cela posé, soit:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

l'équation d'une des ellipses osculatrices et soient A, B les sommets placés sur les axes des x et des y , C le centre et MN la tangente parallèle à la droite AB; son point de contact P est, par une propriété démontrée au § V, le point de contact entre la conique et la spirale logarithmique osculée.

Or si l'on rappelle l'expression (28) des demi-axes de l'ellipse, on a :

$$\tan(\angle NMC) = \tan(\angle BAC) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{9 + \cot^2 i} - \cot i}{3}$$

et cette formule démontre que c'est le grand-axe de l'ellipse osculatrice celui dont l'inclinaison sur la tangente au point de contact a été désignée par θ .

On peut donc énoncer le théorème : «Une ellipse se déplace sur un plan de façon, que le centre parcourt une spirale logarithmique Δ , tandis que les demi-axes a, b varient suivant la loi exprimée par les équations (37). Si le grand-axe de l'ellipse coupe la tangente de Δ sous l'angle ϵ défini par la (38) :

1.º la ligne mobile enveloppe une spirale logarithmique L égale à Δ et ayant le même pôle;

2.º l'ellipse mobile est, dans toute position, la conique osculatrice de la spirale enveloppée.»

APPENDICE

Une nouvelle équation intrinsèque des coniques

Aux §§ I, III de ce mémoire j'ai eu l'occasion de rappeler l'équation en coordonnées intrinsèques ρ, s que M. CESARO a donné pour les coniques; je prends occasion de cela pour faire connaître une autre équation intrinsèque de ces courbes.

Les équations:

$$x = R \cdot \cos \left(\int \frac{\sqrt{1 - R'^2}}{R} ds \right),$$

$$y = R \cdot \sin \left(\int \frac{\sqrt{1 - R'^2}}{R} \cdot ds \right)$$

donnent les coordonnées d'un point quelconque d'une ligne plane, s étant l'arc et R le rayon vecteur issu de l'origine des axes. Et puisque ces équations donnent pour le rayon de courbure ρ

$$\rho = \frac{R \sqrt{1 - R'^2}}{RR'' + R'^2 - 1},$$

on conclut qu'une ligne plane est déterminée d'une manière complète par une équation donnant le rayon vecteur R en fonction de l'arc s .

Je me propose ici de trouver l'équation caractéristique des coniques en coordonnées intrinsèques R, s .

CONIQUES A CENTRE. — Si O, O_1 sont les foyers, a la dis-

tance OO_1 , R le rayon vecteur joignant O à un point quelconque $A(x, y)$ de la conique, les cosinus directeurs des rayons vecteurs OA , O_1A et de la tangente à la conique en A sont respectivement :

$$\frac{x}{R}, \quad \frac{y}{R}; \quad \frac{x-a}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2ax}}, \quad \frac{y}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2ax}}; \quad \frac{dx}{ds}, \quad \frac{dy}{ds}.$$

Par conséquent, si l'on désigne par ω et ω_1 les angles que les rayons vecteurs OA , O_1A font avec la tangente, il résulte :

$$\cos \omega = \frac{xx' + yy'}{R} = \frac{dR}{ds};$$

$$\cos \omega_1 = \frac{(x-a)x' + yy'}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2ax}} = \frac{d\sqrt{R^2 + a^2 - 2ax}}{ds}.$$

Or on a pour x l'expression (39) et d'ailleurs, à cause d'une propriété caractéristique des coniques à centre, $\omega = \omega_1$; on a donc pour ces lignes :

$$\frac{dR}{ds} = \frac{d\sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cdot \cos \left(\int \frac{\sqrt{1-R'^2}}{R} \cdot ds \right)}}{ds}.$$

d'où par intégration :

$$R - k = \sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cdot \cos \left(\int \frac{\sqrt{1-R'^2}}{R} \cdot ds \right)},$$

k étant une constante. On a d'ici:

$$\int \frac{\sqrt{1-R'^2}}{R} \cdot ds = \arcsin \cos \left(\frac{2kR + a^2 - k^2}{2aR} \right);$$

et si l'on dérive cette équation par rapport à *s*, on obtient après quelques calculs:

$$R' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4R(R-k)-(a^2-k^2)}{R(R-k)}}.$$

Donc «les coniques dont le centre est à distance finie sont représentées en coordonnées *R*, *s* par l'équation:

$$2 \int \sqrt{\frac{R(R-k)}{4R(R-k)-(a^2-k^2)}} \cdot dR = s + \text{const.},$$

le pôle étant un des foyers».

PARABOLE. — Soient: O le foyer, ω et ω_1 les angles que la tangente au pointe A forme avec le rayon vecteur OA et avec le conique passant par A. Nous avons:

$$\cos \omega = \frac{dR}{ds};$$

et si l'on prend l'axe de la parabole pour axe des *x*:

$$\cos \omega_1 = \frac{dx}{ds}.$$

En rappelant l'expression de x et la propriété caractéristique de la parabole $\omega = \omega_1$, on obtient :

$$\frac{dR}{ds} = \frac{d \left(R \cdot \cos \int \frac{\sqrt{1-R'^2}}{R} ds \right)}{ds},$$

d'où par intégration :

$$R - k = R \cdot \cos \int \frac{\sqrt{1-R'^2}}{R} ds,$$

k étant une constante arbitraire.

On a de cette équation :

$$\int \frac{\sqrt{1-R'^2}}{R} \cdot ds = \text{arc. cos} \left(\frac{R-k}{R} \right),$$

d'où par dérivation et après quelques calculs :

$$\sqrt{\frac{2R}{2R-k}} \cdot R' = 1.$$

Cette équation, multipliée par ds et intégrée, donne :

$$\log \left(\sqrt{2R} + \sqrt{2R-k} \right)^{\frac{k}{2}} + \frac{1}{2} \sqrt{2R(2R-k)} = s + \text{const.}$$

«Telle est l'équation en coordonnées R, s de la parabole, lorsque le pôle coïncide avec le foyer.»

Parme, decembre, 1891.

ALGUNS THEOREMAS DE MECÂNICA

POR

ANTONIO CABREIRA

Alumno da Eschola Polytechnica de Lisboa

1

Ascenção no plano inclinado

1. VALOR DA FORÇA ASCENCIONAL DE UM CORPO.— Supponhamos dois pontos no espaço, m e M , definindo a linha de maior declive de um plano inclinado, e, ao mesmo tempo, existentes em duas superfícies de nível do peso do corpo, que pretendemos elevar de um para outro dos mesmos pontos. Ora, quer a ascenção se faça segundo a linha de maior declive, ou segundo a vertical, tirada pór M , o trabalho desenvolvido é representado sómente pela diferença dos potenciaes relativos ás superfícies de nível consideradas.

Logo, se designarmos por F , f , P_j e p_j , as forças applicadas ao corpo n'aquellas duas hypotheses, e as projecções, sobre as suas direcções, dos caminhos percorridos no plano e no espaço, teremos a seguinte equação:

Vejâmos agora qual é a lei da variação d'estes elementos, quando a inclinação do plano permanece invariável. Não conhe-

cemos F , à priori, nem mesmo Pj ; pelo contrario, f e pj determinam-se sempre, uma vez que se saiba o valor do peso e qual a distancia que separa as duas superficies de nivel. Notemos porém que a direcção de F faz com o plano inclinado um angulo igual ao angulo de attricto e que dando a este todos os seus valores possiveis, podemos, immediatamente, estabelecer as circumstancias em que F se aproxima, attinge ou excede f , quantidade facilmente conhecida.

Vê-se tambem que F é função de α , inclinação do plano, e da resistencia do meio que suppomos invariavel; enquanto que f não depende senão do peso do corpo, da altura percorrida e d'aquele ultimo elemento. Então se variarmos o angulo de attricto, i , e conservarmos a inclinação do plano, f e pj ficam constantes, d'onde resulta a equação (1) pertencer á fórmula $xy = k^2$. Logo os valores porque F passa, variando-se i , podem-se analyticamente representar pelo ramo superior de uma hyperbole, referida ás suas assymptotas. Deduzâmos pois a solução geral da equação $F \times Pj = f \times pj$, discutindo os valores do angulo de attricto.

Consideremos em primeiro lugar nullo o i ; neste caso Pj confunde-se com a linha de maior declive, e adquire, por esse motivo, o maximo valor, o que exige F attingir o minimo valor. À medida que o attricto aumenta, Pj , girando em volta de M , aproxima-se de pj , e portanto F aumenta successivamente, aproximando-se de f .

Determinemos agora o valor que i precisa ter, para F attingir f e depois exceder esta quantidade.

Ora, se nós introduzirmos a egualdade das forças propostas na equação (1) temos, como consequencia a egualdade das projecções sobre as suas direcções dos caminhos percorridos pelo corpo. Mas a direcção de F é perpendicular á geratriz do cone de equilibrio, cujo angulo, com a linha de maior declive, está voltado para m . Por outro lado, aquella ultima egualdade implica a coincidencia das duas projecções. Logo para F ser igual a f é necessário e sufficiente que aquella geratriz fique parallela ás superficies de nível consideradas, e portanto, que i seja complemento de α .

No caso particular da inclinação do plano ser de 45° as duas forças têm a mesma intensidade, quando o coëfficiente de attricto for a unidade.

Continuemos a augmentar i . Com isso fazemos com que Pj diminua successivamente, e portanto com que F exceda f .

Se i attingisse 90° , Pj annullava se e a direcção de F ficava perpendicular ao plano, caso em que haveria equilibrio.

Esta circumstancia tornava absurda a equação (1) e revellava a impossibilidade do corpo ser conduzido pelo plano inclinado.

Supponhamos, em segundo logar, variavel o angulo α e constante o angulo i .

Estudemos, n'esta hypothese, a lei da variação das quantidades que figuram na equação (1).

Agora a quantidade que fica constante é simplesmente Pj : F , f e pj augmentam com α . Effectivamente, como a linha de maior declive descreve uma rotação de 90° em volta de m , Pj apenas muda de posição no espaço, mantendo a mesma grandeza e a mesma inclinação em relação ao plano; enquanto f , que é função da altura, aumenta de grandeza, pois h varia de 0 até ao comprimento MM' .

É facil de ver que F só pôde ser igual a f quando ainda as duas projecções se confundirem ou, inversamente; e que, antes ou depois, de realisada essa condição, F é menor ou maior que f .

Logo o valor da força ascensional de um corpo pode-se exprimir pelo seguinte theorema :

A força dispendida para elevar um corpo, segundo a linha de maior declive, num plano inclinado, é menor, igual ou maior que a força dispendida para o erguer verticalmente, conforme o angulo de attricto é menor, igual ou maior que o complemento do angulo de inclinação.

2. Supponhamos que pretendemos elevar o corpo, segundo a linha geodesica determinada por dois pontos m e M , existentes em duas superficies de nível do peso do corpo e n'uma superficie curva,

Se o corpo percorrer a concavidade da superficie, que imaginamos voltada no sentido dos zz positivos, as cousas passam-se como se o corpo percorresse um plano, cuja inclinação variasse de 0 a 90° ; se, pelo contrario a concavidade estiver voltada para os zz negativos, então cahimos na hypothese que figurámos, quando α decrescia, desde 90° até 0.

Logo o theorema anterior applica-se tambem ás superficies curvas.

Identicas considerações podemos fazer para os volumes de revolução, de simples curvatura, porque, em todas as suas geratrices

podemos imaginar um plano tangente, e portanto realisadas as circumstancias que temos estabelecido.

3. LEIS DO MOVIMENTO ASCENCIONAL.— Da equação (1) tira-se

$$F = \frac{fpj}{Pj}.$$

Ora $pj = x \operatorname{sen} \alpha$ e $Pj = x \operatorname{sen} \beta$, designando x a distancia percorrida pelo corpo na linha de maior declive, e β o angulo que a mesma recta faz com a perpendicular, baixada do seu extremo inicial, sobre Pj . Logo

$$P = \frac{f \operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{sen} \beta} = \frac{f \operatorname{sen} \alpha}{\cos i}$$

attendendo a que β é complemento de i . Mas $f = m \frac{d^2 h}{dt^2}$; portanto

$$F = m \frac{d^2 h}{dt^2} \times \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos i}.$$

Notando tambem que $F = m \frac{d^2 x}{dt^2}$, será finalmente verdadeira a seguinte egualdade :

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d^2 h}{dt^2} \times \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos i}.$$

Supondo constante a relaçao $\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos i}$ e integrando vem :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dh}{dt} \times \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos i} + v_0.$$

Representando $\frac{dx}{dt}$ por v , velocidade correspondente a F , e $\frac{dh}{dt}$ por V , velocidade correspondente a f , e considerando nulla a velocidade inicial, chegamos á fórmula

$$v = V \times \frac{\sin \alpha}{\cos i}.$$

É evidente que, se as forças impressas ao corpo forem instantaneas, quaesquer que sejam as intensidades, v e V annullam-se, decorrido um certo tempo. Nós porém queremos estudar a hypothese em que F e f são alimentadas por uma fonte de energia, que lhes permitte vencer a acção da gravidade, nas diversas posições do corpo, no espaço. Sendo assim, as forças actuan como se fossem constantes, e segundo as leis que regem o movimento descencional. Temos tambem que as variações do movimento produzido por f , quando eleva o corpo verticalmente, dependem exclusivamente da natureza do meio; o que já não sucede a F , cuja velocidade correspondente é além d'isso, função de α e de i .

Para determinarmos as leis do movimento ascencional, n'esta hypothese, precisamos pois variar aquellas quantidades, e ainda a natureza do meio em que existe o plano inclinado, elemento que influe no valor de V .

Devemos notar que, se a fonte de energia fosse inexgotavel, poderíamos abstrahir da resistencia do meio, porque, qualquer que ella fosse, seria totalmente vencida pelas forças propostas.

Consideremos então dois meios: o vacuo, e um, cuja densidade contrarie sensivelmente o movimento ascencional.

Discutindo aquella ultima fórmula para o primeiro meio, achamos os seguintes resultados:

Ha movimento uniforme: 1.^o — quando α for constante e o $\cos i$ augmentar o mesmo que V ; 2.^o — quando i for constante e o $\sin \alpha$ diminuir tanto quanto V augmentar; 3.^o — quando o $\cos i$ soffrer os mesmos accrescimentos que $V \sin \alpha$.

Ha movimento retardado: 1.^o — quando α for constante e o $\cos i$ augmentar mais do que V ; 2.^o — quando i for constante e o $\sin \alpha$ diminuir mais do que V augmentar; 3.^o — quando o $\cos i$ augmentar mais do que $V \sin \alpha$.

Ha movimento acelerado: 1.^o — quando α for constante e o $\cos i$ diminuir segundo qualquer lei, ou aumentar menos do que V ; 2.^o — quando i for constante e o $\sin \alpha$ diminuir menos do que V aumentar, ou aumentar, segundo qualquer lei; 3.^o — quando α e i forem constantes; 4.^o — quando o $\cos i$ aumentar menos do que $V \sin \alpha$.

A discussão da fórmula $v = V \frac{\sin \alpha}{\cos i}$ tem duas partes, correspondentes a dois estados de movimento, quando imaginamos o plano inclinado n'um meio bastante resistente.

Effectivamente, quando o corpo, vindo do vacuo, penetra n'esse meio, a velocidade, proveniente de f , recebe cada vez accrescimentos menores, até que o movimento se torna uniforme, n'uma certa superficie de nível, a partir da qual se dá o retardamento.

Fazendo pois, em primeiro logar, a discussão do valor de v , n'aquellea região, obtemos os seguintes resultados:

Ha movimento uniforme: 1.^o — quando α for constante e $i = 0$; 2.^o — quando i for constante e $\alpha = 90^\circ$; 3.^o — quando α e i forem constantes; 4.^o — quando $\sin \alpha$ e $\cos i$ diminuirem ou aumentarem na mesma porporção.

Ha movimento retardado: 1.^o — quando α for constante e o $\cos i$ aumentar, segundo qualquer lei; 2.^o — quando i for constante e $\sin \alpha$ diminuir, segundo qualquer lei; 3.^o — quando o $\cos i$ aumentar mais do que o $\sin \alpha$.

Ha movimento acelerado: 1.^o — quando α for constante e o $\cos i$ diminuir, segundo qualquer lei; 2.^o — quando i for constante e o $\sin \alpha$ aumentar, segundo qualquer lei; 3.^o — quando $\cos i$ passar por valores inferiores ao $\sin \alpha$.

Discutindo agora a mesma fórmula para uma superficie de nível do peso do do corpo, em que V decresce, deduzimos os seguintes resultados:

Ha movimento uniforme: 1.^o — quando α for constante e o $\cos i$ diminuir o mesmo que V ; 2.^o — quando i for constante e o $\sin \alpha$ aumentar tanto quanto V diminuir; 3.^o — quando o $\cos i$ diminuir o mesmo que $V \sin \alpha$.

Ha movimento retardado: 1.^o — quando α for constante e o $\cos i$ diminuir menos do que V ; 2.^o — quando i for constante e o $\sin \alpha$ diminuir, segundo qualquer lei, ou aumentar menos do que V diminuir; 3.^o — quando α e i forem constantes; 4.^o — quando o $\cos i$ diminuir menos do que $V \sin \alpha$.

Ha movimento accelerado: 1.^o— quando α for constante e o cos i diminuir mais do que V ; 2.^o— quando i for constante e o sen α augmentar mais do que V diminuir; 3.^o— quando o cos i diminuir mais do que V sen α .

Coordenando estas conclusões, e considerando o movimento desde o vacuo até uma certa profundidade de um meio, sensivelmente resistente, ficam demonstradas as seguintes leis de movimento ascencional:

1.^a— Quando os angulos de inclinação e attricto são constantes, ha movimento accelerado, uniforme ou retardado, conforme o corpo sóbe pelo plano inclinado, no vacuo, nas primeiras regiões ou na profundidade de um meio resistente.

2.^a— Quando sómente é constante o angulo de inclinação, ha movimento uniforme, retardado ou accelerado, conforme o angulo de attricto diminue até 0 e em seguida aumenta; ou, depois de diminuir até um certo valor, aumenta bruscamente; ou, por ultimo, aumenta ou diminue, segundo qualquer lei.

3.^a— Quando sómente é constante o angulo de attricto, ha movimento uniforme, retardado ou accelerado, conforme o angulo de inclinação, variando descontinuamente, passa por 90°; ou diminue continuamente, ou, depois de diminuir, cresce sensivelmente a partir de uma certa profundidade do meio resistente; ou, por ultimo, aumenta para diminuir a uma certa profundidade do meio resistente.

4. ANALYSE DA FORÇA ASCENCIONAL.— N'um plano inclinado cujo angulo de attricto está comprehendido entre 0 e 90°, a força ascencional de um corpo não é parallela nem perpendicular ao plano; logo pode-se decompor em duas componentes tangencial e normal. Estudemos, n'esta hypothese, os valores d'essas componentes.

Sejam então F , P , r , F_t , P_t , r_t , F_n , P_n e r_n a força ascencional o pezo do corpo, a resistencia do plano e as respectivas componentes tangenciaes e normaes.

Ora, porque a resultante de F , P e r , tem uma componente tangencial igual á somma geometrica de F_t , P_t e r_t , bem como uma componente normal expressa por uma somma identica d'aquellas componentes normaes, temos as seguintes equações,

que vamos discutir:

$$|F_t| - (|P_t| + |r_t|) = m \frac{dv}{dt} \dots \dots \dots \quad (a)$$

$$|F_n| - (|P_n| + |r_n|) = \frac{mv^2}{\rho} \dots \dots \dots (b).$$

Estabeleçamos agora as condições da ascenção, dependentes da natureza do plano; estas são: 1.^a — *a resistencia do plano ha de ser igual ao peso do corpo;* 2.^a *a resistencia do plano ha de ser superior ao peso do corpo.*

A primeira condição verifica-se quando

$$|r_n|=|P_n| \text{ e } |r_l|=|P|;$$

a segunda condição realisa-se: 1.º quando

$$|P_t| > |r_t| \text{ e } |P_n| < |r_n|;$$

2.^o quando

$$|P_t| < |r_t| \text{ e } |P_n| > |r_n|;$$

3.^o quando

$$|P_t| < |r_t| \text{ e } |P_n| < |r|.$$

Supponhamos, em primeiro logar, constante a inclinação do plano. Sendo assim, a trajectoria do corpo é rectilinea, e, portanto a tornar-se infinito, donde resulta a equação (b) transformar-se em

em quanto que a equação (a) subsiste.

Se $|r|=|P|$, fica $|P_n|=|r_n|$. Mas como são de signaes con-

4

trarios, a sua somma annulla-se, donde $F_n = 0$ e portanto $F = F_t$, circumstancia que só se obtem quando o attricto é nullo. Temos pois que á primeira condição da ascenção do corpo corresponde o minimo valor para F_n e o maximo valor para F_t .

Introduzamos agora na equação (c) as desigualdades representativas da segunda condição de ascenção.

A primeira torna F_n igual à reacção da resultante das componentes normaes do peso e da resistencia do plano. A segunda exprime F_n pela acção dos mesmos componentes.

Em todos estes casos F_t é expressa pela somma geometrica da componente tangencial da resultante de F , P e r , e da resultante das componentes P_t e r_t .

Supponhamos, em segundo lugar, que a linha de maior declive do plano inclinado descreve uma rotação de 90° em torno da posição inicial do corpo.

Então o corpo é obrigado a percorrer um arco de quadrante, o que exige a annulação de $\frac{dv}{dt}$. Logo a equação (a) transforma-se em

Consideremos $|r|=P$; d'esta igualdade deduzimos, em virtude da primeira condição de ascenção, $|r_t|=|P_t|$, parcellas de signal contrario a F_t . Logo: F_t pode-se considerar igual á reacção da resultante dos componentes tangenciaes do pezo do corpo e da resistencia do plano, e nunca se annulla.

Introduzindo na equação (d) as desigualdades a que já nos referimos chegavamos à mesma conclusão.

A equação (b) traduz-nos, n'este caso, o valor de F_n : representa a somma geometrica da força centripeta originada e da resultante das componentes normaes do peso do corpo e da resistencia do plano.

III

Somma de areas e derivada volumar

5. SOMMA DE ÁREAS. — Supponhamos que $F = F_1 + F_2$, sendo

estas duas ultimas forças definidas por quaesquer intensidades e direcções diferentes, existentes na mesma superficie de nível do pezo do movel, em repouso, sobre que actuam. Consideremos os seus momentos nulos em relação a um eixo fixo, o dos zz , e que o movel está ligado por um vector á origem das coordenadas.

Sendo assim, o movel se fosse só actuado por F_1 descreveria uma certa trajectoria no tempo t ; se, por sua vez, fosse isoladamente sollicitado por F_2 , descreveria outra trajectoria, cuja corda, sommada geometricamente com a corda da primeira, havia de dar aquella correspondente á trajectoria que o corpo, actuado por F , descreveria no mesmo tempo t .

Ora a acção isolada de cada uma das forças propostas determina uma area, descripta pelo vector considerado, area limitada por um triangulo.

Mas, como a base de um d'esses triangulos (a corda correspondente á trajectoria originada por F) é igual, como vimos, á somma das outras duas bases (cordas correspondentes a F_1 e F_2) e a altura é commum (a distancia da superficie de nível ao plano dos xy) temos o seguinte theorema:

A area descripta pelo vector, quando o movel é actuado por F é igual á somma das areas, descriptas pelo mesmo vector, se o movel, isoladamente, fôr actuado por F_1 e F_2 , nas condições que estabeleceremos.

6. DERIVADA VOLUMAR. — Imaginemos agora a seguinte hypothesis:

Um movel, inicialmente em repouso, é durante um certo tempo, t , actuado successivamente por muitas forças constantes, cujas direcções divergem e existem n'uma superficie de nível do pezo do movel. Em virtude do que dissemos no paragrapho anterior, a resultante r , das duas primeiras forças f_1 e f_2 , determinará uma area igual á somma dos determinados por estas forças; depois da acção de f_3 , obtemos uma nova resultante r_2 , que produz identicos resultados a r_1 ; e assim por deante.

Ora da formação sucessiva de todas estas resultantes nasce, necessariamente, uma rotação da corda, correspondente á trajectoria inicial do movel; e portanto, uma revolução da area primitiva descripta pelo vector, area, que augmentando de valor, gera um cone de base espiraliforme.

Feitas estas considerações, chamamos *derivada volumar* ao li-

mite da relação do accrescimo do volume, gerado n'um intervallo de tempo, infinitamente pequeno, para esse mesmo intervallo; e exprimimos o seu valor por $\frac{dV}{dt}$.

7. A derivada volumar, por isso que exprime o limite da relação de um espaço, infinitamente pequeno percorrido n'um intervallo de tempo, tambem infinitamente pequeno, para esse mesmo intervallo, representa a *velocidade volumar*, que, derivada em relação ao tempo, origina a *acceleração volumar* de primeira ordem; e assim successivamente.

Ora uma força qualquer pôde ser sempre expressa pelo producto da massa do corpo, sobre que actua, pela acceleracao que produz. Logo, teremos a seguinte equação:

$$[f_1] + [f_2] + [f_3] + \dots = m \left[\frac{d^2 V}{dt^2} \right]$$

ou

$$[f_1] + [f_2] + [f_3] + \dots = m \left[\frac{d \left(\frac{dV}{dt} \right)}{dt} \right].$$

Multiplicando ambos os membros por dt e integrando fica:

$$\int_{t_0}^t [f_1] dt + \int_{t_0}^t [f_2] dt + \int_{t_0}^t [f_3] dt + \dots = m \left[\frac{dV}{dt} \right]_t - m \left[\frac{dV}{dt} \right]_{t_0}.$$

Portanto fica demonstrado o seguinte theorema:

O accrescimo das quantidades de movimento volumar, adquirido no intervallo que vae de t_0 a t , é igual á somma dos integraes geometricos das impulsões elementares das forças que, n'esse mesmo intervallo de tempo, originaram o movimento volumar.

Se, n'esta ultima expressão dividirmos ambos os membros

por m e tomarmos para unidade de tempo o intervallo de tempo que vai de t_0 a t , deduzimos o seguinte enunciado:

A acceleracão volumar é igual ao quociente da somma dos integraes geometricos das impulsões elementares das forças, que na unidade de tempo actuaram o corpo, pela massa do mesmo corpo.

S. IMPULSÃO E TRABALHO DA RESULTANTE $m \frac{d^2 V}{dt^2}$. — Para

uma força dotada de potencial, supondo a massa unidade, os theoremas das forças vivas e das quantidades de movimento dão-nos

$$\frac{1}{2} v^2 - \frac{1}{2} v_0^2 = M - M_0$$

$$v - v_0 = \int_{t_0}^t F dt.$$

Multiplicando esta ultima igualdade por $v + v_0$, dividindo o resultado por 2 e comparando com a primeira, deduzimos

$$\int_{t_0}^t F dt = 2 \frac{M - M_0}{v + v_0}.$$

Logo:

A impulsão total de uma força, no intervallo $t - t_0$ é igual ao dobro do quociente do accrescimo do potencial pela somma das velocidades inicial e final.

Aplicando este theorema á resultante proposta vem

$$\int_{t_0}^t \frac{d^2 V}{dt^2} dt = 2 \frac{M - M_0}{\frac{dV}{dt} + \frac{dV_0}{dt}}$$

ou

$$\frac{dV}{dt} - \frac{dV_0}{dt} = 2 \frac{M - M_0}{\frac{dV}{dt} + \frac{dV_0}{dt}}$$

d'onde

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dV}{dt} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{dV_0}{dt} \right)^2 = M - M_0$$

expressão que define o trabalho de $m \frac{d^2 V}{dt}$ entre duas das suas superfícies de nível.

SOBRE A NORMAL Á ELLIPSE

POR

RODOLPHO GUIMARÃES

Dado um ponto sobre o plano de uma secção conica não é facil de conduzir por elle uma normal á conica. O problema admite quatro soluções, isto é, podem-se pelo ponto dado tirar quatro normaes e são taes que os pés da 3.^a e o ponto symetrico do pé da 4.^a relativamente ao centro da conica estão situados sobre um circulo (circulo de Joachimsthal). Ha porém certos pontos por onde se podem conduzir normaes de um modo facil. Os pontos do plano de uma ellipse que estão n'estas condições são em grande numero, porém nem todos se podem aproveitar porque as expressões que servem para os definir são extremamente complicadas. Assim, é facil conduzir normaes pelos pontos situados sobre os eixos da ellipse (questão que foi tractada por d'Ocagne no jornal de Longchamps e na *Revue coloniale et maritime*, e por Lebon nos *Nouvelles annales de Mathématiques*). Pelos pontos situados sobre circumferencias de raios $a - b$ e $a + b$ também o problema é simples como mostrámos no *El Progresso Matematico*. Ha um outro ponto particular por onde se pode conduzir uma normal á ellipse.

A equação da ellipse sendo verificada pelos valores

$$x'^2 = \frac{a^4}{a^2 + b^2}, \quad y'^2 = \frac{b^4}{a^2 + b^2}$$

temos que a equação da normal no ponto definido por estas coordenadas é

$$x - y - = \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

e os pontos N e N' de intersecção da normal sobre os eixos têm por coordenadas

$$\left(0, \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{e} \quad \frac{-c^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right).$$

Vê-se pois que o triangulo ONN' , que a normal intercepta sobre os eixos, é rectângulo e isósceles, sendo

$$ON = ON' = \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$NN' = \sqrt{2} \cdot \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Unindo o ponto medio D de NN' com o centro O temos que o triangulo ODN é rectângulo em D e isósceles e portanto

$$OD = \frac{1}{2} NN' = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$DON = \frac{\pi}{4}.$$

Logo, por todo o ponto D situado no plano de uma ellipse e distante do centro O de uma grandeza definida pela expressão (1) e fazendo um angulo de 45° com o eixo maior, é possível conduzir uma normal à ellipse. A normal procurada é então a recta perpendicular a OD .

Estudei tambem uma outra normal especial, isto é a normal conduzida por um ponto M da ellipse, tal que $OMA = 45^\circ$. Pa-

rece-me comtudo que as formulas a que chego são já conhecidas e mesmo sem utilidade. Em todo o caso vou aqui consideral-o.

«Se o vector OM faz um angulo $\frac{\pi}{4}$ com o eixo maior OA de uma ellipse, as coordenadas do ponto M, são

$$x' = y' = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

e a equação da normal no ponto M será

$$a^2x - b'y = \frac{ab c^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} \dots \dots \dots \quad (1).$$

Fazendo n'esta expressão

acha-se

$$\left. \begin{array}{l} x = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 + b^2} \\ y = \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{array} \right\} \dots \dots \dots \quad (2).$$

Se tambem fizermos na mesma expressão (1)

virá

$$\left. \begin{array}{l} y = \frac{a}{b} \sqrt{a^2 + b^2} \\ x = \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{array} \right\} \dots \dots \dots \quad (3).$$

Ora os pontos definidos pelas coordenadas (2) e (3) assim como

as do ponto M, satisfazem á relação

$$y_1(x_2 - x_3) + y_2(x_3 - x_1) + y_3(x_1 - x_2) = 0$$

que exprime a condição para que os tres pontos estejam em linha recta.

Logo dado um dos dois pontos N ou N' definido pelas coordenadas (2) ou (3) pode-se por elle conduzir uma normal á ellipse. Basta para isso unil-o ao ponto M da intersecção da ellipse com o vector OM tirado a 45° sobre OA».

O motivo porque me parece que estes pontos são conhecidos é por causa da ligação que ha entre elles. Com effeito a expressão

$$\frac{b}{a} \sqrt{a^2 + b^2}$$

é igual á grandeza OE que a tangente em M intercepta sobre o eixo menor prolongado; e, fazendo

$$x = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 + b^2} = OE,$$

a 2.^a das expressões (2) torna-se

$$y = \frac{b^2}{\left(\frac{OE}{2}\right)}.$$

Da mesma fórmula as coordenadas do 2.^o ponto N' são

$$y = OF$$

e

$$x = \frac{a^2}{\left(\frac{OF}{2}\right)}.$$



BIBLIOGRAPHIA

Gino Loria.—Nicola Fergola e la scuola di matematici che lo ebbe a duce (Genova, 1892).

Nicolau Fergola nasceu em Napolis em 1753, e n'esta cidade ensinou as mathematicas, ora particular ora publicamente, desde 1775 até 1822, anno em que morreu. É das descobertas d'este geometra eminente e das descobertas dos mathematicos illustres quē sairam da sua escola que o sr. Gino Loria se occupa na sua bella e importante memoria, traçando d'este modo a historia de um periodo brilhante para as sciencias geometricas, que dá a maior honra á Italia.

A presente memoria foi publicada pela Universidade de Genova, e constitue mais um trabalho valioso com que o sabio professor d'esta Universidade veio augmentar a lista dos trabalhos importantes com que tem enriquecido a historia das mathematicas.

Albert Winterhalter.—The international astrophotographic Congress and a visit to certain europian Observatories and other institutions (Washington, 1889).

N'este volume, publicado pelo Observatorio de Washington, o auctor, delegado d'este Observatorio ao Congresso de Astrophotographia que teve logar em Paris em 1887, apresenta o relatorio das sessões d'este Congresso, e o relatorio das visitas que fez a muitos dos observatorios da Europa. Na sua digressão pelo nosso continente viu o illustre astronomo americano os principaes observatorios da França, Inglaterra, Allemanha, Austria, Belgica, Holanda, Dinamarca, etc., e a respeito de cada um d'elles apresenta na presente obra informações detalhadas, dando noticia da sua organisação actual, descrevendo os seus principaes

instrumentos, informando a respeito da sua historia, etc. Excelentes estampas, representando os principaes observatorios visitados e os principaes instrumentos vistos pelo auctor, acompanham a bella obra de que estamos a dar noticia e contribuem consideravelmente para a tornar mais interessante.

Terminando diremos que não conhecemos obra alguma melhor do que a presente para se tomar conhecimento do estado actual dos principaes observatorios da Europa.

C. A. Laisant e E. Perrin. — Premiers principes d'Algèbre (Paris, 1892).

Dos livros, em numero consideravel, que têm sido publicados a respeito dos primeiros principios de Algebra, nenhum conhecemos em que estes principios sejam mais bem expostos do que no livro excellente que vêm de publicar os srs. Laisant e Perrin. Cremos bem que qualquer estudante regularmente inteligente, apprendendo por este livro, não encontrará difficultade alguma em comprehendêr os principios da Algebra e que, quando terminar a sua leitura, ha de manejar com facilidade o calculo algebrico. É garantia d'isto a clareza com que o livro está escripto e a boa escolha dos numerosos exercícios que seguem a cada assumpto considerado.

As doutrinas que contém o novo manual de Algebra são aquellas que no nosso paiz constituem os programmas dos Lyceus e estão divididas em trinta e quatro lições, mais ou menos extensas segundo é mais ou menos facil a doutrina estudada em cada lição. As onze primeiras lições são consagradas ao estudo das operaçōes algebricas e ao estabelecimento de algumas formulas que são consequencia das regras para effectuar estas operaçōes.

As lições doze a vinte e nove são consagradas ao estudo das equações do primeiro grau a uma e a muitas incognitas, ao estudo das equações do segundo grau a uma incognita, e à resolução e discussão, feita com o maior cuidado, dos problemas que levam ás equações precedentes.

As lições trinta a trinta e quatro são consagradas ao estudo das progressões, dos logarithmos e dos problemas de juros compostos e annuidades.

N'um appendice, muito bem feito, occupam-se em seguida os autores dos arranjos e combinações, do desenvolvimento do binomio, da continuidade e representação geometrica dos trinomios do segundo grau, etc. Nota-se n'este appendice demonstrações muito interessantes de algumas proposições arithmeticas por intermedio de um taboleiro de xadrez.

Terminaremos esta rapida notícia recommendando vivamente aos professores e estudantes dos nossos Lyceus este excellente livro.

H. Burkhardt. — Bernhard Riemann, (Göttingen, 1892).

Contém este opusculo um discurso pronunciado pelo sr. Burkhardt na Sociedade mathematica de Göttingen, no dia do vigesimo quinto anniversario da morte de Riemann, para recordar os trabalhos d'este geometra celebre.

A. Gützmer. — Bemerkungen über die Iteration linearer homogener Differentialgleichungen (Sitzungsbericht der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag, 1892).

Refere-se este artigo ao mesmo assumpto a que se refere o artigo publicado pelo mesmo geometra na pag. 3 do t. x d'este jornal.

E. Lemoine. — Sur les triangles orthologiques et sur divers sujets de la Géométrie du triangle (Association française pour l'avancement des sciences, 1888).

— *Sur les transformations systématiques des formules relatives au triangle. Transformation continue. Divers résultats concernant la Géométrie du triangle (Item, 1891).*

— *Étude sur une nouvelle transformation dite transformation continue (Mathesis, 1892).*

— *Sur une transformation relative à la Géométrie du triangle (Bulletin de la Société mathématique de France, 1894).*

— *Sur la transformation continue (Item).*

Todos os artigos precedentes são relativos á nova Geometria do triangulo. O auctor d'elles é um dos geometras que mais têm concorrido para a formaçao e progresso d'este ramo da Geometria.

No primeiro artigo estuda o sr. Lemoine as propriedades dos triangulos ABC e A'B'C' que satisfazem á condiçao de as perpendiculares abaixadas de A, B e C sobre B'C', C'A', A'B' concurrerem n'um mesmo ponto. Em seguida apresenta um numero consideravel de proposições e formulas, relativas aos elementos notaveis do triangulo, das quaes nos é impossivel dar noticia em curto espaço.

Nos outros artigos estuda o auctor uma transformaçao geometrica por meio da qual de cada formula relativa ao triangulo se tiram outras, e continua a apresentar muitas formulas e proposições relativas á Geometria do triangulo.

R. Guimarães. — Sur les transformées des sections planes du cône de révolution (Journal des mathématiques élémentaires, 1892).

N'este artigo acha o auctor a equação polar da transformada de uma secção plana qualquer feita n'um cone de revoluçao, o que o leva a rectificar uma passagem da Geometria descriptiva de Amiot.

Harold Jacoby. — The Rutherford photographic measures in the group of the Pleiades (New-York, 1892).

Contém este opusculo os resultados das observações photographicas do grupo de Pleiades feitas por Rutherford nos annos de 1872 e 1874.

Gino Loria. — Sulla teoria della curvatura delle superficie (Rivista di Matematica, t. II).

Contém este artigo um modo de expor a theoria da curvatura das superficies sem introduzir hypothese alguma relativa á posição

dos eixos cartesianos relativamente á superficie a estudar. Este modo de exposição é o adoptado pelo auctor no seu curso na Universidade de Genova.

G. Vivanti. — *Su certi integrali primi delle equazioni del moto d'un punto (Rend. del R. Istituto Lombardo, 1892).*

Os integraes de primeira ordem das equações do movimento de um ponto estudados pelo auctor são os da fórmā

$$Ax'^2 + By'^2 + Cz'^2 - Dy'z' - Ez'x' - Fx'y' = 2V + c,$$

A, B, C, D, E, F, V representando funcções das coordenadas x, y, z do ponto e c a constante arbitrária.

G. Vivanti. — *Sulla determinazione di quattro funzioni mediante una equazione unica (Rend. del Circulo matematico di Palermo, t. vi).*

Determinação das funcões $f(x)$, $F(x)$, $\varphi(y)$, $\Phi(y)$ que satisfazem á equaçō

$$(f - \varphi)^2 - (F - yf') (\Phi - x\varphi') = 0.$$

H. G. Zeuthen. — *Nouvelle démonstration du principe de correspondance de Cayler et Brill et méthode à la détermination des coïncidences de correspondances algébriques sur une courbe d'un genre quelconque (Mathematische Annalen, t. XL).*

G. Peano. — *Generalizzazione della formula de Simpson (Atti della R. Accademia di Torino, 1892).*

G. Pirondini. — *Ligne d'intersection d'une surface de révolution avec un cylindre dont les génératrices sont parallèles à l'axe* (*El Progreso matematico*, t. II).

Asaph Hall. — *Saturn and its Ring* (*Washington*, 1889).

S. Pincherle. — *Sulla forme differenziale lineare* (*Rend. della R. Accademia dei Lincei*, 1892).

A. Gutzmer. — *Zur Erinnerung au Paul Günther* (*Zeitschrift für Mathematik und Physik*, 1891).

G. Veronese. — *Osservazioni sopra una dimonstrazione contra il segmento infinitesimo attuale* (*Rend. del Circolo matematico di Palermo*, t. VI).

G. T.



SUR L'ADDITION DES ARGUMENTS DANS
LES FONCTIONS ELLIPTIQUES

PAR

M. CH. HERMITE

Soit $R(\xi)$ un polynôme quelconque du 4^{me} degré en ξ , et $\xi = \varphi(x)$ la fonction définie par l'égalité :

$$x = \int \frac{d\xi}{\sqrt{R(\xi)}},$$

on a, en désignant par a une constante, la relation suivante :

$$\begin{aligned} \frac{2\varphi'(a)}{\varphi(x+y) - \varphi(a)} &= \frac{\varphi'(a+y) + \varphi'(a)}{\varphi(a+y) - \varphi(a)} + \frac{\varphi'(a-y) + \varphi'(a)}{\varphi(a-y) - \varphi(a)} \\ &\quad - \frac{\varphi'(a+y) - \varphi'(x)}{\varphi(a+y) - \varphi(x)} - \frac{\varphi'(a-y) + \varphi'(x)}{\varphi(a-y) - \varphi(x)}. \end{aligned}$$

C'est le théorème pour l'addition des arguments dans la fonction $\varphi(x)$; j'indiquerai succinctement comment on en conclut les formules qui concernent les quantités $sn(x+y)$, $cn(x+y)$ et $dn(x+y)$. Supposons à cet effet que $\varphi(x)$ soit une fonction impaire et prenons $a=0$; les deux premiers termes se détruisent, et

l'on trouve ainsi:

$$\begin{aligned}\frac{2\varphi'(0)}{\varphi(x+y)} &= -\frac{\varphi'(y)-\varphi'(x)}{\varphi(y)-\varphi(x)} + \frac{\varphi'(y)+\varphi'(x)}{\varphi(y)+\varphi(x)} \\ &= 2 \cdot \frac{\varphi(x)\varphi'(y)-\varphi'(x)\varphi(y)}{\varphi^2(x)-\varphi^2(y)}\end{aligned}$$

d'où:

$$\varphi(x+y) = \frac{\varphi'(0)[\varphi^2(x)-\varphi^2(y)]}{\varphi(x)\varphi'(y)-\varphi'(x)\varphi(y)}.$$

Cela étant, les résultats recherchés s'obtiennent par un calcul facile en faisant successivement

$$\varphi(x) = snx, \quad \varphi(x) = \frac{snx}{cnx}, \quad \varphi(x) = \frac{snx}{dnx}.$$

Pour parvenir à l'addition des arguments dans la fonction $p(x)$, il faut supposer a infiniment petit, et employer l'expression $p(x) = \frac{1}{a^2}$, en négligeant le carré et les puissances supérieures de a . On est de cette manière amené à la relation suivante:

$$\begin{aligned}p(x+y) &= p(x) + p(y) - \frac{1}{2} D_x^2 \log [p(x)-p(y)] \\ &\quad - D_{xy}^2 \log [p(x)-p(y)] \\ &\quad - \frac{1}{2} D_y^2 \log [p(x)-p(y)]\end{aligned}$$

d'où se conclut sans peine la formule habituelle:

$$p(x+y) = -p(x)-p(y) + \frac{1}{4} \left[\frac{p'(x)-p'(y)}{p(x)-p(y)} \right]^2$$

DEMONSTRAÇÃO DO SEGUNDO THEOREMA DA MEDIA

POR

J. BRUNO DE CABEDO

(Professor na Universidade de Coimbra)

Se $f'(x)$ e $\varphi(x)$ são funções finitas e determinadas entre a e x , a formula de integração por partes

$$\int f(x) \varphi(x) dx = f(x) \int_a^x \varphi(x) dx - \int \left[f'(x) \int_a^x \varphi(x) dx \right] dx$$

dá

$$\int_a^x f(x) \varphi(x) dx = \left[f(x) \int_a^x \varphi(x) dx \right]_a^x - \int_a^x \left[f'(x) \int_a^x \varphi(x) dx \right] dx.$$

Posto isto, designando por x_1 uma quantidade comprehendida entre a e x , e supondo que, dentro d'este intervallo, $f(x)$ varia no mesmo sentido, o primeiro theorema da media applicado ao integral $\int_a^x \left[f'(x) \int_a^x \varphi(x) dx \right] dx$ transforma a formula anterior na seguinte:

$$\int_a^x f(x) \varphi(x) dx = f(x) \int_a^x \varphi(x) dx - [f(x) - f(a)] \int_a^{x_1} \varphi(x) dx.$$

RÉSOLUTION COMPLÈTE DES ÉQUATIONS INDETERMINÉES

$$x^2 + 1 = 2y^2; \quad x^2 - 1 = 2y^2;$$

PAR

E. LEMOINE

Ancien élève de l'école polytechnique

Nous allons d'abord établir quelques résultats qui nous serviront à résoudre la question.

Trouver le terme de rang n d'une suite ainsi formée : le 1^{er} terme est a, le 2^{ème} b et le terme de rang n se forme en ajoutant 2 fois le terme de rang n - 1 au terme de rang n - 2.

1 ^{er} terme	a + 0
2 ^{ième} terme.	0 + b
3 ^{ième} terme	a + 2b
4 ^{ième} terme.....	2a + 5b
5 ^{ième} terme.....	5a + 12b
6 ^{ième} terme	12a + 29b
.....	

Remarquons que, si l'on appelle A_n et B_n les coefficients de a et de b dans le n^{ième} terme, on a A_n = B_{n-1}. Ce qui est facile à démontrer en faisant voir que si la chose a lieu pour trois termes consécutifs elle a lieu pour le suivant.

On conclut de là que la suite des coefficients de a à partir du 2^{ème} terme de K est la même que la suite des coefficients de b à partir du 1^{er} terme et sont les nombres 0, 1, 2, 5, 12, 29, ... formés avec 0 et 1, comme la suite K est formée avec a et b .

Formons avec ces nombres **0** et **1** le tableau H de ces coefficients.

1 ^{er} terme . . .	$0 = 0$	(H)
2 ^{ième} terme . . .	$1 = 2^0$	
3 ^{ième} terme . . .	$2 = 2^1$	
4 ^{ième} terme . . .	$5 = 2^2 + 1$	
5 ^{ième} terme . . .	$12 = 2^3 + 2 \cdot 2$	
6 ^{ième} terme . . .	$29 = 8^4 + 3 \cdot 2^2 + 1$	
7 ^{ième} terme . . .	$70 = 2^5 + 4 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^1$	
8 ^{ième} terme . . .	$169 = 2^6 + 5 \cdot 2^4 + 6 \cdot 2^2 + 1$	
9 ^{ième} terme . . .	$408 = 2^7 + 6 \cdot 2^5 + 10 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^1$	
10 ^{ième} terme . . .	$985 = 2^8 + 7 \cdot 2^6 + 15 \cdot 2^4 + 10 \cdot 2^2 + 1$	

et comparons le tableau **H** avec le triangle arithmétique de Pascal (tableau **L**)

On aperçoit que les coefficients des puissances de 2 dans les colonnes du tableau H sont les nombres correspondants des colonnes du tableau L, et il est facile de voir que la loi est générale en montrant que, si elle a lieu dans le tableau H jusqu'au $n^{\text{ème}}$ terme, elle a lieu pour le suivant.

On a donc en désignant par N_{2n-1} et N_{2n} le $2n-1^{\text{ème}}$ et le $2n^{\text{ème}}$ termes du tableau H

$$N_{2n-1} = 2_{2n-3} + C_{2n-4}^1 \cdot 2^{2n-5} + C_{2n-4}^2 \cdot 2^{2n-7}$$

$$+ \dots \dots C_{2n-4}^{2n-1} \cdot 2$$

$$N_{2n} = 2^{2n-2} + C_{2n-3}^1 \cdot 2^{2n-4} + C_{2n-3}^2 \cdot 2^{2n-6}$$

$$+ \dots \dots C_{2n-3}^{2n-2} \cdot 2^2 + 1;$$

d'après cela si Δ_p est le $p^{\text{ème}}$ terme du tableau K on a :

$$\Delta_p = a N_{p-1} + b N_p.$$

Soient maintenant à résoudre en nombres entiers positifs ou négatifs les deux équations indéterminées

$$(1) \quad x^2 + 1 = 2y^2$$

$$(2) \quad x^2 - 1 = 2y^2 \quad (\text{voir, } Nouvelles Annales de Mathématiques, 1872, \text{ pag. 173}).$$

Il est évident que, x et y représentant des nombres entiers et positifs, si x , y est une solution soit de (1) soit de (2) les couples

$$-x, -y; \quad +x, -y; \quad -x, +y$$

seront aussi des solutions ; il nous suffira donc de chercher toutes les solutions positives.

Il est facile de voir que si x et y sont une solution de (1)

$$x+2y, \quad \text{et} \quad x+y$$

seront une solution de (2) et que si x et y sont une solution de (2)

$$x+2y \quad \text{et} \quad x+y$$

sont une solution (1); pour le démontrer substituons dans (2)

$$x+2y \quad \text{et} \quad x+y$$

à la place de x et de y , et il viendra

$$(x+2y)^2 - 1 = 2(x+y)^2$$

d'où

$$x^2 + 1 = 2y^2,$$

ce qui est vérifié par hypothèse etc.

On déduit de là que, si x et y sont une solution de (1),

$$3x + 4y, \quad 2x + 3y$$

sont aussi une solution de (1) ainsi que

$$3x - 4y \quad \text{et} \quad 3y - 2x;$$

si de même x et y sont une solution de (2),

$$3x + 4y, \quad 3y + 2x \quad \text{et} \quad 3x - 4y \quad \text{et} \quad 3y - 2x$$

seront aussi des solutions de (2).

Une solution connue de (1) ou de (2) conduit donc à une famille de solutions de (1) ou de (2);

$$x = 1, \quad y = 1$$

est une solution évidente de l'équation (1), de même que

$$x = 1, \quad y = 0$$

pour l'équation (2)

Il dérive donc de ces valeurs *une famille* de solutions pour les équations (1) et (2); nous allons démontrer que toutes les solutions possibles de ces équations appartiennent à cette même famille; il suffit de le démontrer pour l'une des équations (1) ou (2) puisque nous avons vu que leurs solutions sont liées linéairement.

Nous allons donc le démontrer seulement pour (1).

Soit x, y une solution de (1) en nombres *entiers et positifs*; nous

avons vu que

$$x' = 3x - 4y$$

$$y' = 3y - 2x$$

est aussi une solution; comme on a :

$$x = 3x' + 4y', \quad y = 2x' + 3y'$$

il est clair que, si x' et y' sont positifs, on aura

$$x' < x \quad y' < y;$$

comme de x' et de y' on peut déduire une solution x'', y'' , etc., il est clair que nous pouvons supposer que x, y est la dernière solution positive de la famille décroissante de solutions qu'elle engendre. Ces solutions décroissantes sont données par les formules

$$x_1 = 3x - 4y$$

$$y_1 = 3y - 2x.$$

Puisque x et y positifs sont une solution de (1) on a :

$$y_1 = 3y - 2\sqrt{2y^2 - 1}$$

ce qui est toujours positif dans l'hypothèse faite de $y > 0$ et le signe du radical étant explicité; mais comme x et y sont par hypothèse la plus petite solution positive de (1), et ces valeurs sont toutes deux positives, il faut qu'on ait

$$x_1 > 0 \quad \text{ou} \quad 3\sqrt{2y^2 - 1} - 4y < 0$$

ou

$$2y^2 - 9 < 0 \quad \text{ou} \quad y < \frac{3}{\sqrt{2}};$$

ainsi l' y de la dernière solution positive d'une famille quelconque de solutions est plus petit que $\frac{3}{\sqrt{2}}$, il ne peut donc être que 2,

1, ou 0.

Or $y = 2$ ne correspond à aucune valeur entière de x satisfaisant à (1);

$y = 1$ donne $x = 1$, ce qui conduit à la famille que nous avons signalée;

$y = 0$ ne correspond à aucune valeur entière de x .

Donc toute solution de (1) appartient à la famille dérivée de $x = 1$, $y = 1$ et par suite toute solution de (2) à la famille dérivée de $x = 1$, $y = 0$. Cela posé, nous aurons donc complètement résolu l'équation (1) si nous donnons toutes les solutions positives de la famille de solutions que nous avons reconnue.

En partant pour l'équation (2) des valeurs $x = 1$ $y = 0$ et pour l'équation (1) de $x = 1$ $y = 1$, on peut former le tableau T des solutions positives de ces deux équations

Valeurs de	x	y	
Pour l'équation (2)	1	0	
..... (1)	1	1	
..... (2)	3	2	
..... (1)	7	5	
..... (2)	17	12	
..... (1)	41	29	(T)

On voit que la colonne des x du tableau T coïncidera avec les

termes du tableau K dans lequel on suppose $a = 1$, $b = 1$ et que la colonne des y du tableau T coïncidera avec les termes du tableau K où l'on suppose

$$a = 0, \quad b = 1.$$

On déduit de ce qui précède que toutes les solutions positives de (1), et par suite toutes les solutions, sont données par

$$x_n = N_{2n-1} + N_{2n} = N_{2n+1} - N_{2n}$$

$$y_n = N_{2n}$$

et toutes les solutions de (2) par

$$x_2 = N_{2n-2} + N_{2n-1}$$

$$y_n = N_{2n-1}.$$

REMARQUE. N_{2n-1} a : $n - 1$ termes,

N_{2n} a : $n + 1$ termes.

Il est très facile de voir que la question que nous venons de traiter peut s'énoncer ainsi :

Donner explicitement toutes les valeurs entières de n pour lesquelles $2n^2 - 1$ est un carré parfait et toutes les valeurs entières de n pour lesquelles $2n^2 + 1$ est un carré parfait.

La solution que nous venons de donner des équations indéterminées (1) et (2) s'appuie sur la formation du tableau H, c'est-à-dire sur la résolution d'une équation aux différences finies

$$U_n = 2 \cdot U_{n-1} + U_{n-2}$$

laquelle n'est qu'un cas particulier de la suivante

$$U_n = l \cdot U_{n-2} + m U_{n-1}.$$

Nous allons terminer cette note en donnant la solution complète de cette dernière équation en supposant que les deux premiers termes soient a et b .

Formons le tableau K' de la série :

$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{array}{l} \text{1er terme : } a + 0 \\ \text{2i\`eme terme : } 0 + b \\ \text{3i\`eme terme : } la + mb \\ \text{4i\`eme terme : } lma + (l + m^2)b \\ \text{5i\`eme terme : } l(l + m^2)a + m(U + m^2)b \\ \text{6i\`eme terme : } lm(al + m^2)a + (l^2 + 3lm^2 + m^4)b \\ \dots \dots \dots \\ \text{2}p\text{i\`eme terme : } lm \left[(p-1) \cdot l^{p-2} + C_3 \cdot l^{p-3} \cdot m^2 + \right. \\ & \quad \left. + C_{p+1}^5 \cdot l^{p-4} \cdot m^4 + \dots (2p-4)l \cdot m^{2p-4} + m^{2p-2} \right] a \\ & \quad + \left[l^{p-1} + C_p^2 \cdot l^{p-2} \cdot m^2 + C_{p+1}^4 \cdot l^{p-3} \cdot m^4 + \dots \right. \\ & \quad \left. + C_{2p-3}^{2p-4} \cdot l \cdot m^{2p-4} + m^{2p-2} \right] b, \\ (K') \quad (2p+1)\text{i\`eme terme : } l \left[l^{p-1} + C_p^2 \cdot l^{p-2} \cdot m^2 + C_{p-1}^4 \cdot l^{p-3} \cdot m^4 + \dots \right. \\ & \quad \left. + C_{2p-3}^{2p-4} \cdot l \cdot m^{2p-4} + m^{2p-2} \right] a \\ & \quad + m \left[pl^{p-1} + C_{p+1}^3 \cdot l^{p-2} \cdot m^2 + C_{p-2}^5 \cdot l^{p-3} \cdot m^4 + \dots \right. \\ & \quad \left. + C_{2p-2}^{2p-3} \cdot l \cdot m^{2p-4} + m^{2p-2} \right] b, \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

et il suffit de montrer que si la loi est vraie jusqu'à un certain terme elle est g\'en\'erale.

NOTE SUR LES SÉRIES DONT LES TERMES
SONT FONCTIONS D'UNE VARIABLE COMPLEXE

PAR

CH. DE LA VALLÉE POUSSIN

(Professeur à l'Université de Louvain)

REMARQUE PRÉLIMINAIRE. — Soit $f(z)$ une fonction continue d'une variable complexe z ; on sait que si $f(z)$ est synectique dans une aire A , la valeur de l'intégrale

$$\int_{z_0}^z f(z) dz$$

ne dépend que des extrémités de la ligne d'intégration, à supposer que l'on ne sorte pas de A .

Réciproquement, soient z_0 et z les extrémités d'une ligne L ; si l'intégrale, effectuée le long de cette ligne,

$$\int_{z_0}^z f(z) dz$$

ne dépend que de z_0 et de z (L étant dans A), la fonction $f(z)$ est synectique dans l'aire A .

En effet, la fonction

$$\varphi(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$$

est alors une fonction uniforme de sa limite supérieure z ; de plus cette fonction a une dérivée unique et bien déterminée $f(z)$, car

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(z+h) - \varphi(z)}{h} = \lim \int_z^{z+h} f(z) dz = f(z);$$

donc $\varphi(z)$ est synectique: il en est alors de même pour toutes ses dérivées, et pour $f(z)$ en particulier.

THÉORÈME. — Considérons la série

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots,$$

dont tous les termes sont fonctions synectiques de z dans une aire A ; si cette série converge uniformément dans la même aire:

- 1°) La somme de la série est une fonction synectique dans l'aire A ;
- 2°) La série des dérivées d'ordre p

$$\frac{d^p u_0}{dz^p} + \frac{d^p u_1}{dz^p} + \dots + \frac{d^p u_n}{dz^p} + \dots$$

est uniformément convergente dans toute aire A' intérieure à A et a pour somme $\frac{d^p f(z)}{dz^p}$.

Démonstration. Soit ε un nombre arbitrairement petit; puisque la série converge uniformément, on aura, pour n assez grand,

$$f(z) = u_0 + u_1 + \dots + u_n r_n,$$

$$|r_n| < \varepsilon,$$

et l'on sait d'ailleurs que $f(z)$, donc r_n aussi, seront des fonctions continues de z dans l'aire A .

Soient z_0 et z les extrémités d'une ligne d'intégration L ; on aura

$$\int_L f(z) dz = \int_{z_0}^z u_0 dz + \int_{z_0}^z u_1 dz + \dots \dots + \int_{z_0}^z u_n dz + \int_L r_n dz,$$

$$\left| \int_L r_n dz \right| < \varepsilon S,$$

S étant la longueur de la ligne L .

Faisons tendre n vers l'infini et ε vers zéro, nous aurons, à la limite,

$$\int_L f(z) dz = \int_{z_0}^z u_0 dz + \int_{z_0}^z u_1 dz + \dots \dots + \int_{z_0}^z u_n dz + \dots \dots ,$$

ce qui prouve deux choses : 1°) que la série infinie

$$\int_{z_0}^z u_0 dz + \int_{z_0}^z u_1 dz + \dots \dots$$

et convergente ; 2°) que la somme de cette série ne pouvant dépendre que de z_0 et de z , extrémités de la ligne L , il en sera de même pour la valeur de l'intégrale

$$\int_L f(z) dz,$$

et, par conséquent, en vertu de notre remarque préliminaire, $f(z)$ est synectique.

La démonstration de la seconde partie du théorème en dérive immédiatement.

Soient z un point de l'aire A' , R sa plus courte distance au contour de l'aire A ; la fonction $f(z)$ sera synectique dans un cer-

cle de rayon R , décrit autour du point z , et, par conséquent, r_n le sera également; d'ailleurs, on a sur ce cercle

$$|r_n| < \epsilon,$$

d'où par un théorème bien connu on conclut au point z

$$\left| \frac{d^\rho r_n}{dz^\rho} \right| < \frac{1 \cdot 2 \cdots \rho}{R^\rho} \epsilon.$$

Considérons maintenant l'équation

$$\frac{d^\rho f(z)}{dz^\rho} = \frac{d^\rho u_0}{dz^\rho} + \frac{d^\rho u_1}{dz^\rho} + \dots + \frac{d^\rho u_n}{dz^\rho} + \frac{d^\rho r_n}{dz^\rho};$$

tant que le point z restera dans A' supposé intérieure à A , R restera supérieur à un nombre fixe, donc

$$\left| \frac{d^\rho r_n}{dz^\rho} \right|$$

tendra uniformément vers zéro quand u tendra vers l'infini, donc la série des dérivées d'ordre ρ est uniformément convergente et a pour somme

$$\frac{d^\rho f(z)}{dz^\rho},$$

quel que soit ρ .

REMARQUE. — Les propriétés des fonctions supposées connues dans cette démonstration sont démontrées dans presque tous les traités avant celles des séries potentielles. Cependant, la plupart de celles-ci sont généralement établies par des considérations

spéciales, tandis qu'elles ne sont que des cas particuliers du théorème précédent. Il nous paraîtrait plus philosophique de commencer par établir le théorème général et de l'appliquer ensuite aux séries potentielles. On peut se demander en outre si la première partie du théorème n'est pas implicitement supposée dans la démonstration des théorèmes classiques de Weierstrass et de Mittag-Leffler pour la représentation des fonctions. Ce sont ces considérations didactiques qui nous ont engagé à rédiger cette petite Note.



BIBLIOGRAPHIA

J. Alves Bonifacio.—Geometria elementar plana e no espaço (Porto, 1892).

Contém este manual de Geometria elementar todos os assumptos que ordinariamente fazem parte das obras d'esta natureza, dispostos com boa ordem em dez livros, sendo os cinco primeiros dedicados á Geometria plana, os quatro seguintes á Geometria no espaço, e o ultimo aos principios da theoria geometrica das secções conicas e das superficies de segunda ordem. Eis um resumo dos assumptos tractados em cada um d'estes livros: I. Angulos. Perpendiculares e obliquas. Parallelas. II. Arcos e cordas. Tangentes á circumferencia. Medida dos segmentos de recta, dos arcos e dos angulos. III. Triangulos. Linhas perpendiculares no circulo. IV. Polygonos. Rectificação da circumferencia. V. Areas. VI. Planos e rectas no espaço. VII. Pyramides, prismas e polyedros. VIII. Cylindro, cone e esphera. IX. Areas e volumes. X. Propriedades elementares da ellipse, da hyperbole e da parabola. Transversaes no triangulo. Figuras homotheticas. Superficies do segundo grau.

Cada livro é acompanhado de numerosos exercícios relativos ás doutrinas n'elle tractadas.

A clareza com que é feita a exposição dos assumptos, a boa ordem na disposição dos mesmos e a boa escolha das demonstrações empregadas tornam o novo manual de Geometria elementar muito proprio para o ensino da Geometria nos Lyceus.

A Faculdade de Mathematica da Universidade de Coimbra (Coimbra, 1892).

Contém este opusculo um pequeno additamento á *Memoria*

historica da Faculdade de Mathematica, publicada em 1872 pelo sr. dr. F. de Castro Freire; as propostas appresentadas ao Conselho superior de Instrucção publica no biennio de 1885 a 1886 pelo illustre delegado da Faculdade o sr. dr. L. da Costa e Almeida; e finalmente um projecto de reforma da mesma Faculdade elaborado por ella em 1887.

C. A. Laisant. — *Recueil de problèmes de Mathématiques (Géométrie analytique à deux dimensions)*, Paris, Gauthier-Villars, 1892.

Este volume é o primeiro de uma obra muito util, que constará de sete volumes, na qual serão reunidos, dispostos por ordem científica, os enunciados dos problemas que têm sido propostos nas *Nouvelles Annales*, na *Nouvelle Correspondance*, no *Journal de Mathématiques élémentaires*, no *Mathesis*, etc. As soluções não são appresentadas, mas cada problema é acompanhado de uma indicação do logar em que n'aquelles jornaes se encontra a solução.

No presente volume são reunidos os problemas que se referem á Geometria analytica plana e á Geometria superior. Está dividido em sete partes em que são respectivamente dispostos os problemas relativos ás figuras rectilineas e circulares, ás conicas, ás curvas algebraicas, ás curvas transcendentas, aos logares geometricos, ás envolventes e as trajectorias. Cada uma d'estas partes é subdividida em muitas outras. Esta distribuição ordenada dos problemas permite procurar-se com facilidade se um certo problema vem na collecção e em que logar foi publicada a solução. A utilidade de uma publicação d'esta natureza é evidente; por isso com ella fez o sr. Laisant um grande serviço aos que cultivam as sciencias mathematicas.

X. Antomari. — *Léçons de Cinématique et de Dynamique* (Paris, Nony, 1892).

Contém este volume a parte da Cinematica e da Dynamica

..

que é exigida pelos programmas de admissão á Eschola Polytechnica de Paris. Contém além d'isso a parte da Statica do sólido invariável em que se tracta da determinação dos centros de gravidade. Na exposição das doutrinas, que é feita com a maior clareza, o auctor subordina o estudo da Statica ao estudo da Dynamica.

A obra é dividida em tres partes, sendo na primeira estudada a Cinematica do ponto, na segunda a Dynamica do ponto e na terceira a theoria dos centros de gravidade dos solidos.

N'um capitulo preliminar é estudada a theoria geometrica dos vectores, cuja importancia em Mecanica é bem conhecida.

Cada capitulo é seguido de muitos exercicios para os alumnos se familiarisarem com as doutrinas tractadas.

J. Deruyts. — Essai d'une théorie générale des formes algébriques (Bruxelles, 1891).

O illustre auctor d'este bello e importante trabalho tem-se ocupado muitas vezes da theoria das fórmulas algebraicas em artigos publicados nas principaes collecções scientificas belgas. Na presente memoria coordena e completa os resultados obtidos nos trabalhos anteriores. N'ella estende ao caso de muitas series de qualquer numero de variaveis os resultados anteriormente obtidos pelos geometras para o caso de muitas series de duas variaveis. Considerando principalmente as funcções invariantes, reduz estas funcções a certas funcções invariantes com $n - 1$ series de n variaveis, a que dá o nome de *covariantes primarios*, cujas propriedades estuda desenvolvidamente.

S. Pincherle. — Contributo alla integrazione delle equazioni differenziali lineari mediante integrali definiti (Memorie della R. Acad. di Bologna, 1892).

O objecto d'esta importante memoria é a transformação do integral $\phi(t)$ de uma equação linear qualquer, regular e com coefficientes racionaes, no integral de uma nova equação linear,

tambem regular e com coeffientes racionaes, por meio da relaçao

$$J(x) = \int_x A(t, x) \varphi(t) dt,$$

nos casos de $A(t, x)$ representar uma das funcções $(t-x)^p$ ou $G^p(t, x)$, $G(t, x)$ sendo uma função inteira.

V. Retali. — *Sullo sportamento finito di una figura piana nel suo piano* (*Memorie della R. Acad. di Bologna*, 1892).

N'esta memoria o auctor rectifica uma proposição enunciada por Charles no n.^o 17 da sua memoria — *Propriétés relatives au déplacement fini quelconque dans l'espace d'une figure de forme invariable*.

P. H. Schoute. — *Le déplacement le plus général dans l'espace à n dimensions* (*Annales de l'École Polytechnique de Delft*, t. vii).

N'esta memória muito interessante tracta M. Schoute, professor na Universidade de Groningen, de obter por methodos geometricos muitos resultados relativos á questão da congruencia e da simetria de duas figuras no espaço a n dimensões, anteriormente obtidos pelo sr. Rahusen por meio da theoria dos determinantes. Em seguida estuda de uma maneira mais profunda estas questões e deduz um meio de representação simples da relação entre duas figuras congruentes e da relação entre duas figuras simetricas no espaço a n dimensões.

J. Duran Loriga. — *Sobre las funciones simétricas simples de las racines de una ecuacion* (*El Progreso matematico*, t. II).

Dr. J. Bergbohm. — *Entwurf einer neuen Integralrechnung etc.*
(Leipzig, 1892).

M. Lerch. — *Základové theorie Malmsténovských rad (Bulletin da Academia de Praga, t. II).*
 — *Poznámky k teorii interpolace (Item).*
 — *Prispevky k teorii funkci elliptickch, etc. (Item).*

M. d'Ocagne. — *Sur la construction de la parabole osculatrice en un point d'une courbe donnée (Nouvelles Annales des Mathématiques, 1892).*
 — *Sur la corrélation entre les systèmes de coordonnées ponctuelles et les systèmes de coordonnées tangentielle (Item).*
 — *Sur la liaison entre les expressions du rayon de courbure en coordonées ponctuelles et en coordonées tangentielle (Bulletin de la Société mathématique de France, 1891).*
 — *Sur une détermination particulière du centre de courbure des lignes planes (Item).*
 — *Détermination du rayon de courbure en coordonnées parallèles ponctuelles (Bulletins de l'Académie de Belgique, 1891).*

S. Pincherle. — *Sulle forme differenziali lineari (Rend. della R. Ac. dei Lincei, Roma, 1892).*

A. Gützmer. — *Bemerkung über die Jacobische Thetaformel (Journal für die reine und angewandte Mathematik, t. 110).*

V. Retali. — *Sur quelques problèmes concernant le double contact et le contact du troisième ordre des coniques (Mathesis, 1892).*

E. Cesáro. — *Sulle curve di Bertrand* (*Rivista di Matematica*, t. II).

J. Deruyts. — *Sur une extension de la loi de réciprocité de M. Hermite* (*Bulletins de l'Acad. de Belgique*, 1891)..

— *Sur le développement de certaines fonctions algébriques* (*Mémoires de l'Acad. de Belgique*, 1892).

G. Pirondini. — *Contatto e ortogonalità di due elicoide* (*Rivista di Matematica*, t. II).

G. Vivanti. — *L'infinito nella natura e nella scienza* (Milano, 1892).

— *Sugli integrali delle equazioni del moto d'un punto che sono funzioni lineari fratte delle velocità componenti* (*Rend del Circolo matematico di Palermo*, 1892).

G. T.



PROCESSOS EXPEDITOS PARA ACHAR OS DESENVOLVIMENTOS
DE ALGUNS DETERMINANTES

Determinantes de terceira ordem

POR

JOSÉ PEDRO TEIXEIRA

Tome-se o typo, $a_1 b_2 c_3$, inverta-se a ordem dos indices e mude-se de signal; nos termos assim obtidos juncte-se a cada indice uma unidade, considerando, no acto de addição, o indice tres como nullo, e repita-se esta operação tres vezes sobre cada termo, conservando os signaes: a somma algebrica dos termos assim obtidos é o desenvolvimento do determinante de terceira ordem.

Convirá dispôr o calculo assim:

$$\begin{aligned}
 & + a_1 b_2 c_3 - a_3 b_2 c_1 \\
 & + a_2 b_3 c_1 - a_1 b_3 c_2 \\
 & + a_3 b_1 c_2 - a_2 b_1 c_3.
 \end{aligned}$$

Para os determinantes literaes, esta regra é mais expedita ainda do que a de Sarrus.

Determinantes de quarta ordem

Tome-se o termo typo, $a_1 b_2 c_3 d_4$, troquem-se as letras a e b e mude-se de signal, e no resultado troquem-se as letras a e c e mude-se tambem de signal; inverta-se a ordem dos indices nos

tres termos assim obtidos, conservando os signaes ; juncte-se, em cada um dos seis termos, uma unidade a cada indice, considerando, no acto da addição, o indice quatro como nullo, e repita-se a operação quatro vezes, mudando sempre de signal : a somma algebrica dos termos assim obtidos é o desenvolvimento do determinante de quarta ordem.

Disponha-se o calculo assim :

$$\begin{aligned}
 & a_1 b_2 c_3 d_4 - b_1 a_2 c_3 d_4 + b_1 c_2 a_3 d_4 + \\
 & + a_4 b_3 c_2 d_1 - b_4 a_3 c_2 d_1 + b_4 c_3 a_2 d_1 \\
 & - a_2 b_3 c_4 d_1 + b_2 a_3 c_4 d_1 - b_2 c_3 a_4 d_1 - \\
 & - a_1 b_4 c_3 d_2 + b_1 a_4 c_3 d_2 - b_1 c_4 a_3 d_2 \\
 & + a_3 b_4 c_1 d_2 - b_3 a_4 c_1 d_2 + b_3 c_4 a_1 d_2 + \\
 & + a_2 b_1 c_4 d_3 - b_2 a_1 c_4 d_3 + b_2 c_1 a_4 d_3 \\
 & - a_4 b_1 c_2 d_3 + b_4 a_1 c_2 d_3 - b_4 c_1 a_2 d_3 - \\
 & - a_3 b_2 c_1 d_4 + b_3 a_2 c_1 d_4 - b_3 c_2 a_1 d_4
 \end{aligned}$$

Tambem se pôde achar o desenvolvimento do determinante da maneira que se segue : Repitam-se as tres primeiras linhas e forme-se o quadro :

a_1	b_1	c_1	d_1
a_2	b_2	c_2	d_2
a_3	b_3	c_3	d_3
a_4	b_4	c_4	d_4
a_1	b_1	c_1	d_1
a_2	b_2	c_2	d_2
a_3	b_3	c_3	d_3

Forme-se o somma dos productos dos elementos das diagonaes que se cruzam nos pontos de ordem impar (*) e d'esta somma

(*) Consideramos os pontos que os dividem em partes eguaes,

subtrahe-se a somma dos productos dos elementos das diagonaes que se cruzam nos pontos de ordem par, e seja A_1 o resultado. Repetindo a mesma operaçao nos quadros

b_1	a_1	c_1	d_1
b_2	a_2	c_2	d_2
b_3	a_3	c_3	d_3
b_4	a_4	c_4	d_4
b_1	a_1	c_1	d_1
b_2	a_2	c_2	d_2
b_3	a_3	c_3	d_3

b_1	c_1	a_1	d_1
b_2	c_2	a_2	d_2
b_3	c_3	a_3	d_3
b_4	c_4	a_4	d_4
b_1	c_1	a_1	d_1
b_2	c_2	a_2	d_2
b_3	c_3	a_3	d_3

e sejam A_2 e A_3 os resultados; será

$$A_1 - A_2 + A_3$$

o valor do determinante de quarta ordem,

Determinante de quinta ordem

Tome-se o termo typo, $a_1 b_2 c_3 d_4 e_5$, troquem-se a e b , depois a e c , depois a e d , mudando de signal a cada troca; obtemos assim :

$$a_1 b_2 c_3 d_4 e_5 - b_1 a_2 c_3 d_4 e_5 + b_1 c_2 a_3 d_4 e_5 - b_1 c_2 d_3 a_4 e_5 \quad (1)$$

N'esta expressão, troquem-se b e c e mude-se de signal, o que dá

$$-a_1 c_2 b_3 d_4 e_5 + c_1 a_2 b_3 d_4 e_5 - c_1 b_2 a_3 d_4 e_5 + c_1 b_2 d_3 a_4 e_5; \quad (2)$$

e tambem b e d , mudando tambem de signal, o que dá

$$-a_1 d_2 c_3 b_4 e_5 + d_1 a_2 c_3 b_4 e_5 - d_1 c_2 a_3 b_4 e_5 + d_1 c_2 b_3 a_4 e_5 \quad (3)$$

Em (1), (2) e (3) inverta-se a ordem dos indices, conservando os signaes; e, nos termos obtidos, juncate-se a cada indice uma unidade, considerando, no acto da somma, o indice 5 como nullo, e repita-se a operação cinco vezes, conservando os signaes: a somma algebrica dos termos assim obtidos é o desenvolvimento do determinante de quinta ordem

Tambem se pôde obter o mesmo desenvolvimento do modo seguinte: Repitam-se as quatro primeiras linhas e forme-se o quadro :

a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	d_2	e_2
a_3	b_3	c_3	d_3	e_3
a_4	b_4	c_4	d_4	e_4
a_5	b_5	c_5	d_5	e_5
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	d_2	e_2
a_3	b_3	c_3	d_3	e_3
a_4	b_4	c_4	d_4	e_4

e os que se deduzem d'aqui collocando a primeira linha successivamente em 2.^o, 3.^o e 4.^o lugar; formem-se depois os productos dos elementos das diagonaes e sejam A_1, A_2, A_3, A_4 as sommas d'estes productos relativos aos quatro quadros; repitam-se todas estas operaçōes relativamente aos determinantes $(a_1 c_2 b_3 d_4 e_5)$,

($a_1 d_2 c_3 b_4 e_5$), que se obtém do proposto trocando b e c , e b e d , e sejam A'_1, A'_2, A'_3, A'_4 , e $A''_1, A''_2, A''_3, A''_4$ as quantidades análogas às precedentes: será

$$A_1 - A_2 + A_3 - A_4$$

$$- A'_1 + A'_2 - A'_3 + A'_4$$

$$+ A''_1 - A''_2 + A''_3 - A''_4$$

o valor do determinante ($a_1 b_2 c_3 d_4 e_5$)

SUR UNE REPRÉSENTATION DES FONCTIONS EXPONENTIELLES PAR DES PRODUITS INFINIS

PAR

M. A. BASSANI

(Professeur à l'Ecole Navale de Livourne)

1. Sous le même titre M. Lipschitz publia une Note dans les Comptes Rendus de l'Académie de France (T. xcix, pag. 701), dans laquelle l'habile analyste déduit, à partir de la série très-connu

$$\sum_1^{\infty} \varphi(n) \frac{z^n}{1-z^n} = \sum_1^{\infty} n z_n,$$

où $\varphi(n)$ est la fonction arithmétique de Gauss, un développement en produit infini de la fonction exponentielle $e^{-\frac{z}{1-z}}$.

La même question, traitée sous un point de vue plus général, forme le sujet du présent travail, dans lequel je me suis borné à considérer seulement quelque exemple relatif aux développements susdits, quoique la méthode puisse s'étendre à une foule d'autres.

2. Soit

$$(1) \quad S(z) = F(1) + F(2)z + F(3)z^2 + F(4)z^3 + \dots$$

une série infinie, absolument convergente quand z est comprise

au dédans d'un cercle de rayon égal à l'unité, décrit de l'origine comme centre, n étant un nombre entier positif fini ou infini et $F(n)$ une fonction entière de n . Supposons que l'on ait

$$(2) \quad F(n) = \sum f(\delta),$$

où f est une fonction, qu'il faut déterminer, et la somme Σ se rapporte à tous les diviseurs δ du nombre n . On sait que pour chaque fonction F il existe une et une seule fonction f , qui vérifie la (2); cette fonction est donnée, en désignant par u, v, w, \dots les facteurs premiers de n , par la relation suivante

$$f(n) = F(n) - \sum F\left(\frac{n}{u}\right) + \sum F\left(\frac{n}{uv}\right) - \sum F\left(\frac{n}{uvw}\right) + \dots$$

ou, en employant la fonction renversante de M. Cesàro, dont le savant professeur a fait ressortir toute l'importance dans ses beaux travaux d'arithmétique supérieure, par la relation

$$f(n) = \sum \mu\left(\frac{n}{\delta}\right) F(\delta) = \sum \mu(\delta) F\left(\frac{n}{\delta}\right),$$

où les sommes se rapportent à tous les diviseurs δ du nombre n .

La fonction $\mu(\delta)$ est la fonction renversante susdite; elle est généralement nulle, mais égale à $(-1)^k$ lorsque δ est le produit de k facteurs premiers, inégaux.

Cela posé, si l'on substitue dans la (1) au lieu de $F(n)$ la valeur donnée par la (2), et, en égard à la convergence absolue de (1), on arrange convenablement les termes, on trouve la série

$$(3) \quad S(z) = f(1) \frac{1}{1-z} + f(2) \frac{z}{1-z^2} + f(3) \frac{z^2}{1-z^3} + \dots$$

qui intégrée, à partir de 0, le long d'une ligne comprise à l'inté-

rieur du cercle de convergence, nous donne

$$(3)' - \sum_1^{\infty} F(n) \frac{z^n}{n} = f(1) \log(1-z) + \frac{f(2)}{2} \log(1-z^2) + \frac{f(3)}{3} \log(1-z^3) + \dots,$$

qu'on peut mettre sous la forme

$$(4) e^{-\sum_1^{\infty} F(n) \frac{z^n}{n}} = \prod_1^{\infty} (1-z^n)^{\frac{f(n)}{n}},$$

la convergence du produit ayant lieu dans le domaine de convergence de la série (1).

En écrivant $\frac{1}{z}$ au lieu de z , on trouve aussi

$$(5) e^{\sum_1^{\infty} \frac{F(n)}{z^n}} = \prod_1^{\infty} \left(\frac{z^n}{z^n - 1} \right)^{\frac{f(n)}{n}}$$

et le second membre est convergent en déhors du cercle ayant son centre à l'origine et son rayon égal à l'unité.

3. Pour appliquer les résultats à quelque exemple, considérons la fonction arithmétique $\varphi_v(x)$, qui représente le nombre des fractions irréductibles, de numérateur x , non inférieures à v . On voit que cette fonction comprend la fonction $\varphi(x)$ de Gauss pour $v=1$, et dans ce cas est égale au nombre des nombres premiers avec x et inférieurs à x .

En employant le symbole $E\left(\frac{x}{v}\right)$ pour indiquer le plus grand entier contenu en x , on démontre très-aisément que

$$\sum \varphi_v(\delta) = E\left(\frac{n}{v}\right),$$

d'où l'on tire, en s'aidant de la (4),

$$(6) \quad e^{-\frac{z}{1-\frac{1}{z}} E\left(\frac{n}{v}\right) \frac{z^n}{n}} = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - z^n)^{\frac{\varphi_v(n)}{n}} \quad [v = 1, 2, 3, \dots]$$

Maintenant posons

$$S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\frac{n}{v}\right) \frac{z^n}{n};$$

on aura alors, en dérivant,

$$z S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\frac{n}{v}\right) z^n,$$

qu'on peut mettre sous la forme

$$z S'(z) = \sum_{v=1}^{2v-1} z^n + 2 \sum_{v=2}^{3v-1} z^n + 3 \sum_{v=3}^{4v-1} z^n + \dots,$$

ou, en effectuant les sommes dans le second membre,

$$\begin{aligned} z S'(z) &= \frac{z^v (1-z^v)}{1-z} + 2 \frac{z^{3v} (1-z^v)}{1-z} + 3 \frac{z^{3v} (1-z^v)}{1-z} + \dots \\ &= \frac{1-z^v}{1-z} \frac{z^v}{(1-z^v)^2}. \end{aligned}$$

On en tire, en intégrant,

$$S(z) = \int_0^z \frac{z^{v-1} dz}{(1-z)(1-z^v)},$$

et par conséquent la (6) peut être écrite ainsi:

$$(6)' e^{-\int_0^z \frac{z^{v-1} dz}{(1-z)(1-z^v)}} = \prod_{n=1}^{\infty} (1-z^n)^{\frac{\varphi_v(n)}{n}}.$$

En particulier, pour $v=1$ on a $\int_0^z \frac{dz}{(1-z)^2} = \frac{z}{1-z}$, et la dernière formule devient

$$(7) e^{-\frac{z}{1-z}} = \prod_{n=1}^{\infty} (1-z^n)^{\frac{\varphi(n)}{n}},$$

qui est la formule de M. Lipschitz.

En remplaçant, dans la précédente, z par $\frac{1}{z}$, on trouve

$$(7)' e^{\frac{1}{z-1}} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z^n}{z^n - 1} \right)^{\frac{\varphi(n)}{n}}$$

pourvu qu'on ait $\text{mod } z > 1$.

Lorsque $v=2$, on a

$$S(z) = \int_0^z \frac{z dz}{(1-z)(1-z^2)}.$$

En posant $z = \sin \varphi$, on trouve

$$\int \frac{z dz}{(1-z)(1-z^2)} = \int \frac{\tan \varphi d\varphi}{1 - \sin \varphi} = \int \frac{\sin^2 \varphi d\varphi}{\cos^3 \varphi} + \int \frac{\sin \varphi d\varphi}{\cos^3 \varphi}$$

$$= \frac{1 + \sin \varphi}{2 \cos^2 \varphi} + \frac{1}{2} \log . \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right),$$

et pour cela

$$S(z) = \frac{z}{2(1-z)} + \frac{1}{2} \log . \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\arcsin z}{2} \right);$$

donc

$$(8) \quad e^{-\frac{z}{2(1-z)} - \frac{1}{2} \log \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\arcsin z}{2} \right)} = \prod_1^{\infty} (1 - z^n)^{\frac{\varphi_2(n)}{n}}.$$

4. Une fonction qui présente quelque analogie avec la précédente est la fonction $i(x)$ de M. Cesàro (*), qui représente le nombre des fractions irréductibles, dont un terme au moins est égal à x . La fonction en question n'est que le double de la fonction de Gauss, sauf pour $x = 1$, car $i(1) = 2 \varphi(1) - 1$; par conséquent on peut écrire

$$\sum i(\delta) = 2n - 1,$$

et de la (4) on tire

$$(9) \quad e^{-\sum_1^{\infty} \frac{2n-1}{n} z^n} = e^{-\frac{2z}{1-z} + \log(1-z)} = \prod_1^{\infty} (1 - z^n)^{\frac{i(n)}{n}}.$$

(*) *Annali di Matem. di Brioschi*, serie 2.^a, pag. 235.

5. Il est ais  d'obtenir aussi les d veloppements en produits infinis des fonctions exponentielles e^{-z} , $e^{-\text{arc. } \text{tg } z}$, dont le premier, d  脿 M. Tchebichef, a 蒙t  donn  par M. Bertrand dans le *Calcul Diff rentiel*.

En effet, consid rant la fonction $\mu(x)$ de M. Ces ro, on voit, par la d finition m me de la fonction, qu'elle donne lieu 脿 l' galit 

$$F(n) = \sum \mu(\delta) = \begin{cases} 0 & \text{si } n > 1 \\ 1 & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

et l'on peut alors en d duire facilement par le moyen de (4)

$$e^{-z} = \prod_1^{\infty} (1 - z^n)^{\frac{\mu(n)}{n}},$$

c'est- -dire

$$(10) \quad e^{-z} = \frac{(1-z)(1-z^6)^{\frac{1}{6}}(1-z^{10})^{\frac{1}{10}}(1-z^{14})^{\frac{1}{14}}(1-z^{15})^{\frac{1}{15}} \dots}{(1-z^2)^{\frac{1}{2}}(1-z^3)^{\frac{1}{3}}(1-z^5)^{\frac{1}{5}}(1-z^7)^{\frac{1}{7}}(1-z^{11})^{\frac{1}{11}} \dots}$$

De m me, en posant dans (2) $F(n) = \sin \frac{n\pi}{2}$ on obtient

$$f(n) = \sum \mu(\delta) \sin \frac{n\pi}{2\delta}.$$

D'ailleurs on a 膏idemment

$$\sum_1^{\infty} \sin \frac{n\pi}{2} \cdot \frac{z^n}{n} = z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{5} - \frac{z^7}{7} + \dots = \text{arc. tang } z,$$

• •

done, d'après ce qui a été démontré,

$$(11) \quad e^{-\operatorname{arc \tan} z} = \frac{(1-z)(1-z^6)^{\frac{2}{6}}(1-z^9)^{\frac{2}{9}}(1-z^{14})^{\frac{2}{14}} \dots}{(1-z^2)^{\frac{1}{2}}(1-z^3)^{\frac{2}{3}}(1-z^7)^{\frac{2}{7}}(1-z^{11})^{\frac{2}{11}} \dots}$$

6. En poursuivant l'exposition des résultats, qu'on peut tirer des formules démontrées précédemment, considérons maintenant le cas, où $F(n) = n^r$, r étant un nombre entier positif ou négatif.
Posons alors

$$\sum \psi_r(\delta) = n^r$$

d'où l'on tire

$$\psi_r(n) = n^r \sum \frac{u(\delta)}{\delta^r} = n^r \prod \left(1 - \frac{1}{p^r}\right),$$

le produit \prod se rapportant à tous les facteurs premiers p du nombre n .

En particulier : 1°, pour $r=0$ il est aisé de voir qu'on a

$$\psi_0(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n > 1 \\ 1 & \text{si } n = 1 \end{cases};$$

2° pour $r=1$ on a

$$\psi_1(n) = n \prod \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

qui coïncide avec la fonction $\varphi(n)$ de Gauss ;

3° pour $r=2$ on obtient

$$\psi_2(n) = \frac{n^2}{N} \varphi(n) \Phi(N),$$

où N est le produit des facteurs premiers de n , et $\Phi(N)$, en employant la notation de M. Kronecker, est la somme des diviseurs de N ;

4°, pour $r = -1$ on trouve

$$\psi^{(n)}_{-1} = \frac{N \varphi(n)}{n};$$

5° si l'on pose $r = -2$ il en résulte

$$\psi^{(n)}_{-2} = \frac{N}{n^2} \varphi(n) \Phi(N);$$

etc. etc.

En substituant dans la (4) et considérant premièrement le cas, où r est positif, nous avons

$$(12) \quad e^{-\sum_{i=1}^{\infty} n^{r-1} z^n} = (1-z)^{\psi_r(1)} (1-z^2)^{\frac{\psi_r(2)}{2}} (1-z^3)^{\frac{\psi_r(3)}{3}} \dots$$

Mais pour une propriété qui a été mise en évidence par M. Catalan dans son Mémoire «Sur une suite de polynômes entiers», on sait que

$$z + 2^{r-1} z^2 + 3^{r-1} z^3 + \dots = \sum_{i=1}^{r-1} \Delta^i (0^{r-1}) \frac{z^i}{(1-z)^{i+1}}, \quad (r > 1)$$

où $\Delta^i (0^{r-1})$ représente le coefficient de $\frac{x^i}{i!}$ dans le développement de $(e^x - 1)^{r-1}$ en série ordonnée suivant les puissances de x , c'est-à-dire

$$\Delta^i (0^{r-1}) = i^{r-1} - i(i-1)^{r-1} + \frac{i(i-1)}{2!} (i-2)^{r-1} - \dots$$

Conséquemment la formule précédente peut s'écrire

$$(13) \quad e^{-\sum_{i=1}^{r-1} \Delta^i (0^{r-i}) \frac{z^i}{(1-z)} i + 1} = (1-z)^{\psi_r(1)} (1-z^2)^{\frac{\psi_r(2)}{2}} (1-z^3)^{\frac{\psi_r(3)}{3}} \dots$$

Maintenant il est aisément d'exprimer le premier membre de cette dernière égalité par le moyen des nombres ultra-bernoulliens, ainsi nommés par M. Trudi, qui en a fait sujet d'étude dans un Mémoire lu à l'Académie de Naples. M. Cesàro reprit ensuite dans les Nouvelles Annales l'étude de ces nombres, et, pour mettre en vue l'analogie, qui existe entre eux et les nombres de Bernoulli, proposa la définition symbolique

$$(B+1)^v - zB^v = v, \quad [v = 0, 1, 2, 3, \dots]$$

z étant une quantité arbitraire différente de zero. On en conclut, de proche en proche,

$$B_0(z) = 0, \quad B_1(z) = -\frac{1}{1-z}, \quad \frac{B_2(z)}{2} = -\frac{z}{(1-z)^2},$$

$$\frac{B_3(z)}{3} = -\frac{z}{(1-z)^2} - \frac{2z^2}{(1-z^3)}, \quad \frac{B_4(z)}{4} = -\frac{z}{(1-z)^2} -$$

$$-\frac{6z^2}{(1-z)^3} - \frac{6z^3}{(1-z)^4} \dots$$

$$\frac{B_r(z)}{r} = -\Delta(0^{r-1}) \frac{z}{(1-z)^2} - \Delta^2(0^{r-1}) \frac{z^2}{(1-z)^3} - \dots -$$

$$-\Delta^{r-1}(0^{r-1}) \frac{z^{r-1}}{(1-z)^r}.$$

En conséquence la formule (13) peut être mise sous la forme remarquable

$$(14) \quad e^{\frac{B_r(z)}{r}} = \prod_1^{\infty} (1 - z^n)^{\frac{\psi_r(n)}{n}}.$$

En particulier, pour $r=1$ les formules (13), (14) n'ont pas de sens, mais il est aisément de voir que nous sommes dans les cas du développement de M. Lipschitz donné auparavant.

Pour $r=2, 3, \dots$ la (14) donne lieu aux développements

$$e^{-\frac{z}{(1-z)^2}} = \prod_1^{\infty} (1 - z^n)^{\frac{\psi_2(n)}{n}},$$

$$e^{-\frac{z(1+z)}{(1-z)^3}} = \prod_1^{\infty} (1 - z^n)^{\frac{\psi_3(n)}{n}},$$

.....
.....

Venons maintenant à considérer le cas, où r est un nombre négatif, et dans le but de mettre sous forme intégrale la somme

$$S(z) = \sum_1^{\infty} \frac{z}{n^{r+1}},$$

qui se présente dans le premier membre de (12), lorsqu'on y fait r négatif, considérons le développement

$$\frac{z}{e^x - z} = z e^{-x} + z^2 e^{-2x} + z^3 e^{-3x} + \dots$$

qui subsiste tant que $\operatorname{mod} z > 1$ et $\operatorname{mod} e^{-x} \leq 1$.

En multipliant par $x^r dx$ et intégrant de 0 à ∞ , en vertu de

la formule connue

$$\int_0^\infty e^{-nx} x^r dx = \frac{r!}{n^{r+1}},$$

on obtient sans peine

$$\frac{1}{r!} \int_0^\infty \frac{zx^r dx}{e^x - z} = \sum_1^\infty \frac{z^n}{n^{r+1}}.$$

Conséquemment la (12) nous donne

$$(15) \quad e^{-\frac{1}{r!} \int_0^\infty \frac{zx^r dx}{e^x - z}} = \prod_1^\infty (1 - z^n)^{\frac{\psi_{-r}(n)}{n}}$$

En particulier, pour $r = 0$, on tire de là

$$e^{\log(1-z)} = 1 - z,$$

qui est évident.

7. Voici maintenant une application très-étendue, qu'on peut faire de (4), en supposant que la fonction $f(n)$ soit un polynôme quelconque en n .

Puisque chaque fonction rationnelle et entière de n , du degré p , est toujours décomposable suivant la forme

$$a_0 + a_1 n + a_2 \frac{n(n+1)}{2!} + a_3 \frac{n(n+1)(n+2)}{3!} + \dots$$

$$+ a_p \frac{n(n+1)(n+2)\dots(n+p-1)}{p!},$$

on peut déterminer les coefficients a_0, a_1, \dots, a_p de manière à

avoir identiquement

$$f(n) = a_0 + a_1 n + a_2 \frac{n(n+1)}{2!} + \dots + a_p \frac{n(n+1)\dots(n+p-1)}{p!}.$$

Cela posé, en employant une transformation, due à Jacobi, on obtient

$$f(1) \frac{z}{1-z} + f(2) \frac{z^2}{1-z^2} + f(3) \frac{z^3}{1-z^3} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{v=0}^p \frac{a_v z^n}{(1-z^n)^{v+1}},$$

d'où l'on déduit

$$(16) \quad e^{\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_0}{n} \log(1-z^n) - \sum_{v=1}^p \frac{a_v}{n^v} \frac{1-(1-z^n)^v}{(1-z^n)^v} \right]} = \prod_1^{\infty} (1-z^n)^{\frac{f(n)}{n}}.$$

En particulier, pour $a_1 = 1$ et $a_0 = a_2 = \dots = a_p = 0$, on a $f(n) = n$ et $F(n) = \Phi(n)$; donc la dernière formule devient.

$$e^{-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Phi(n)}{n} z^n} = e^{-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{z^n}{1-z^n}} = \prod_1^{\infty} (1-z^n).$$

Encore, si l'on pose $a_0 = 1$, $a_1 = a_2 = \dots = a_p = 0$, il en dérive $f(n) = 1$ et $F(n)$ égale au nombre des diviseurs de n , que nous désignerons par $\lambda(n)$. On en conclut

$$e^{-\sum \frac{\lambda(n)}{n} z^n} = e^{-\sum \frac{\log(1-z^n)}{n}} = \prod_1^{\infty} (1-z^n)^{\frac{1}{n}},$$

etc. etc.

S. Pour finir, représentons par $v(x)$ une fonction généralement nulle, mais, lorsque x est un nombre premier ou puissance

d'un nombre premier, égale au logarithme de ce nombre. On aura

$$\Sigma v(\delta) = \log n,$$

et pour cela

$$(1-z^2)^{\frac{\log 2}{2}} (1-z^3)^{\frac{\log 3}{3}} (1-z^4)^{\frac{\log 2}{4}} \dots = e^{-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n} z^n}.$$

D'ailleurs

$$\Sigma \log n \frac{z^n}{n} = \log [1^{\frac{z}{2}} 2^{\frac{z^2}{2}} 3^{\frac{z^3}{3}} \dots],$$

donc

$$(17) \quad (1-z^2)^{\frac{\log 2}{2}} (1-z^3)^{\frac{\log 3}{3}} (1-z^4)^{\frac{\log 2}{4}} \dots = 2^{-\frac{z^2}{2}} \cdot 3^{-\frac{z^3}{3}} \cdot 4^{-\frac{z^4}{4}} \dots$$

d'où l'on peut tirer des identités curieuses.



SUR LA DIFFÉRENTIATION DES SÉRIES

(Extrait d'une lettre adressée à Gomes Teixeira)

PAR

M. LERCH

(Professeur à l'École Polytechnique de Prague)

Je prends la liberté vous communiquer une remarque à laquelle m'a donné l'occasion la note de M. de la Vallée Poussin contenue dans le 3^{me} numéro du t. xi de votre journal. Dans mes leçons à l'École technique tschèque j'ai développé une démonstration d'un théorème qui traite un sujet analogue à celui de M. de la Vallée Poussin, mais avec moins d'hypothèses.

Le théorème dont il s'agit est le suivant: Supposons que les termes de la série infinie

$$f_0(x) + f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots$$

sont des fonctions uniformes et synectiques dans une aire finie que'conque A et que la série soit uniformément convergente lorsque la variable x parcourt tout le contour S de cette aire A. Alors je dis que la série sera convergente aussi pour tous les points intérieurs de A et qu'elle représente une fonction analytique $F(x)$ dont les dérivées s'obtiennent en différentiant les termes de la série considérée.

Employons à cet effet la formule

$$f_n(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_S \frac{f_n(z) dz}{z - x},$$

où x est un des points intérieurs de A , l'intégrale étant prise le long du contour S dans le sens positif. Il s'ensuit

$$\sum_{n=m}^{m+p} f_n(x) = \int_S \frac{dz}{z - x} \sum_{n=m}^{m+p} f_n(z);$$

or la série $\sum f_n(z)$ étant uniformément convergente sur le contour S , on peut trouver une limite m_0 telle que, pour chaque valeur de m supérieure à m_0 , chaque corps de termes éloignés $\sum f_n(z)$, ($n = m, m+1, \dots, m+p$) a une somme moindre qu'une quantité ε donnée d'avance, quelque soit p .

On aura ainsi l'inégalité

$$|\sum_{n=m}^{m+p} f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_S \frac{ds}{|z - x|},$$

en représentant par ds la différentielle de l'arc du contour s . De là il suit que la série $\sum f_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) est convergente lorsque x est à l'intérieur de A , mais on ne voit pas encore si cette convergence est uniforme. Pour ce but je représente par k la distance moindre d'un point intérieur x_0 au contour S et je considère l'entourage de ce point donné par l'inégalité $|x - x_0| \leq \rho$, ρ étant une constante positive moindre que k . La distance de tous les points de cet entourage aux points z du contour S étant inférieure à $k - \rho$, on aura $|z - x| < k - \rho$ et par conséquent

$$\int_S \frac{ds}{|z - x|} < \frac{S}{k - \rho},$$

en convenant de représenter par S la longueur de la périphérie S .

Ainsi lorsque x appartient à l'entourage du point x_0 la somme $\sum f_n(x)$, ($n = m, m+1, \dots, m+p$) sera inférieure à une constante $\frac{\epsilon S}{2\pi(k-p)}$, d'où il suit que notre série converge *uniformément* dans les environs de tous les points intérieurs de l'aire A.

On voit de même que l'on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_S \frac{F(z) dz}{z-x},$$

en posant, sur le contour S ,

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z),$$

d'où l'on tire aisément que nous avons dans l'entourage considéré du point x_0

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m (x-x_0)^m, \quad C_m = \frac{1}{2\pi i} \int_S \frac{F(z) dz}{(z-x_0)^{m+1}},$$

ce qui prouve que notre série représente une fonction analytique. La quantité C_m est évidemment égale à la série

$$C_m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_S \frac{f_n(z) dz}{(z-x_0)^{m+1}}$$

identique avec la suivante

$$C_m = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_n^{(m)}(x_0)}{m!},$$

ce qui démontre qu'aussi les séries dérivées sont convergentes et ont des sommes égales à des dérivées de la somme primitive, ce qui est le résultat auquel nous voulions parvenir.

C'est précisément le théorème de M. Weierstrass modifié pour une aire quelconque. Car l'illustre géomètre considère une somme de termes de la forme

$$f_n(x) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v x^v,$$

l'aire A étant ici un cercle $|x| \leq R$, et suppose que la somme $f_n(x)$ soit uniformément convergente pour tous les points de la circonférence $|x| = R$; dans ce cas nous aurons évidemment, en prenant dans notre résultat $x_0 = 0$, $\rho < R$, $|x| \leq \rho$, l'équation

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m x^m, \quad C_m = \sum_{n=0}^{\infty} a_{nm}.$$

On peut désirer une généralisation qui aurait plus d'analogie *formale* avec le théorème de l'illustre géomètre, en étudiant une catégorie spéciale des développements

$$f_n(x) = \sum_{v=0}^{\infty} a_{nv} \varphi_v(x)$$

et en se proposant la question relative à des conditions à remplir pourqu'on ait

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{v=0}^{\infty} C_v \varphi_v(x), \quad C_v = \sum_{n=0}^{\infty} a_{nv}.$$

Cette circonstance se vérifie toutes les fois que les fonctions $\varphi_v(x)$ soient entières et que l'on ait $\lim_{v=\infty} \varphi_v(x) \cdot x^{-m_v} = K$, cette

quantité-ci étant constante, mais on n'a pas aucun théorème général sur ce sujet.

J'ai essayé de résoudre cette question sous des conditions qui sont souvent remplies.

Je suppose que les fonctions $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$, ... sont synectiques et uniformes dans l'aire A et telles qu'il leur corresponde une suite de fonctions $\psi(z)$, $\psi_1(z)$, $\psi_2(z)$, définies sur la ligne S pour lesquelles l'intégrale

$$\frac{1}{2\pi i} \int_S \varphi_m(z) \psi_n(z)$$

prise le long du contour S est zéro en général, mais égale à l'unité lorsque $m=n$.

On suppose de plus qu'en représentant par ψ_v le module maximum de $\psi_v(z)$ sur le contour S, la série $\sum \psi_v \varphi_v(x)$ soit absolument convergente.

À l'aide de ces hypothèses on établit cette proposition analogue à celle de Cauchy qu'en représentant par g le module maximum sur le contour S de la somme

$$f(z) = \sum_{v=0}^{\infty} C_v \varphi_v(z)$$

supposée uniformément convergente sur le contour S, on a l'inégalité

$$|C_v| < \frac{S}{2\pi} g \psi_v$$

Considérons maintenant une série de la forme

$$V(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x), \text{ où } f_n(x) = \sum_{v=0}^{\infty} a_{nv} \varphi_v(x),$$

toutes les séries $V(x)$ et $f_n(x)$ étant supposées uniformément convergentes sur le contour S . Nous allons établir 1°) que $V(x)$ converge aussi à l'intérieur de A et 2°) que l'on a $V(x) = \sum_{v=0}^{\infty} \varphi_v(x) \sum_{n=m}^{m+p} a_{nv}$.

On tire d'abord de la convergence uniforme $V(z)$ l'inégalité

$$\left| \sum_{n=m}^{m+p} f_n(z) \right| < \varepsilon \text{ ou bien } \left| \sum_{v=0}^{\infty} \varphi_v(z) \sum_{n=m}^{m+p} a_{nv} \right| < \varepsilon, \quad (z \text{ est sur la ligne } S),$$

qui a lieu pour une quantité ε donnée d'avance, lorsque l'entier m surpassé une certaine limite. En employant le théorème (1) on en déduit

$$(a) \quad \left| \sum_{n=m}^{m+p} a_{nv} \right| < \frac{S}{2\pi} \varepsilon \psi_v$$

ce qui prouve que les séries $\sum_{n=0}^{\infty} a_{nv} = A_v$ sont convergentes, et que leurs restes satisfont à l'inégalité

$$(3) \quad \left| \sum_{n=m}^{\infty} a_{nv} \right| \leq \frac{S}{2\pi} \varepsilon \psi_v.$$

La première partie du théorème se vérifie aisément à l'aide de l'inégalité (a). Car soit x un point intérieur de l'aire A , et observons que l'identité

$$\sum_{n=m}^{m+p} f_n(x) = \sum_{v=0}^{\infty} \varphi_v(x) \sum_{n=m}^{m+p} a_{nv}$$

combinée avec l'inégalité (a) donne

$$\left| \sum_{n=m}^{m+p} f_n(x) \right| < \frac{S\varepsilon}{2\pi} \sum_{v=0}^{\infty} |\varphi_v(x)| \psi_v;$$

or ε étant infiniment petit pour m infini, on voit que la série $\sum f_n(x)$ doit être convergente, ce qui prouve la première proposition. Il faut encore établir la convergence de la série $\sum A_v \varphi_v(x)$ et montrer qu'elle est égale à $V(x)$. Décomposons à cet effet la série A_v , comme il suit:

$$A_v = A_v' + A_v'', \quad A_v' = \sum_{n=0}^{m-1} a_{nv}, \quad A_v'' = \sum_{n=m}^{\infty} a_{nv},$$

il est clair que l'on a

$$\sum_{n=0}^{m-1} f_n(x) = \sum_{v=0}^{\infty} A_v' \varphi_v(x), \quad |A_v''| \leq \frac{S}{2\pi} \varepsilon \psi_v;$$

la dernière inégalité prouve que la série

$$\sum_{v=0}^{\infty} |A_v \varphi_v(x)| \leq \frac{S}{2\pi} \varepsilon \sum_{v=0}^{\infty} |\psi_v \varphi_v(x)|$$

et par conséquent aussi la série $\sum A_v'' \varphi_v(x)$ est convergente et devient infiniment petite avec ε . Puisque

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) - \sum_{v=0}^{\infty} A_v \varphi_v(x) = \sum_{n=m}^{\infty} f_n(x) - \sum_{v=0}^{\infty} A_v'' \varphi_v(x)$$

et que les deux sommes deviennent infiniment petites pour m infini, il est claire que cette différence est rigoureusement zéro.

Dans le théorème démontré plus haut on n'a pas fait voir quel est le caractère de convergence de la série $\sum f_n(x)$ lorsque x s'approche indéfiniment du contour S . Cette question exige un moyen un peu moins élémentaire, à savoir le théorème que les valeurs de la partie réelle (imaginaire) de $f_n(x)$, pour les points intérieurs de A , sont contenues entre deux valeurs réelles (ima-

ginaires) de $f_n(z)$ sur le contour S. M. Jules Riemann en a conclut que la partie réelle ainsi que la partie imaginaire du corps de termes éloignés

$$\sum_{n=m}^{m+p} f_n(x) = \sum_{n=m}^{m+p} U_n + i \sum_{n=m}^{m+p} V_n$$

sera contenue entre deux limites indépendantes de x et de p , qui seront infiniment petites pour m infiniment croissant. En d'autres termes, on a cette proposition beaucoup plus précise (mais superflue pour quelques buts), que la convergence de notre série $\Sigma f_n(x)$ sera uniforme dans toute l'aire A.



EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. D'OCAGNE À M. E. LEMOINE

«... Il n'est pas sans intérêt de remarquer que votre équation (2) (*Journal de M. Teixeira*, vol. xi, pag. 70), à laquelle, ainsi que vous l'avez fait voir, peut se ramener l'équation (1), et que vous traitez par une méthode si simple, est un cas particulier de l'équation

$$x^2 - Ky^2 = z^n$$

dont j'ai fait connaître la résolution en nombres entiers dans les *Comptes rendus de l'Académie des Sciences* de 1884 (T. 99, pag. 1112). En faisant $K = 2$ et $z = 1$ dans mes formules, on retombe bien sur les vôtres.

C'est d'ailleurs aussi, au moyen des suites récurrentes, que j'ai traité le problème ainsi généralisé, et, à ce propos, je vous demanderai encore la permission de vous faire observer que j'ai, par une marche directe, obtenu la formule générale (K') qui termine votre note et qui donne la solution de l'équation aux différences finies

$$U_n = ?U_{n-2} + mU_{n-1}.$$

Cette formule (écrite avec d'autres notations) résulte, en effet, du simple rapprochement des formules (8) et (12) de ma *Théorie élémentaire des séries récurrentes* (*Nouvelles Annales de Mathématiques*, 1884, pag. 69 et 71).

Dans un grand Mémoire sur les suites récurrentes achevé depuis quelque temps et qui paraîtra dans le 64^e cahier du *Journal de l'Ecole Polytechnique*, j'étends ma méthode aux équations aux différences finies analogues à la précédente, mais d'ordre quelconque...».



N. J. LOBATCHEFFSKY

Em outubro de 1893 tem logar o centenario do nascimento do eminent geometra russo Lobatcheffsky, o primeiro que demonstrou que o postulado de Euclides relativo á theoria das rectas parallelas não pôde ser deduzido como corollario mathematico dos outros postulados e das definições e axiomas da Geometria elementar, e que a admissão d'este postulado equivale á admissão de certas propriedades do nosso espaço que só podem ser verificadas pela observação e pela experientia. N'uma serie de memorias que escreveu a respeito d'este assumpto, fundou mesmo uma geometria, independente do postulado das parallelas, não applicavel ao nosso espaço.

Para celebrar o centenario d'este sabio resolveu a Sociedade physico-mathematica da Universidade de Kasan, em que elle foi professor desde 1812 até 1846 e reitor desde 1827 até 1846, abrir uma subscripção com o louvavel fim de fundar um premio em sua honra e de lhe levantar um busto no edificio da Universidade. Uma circular vem de ser dirigida aos geometras convidando-os a associar-se a esta manifestação justa. Assignam esta circular o sr. Wassilieff, presidente da Sociedade physico mathematica de Kasan, o sr. Souvoroff, vice-presidente da mesma Sociedade e os professores de mathematica na Universidade de Kasan.

DEFINIÇÃO ANALYTICA DOS NUMEROS COMPLEXOS

POR

J. BRUNO DE CABEDO

(Professor na Universidade de Coimbra)

1. Com $a, b, \dots, a', b', \dots$ significamos numeros positivos ou negativos.

Posto isto, chamaremos numero complexo a todo o symbolo da fórmula $a \sim b_*$ (*) sujeito ás definições seguintes :

2. Diz-se que $a \sim b_* = a' \sim b'_*$, quando fôr $a = a', b = b'$.

Diz-se que $a \sim b_* = a'$, quando fôr $a = a', b = 0$.

Para simplificar, com o symbolo b_* representaremos o numero complexo $0 \sim b_*$.

3. Chama-se adição dos numeros complexos $a \sim b_*$ e $a' \sim b'_*$ á operação definida pela egualdade

$$(a \sim b_*) + (a' \sim b'_*) = (a + a') \sim (b + b')_*$$

Como $a = a \sim 0_*$ e $b_* = 0 \sim b_*$, resulta da precedente definição

$$a + b_* = (a \sim 0_*) + (0 \sim b_*) = a \sim b_*$$

(*) Symbolos que não differem essencialmente de $a \sim b_*$ são usados nas mais rudimentares applicações da arithmeticá, quando se pede a descrição quantitativa e qualitativa de um todo composto de elementos de duas espécies diferentes.

Logo todo o numero complexo $a - b_*$ pôde pôr-se debaixo da fórmula $a + b_*$

4. Chama-se multiplicação dos numeros $a + b_*$ e $a' + b'_*$ à operação definida pela igualdade

$$(a + b_*) (a' + b'_*) = (aa' - bb') + (ab' + ba')_*$$

D'esta definição resulta $b \cdot 1_* = (b + 0_*) (0 + 1_*) = b_*$.

Logo todo o numero complexo pôde pôr-se debaixo da fórmula $a + b \cdot 1_*$.

Quanto ao numero 1_* , mostra a mesma definição que é

$$1_* \cdot 1_* = (0 + 1_*) (0 + 1_*) = -1.$$

5. Com estes principios a exposição completa da teoria dos numeros complexos não apresenta a menor dificuldade.



BIBLIOGRAPHIA

A. Faifofer. — Elementi di Geometria, 8.^a ed., (Venezia, 1891).

Entre os livros que têm sido publicados para substituir nas escholas a obra immortal de Euclides, um dos melhores que conhecemos é o que, com o titulo precedente, foi publicado em Italia pelo sr. Faifofer, professor no Lyceu Marco Foscarini de Veneza. Por suas boas qualidades mereceu esta obra elogios de alguns geometras illustres, como Beltrami, Mansion, etc., e obteve um successo tal entre os professores italianos que onze edições d'ella foram até hoje publicadas. Está na verdade escrito com um cuidado tal que é um verdadeiro modelo a seguir em obras d'esta natureza.

As doutrinas que se encontram nos *Elementi* do sr. Faifofer são aquellas que ordinariamente contêm os manuaes de Geometria elementar destinados ao ensino, e estão dispostas em vinte e quatro capitulos, sendo um destinado ás noções fundamentaes, quatorze á Geometria plana e os restantes á Geometria no espaço.

Dos capitulos que pelo modo original como estão scriptos, merecem mais attenção, mencionarei em primeiro lugar o capitulo primeiro, onde o auctor tracta de enumerar e fixar com o maior cuidado quaes os principios que a sciencia geometrica vae buscar á observação exterior. N'elle o sr. Faifofer substitue muitas definições ininteligiveis, que appareciam nos anteriores manuaes de geometria elementar, por postulados claramente explicados.

Merece tambem attenção o modo simples como é tractada a theoria da equivalencia. O auctor chama equivalentes duas superficies que se possam dividir no mesmo numero de partes respectivamente eguaes. Partindo d'esta definição, mais compre-

hensivel do que a dada nos manuaes anteriormente publicados, tracta com a maior clareza da equivalencia dos polygonos. Para abranger as superficies terminadas por linhas curvas é esta definição extendida no capitulo intitulado *ciclometria*.

N'este capitulo, um dos melhores da obra, o auctor collocando-se primeiramente n'un ponto de vista geral, introduz a noção de *classe* de grandezas (grupo de grandezas que satisfazem a uma determinada condição) e de *classes contiguas* (duas classes tales que cada grandeza de uma das classes seja maior do que todas as grandezas da outra classe, e tales que se possam achar duas grandezas, uma de cada classe, cuja diferença seja menor do que uma grandeza da mesma especie dada qualquer) e estuda as propriedades d'estas classes de grandezas. Em seguida, baseando-se n'estas propriedades, demonstra a proposição fundamental segundo a qual, dado um circulo, existe um segmento e um só que tem a propriedade de ser menor do que o perimetro de qualquer polygono circumscreto e maior do que o perimetro de qualquer polygono inscrito. É este segmento que por definição considera como equivalente ao circulo e cuja determinação constitue o problema da rectificação da circumferencia.

Depois de resolver este problema, passa á resolução do problema da quadratura approximada do circulo. N'este lugar, fazendo a extensão da noção de equivalencia a que já nos referimos, considera como equivalentes duas superficies que estejam comprehendidas entre duas mesmas classes contiguas, e mostra que a superficie do circulo é equivalente a um triangulo de base equivalente á circumferencia e de altura igual ao raio.

A falta de espaço não nos permite indicar mais pontos da Geometria do sr. Faifofer que merecem attenção. Terminaremos pois esta noticia dizendo que as modificações introduzidas pelo sr. Faifofer na exposição da Geometria elementar têm sido adoptadas na maior parte dos livros italianos posteriormente publicados e recommendando a sua excellente obra aos professores dos Lyceus portuguezes.

Humbert. — Traité d'Arithmétique, (Paris, Nony, 1893).

Diz o sr. Tannery, no prefacio d'este livro, referindo-se a elle:

il a été pensé avant d'avoir été écrit. Estas palavras, completamente justas, dão testemunho do cuidado com que está escripto o livro.

Os pontos de Arithmetica cuja exposição é mais difícil, como a introducção da noção de fração e a theoria dos numeros irrationaes, são n'esta obra excellente tractados com a maior clareza e da maneira mais propria para serem comprehendidos pelos alumnos. O auctor, vendo quanto é inconveniente para os alumnos uma exposição demasiadamente abstracta d'estes assuntos, introduz, com a noção de numero fraccionario e de numero irracional, a representação d'estes numeros por segmentos de recta, e explica as operaçoes sobre estes numeros pelas operaçoes sobre as rectas que os representam.

A obra é dividida em seis partes, em que são estudadas, além das doutrinas que habitualmente são consideradas em livros d'esta natureza, a theoria das quantidades negativas, os principios da theoria das congruencias binomias, etc.

Terminando diremos que o Tratado de Arithmetica do sr. Lambert é um livro excellente, com a publicação do qual este sabio geometra prestou um grande serviço aos alumnos, que têm n'elle um bom guia para o seu estudo, e aos professores que têm n'elle um bom modelo para o seu ensino.

P. Painlevé. — *Mémoire sur les équations différentielles du premier ordre*, (Paris, G. Villars, 1892).

A theoria geral da integração das equações diferenciaes de primeira ordem tem sido objecto da parte do sr. Painlevé de trabalhos importantes. Na presente memoria, que mereceu a alta honra de ser premiada pela Academia das sciencias de Paris, estudou este eminent geomетra a equação completa $F(x, y, y')=0$ para procurar o que acontece a cada integral particular d'esta equação quando se faz variar x de uma maneira qualquer no plano onde esta variavel se representa, tendo em attenção os pontos criticos do integral, isto é os pontos em que alguns valores de y se permутam. Partindo dos trabalhos dos srs. Fuchs e Poincaré a respeito dos integraes que só têm pontos criticos fixos (isto é que não variam com as constantes arbitrárias da

integração) e generalisando estes ultimos, estuda os integraes que têm *pontos criticos moveis*, no caso em que, x variando sem descrever curvas fechadas que contenham os pontos criticos fixos, z adquire um numero limitado de valores em cada ponto x , e determina as condições para que esta circunstancia se dê. Para tractar esta questão difícil faz o auctor, em dois capítulos preliminares, um estudo profundo de algumas propriedades caraterísticas das equações diferenciaes de primeira ordem e das propriedades das transformações racionaes das curvas algebricas.

Ch. J. de la Vallée Poussin. — *Étude des intégrales à limites infinies, etc.* (*Annales de la Société scientifique de Bruxelles*, t. **xvi**).

— *Recherches sur la convergence des intégrales définies* (*Journal de math. pures et ap.*, 1892).

Na primeira d'estas bellas e importantes memorias o auctor, considerando os integraes com limites infinitos das funções continuas, dá regras precisas para a diferenciação e integração das funções definidas por estes integraes. Para esse fim introduz a noção de convergência uniforme dos integraes definidos (considerando como *uniformemente convergente* no intervallo de $\alpha = a$ a $\alpha = b$ o integral $\int_p^\infty f(x, \alpha) dx$ quando a todo o numero positivo ε corresponde um numero n' tal que seja

$$\left| \int_p^\infty f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$$

para todo o valor de α no intervallo considerado e todo o valor de n superior a n') e dá methodos para reconhecer se qualquer integral dado é uniformemente convergente. Dos principios expostos faz applicação aos integraes mais importantes que têm sido considerados pelos geometras.

Na segunda memoria considera o illustre geometra belga os integraes das funções descontinuas em um numero finito ou infinito de pontos. Faz primeiramente um estudo profundo das

condições de convergencia tanto dos integraes simples como dos integraes duplos e estuda em seguida ás condições em que é possivel inverter a ordem das integrações.

P. Pizzetti. — I fondamenti matematici per la critica dei risultati sperimentalni (Atti della R. Università di Genova, 1892).

N'este excellente trabalho estuda o sr. Pizzetti, debaixo do ponto de vista theorico, o problema que tem por objecto combinar do modo mais vantajoso as observações e assignar a precisão de um resultado experimental. N'este estudo não se occupa, como elle mesmo diz, das particularidades de interesse puramente practico do problema, mas sómente da sua parte fundamental e phylosophica. A exposição da theoria a que o trabalho é consagrado é acompanhada de uma critica profunda dos trabalhos mais importantes dos geometras a este respeito e de muitas informações historicas relativas a cada ponto considerado.

Revue semestrielle des publications mathématiques, Amsterdam, Versluyss.

Com o fim de fazer conhecer sem demora importante o titulo e um resumo do assumpto das memorias mathematicas publicadas nos principaes jornaes scientificos, vem a Sociedade mathematica de Amsterdam de fundar uma revista, com o titulo precedente, confiando a sua direcção aos illustres professores Schoutte, Korteweg, Kapteyn, Kluyver e Zeeman. Em janeiro e julho de cada anno será publicado um fasciculo d'esta revista, contendo o fasciculo de janeiro a analyse dos trabalhos publicados desde 1 de março até 1 de outubro do anno precedente e o fasciculo de outubro a analyse dos trabalhos publicados desde 1 de outubro do anno precedente até 1 de março do anno corrente.

Com esta publicação presta a Sociedade mathematica de Amsterdam um serviço relevante aos geometras dando-lhes sem

demora conhecimento do que se vae publicando sobre sciencias mathematics.

G. Fontené. — L'hyperespace a n—1 dimensions, Paris, Gauthier-Villars, 1892.

Em geometria não euclideana as propriedades metricas estão ligadas á quadrica directriz de uma correspondencia por polares reciprocas. Na presente Memoria o sr. Fontené, collocando-se n'um ponto de vista mais geral, considera, em logar d'esta correspondencia por polares reciprocas, uma correlação metrica geral e estuda as propriedades metricas do espaço assim constituido.

A. Macfarlane. — Principles of the Algebra of Physics, (Salem, 1891).

— *The imaginary of Algebra, (Salem, 1892).*

Referem-se estes opusculos á extensão ao espaço da theoria das quantidades geometricas. N'elles o auctor, professor na Universidade de Texas, lança os fundamentos de uma algebra mais geral do que a ordinaria, que unifica o methodo de Hamilton e o methodo de Grassmann. Encontram-se ainda n'estes opusculos muitas indicações historicas e interessantes observações criticas a respeito do assumpto considerado.

S. Pincherle. — Analisi algebrica, Milano, Hoepli, 1893.

O presente manual de Analyse algebrica faz parte de uma collecção de manuaes que com o nome de *Manuali Hoepli* está sendo publicada em Milão. É um pequeno livro em que o sr. Pincherle conseguiu reunir a parte mais essencial da Analyse algebrica, sem que da concisão, a que foi obrigado pelo espaço

a que tinha de se limitar, resulte falta de clareza ou omissão de alguma consideração necessaria para o rigor das demonstrações e regular encadeamento dos assumptos.

Eis o objecto de cada um dos doze capitulos d'esta obra excellente :

I. Numeros inteiros. II. Numeros reaes. III. Numeros complexos. IV: Limites. V. Raizes. VI. Calculo combinatorio. VII. Applicações do calculo combinatorio (desenvolvimento do binomio, potencias similhantes dos numeros naturaes, probabilidades). VIII. Series. IX. Productos infinitos. X. Fracções continuas. XI. Series de potencias. XII. Funcção expornencial. Funcções circulares.

C. A. Laisant. — Recueil de problèmes de Mathématiques, Paris, Gauthier-Villars.

Mais dois volumes de obra util, a que nos referimos na pagina 83 do t. xi d'este *Jornal*, vêm de ser publicados.

O primeiro é dedicado á Geometria analytica a tres dimensões e á Geometria superior, e ahi são successivamente considerados problemas relativos a figuras rectilineas, a figuras esfericas, a curvas e superficies de segunda ordem, aos logares geometricos de pontos, aos logares geometricos de rectas, ás superficies envolventes, ás curvas e superficies algebricas e ás curvas e superficies em geral.

O outro volume é dedicado a Arithmetica, Algebra elementar e Trigonometria, e ahi são considerados os problemas relativos á parte d'estas sciencias que em Portugal é estudada nos Lyceus, reservando o auctor para volumes seguintes os problemas que exigem maiores conhecimentos.

Annuaire pour l'an 1893, publié par le Bureau des Longitudes, (Paris, Gauthier-Villars).

Além das informações praticas que é uso conter esta util

publicação, o *Annuaire du Bureau des Longitudes* para 1893 contem artigos sobre moedas, statistica, geographia, etc., e as noticias scientificas seguintes: *Sobre o Observatorio do Monte Branco*, por Jansen. *Sobre a correlação dos phenomenos de electricidade estatica e dynamica e a definição das unidades electricas*, por Cornu. *Discurso sobre Aeronautica*, por Janssen. *Discurso pronunciado nos funeraes de O. Bonnet*, por Tisserand, etc.

E. Lampe. — Die Entwicklung der Mathematik im Zusammenhange mit der Ausbreitung der Kultur, (Berlim, 1895).

Contem este opusculo um interessante discurso pronunciado na Real Eschola technica superior de Berlim pelo illustre Director d'esta Eschola o sr. E. Lampe, no dia 26 de janeiro de 1893, a respeito do desenvolvimento adquirido pelas sciencias matematicas na actualidade. Nota-se n'este discurso uma noticia desenvolvida sobre as publicações periodicas que têm sido fundadas nos diversos paizes para o estudo especial das sciencias matematicas.

Davide Besso. — Sopra un opuscolo di Michelangelo Ricci (Periodico di Matematica, etc., t. VIII).

Ricci nasceu em Roma em 1619 e morreu n'esta mesma cidade em 1682. O opusculo a que o sr. Besso se refere intitula-se: *Exercitatio geometrica de maximis et minimis.*

Merriman. — Final formulas for the algebraic solution of quartic equations (Bul. of the New York Math. Society, 1892).

A. Gützmer. — *Über gewisse partielle Differentialgleichungen höherer Ordnung, (Berlin, 1893).*

G. Pirondini. — *Intorno alle indicatrici sferiche delle linnee dello spazio (Rivista di Matematica, t. III).*

M. Lerch. — *Studie se oboru Malmstenovskych rad a invariantu forem kvadratickych (Mémoires de l'Académie de Prague, 1893).*

M. Lerch. — *Sur une intégrale d'Euler (Bulletin des sciences mathématiques, 1892).*

Demonstraçao simples da formula de Euler

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{1+x} = \frac{\pi}{\operatorname{sen} a \pi}.$$

Ch. Hermite. — *Sur la transformation des fonctions elliptiques (Mémoires de l'Académie de Prague, 1892).*

H. Burkhardt. — *Ueber einen fundamentalen Satz der Lehre von den endlichen Gruppen linearer Substitutionen (Mathematische Annalen, t. 41).*

G. Vivanti. — *Sull'uso della representatione geometrica nella teoria aritmetica dei numeri eomplessi* (*Rivista di Matematica*, t. II).


F. Giudice. — *Sulle equazioni algebriche* (*Rivista di Matematica*, t. II),

D. André. — *Sur le partage en quatre groupes des permutations des n premiers nombres* (*Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris*, 1893).

R. Guimarães. — *Sobre uma formula geometrica* (*Progreso matematico*, t. II).

Guccia. — *Due proposizioni relative alle involuzioni di specie qualunque dotate di singolarità ordinarie* (*Rend. del Circolo matematico di Palermo*, 1893).

G. T.



SUR LES SÉRIES DE FONCTIONS

PAR

S. PINCHERLE

(Professeur à l'Université de Bologne)

Je me propose, dans cette note, de montrer comment on peut passer d'une série de la forme

$$(1) \dots \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{x - a_n}$$

à une série de la forme

$$(2) \dots \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g_n}{(x - a_0)(x - a_1) \dots (x - a_n)}.$$

Je suppose que pour toutes les valeurs de x qui ne coïncident avec aucun des points $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ la série

$$(3) \dots S(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{t^{n+1}(x - a_n)}$$

soit convergente pour toutes les valeurs de t telles que l'on ait

$|t| > \alpha$, α étant un nombre positif fini. Si

$$\varphi(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n$$

est une série de puissances convergente dans un cercle de rayon α' supérieur à α , on aura, en désignant par (ρ) une circonférence de centre $t=0$ et de rayon compris entre α' et α :

$$(4) \dots \dots \frac{1}{2\pi i} \int_{(\rho)} S(t, x) \varphi(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{x-a_n}.$$

Réciproquement, toute série (1) telle que $\sum c_n t^n$ soit convergente dans un cercle de rayon supérieur à α peut s'exprimer par une intégrale définie de la forme du premier membre de (4).

Posons maintenant

$$p_n(x) = (x - a_0)(x - a_1) \dots (x - a_n),$$

et considérons les polynômes en t

$$q_n(t) = \frac{1}{p'_n(a_0)} + \frac{t}{p'_n(a_1)} + \frac{t^2}{p'_n(a_2)} + \dots + \frac{t^n}{p'_n(a^n)},$$

où $p'_n(x)$ est la dérivée de $p_n(x)$.

On a immédiatement

$$(5) \dots \dots \frac{1}{2\pi i} \int_{(\rho)} S(t, x) q_n(t) dt = \frac{1}{p_n(x)},$$

d'après la formule de décomposition d'une fraction rationnelle en ses fractions simples.

Or, je dis que toute série de puissances $\varphi(t)$ peut, au moins formellement, se développer en une série de la forme

$$\sum_{n=0}^{\infty} g_n q_n(t).$$

En effet, en multipliant $q_0 = 1, q_1(t), q_2(t), \dots, q_n(t)$ respectivement par $1, p_0(a_n), p_1(a_n), \dots, p_{n-1}(a_n)$ et en sommant, on obtient

$$1 + p_0(a_n) q_1(t) + p_1(a_n) q_2(t) + \dots + p_{n-1}(a_n) q_n(t) =$$

$$= \sum_{k=0}^n t^k \left(\frac{p_{k-1}(a_n)}{p'_k a_k} + \frac{p_k(a_n)}{p'_{k+1}(a_k)} + \dots + \frac{p_{n-1}(a_n)}{p'_n a_k} \right);$$

or le coefficient de t^k , pour $k < n$, en dehors du facteur

$$\frac{(a_n - a_0)(a_n - a_1) \dots (a_n - a_{k-1})}{(a_k - a_0)(a_k - a_1) \dots (a_k - a_{k-1})}$$

commun à tous ses termes, est égal à

$$1 + \frac{a_n - a_k}{a_k - a_{k+1}} + \frac{(a_n - a_k)(a_n - a_{k+1})}{(a_k - a_{k+1})(a_k - a_{k+2})} + \dots +$$

$$+ \frac{(a_n - a_k)(a_n - a_{k+1}) \dots (a_n - a_{n-1})}{(a_k - a_{k+1})(a_k - a_{k+2}) \dots (a_k - a_n)},$$

lequel, par une formule connue dans la théorie des fonctions in-

..

terpolaires, est identiquement nul. Pour $k=1$ au contraire, le coefficient est égal à l'unité. On obtient ainsi

$$(6) \quad t^n = 1 + p_0(a_n) q_1(t) + p_1(a_n) q_2(t) + \dots + p_{n-1}(a_n) q_n(t)$$

qui permet d'obtenir le développement *formel* de $\varphi(t)$ en une série de fonctions $q_n(t)$. Si l'on a

$$\sum c_n t^n = \sum g_n q_n(t),$$

les coefficients g_n sont donnés par

$$(7) \quad g_n = c_n p_{n-1}(a_n) + c_{n+1} p_{n-1}(a_{n+1}) + \dots + c_{n+r} p_{n-1}(a_{n+r}) + \dots$$

Quant à la convergence de ce développement, elle dépend d'abord du système $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$; ensuite, pour un système donné, du rayon de converge de la série de puissances $\varphi(t)$. Supposons que ce développement converge uniformément le long de toute la circonférence qui a été précédemment indiquée par (ρ) ; on aura

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{(\rho)} S(t, x) \varphi(t) dt = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} g_n \int_{(\rho)} S(t, x) q_n(t) dt,$$

d'où, par la formule (5),

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{(\rho)} S(t, x) \varphi(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g_n}{p_n(x)}.$$

En rappelant la formule (4), on conclut enfin

$$(8) \dots \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{x-a_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g_n}{(x-a_0)(x-a_1)\dots(x-a_n)},$$

où les coefficients g_n sont exprimés par la formule (7) en fonction des c_n . C'est là la formule qu'il s'agissait d'établir.

La question inverse, où étant donnée une série de la forme (2), on veut la transformer en une série (1), ou bien, ce qui revient au même, la résolution du système infini d'équations linéaires (7) par rapport aux inconnues c_n , est beaucoup plus facile. On a, en effet,

$$\begin{aligned} \frac{1}{p_n(x)} &= \frac{1}{p'_n(a_0)(x-a_0)} + \frac{1}{p'_n(a_1)(x-a_1)} + \dots + \\ &+ \frac{1}{p'_n(a_n)(x-a_n)}, \end{aligned}$$

d'où, formellement,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{g_n}{p_n(x)} = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{c_v}{x-a_v},$$

où

$$(9) \dots c_v = \frac{g_v}{p'_v(a_v)} + \frac{g_{v+1}}{p'_{v+1}(a_v)} + \dots + \frac{g_{v+\mu}}{p'_{v+\mu}(a_v)} + \dots,$$

Ce qui résout le problème. Il est facile aussi de donner une condition sous laquelle cette résolution *formelle* est en même temps

effective. En supposant

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty,$$

et que pour toutes valeurs de r, s on ait un nombre positif d tel que

$$|a_r - a_s| > d;$$

enfin, en supposant que la série $\sum g_n t^n$ soit convergente dans un cercle de rayon non nul, d'où suit l'existence de deux nombres positifs M et α tels que

$$|g_n| < M\alpha^n,$$

on aura pour $\alpha < d$

$$|c_v| < \frac{M\alpha^v}{d^{v-1}(d-\alpha)},$$

et sous la même condition, la série $\sum \frac{c_v}{x-a_v}$ est convergente absolument et uniformément pour toutes les valeurs de x , les a_n exclus.

APPLICATION. Pour faire une application de ce qui précède, supposons $a_n = n$. On a alors

$$p_n(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-n)$$

et

$$q_n(t) = \frac{(-1)^n (1-t)^n}{n!},$$

le développement de $\varphi(t)$ en série de $q_n(t)$ n'est donc autre chose que le développement en série de Maclaurin, et l'on a

$$(10) \dots \dots \dots \varphi(t) = \sum g_n \frac{(t-1)^n}{n!},$$

où $g_n = \varphi(1)$. La formule (8) est applicable pourvu que le développement (1) soit convergent dans un cercle de centre $t=1$ et de rayon plus grand que 2, et sous cette condition on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!} \frac{1}{(x-n)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi^{(n)}(1)}{x(x-1)(x-2)\dots(x-n)},$$

que j'ai déjà donnée sous une forme un peu différente dans les *Rendiconti del Circolo matematico di Palermo*, t. II, décembre, 1888.



SOBRE A ADDIÇÃO E AS DIFFERENCIAES
NAS FUNÇÕES ELLIPTICAS

POR

J. PEDRO TEIXEIRA

I

A primeira das funcções duplamente periodicas,

$$(1) \quad \varphi_1(x-z) = \frac{dn(x-z)}{sn(x-z)cn(x-z)},$$

$$(2) \quad \varphi_2(x-z) = \frac{cn(x-z)dn(x-z)}{sn(x-z)},$$

tem os polos principaes x e $x + \omega$, com os residuos -1 e $+1$; e a segunda, os polos principaes x e $x + i\omega'$, com aquelles mesmos residuos.

As propriedades das funcções ellipticas, relativas á adição dos semiperiodos, mostram que as funcções consideradas satisfazem ás relações

$$(3) \quad \varphi_1(x - i\omega') = - \frac{k^2}{\varphi_1(x)} = - \frac{k^2 snx cnx}{dnx},$$

$$(4) \quad \varphi_2(x - i\omega') = - \varphi_2(x) = - \frac{cnx dnx}{snx},$$

que havemos de utilizar no que vae seguir-se.

Como a função

$$\operatorname{sn} z \operatorname{sn} (z + a),$$

é tambem duplamente periodica e tem os infinitos principaes $i\omega'$, $i\omega' - a$, com os residuos $\frac{1}{k'sn a}$, $-\frac{1}{k'sn a}$, o theorema de Liouville applicado aos productos

$$\operatorname{sn} z \operatorname{sn} (z + x) \varphi_1 (x - z),$$

$$\operatorname{sn} z \operatorname{sn} (z + x) \varphi_2 (x - z),$$

dá

$$(5) \quad \dots \begin{cases} \operatorname{sn} (x + \omega) \operatorname{sn} (x + a + \omega) - \operatorname{sn} x \operatorname{sn} (x + a) \\ + \frac{1}{k'sn a} [\varphi_1 (x - i\omega') - \varphi_1 (x + a - i\omega')] = 0, \end{cases}$$

$$(6) \quad \dots \begin{cases} \operatorname{sn} (x + \omega') \operatorname{sn} (x + a + i\omega') - \operatorname{sn} x \operatorname{sn} (x + a) \\ + \frac{1}{k'sn a} [\varphi_2 (x - i\omega') - \varphi_2 (x + a - i\omega')] = 0. \end{cases}$$

Tendo em vista as relações (3) e (4) e as propriedades das funções ellipticas, a que já nos referimos, estas equações dão :

$$(5') \quad \dots \begin{cases} \frac{\operatorname{cn} x \operatorname{cn} (x + a)}{\operatorname{dn} x \operatorname{dn} (x + a)} - \operatorname{sn} x \operatorname{sn} (x + a) \\ = \frac{1}{\operatorname{sn} a} \left[\frac{\operatorname{sn} (x + a) \operatorname{cn} (x + a)}{\operatorname{dn} (x + a)} - \frac{\operatorname{sn} x \operatorname{cn} x}{\operatorname{dn} x} \right], \end{cases}$$

$$(6') \dots \begin{cases} \frac{1}{k^2 \operatorname{sn} x \operatorname{sn}(x+a)} - \operatorname{sn} x \operatorname{sn}(x+a) \\ = \frac{1}{k^2 \operatorname{sn} a} \left[\frac{\operatorname{cn} x \operatorname{dn} x}{\operatorname{sn} x} - \frac{\operatorname{cn}(x+a) \operatorname{dn}(x+a)}{\operatorname{sn}(x+a)} \right]. \end{cases}$$

É d'estas relações que tiramos os theoremas anunciados na epígraphe d'esta nota pela analyse que segue.

II

Multiplicando ambos os membros da segunda por $k^2 \operatorname{sn} a$, e attendendo a que as expressões

$$k^2 \operatorname{sn} x \operatorname{sn} a \operatorname{sn}(x+a), \quad \frac{\operatorname{cn}(x+a) \operatorname{dn}(x+a)}{\operatorname{sn}(x+a)},$$

são funcções simétricas de x e a , vem

$$\begin{aligned} & \frac{\operatorname{sn} a}{\operatorname{sn} x \operatorname{sn}(x+a)} - \frac{\operatorname{cn} x \operatorname{dn} x}{\operatorname{sn} x} \\ &= \frac{\operatorname{sn} x}{\operatorname{sn} a \operatorname{sn}(x+a)} - \frac{\operatorname{cn} a \operatorname{dn} a}{\operatorname{sn} a}, \end{aligned}$$

ou

$$(7) \dots \operatorname{sn}(x+a) = \frac{\operatorname{sn}^2 x - \operatorname{sn}^2 a}{\operatorname{sn} x \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a - \operatorname{sn} a \operatorname{cn} x \operatorname{dn} x},$$

que é a formula de adição relativa à função $\operatorname{sn} x$.

Se quizessemos passar para a formula ordinaria, bastaria multiplicar ambos os termos da fração antecedente pelo binomio

$$\operatorname{sn} x \operatorname{cn} a \operatorname{dn} a + \operatorname{sn} a \operatorname{cn} x \operatorname{dn} x.$$

As formulas de adição relativas ás outras funções são consequências da anterior e das relações elementares conhecidas; podiam, porém, estabelecer-se directamente por um processo análogo.

A equação (5'), por meio de considerações muito simples, dá o theorema de adição debaixo da fórmula

$$\operatorname{sn}(x+a) = \frac{\operatorname{sn}x \operatorname{cn}x \operatorname{dn}a + \operatorname{sn}a \operatorname{cn}a \operatorname{dn}x}{\operatorname{sn}x \operatorname{sn}a \operatorname{dn}x \operatorname{dn}a + \operatorname{cn}x \operatorname{cn}a}.$$

Fazendo n'esta equação $k=0$, resulta

$$\operatorname{sen}(x+a) = \frac{\operatorname{sen}x \cos x + \operatorname{sen}a \cos a}{\operatorname{sen}x \operatorname{sen}a + \cos x \cos a},$$

que é uma fórmula do theorema de adição da função angular seno.

III

Escrevendo os segundos membros das equações (5') e (6') sob as fórmulas

$$\frac{a}{\operatorname{sn}a} \cdot \frac{1}{a} \left[\frac{1}{\varphi_1(x+a)} - \frac{1}{\varphi_1(x)} \right],$$

$$-\frac{1}{k^2} \cdot \frac{a}{\operatorname{sn}a} \cdot \frac{1}{a} [\varphi_2(x+a) - \varphi_2(x)],$$

e attendendo a que

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{a}{\operatorname{sn}a} = 1,$$

temos :

$$(8) \dots \dots \dots d_x \frac{1}{\varphi_1(x)} = \frac{cn^2 x}{dn^2 x} - sn^2 x,$$

$$(9) \dots \dots \dots d_x \varphi_2^2(x) = k^2 sn^2 x - \frac{1}{sn^2 x}.$$

As equações (1) e (2) mostram que :

$$\frac{1}{\varphi_1(x)} \cdot \varphi_2(x) = cn^2 x,$$

e por isso

$$\varphi_2(x) d_x \frac{1}{\varphi_1(x)} + \frac{1}{\varphi_1(x)} d_x \varphi_2(x) = 2 cn x d_x cn x.$$

Substituindo n'esta equação os valores de $\frac{1}{\varphi_1(x)}$, $\varphi_2(x)$ e das suas derivadas, dados pelas equações (8) e (9), vem, depois d'un calculo simples :

$$d_x cn x = - sn x dn x.$$

As outras equações

$$d_x sn x = cn x dn x,$$

$$d_x dn x = - k^2 sn x cn x,$$

são consequencias d'aquelle e das relações fundamentaes conhecidas.

IV

As equações (5) e (6) dão theoremas de adição dos semiperíodos com respeito à função $\operatorname{sn}x \operatorname{sn}(x+a)$; porém, as considerações empregadas, para estabelecer aquellas equações, não são particulares áquella função, podendo empregar-se para obter theoremas do mesmo uso respeitantes a todas as funções duplamente periódicas, d'onde, por ventura, se poderão tirar theoremas geraes de adição. Assim, se $F(x)$ for duplamente periódica e tiver os polos principaes α_j ($j = 1, 2, \dots, m$), com os residuos respectivos A_j ($j = 1, 2, \dots, m$), obteremos muito facilmente:

$$(10) \quad \left\{ \begin{array}{l} F(x+\omega) = F(x) - \sum_1^m A_j \varphi_1(x-\alpha_j), \\ F(x+i\omega') = F(x) - \sum_1^m A_j \varphi_2(x-\alpha_j). \end{array} \right.$$

D'estas equações deduz-se o seguinte theorema, que poderá ter alguma importancia:

Duas funções duplamente periódicas são identicas quando tiverem os mesmos polos simples, com os mesmos residuos, e satisfezarem conjuntamente a alguma das relações:

$$(11) \quad f(x+\omega) = -f(x),$$

$$(12) \quad f(x+i\omega') = -f(x),$$

$$(13) \quad \left\{ \begin{array}{l} f(x+\omega) = \pm \frac{C}{f(x)}, \\ f(x+i\omega') = \pm \frac{C}{\overline{f(x)}}. \end{array} \right.$$

Nos nossos estudos sobre as funções ellipticas temos encon-

trado muitas funções ás quaes é applicavel esta proposição. Por exemplo: a função $\varphi_1(x)$, que n'esta nota empregamos como elemento simples de decomposição, e a função definida pela serie

$$\Sigma_n \frac{2i\pi}{\omega} e^{\frac{\pi ix}{\omega}} q_1^{2n} \left[e^{\frac{2\pi ix}{\omega}} - q_1^{4n} \right]^{-1},$$

onde $q_1 = e^{-\pi \frac{\omega}{\omega}}$, que satisfazem a (12).

Quando os polos forem multiplos, as equações (10) devem escrever-se d'este modo :

$$(10') \dots \begin{cases} F(x+\omega) = F(x) - \sum \left[A_0 \varphi_1(x-\omega) + A_1 d_{\omega} \varphi_1(x-\omega) + \dots + \right. \\ \left. + A_{p-1} d_{\omega}^{p-1} \varphi_1(x-\omega) \right] \\ F(x+i\omega') = F(x) - \sum \left[A_0 \varphi_2(x-\omega) + A_1 d_{\omega} \varphi_2(x-\omega) + \dots + \right. \\ \left. + A_{p-1} d_{\omega}^{p-1} \varphi_2(x-\omega) \right] \end{cases}$$

onde os sommatorios se devem estender a todos os polos ω e onde p designa o grau de multiplicidade d'este polo.

Como exemplo, tomemos a função $p(x)$ do sr. Weierstrass, a qual tem 0 como polo duplo. O seu desenvolvimento,

$$p(x) = \frac{1}{x^2} + a_2 x^2 + a_4 x^4 + \dots,$$

pelo theorema de Laurent, mostra que nas formulas (10') são :
 $A_0 = 0$, $A_1 = 1$, e por isso temos, attendendo a que

$$[d_{\omega} \varphi_1(x - \omega)]_{\omega=0} = -d_x \varphi_1(x),$$

$$[d_x \varphi_2(x - \omega)]_{\omega=0} = -d_x \varphi_2(x),$$

as seguintes equações

$$p(x + \omega) = p(x) + d_x \varphi_1(x),$$

$$p(x + i\omega') = p(x) + d_x \varphi_2(x). \quad (*).$$

Substituindo n'esta ultima equação o valor de $p(x + i\omega')$, dado pela equação

$$p(x) = \frac{1}{sn^2 x} - \frac{1 + k^2}{3},$$

(*) Halphen, no seu tractado das funcções ellipticas, obteve as equações seguintes para a addição dos semiperíodos de $p(x)$:

$$p(x + \omega) = e_1 + \frac{(e_1 - e_2)(e_1 - e_3)}{p(x) - e_1},$$

$$p(x + i\omega') = e_3 + \frac{(e_3 - e_2)(e_3 - e_1)}{p(x) - e_3}.$$

obtemos

$$k^2 \operatorname{sn}^2 x = p(x) + d_x \varphi_2(x) + \frac{1+k^2}{3},$$

que, integrada entre 0 e x , dá a função $Z(x)$ do sr. Hermite (*), expressa na função $\varphi_2(x)$ e na função $\zeta(x)$ do sr. Weierstrass.

Esta função $Z(x)$ figura, como é sabido, na expressão do arco de ellipse.

(*) Nota do sr. Hermite no Calculo de Lacroix.

SUR LES LIGNES GÉODÉSIQUES DES PARABOLOÏDES

PAR

R. MARCOLONGO

On sait intégrer les équations différentielles des lignes géodésiques des paraboloides par les fonctions elliptiques; les coordonnées d'un point de la géodésique peuvent s'exprimer rationnellement par des fonctions θ d'un seul argument, comme j'ai montré dans une note insérée dans les « Rend. Acc. d. Lincei, Maggio 1890 ». Dans une autre note, en employant les fonctions p et σ , j'ai mis l'équation des lignes géodésiques sous une forme très simple. En employant encore les mêmes fonctions je veux montrer directement la propriété que les coordonnées des points de la géodésique sont des fonctions rationnelles de fonctions doublement périodiques de deuxième espèce et d'un seul argument. Il ne faudra plus s'appuyer sur une formule donnée par Rosenhain et sur ses transformées.

Considérons le parabolode elliptique:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

et soient λ_1, λ_2 les racines, différentes de zero, de l'équation:

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 2z + \lambda$$

qui sont les paramètres des paraboloïdes elliptiques et hyperboliques homofocaux au premier. Si l'on pose:

$$S(\lambda) = \lambda(a^2 + \lambda)(b^2 + \lambda)(c^2 + \lambda) = \lambda^4 + 4a_1\lambda^3 + 6a_2\lambda^2 + 4a_3\lambda$$

avec: $c^2 = a^2 - \mu'^2$, où μ'^2 est une constante comprise entre zéro et $a^2 - b^2$, l'équation différentielle des lignes géodésiques est:

$$\frac{\lambda_1 d\lambda_1}{\sqrt{S(\lambda_1)}} + \frac{\lambda_3 d\lambda_2}{\sqrt{S(\lambda_2)}} = 0.$$

Faisant:

$$\lambda = -a_1 + \frac{1}{2} \frac{p'u - p'\alpha}{pu - p\alpha}$$

α étant une constante définie par les deux relations:

$$p\alpha = \alpha_1^2 - a_2; \quad p'\alpha = a_3 - 3a_1 a_2 + 2a_1^3,$$

l'équation des lignes géodésiques est:

$$\frac{\sigma(u_1 + \alpha)\sigma(u_2 + \alpha)}{\sigma u_1 \cdot \sigma u_2} = \rho e^{2w};$$

ρ est une constante et:

$$w = \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{\sigma'\alpha}{\sigma\alpha} \right) (u_1 + u_2).$$

Les racines λ_r de l'équation:

$$S(\lambda) = 0$$

sont réelles et égales à: $0, -a^2, -b^2, -c^2$; le discriminant des fonctions elliptiques est positif et α est réel et compris entre 0 et 2ω ; les racines sont données en fonction de α par les formules:

$$\lambda_r = -a_1 - \frac{1}{2} \frac{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega_r \right)}{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega_r \right)} = -a_1 - \frac{1}{2} \frac{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega_r \right) + p'\alpha}{p \left(\frac{\alpha}{2} + \omega_r \right) - p\alpha}$$

($r = 0, 1, 2, 3$; $\omega_0 = 0$); elles sont rangées dans l'ordre

$$\lambda_0 > \lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1;$$

(Halphen. Fonct. Ellip. T. 1.^o p. 121) et puisque l'on a:

$$a^2 > c^2 > b^2 > 0$$

l'on devra poser:

$$-a^2 = -a_1 - \frac{1}{2} \frac{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega \right) + p'\alpha}{p \left(\frac{\alpha}{2} + \omega \right) + p\alpha},$$

$$-b^2 = -a_1 - \frac{1}{2} \frac{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega' \right) + p'\alpha}{p \left(\frac{\alpha}{2} + \omega' \right) + p\alpha}.$$

Si nous définissons donc deux autres paramètres μ, ν tels que:

$$\mu^2 = a^2 + \lambda_1; \quad \nu^2 = -a^2 - \lambda_2$$

• •

nous aurons :

$$\mu^2 = \frac{1}{2} \frac{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega \right) + p' \alpha}{p \left(\frac{\alpha}{2} + \omega \right) - p \alpha} + \frac{1}{2} \frac{p' u_1 - p' \alpha}{p u_1 - p \alpha};$$

$$v^2 = -\frac{1}{2} \frac{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega \right) + p' \alpha}{p \left(\frac{\alpha}{2} + \omega \right) - p \alpha} - \frac{1}{2} \frac{p' u_2 - p' \alpha}{p u_2 - p \alpha}.$$

La formule d'addition pour la fonction ζ nous donnera :

$$\mu^2 = \zeta(u_1 + \alpha) - \zeta u_1 + \zeta \left(\omega - \frac{\alpha}{2} \right) - \zeta \left(\omega + \frac{\alpha}{2} \right).$$

C'est une fonction rationnelle de $p u_1$ et $p' u_1$, qui a les infinis $u_1 = 0$, $u_1 = -\alpha$, et les zéros $u_1 = \omega - \frac{\alpha}{2}$, $u_1 = -\omega - \frac{\alpha}{2}$; elle a donc la forme :

$$A \frac{\sigma \left(u_1 - \omega + \frac{\alpha}{2} \right) \sigma \left(u_1 + \omega + \frac{\alpha}{2} \right)}{\sigma u_1 \sigma (u_1 + \alpha)}$$

où A est une constante; multipliant les deux membres par $u_1 + \alpha$, puis faisant $u_1 = -\alpha$, on trouve :

$$A = \frac{\sigma \alpha}{\sigma \left(\omega + \frac{\alpha}{2} \right) \sigma \left(\omega - \frac{\alpha}{2} \right)}.$$

Mais si l'on se rappelle que :

$$\sigma(u + \omega) = -\sigma(u - \omega) e^{2\pi i \omega}$$

on a :

$$\mu^2 = -\frac{\sigma \alpha}{\sigma^2 \left(\omega - \frac{\alpha}{2}\right)} \cdot e^{2\pi i \left(u_1 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right)} \frac{\sigma^2 \left(u_1 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right)}{\sigma u_1 \sigma(u_1 + \alpha)}.$$

Changeant de signe, et remplaçant u_1 avec u_2 nous aurons :

$$\nu^2 = \frac{\sigma \alpha}{\sigma^2 \left(\omega - \frac{\alpha}{2}\right)} e^{2\pi i \left(u_2 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right)} \frac{\sigma^2 \left(u_2 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right)}{\sigma u_2 \sigma(u_2 + \alpha)}.$$

Les coordonnées des points de la ligne géodésique sont :

$$x^2 = \frac{a^2}{h^2} \mu^2 \nu^2; \quad y^2 = \frac{b^2}{h^2} h^2 - \mu^2 (h^2 + \nu^2)$$

où : $h^2 = a^2 - b^2$; par conséquent :

$$x^2 = -\frac{a^2}{h^2} \frac{\sigma^2 \alpha}{\sigma^4 \left(\omega - \frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma \left(u_1 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right) \sigma \left(u_2 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right)}{\sigma u_1 \sigma u_2 \sigma(u_1 + \alpha) \sigma(u_2 + \alpha)} \cdot e^{2\pi(u_1 + u_2 + \alpha - 2\omega)}$$

ou encore :

$$x = G e^{mu+n} \frac{\sigma\left(u_1 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right) \sigma\left(u_2 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right)}{\sigma u_1 \sigma u_2}; \quad u = u_1 + u_2.$$

G, m, n sont des constantes faciles à former.

Partons maintenant de l'équation à trois termes :

$$\sigma(x-y) \sigma(x+y) \sigma(z-w) \sigma(z+w) +$$

$$+ \sigma(y-z) \sigma(y+z) \sigma(x-w) \sigma(x+w) +$$

$$+ \sigma(z-x) \sigma(z+x) \sigma(y-w) \sigma(y+w) = 0$$

en y faisant :

$$2x = u_1 + u_2; \quad 2y = u_2 - u_1; \quad 2z = u_1 + u_2 + 2\alpha; \quad 2w = u_1 + u_2 + z - 2\omega.$$

On trouve :

$$\sigma u_1 \sigma u_2 \sigma\left(u + \frac{3z}{2} - \omega\right) \sigma\left(\omega - \frac{\alpha}{2}\right) +$$

$$+ \sigma(u_1 + \alpha) \sigma(u_2 + \alpha) \sigma\left(u + \frac{z}{2} - \omega\right) \sigma\left(\omega - \frac{\alpha}{2}\right) =$$

$$= -\sigma z \sigma(u + \alpha) \sigma\left(u_1 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right) \sigma\left(u_2 + \frac{\alpha}{2} - \omega\right)$$

ou bien :

$$\frac{\sigma \left(u_1 + \frac{\alpha}{2} - \omega \right) \sigma \left(u_2 + \frac{\alpha}{2} - \omega \right)}{\sigma u_1 \sigma u_2} = - \frac{\sigma \left(\omega - \frac{\alpha}{2} \right)}{\sigma \alpha}.$$

$$\frac{\sigma \left(u + \frac{3\alpha}{2} - \omega \right) + \wp e^{2w} \sigma \left(u + \frac{\alpha}{2} - \omega \right)}{\sigma (u + \alpha)}.$$

Donc enfin.

$$x = G_1 e^{mu+n} \frac{\sigma \left(u + \frac{3\alpha}{2} - \omega \right) + \wp e^{2w} \sigma \left(u + \frac{\alpha}{2} - \omega \right)}{\sigma (u + \alpha)}.$$

Pour trouver y il faut observer que :

$$h^2 - \mu_2 = -b^2 + a_1 - \frac{1}{2} \frac{p'u_1 - p'\alpha}{pu_1 - p\alpha}$$

ou, ce qui est la même chose :

$$h^2 - \mu^2 = -\frac{1}{2} \frac{p' \left(\frac{\alpha}{2} + \omega' \right) - p'\alpha}{p \left(\frac{\alpha}{2} + \omega' \right) - p\alpha} - \frac{1}{2} \frac{p'u_1 - p'\alpha}{pu_1 - p\alpha}$$

c'est à dire que l'on peut obtenir $h^2 - \mu^2$, en changeant dans μ^2

le signe et ω en ω' . Ainsi on déduira $h^2 + v^2$ en changeant dans v^2 , ω en ω' ; on aura donc.

$$y = G_2 e^{m'u+n'} \frac{\sigma\left(u + \frac{3\alpha}{2} - \omega'\right) + \dot{\varphi} e^{2w} \sigma\left(u + \frac{\alpha}{2} - \omega'\right)}{\sigma(u + \alpha)}.$$

Rome, Mai 1893.



BIBLIOGRAPHIA

A. R. Forsyth: Theory of Functions of a complex variable, Cambridge, 1893.

A obra de que vamos dar noticia é notável pelo modo profundo, desenvolvido, claro e, em muitos pontos, original como o sr. Forsyth tracta a theoria geral das funcções analyticas. O illustre geometra inglez não só considera todos os pontos d'esta theoria que são essenciaes, mas apresenta como exercícios ou exemplos um numero consideravel de resultados e theoremas interessantes que a este respeito tem sido apresentados pelos geometras.

A theoria das funcções analyticas tem feito nos ultimos tempos progressos notaveis, para o que teem concorrido com trabalhos importantes muitos dos maiores geometras do nosso tempo. Pois o sr. Forsyth toma em consideração todos estes trabalhos e dá noticia de todos estes progressos, tornando assim a sua obra muito propria para dar aos leitores um conhecimento completo do estado actual d'esta parte da Analyse.

As doutrinas de que o auctor se occupa estão dispostas em vinte e dois capítulos, de cujos assumptos vamos dar uma rapida noticia.

Os primeiros sete capítulos são dedicados á theoria das funcções uniformes. No estudo d'estas funcções é empregado o methodo de Cauchy, baseado na theoria dos integraes tomados entre limites imaginarios, que primeiramente é exposta. N'elles se encontram os trabalhos de Cauchy, Weierstrass e Mittag-Leffler a respeito da theoria geral d'estas funcções.

No capitulo VIII é estudada, pelo methodo de Cauchy, a theoria geral das funcções multiformes e em especial a theoria das funcções algebricas.

Nos capitulos IX a XIII são estudadas as funcções multiformes definidas por integraes das funcções algebricas e as funcções uniformes que resultam da inversão de alguns d'estes integraes. O methodo seguido é ainda o de Cauchy como foi empregado por Briot e Bouquet na sua obra sobre a theoria das funcções ellipticas. Encontra-se n'estes capitulos um estudo desenvolvido da theoria geral das funcções duplamente periodicas de primeira, segunda e terceira especie, e em especial a theoria das funcções $p(u)$, $\zeta(u)$, $\sigma(u)$ de Weierstrass.

O capitulo XIII é dos mais interessantes da obra. N'elle o auctor resolve a questão que consiste em procurar as funcções que admittem um theorema de adição algebrico. A solução d'esta questão, obtida por Weierstrass, leva á consideração das funcções ellipticas e dá assim um dos modos de entrar n'esta theoria. O livro do sr. Forsyth é a primeira obra didactica em que é exposto este assumpto, a respeito do qual muito pouco tem sido publicado.

Nos capitulos XIV a XVIII é exposta a theoria das funcções multiformes pelo methodo de Riemann, sendo o primeiro d'estes capitulos destinado á exposição de algumas proposições geometricas necessarias para a exposição do methodo, o segundo ao estudo da representação geometrica empregada por Riemann, o terceiro ao estudo das funcções algebricas e seus integraes, o quarto ao problema de Derichlet para o caso de duas variaveis independentes, etc.

Os capitulos XIX e XX conteem um estudo profundo da doutrina relativa á representação conforme.

Finalmente os capitulos XXI e XXII são consagrados á theoria das funcções fuchsianas, ultimamente creada pelos trabalhos de Poincaré.

Como se vê por esta rapida noticia dos assumptos de cada capitulo, o sr. Forsyth empregou no estudo das funcções analyticas os methodos de Cauchy, Riemann e Weierstrass, isto é os tres methodos fundamentaes que existem para este estudo.

Terminando diremos que esta obra excellente, digna dos maiores elogios, nos parece uma das mais proprias para se estudar com largueza a theoria das funcções analyticas e que nos parece destinada a prestar os maiores serviços aos que fazem d'este bello assumpto objecto de seus estudos e de suas indagações.

J. Tannery e J. Molk: *Éléments de la théorie des fonctions elliptiques*, Paris, G. Villars, t. I, 1893.

O presente volume é o primeiro de uma obra que constará de quatro volumes, na qual será estudada a theoria das funcções ellipticas com suas principaes applicações. Os auctores empregam principalmente, na exposição d'esta theoria, as notações de Weierstrass, fazendo todavia conhecer a respeito das notações anteriormente empregados o sufficiente para se poderem ler os trabalhos em que estas notações são empregadas.

A exposição do assumpto é feita de modo que possa ser comprehendida pelos que conhecem as doutrinas que são objecto do ensino ministrado nas Faculdades de França e que se encontram nos manuaes actualmente classicos. Para os assumptos de Analyse que não são ensinados n'essas faculdades com assaz desenvolvimento e que teem na obra maior applicação, destinaram os auctores uma parte consideravel do presente volume, em que se encontra uma exposição muito bem feita da theoria das series e dos productos infinitos a dupla entrada, da theoria das series e dos productos infinitos cujos termos dependem de uma variavel e finalmente da theoria das funcções transcendentas inteiras.

A parte relativa á theoria das funcções ellipticas que se encontra no presente volume está distribuida por dois capitulos, sendo no primeiro estudada a theoria geral das funcções periodicas e no segundo a função $\sigma(u)$ de Weierstrass e as funcções $p(u)$, $\zeta(u)$, etc. que d'ella derivam.

Seguindo o caminho de Weierstrass, os auctores definem a função $\sigma(u)$ por meio de um producto infinito a dupla entrada, tiram d'esta definição as propriedades de $\sigma(u)$ e passam para as funcões $\zeta(u)$ e $p(u)$ por meio de derivações. Encontra-se ainda n'este volume o estudo, feito com a maior clareza, da theoria da transformação das funcões σ .

Pela leitura d'este primeiro volume vê-se já que, com a publicação da sua obra, os srs. Tannery e Molk veem junctar mais um bello trabalho á tão rica collecção de escriptos relativos á theoria das funcões ellipticas, e fornecer aos que querem estudar este ramo de Analyse um livro excellente e dos mais proprios para os guiar n'este estudo.

G. Lazzeri. — Trattato di Geometria analitica, Livorno, 1893.

Contém este livro não só os assumptos das lições de geometria analytica dadas pelo auctor na Eschola naval de Livorno, mas ainda os assumptos d'esta sciencia que em Italia é uso estudar nos cursos universitarios.

Lendo esta obra excellente nota-se em primeiro logar que o sr. Lazzeri não separa a Geometria plana da Geometria no espaço, como já fizera no livro que ha annos publicou sobre Geometria elementar em collaboração com o sr. Bassani.

Nota-se em segundo logar que o auctor teve a boa ideia de dar igual desenvolvimento á exposição do sistema de coordenadas cartesianas e do sistema de coordenadas projectivas, e de fazer quasi igual uso dos dois systemas, aproveitando um ou outro segundo a natureza da questão a resolver.

Abre o livro por uma introdução em que são expostos os principios de Geometria projectiva necessarios para a intelligenzia dos assumptos considerados. N'ella são estabelecidas as noções de projectividade, reciprocidade e omologia e é exposto o principio de dualidade.

Segue-se depois a *Primeira parte*, composta de cinco capítulos, onde são estudadas as coordenadas cartesianas e projectivas das fórmulas geometricas de primeira, segunda e terceira especie, as propriedades das rectas no plano e das rectas e planos no espaço, e as propriedades do círculo e da esfera.

A *Parte segunda* contém quatro capítulos onde são respectivamente estudadas as propriedades projectivas das conicas e das quadricas, as propriedades metricas das conicas e das quadricas, os focos e directrizes das conicas e das quadricas e finalmente as construções e problemas graphicos relativos às conicas.

Cada capítulo é seguido de uma lista de problemas bem escolhidos, relativos ao assumpto considerado no capítulo.

Como se vê pelas precedentes indicações, o sr. Lazzeri ao planejar o seu livro teve em vista preparar os alumnos com os conhecimentos dos methodos fundamentaes de Geometria analytica necessarios para o estudo dos trabalhos modernos sobre Geometria. Cremos que conseguiu o seu fim, e que este livro será para elles do maior proveito. A clareza e elegancia da exposição tornam a sua leitura facil e attrahente.

M. G. de Longchamps.—Supplément au Cours de mathématiques especiales, Paris, Delagrave, 1895.

No tomo **viii** (pag. 111) d'este jornal deu-se noticia da anterior edição do *Supplemento* do sr. Longchamps ao seu *Curso de mathematicas especiaes*. Na nova edição, que vem de ser publicada, o auctor acrescentou alguns assumptos. Assim contém a nova edição a mais a trigonometria plana e espherica, e a parte da mechanica racional que comprehende a statica, a dynamica do ponto material e a statica do solido invariavel. Na exposição d'estes assumptos revelam-se as mesmas boas qualidades que dissemos já existirem na exposição dos assumptos que se encontravam na anterior edição.

E. Lucas.—Récréations mathématiques, Paris, G. Villars, t. iii, 1893.

O auctor d'esta bella e interessante obra falleceu em Paris em 3 de janeiro de 1891, depois de ter publicado douis volumes d'ella. Entre os seus manuscripts foram encontrados pelos srs. Delannoy, Laisant e Lemoine, encarregados pela Sociedade mathematica de França de os exáminar, mais douis volumes da mesma obra quasi complemente preparados para a publicação. O primeiro d'estes volumes vem de ser publicado. Contém septe recreios assim intitulados: 1.^º calculo digital; 2.^º machinas de calcular; 3.^º o jogo do Camaleão e o jogo da juncção de pontos; 4.^º o jogo militar e a tomada da Bastilha; 5.^º a pata do ganso e a ferradura; 6.^º o jogo americano; 7.^º a estrella nacional e os jogos do vermelho e negro. Todos estes recreios são estudados em um bello volume de 200 paginas cuja leitura é das mais agradaveis.

Index du Répertoire bibliographique des sciences mathématiques, Paris, G. Villars, 1893.

Na pag. 143 do vol. **ix** d'este jornal publicámos as resoluções, tomadas no congresso de mathematica que teve logar em Paris

em 1889, relativamente á publicação de um Reportorio bibliographico das sciencias mathematicas. Logo depois foi publicado um opusculo contendo a classificação dos assumptos mathematicos adoptada pelo congresso. Uma nova edição d'este trabalho, mais completa, vem de ser publicada.

R. Bettazzi. — La risoluzione dei problemi numerici e geometrici, Torino, 1893.

N'este opusculo, muito bem feito e muito util, o sr. Bettazzi trata do estudo dos methodos geraes empregados na resolução dos problemas numericos e geometricos.

Principia o auctor pelo estudo dos methodos para a resolução dos problemas em geral, explicando n'esta parte, com o maior cuidado, em que consistem os methodos chamados analytico, synthetico e mixto. Vem depois o estudo dos methodos empregados na resolução dos problemas arithmeticos e algebraicos. Vem finalmente o estudo dos methodos, quer puramente geometricos quer algebraicos, empregados na resolução dos problemas geometricos. O estudo dos methodos é acompanhado dos exemplos suficientes para os esclarecer.

Em geral no ensino das mathematicas elementares os alumnos são levados ao conhecimento dos methodos geraes para a resolução dos problemas por uma especie de inducção resultante de repetidas resoluções de problemas que lhes são propostos. Chamar-lhes a attenção para os methodos que empregam é de vantagens evidentes; por isso com a publicação do seu livro, onde estes methodos podem ser estudados com a maior facilidade, prestou o illustre professor do lyceu de Turin um bom serviço aos alumnos.

M. Mansion. — Notice sur les travaux scientifiques de L. Ph. Gilbert, Paris, G. Villars, 1893.

Contém este opusculo interessante a biographia, o retrato e a lista dos trabalhos de L. Ph. Gilbert. D'elle extrahimos os

seguintes apontamentos a respeito d'este geometra eminent, que a Belgica perdeu em 4 de fevereiro de 1892.

Ph. Gilbert nasceu a 7 de fevereiro de 1832 em Beauring. Estudou primeiramente no collegio de Dinant e em seguida na Universidade de Louvain, onde tomou o grau de doutor em sciencias physicas e mathematicas em 1855. N'este mesmo anno principiou a reger n'esta Universidade as cadeiras de Analyse infinitesimal e Mecanica analytica, continuando esta regencia até á sua morte. Para o seu ensino d'estas sciencias escreveu os seus excellentes livros: *Cours d'analyse infinitesimal* e *Cours de Mécanique analytique*. Escreveu importantes memorias e notas sobre muitos pontos de analyse, geometria, mecanica, physica matematica, etc., que foram publicadas nas principaes collecções scientificas da Belgica e da França, e que lhe abriram as portas da Academia das Sciencias de Paris, sendo eleito socio correspondente d'esta Academia em 3 de fevereiro de 1890. Foi um dos fundadores da Sociedade Scientifica de Bruxellas em cujos Annaes publicou algumas das suas principaes memorias.

E. Carvallo. — Traité de Mécanique, Paris, Nony, 1893.

Este livro, escripto pelo auctor para uso dos alumnos da classe de mathematicas elementares dos Lyceus franceses, contém as doutrinas de mechanica exigidas pelos respectivos programmas, isto é, a theoria da composição das forças, dos centros de gravidade, do equilibrio dos solidos e das machinas simples. O destino do livro obrigou o auctor a ter na maior attenção a clareza e simplicidade na exposição dos assumptos. Julgamos que conseguiu que o livro tenha estas qualidades, sem todavia em ponto algum sacrificar o rigor. Escripto todo com o maior cuidado, merece todavia principal attenção o modo como são tratadas a theoria das forças paralelas, e a dos centros de gravidade.

Cada capitulo é acompanhado de uma lista de exercícios bem escolhidos.

E. Lemoine. — La Géométographie ou l'art des constructions géométriques (Association française pour l'avancement des sciences, 1892).

O auctor d'este trabalho tracta de appresentar processos para determinar o grau de simplicidade e de exactidão das construções geometricas com regoa e compasso, que se empregam para resolver graphicamente os problemas.

As operaçōes elementares de que, segundo o sr. Lemoine, depende qualquer d'estes problemas são: 1.º, pôr a borda da regoa em coincidencia com um ponto; 2.º, traçar a linha recta; 3.º, pôr uma ponta do compasso n'um ponto determinado; 4.º, pôr uma ponta do compasso em um ponto indeterminado de uma linha recta; 5.º, traçar a circumferencia. Representando respectivamente por R_1 , R_2 , C_1 , C_2 , C_3 estas operaçōes, qualquer construcção feita com a regoa e o compasso é representada por $l_1 R_1 + l_2 R_2 + m_1 C_1 + m_2 C_2 + m_3 C_3$.

A somma dos numeros inteiros l_1 , l_2 , m_1 , m_2 , m_3 representa para o auctor o grau de simplicidade da operação, a somma dos inteiros l_1 , m_1 e m_2 o grau de exactidão (porque o grau de exactidão das construções depende das operaçōes preparatorias e não das operaçōes de traçado).

Estes são os principios geraes do que o sr. Lemoine chama *Géométographia*. Na presente memoria são elles discutidos e applicados a um numero consideravel de exemplos.

Terminaremos aqui esta rapida noticia com o qual tivemos em vista chamar a attenção para um trabalho em que são desenvolvidas considerações que, pela sua applicação em geometria practica e em especial em geometria descriptiva, nos parecem dever ser conhecidas.

G. T.



NOTA MATEMATICA

POR

JUAN J. DURÁN LORIGA

Capitan de Artilleria

Cuando un triangulo se deforma conservando la base fija en magnitud y posicion y constante el area (esto es moviendose el vertice sobre una paralela á la base) los puntos notables del triangulo describen lineas que es curioso conocer; la naturaleza de las descritas por ciertos puntos se vé facilmente á priori, así por ejemplo el centro de gravedad marca una paralela á la base fija, el centro del circulo circunscripto se mueve en la mediatrix correspondiente al lado inmóvil D. En la presente nota vamos a indicar el procedimiento general para llegar á las ecuaciones de las distintas lineas á que hemos hecho referencia.

Sea ABC el triangulo en cuestión y δ_a , δ_c las coordenadas absolutas mr y $m\varphi$ de un punto cualquiera m con relación á los lados a y c de dicho triangulo. Tomemos como ejes cartesianos el lado fijo a y la perpendicular en B.

Se tiene evidentemente

$$ms = \frac{m\varphi}{\cos B}, \quad rs = mr + \frac{m\varphi}{\cos B}, \quad Br = \frac{sr}{\tan B} = \frac{mr}{\tan B} + \frac{m\varphi}{\sin B}$$

de donde se deduce facilmente llamando h_a la altura relativa

al lado a y p la projección sobre BC del lado BA

$$\begin{cases} x = \frac{p \cdot \delta_a}{h_a} + \frac{\delta_c \sqrt{h_a^2 + p^2}}{h_a} \\ y = \delta_a \end{cases}$$

Ahora bien, en los 2.^{os} miembros de las anteriores ecuaciones figuran en general tres parametros variables b , c y p , pero por medio de las relaciones

$$c^2 = h_a^2 + p^2, \quad b^2 = h_a^2 + (a - p)^2$$

se llegará o tener un solo parametro p y dos ecuaciones de la forma

$$x = f(p), \quad y = \varphi(p);$$

la eliminacion de p conducirá á la ecuacion del lugar geometrico del punto m .

Aplicaciones:

1.^a — Centro de gravedad.

$$\begin{aligned} \delta_a &= \frac{h_a}{3} & \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{p}{3} + \frac{a h_a}{3 \sqrt{h_a^2 + p^2}} \cdot \frac{\sqrt{h_a^2 + p^2}}{h_a} = \frac{a+p}{h_a} \\ y = \frac{h_a}{3} \end{array} \right. \\ \delta &= \frac{2S}{3c} = \frac{a h_a}{3 \sqrt{h_a^2 + p^2}} \end{aligned}$$

El lugar geometrico es pues en este caso, como se vé á priori, una paralela á la base, manifestando el valor de x una propiedad geometrica facil de enunciar.

2.^a — Punto de Lemoine.

$$x = \frac{2apS}{h_a(a^2 + b^2 + c^2)} + \frac{2cS\sqrt{h_a^2 + p^2}}{h_a},$$

$$y = \frac{2aS}{a^2 + b^2 + c^2};$$

estas ecuaciones se transforman facilmente en las siguientes

$$x = \frac{a^2p + a(h_a^2 + p^2)}{2(a^2 + h_a^2 + p^2 - ap)},$$

$$y = \frac{a^2h_a}{2(a^2 + h_a^2 + p^2 - ap)};$$

la eliminacion del parametro p conduce á la siguiente ecuacion para el lugar geometrico:

$$4h_a^2x^2 + 4(4h_a^2 + 3a^2)y^2 - 4ah_a^2x - 8a^2h_a^2y + a^2h_a^2 = 0,$$

que representa una ellipse. Si trasladamos los ejes paralelamente tomando como nuevo origen el medio de la ordenada del punto de Lemoine del triangulo isosceles equivalente al dado, resulta

• •

la ecuacion

$$\frac{4h_a^2 + 3a^2}{a^4}x^2 + \frac{(4h_a^2 + 3a^2)^2}{a^4 h_a^2}y^2 = 1.$$

Vemos pues que los ejes de esta conica son

$$\frac{2a^2}{\sqrt{4h_a^2 + 3a^2}}, \quad \frac{2a^2 h_a}{4h_a^2 + 3a^2}$$

y la estructura de estas expresiones permite deducir facilmente la construccion geometrica para el trazado de la curva.

Este es el procedimiento general, pero la eliminacion del parametro p se hace con frequencia penosa y de aqui que convenga en muchos casos acudir á las propiedades particulares del punto que se considere, asi p . e encontrariamos la linea descrita por el ortocentro (que se sabe es una parábola) eliminando p entre las ecuaciones

$$x = \frac{h_a}{p}, \quad y = -\frac{1}{p}(x - a)$$

deducidas tomando como ejes el lado fijo y una perpendicular al lado a en B. La eliminacion dá

$$y = -\frac{x^2}{h_a} + \frac{ax}{h_a}$$

y si se toma como nuevo origen el ortocentro del triangulo isos-

celes equivalente al dado, pero conservando la misma dirección de ejes, resulta

$$x^2 = -h_a y$$

que representa una parábola de eje vertical y extendiéndose por la región de las y negativas. Como los valores

$$x = \pm \frac{a}{2}, \quad y = -\frac{a^2}{4h_a}$$

verifican la ecuación, resulta que la curva pasa por los vértices de la base, como debe suceder.

Si ahora queremos obtener la línea descrita por el punto de Lemoine, con más sencillez que anteriormente lo hemos hecho, podemos considerarlo como intersección de la recta que tiene por ecuación

$$y = \frac{2Sa}{a^2 + b^2 + c^2}$$

y la que une el medio de la base con el de la altura correspondiente. Si tomamos como ejes la base fija y la mediatrix, la última recta tiene por ecuación

$$y = \frac{h_a}{2p} x$$

teniendo p la misma significación que anteriormente. Como el

primer valor de y se transforma en

$$y = \frac{2 a^2 h_a}{4 \frac{h^2}{a} + 3 a^2 + 4 p^2},$$

la eliminacion de p conduce á la siguiente ecuacion


$$(4 \frac{h^2}{a} + 3 a^2) y^2 + h^2 x^2 - 2 a^2 h_a y = 0,$$

y trasladando el origen al medio de la ordenada del punto de Lemoine del triangulo isosceles correspondiente se obtiene la misma ecuacion que antes para la curva descrita por el citado punto.

Resulta por consiguiente que, dado um triangulo cualquiera, se pueden considerar como adjuntas por cada punto notable tres lineas de la naturaleza de las que hemos considerado, pero claro está que la importancia que tengan en la geometria del triangulo dependerá de las propriedades de que gozen.

En este concepto puede ser interesante un detenido estudio sobre este particular. Ja insistiremos sobre este punto cuando contemos con tiempo para ello, asi como tambien sobre la deformacion de un triangulo conservando dos vertices fijos y moviendo el tercero sobre la circunferencia circunscripta.

La Coruña, octubre de 1893.



SUR UNE ÉQUATION
AUX DIFFÉRENCES FINIES ET PARTIELLES

PAR

G. VIVANTI

Cette équation se présente dans le calcul des dérivées successives de la fonction $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$. On a :

$$f'(z) = -e^{\frac{1}{z}}, \quad f''(z) = \left[\frac{1}{z^4} + \frac{2}{z^3} \right] e^{\frac{1}{z}},$$

et en général :

$$f^{(v)}(z) = (-1)^v S_v(z) e^{\frac{1}{z}},$$

où $S_v(z)$ est une fonction rationnelle et entière de $\frac{1}{z}$. Nous poserons :

$$S_v(z) = \frac{a_{v,1}}{z^{m_v}} + \frac{a_{v,2}}{z^{m_v-1}} + \dots + \frac{a_{v,m_v-n_v+1}}{z^{n_v}},$$

et déterminerons avant tout les nombres m_v, n_v . De l'égalité :

$$f^{(v+1)}(z) = (-1)^{v+1} S_{v+1}(z) e^{\frac{1}{z}} = (-1)^v e^{\frac{1}{z}} \left\{ \frac{d S_v(z)}{dz} - \frac{1}{z^2} S_v(z) \right\},$$

il suit :

$$S_{v+1}(z) = \frac{1}{z^2} S_v(z) - \frac{d S_v(z)}{dz},$$

ou bien :

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{a_{v+1,1}}{z^{m_v+1}} + \dots + \frac{a_{v+1,m_v+1-n_v+1} + 1}{z^{n_v+1}} = \frac{a_{v,1}}{z^{m_v+2}} + \dots + \\ \qquad \qquad \qquad + \frac{a_{v,m_v-n_v+1}}{z^{n_v+2}} + \frac{m_v a_{v,1}}{z^{m_v+1}} + \dots + \frac{n_v a_{v,m_v-n_v+1}}{z^{n_v+1}}, \end{array} \right.$$

et par conséquent

$$m_{v+1} = m_v + 2, \quad n_{v+1} = n_v + 1.$$

Or $m_1 = n_1 = 2$; donc $m_v = 2v$, $n_v = v + 1$, et :

$$S_v(z) = \frac{a_{v,1}}{z^{2v}} + \frac{a_{v,2}}{z^{2v-1}} + \dots + \frac{a_{v,v+1}}{z^{v+1}}.$$

On a en outre, en comparant les coefficients de $\frac{1}{z^{2v+2}}$ et ceux de $\frac{1}{z^v}$ dans les deux membres de l'équation (1) :

$$a_{v+1,1} = a_{v,1}, \quad a_{v+1,2v+3-s} = a_{v,2v+3-s} + (s-1) a_{v,2v+2-s},$$

on bien en faisant $v = x$, $2v + 3 - s = y$:

$$(2) \dots \dots \quad a_{x+1,y} = a_{x,y} + (2x - y + 2) a_{x,y-1}.$$

Il s'agit maintenant d'intégrer cette équation aux différences finies sous les conditions :

$$a_{x,y} = 1, \quad a_{x,y} = 0 \quad \text{pour } y > x.$$

Désignons comme toujours par $\Delta_x \Sigma$ la différentiation et l'intégration finies, et par x_y la faculté d'ordre y de x , c. à. d. le produit $x(x-1)(x-y+1)$. Nous pouvons écrire l'équation ainsi :

$$\Delta_x a_{x,y} = (2x - y + 2) a_{x,y},$$

ou encore en intégrant :

$$a_{x,y} = \sum_x (2x - y + 2) a_{x,y-1} + \varphi(y),$$

où $\varphi(y)$ est une fonction arbitraire de y , qui peut tout aussi bien contenir x , pourvu qu'elle ait la période 1 par rapport à cette variable. Si toutefois l'on entende par Σ l'intégrale particulière qu'on obtient en sommant l'expression différentielle depuis $x=1$ jusqu'à $x=x-1$, il est aisément de voir que la fonction $\varphi(y)$ est identiquement nulle. On a donc :

$$a_{x,y} = \sum_x (2x - y + 2) a_{x,y-1},$$

et par conséquent :

$$a_{x,y} = \sum_x (2x - y + 2) \sum_x (2x - y + 3) \dots \sum_x (2x - 1) \sum_x 2x.$$

Il suit de là pour $y=2$ et pour $y=3$:

$$a_{x,2} = \sum_x 2x = x_2,$$

$$a_{x,3} = \sum_x (2x - 1) x_2 = \sum_x [x_1 + (x - 1)_1] x_2 = \sum_x [x_1 x_2 + x_2 (x - 1)_1].$$

En posant $u = x_2$, $\Delta v = (x - 1)$, et par suite $\Delta u = 2x_1$, $v = \frac{1}{2}(x - 1)_2$, $v + \Delta v = \frac{x}{2}$, et en appliquant l'identité connue:

$$(3) \dots \dots \dots uv = \sum [\Delta u (v + \Delta v) + u \Delta v],$$

on obtient :

$$a_{x,3} = \frac{1}{2} x_2 (x - 1)_2.$$

On peut tenter de généraliser cette formule, en posant :

$$a_{x,y} = \frac{1}{(y-1)!} x_{y-1} (x-1)_{y-1}$$

et il ne reste qu'à en vérifier l'exactitude par la méthode de l'in-

duction complète ; en d'autres termes, on doit démontrer que :

$$\frac{1}{(y-1)!} \sum_x (2x-y+1) x_{y-1} (x-1)_{y-1} = \frac{1}{y!} x_y (x-1)_y.$$

Désignons par M le premier membre de cette relation, et possons :

$$u = x_y, \quad \Delta v = (x-1)_{y-1},$$

d'où il s'ensuit :

$$\Delta u = y x_{y-1}, \quad v = \frac{1}{y} (x-1)_y, \quad v + \Delta v = \frac{1}{y} x_y;$$

en vertu de l'identité (3) nous aurons :

$$M = \frac{1}{(y-1)!} \sum_x [x + (x-y+1)] x_{y-1} (x-1)_{y-1} =$$

$$= \frac{1}{(y-1)!} \sum_x [x_{y-1} x_y + x_y (x-1)_{y-1}]$$

$$= \frac{1}{(y-1)!} \sum_x [\Delta u (v + \Delta v) + u \Delta v] = \frac{1}{(y-1)!} u = v \frac{1}{y!} x_y x_{y-1},$$

c. q. f. d.

Les nombres $a_{x,y}$ forment une espèce de triangle arithmétique :

			1			
		1	2			
		1	6	6		
		1	12	36	24	
		1	20	120	240	120
		1	30	300	1200	1800
				720		
					,

dont la loi de formation est représentée par l'équation (2).

Mantoue, le 23 mai 1893.

NOVO METHODO DE DESENVOLVER OS DETERMINANTES

POR

J. PEDRO TEIXEIRA

Em o *Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas* (t. xi, n.^o 3), apresentámos processos expeditos para desenvolver os determinantes de terceira, quarta e quinta ordem, inferidos da analyse de seus desenvolvimentos, obtidos pelos methodos conhecidos. Reflectindo posteriormente sobre aquelles processos, descobrimos os principios geraes a que obedecem, os quaes, por nos parecerem de algum interesse, vão fazer objecto d'este trabalho.

Em primeiro logar, estabelecemos proposições novas a respeito dos indices, mediante as quaes derivamos d'um termo do determinante $2n - 1$ novos termos, d'um modo expedito; depois, os termos, que denominamos primitivos, pela analogia de seu papel com o de certas raizes de unidade; finalmente, o desenvolvimento do determinante em função de certos elementos, dependentes dos termos primitivos, a que correspondem schemas d'um calculo simples e mnemonico.

I

Seja

(1)	a_1	b_1	..	l_1	
	a_2	b_2	..	l_2	
	a_3	b_3	..	l_3	
	
	a_n	b_n	..	l_n	

um determinante do grau n e

$$(2) \dots \dots \dots (-1)^m d_{\delta} k_{\lambda} \dots i_n \dots a_{\alpha} l_{\lambda}$$

um dos seus termos, onde supomos que se realizam m inversões em relação às letras e aos indices.

Supondo n nullo e juntando depois uma unidade a cada indice, resulta

$$(3) \dots \dots \dots (-1)^{m'} d_{\delta+1} k_{\lambda+1} \dots i_1 \dots a_{\alpha+1} l_{\lambda+1},$$

que é evidentemente um outro termo do mesmo determinante, onde se realizam m' inversões. Procuremos o valor de m' .

Na passagem de (2) para (3), sómente pôde ter variado o numero das inversões em relação aos indices, pois que as letras se acham dispostas do mesmo modo nos dois termos. Seja x o numero das letras que precedem i e y o das que se lhe seguem. Pondo esta de parte, os indices das outras realizam em (2) e (3) o mesmo numero de inversões; e, considerando tambem aquella letra, os indices das precedentes não realizam inversões com o seu em (2) e realizam x em (3), enquanto que os das seguintes realizam com aquelle y em (2) que deixam de realizar em (3).

Conseguintemente, na passagem de (2) para (3), o numero de inversões variou de $x - y$, e por isso temos

$$m' = m + x - y,$$

$$(-1)^{m'} = (-1)^m (-1)^{x-y}.$$

D'aqui, visto que $x - y$ é impar ou par, conforme n for par ou impar, concluimos :

THEOREMA I. *Se em um termo d'um determinante do grau n*

substituirmos n por zero e juntarmos em seguida uma unidade a cada indice, obtemos outro termo, do mesmo ou de differente signal, conforme n for impar ou par.

Exemplo: de $a_2 b_3 c_1$ do determinante $(a_1 b_2 c_3)$ deduzimos $a_3 b_1 c_2$; de $-a_4 b_1 c_2 d_3$ do determinante $(a_1 b_2 c_3 d_4)$ deduzimos $a_1 b_2 c_3 d_4$.

Se applicarmos a operação a que se refere aquelle theorema $n-1$ vezes successivamente a um termo, obtemos $n-1$ novos termos, diferentes entre si e do de partida; e repetindo-a sobre o ultimo reproduz-se aquelle, como se vê neste quadro

$$\begin{array}{ll}
 -a_1 b_3 c_2 d_4 & -a_1 b_3 d_2 c_4 e_5 \\
 +a_2 b_4 c_3 d_1 & -a_2 b_4 d_3 c_5 e_1 \\
 -a_3 b_1 c_4 d_2 & -a_3 b_5 d_4 c_1 e_2 \\
 +a_4 b_2 c_1 d_3 & -a_4 b_1 d_5 c_2 e_3 \\
 & -a_5 b_2 d_1 c_3 e_4.
 \end{array}$$

II

Tomando de novo o termo

$$(-1)^m d_\beta k_\chi \dots a_\alpha l_\lambda$$

e invertendo a ordem dos indices, obtemos

$$(-1)^{m''} d_\lambda k_\alpha \dots a_\gamma l_\beta,$$

que é tambem um termo do determinante considerado.

Procuremos o factor $(-1)^{m''}$.

A operação precedente equivale evidentemente a permutar entre

si os indices das letras d e l , k e a , etc.; por isso tendo em vista a proposição conhecida, ácerca das permutações dos indices, deduzimos:

$$m'' = m + 2p, (-1)^{m''} = (-1)^m, \text{ se } n \text{ for de fórmula } 4p \text{ ou } 4p+1;$$

$$m'' = m + 2p + 1, (-1)^{m''} = -(-1)^m, \text{ se } n \text{ for de fórmula } 4p+2 \text{ ou } 4p+3.$$

D'aqui resulta :

THEOREMA II. *Se em um termo d'um determinante do grau n invertermos a ordem dos indices, obtemos um outro termo, do mesmo signal, se n for da fórmula $4p$ ou $4p+1$, e de signal differente, se n for da fórmula $4p+2$ ou $4p+3$.*

Exemplos: De $a_3 b_1 c_2$ ($n = 4p + 3$) deduz-se $-a_2 b_1 c_3$; de $-a_2 b_3 c_4 d_1$ ($n = 4p$), $-a_1 b_4 c_3 d_2$; de $a_3 b_1 c_2 d_4 e_5$ ($n = 4p + 1$), $a_5 b_4 c_2 d_1 e_3$; de $a_4 b_3 c_1 d_2 e_6 f_3$ ($n = 4p + 2$), $-a_3 b_6 c_2 d_1 e_3 f_4$.

III

Tomemos o termo principal

$$(x) \dots \dots \dots a_1 b_2 \dots j_{n-2} k_{n-1} l_n$$

do determinante considerado e, sem alterar a ordem dos indices, levemos a letra j até ao fim, por trocas successivos de logar e de signal. Obtemos d'este modo

$$(j) \dots \dots \dots \begin{cases} -a_1 b_2 \dots k_{n-2} j_{n-1} l_n, \\ +a_1 b_2 \dots k_{n-2} l_{n-1} j_n. \end{cases}$$

distintos entre si e do primeiro e que pertencem tambem ao determinante. Em cada um dos termos de (φ) e (j) levemos a letra i até ao fim, pelo processo anterior, o que nos dá um grupo (i) formado de $3 \cdot 3$ termos do determinante. Continuando assim até termos considerado a letra b , obtemos outros grupos (h), (g), . . . (b) de termos tambem pertencentes ao determinante. Estes termos receberão aqui a designação de *termos primitivos*. O seu numero é a somma

$$3 + 3 \cdot 3 + (3 + 3 \cdot 3) 4 + [3 + 3 \cdot 3 + (3 + 3 \cdot 3) 4] 5 + \dots +$$

$$+ \{3 + 3 \cdot 3 + (3 + 3 \cdot 3) 4 + \dots\} (u - 2)$$

cujo valor é

$$1 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n - 1) = \frac{(n - 1)!}{2}.$$

Para formar as permutações das $n - 1$ letras b, c, \dots, k, l , consideramos os grupos kl e lk e introduzimos a letra j em todos os logares possiveis, podendo começar no primeiro pela esquerda e no segundo pela direita, e nas permutações resultantes faremos o mesmo a respeito da letra i e assim por deante até termos considerado a letra b . Tendo presente a geração dos termos primitivos, vemos que elles tambem se podiam obter escrevendo a letra a à direita das permutações que se derivam de kl , afectando em cada uma as letras dos indices $1, 2, \dots, n$, sempre por esta ordem, tomindo depois as pares com o signal $+$ e as impares com o signal $-$; logo o numero dos dictos termos primitivos é igual a $\frac{1}{2} \cdot (n - 1)!$, como já tinhamos visto. Porém, o fim principal d'esta nota é o que se segue :

Attendendo ao modo como formamos as permutações das letras b, c, \dots, l , facilmente se reconhece que invertendo a ordem das letras em grupo do derivado de kl obtemos uma do derivado de lk ; por isso, e por serem distintas todas as permutações, se em uma do primeiro grupo invertermos a ordem das letras, não

podemos obter uma outra d'este mesmo grupo. D'aqui resulta esta proposição que havemos de utilizar:

Se em um termo primitivo invertermos a ordem das letras, não considerando a letra a, o resultado não pode ser outro termo primitivo.

IV

Sendo A, B, C..., L os termos primitivos e $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, ..., $A^{(n-1)}$ os que se obtém applicando o theorema I successivamente $n-1$ vezes a A, etc., formemos o quadro

A	B	C	..	L
$A^{(1)}$	$B^{(1)}$	$C^{(1)}$..	$L^{(1)}$
$A^{(2)}$	$B^{(2)}$	$C^{(2)}$..	$L^{(2)}$
..
$A^{(n-1)}$	$B^{(n-1)}$	$C^{(n-1)}$..	$L^{(n-1)}$;

e, applicando o theorema II a cada um dos seus termos, formemos tambem

A_1	B_1	C_1	..	L_1
$A_1^{(1)}$	$B_1^{(1)}$	$C_1^{(1)}$..	$L_1^{(1)}$
$A_1^{(2)}$	$B_1^{(2)}$	$C_1^{(2)}$..	$L_1^{(2)}$
..
$A_1^{(n-1)}$	$B_1^{(n-1)}$	$C_1^{(n-1)}$..	$L_1^{(n-1)}$.

Nos dois quadros ha $n!$ termos do determinante, os quaes vamos provar que são distinctos.

Os termos d'uma columna qualquer do primeiro quadro são distinctos uns dos outros, pelo que já se disse (I).

Um termo $D^{(i)}$ da columna dos D do primeiro quadro só poderia ser identico ao termo $H^{(i)}$ de columna dos H , pois que é o unico d'esta columna onde a letra a entra com o indice com que figura em $D^{(i)}$; porém, como nos dois termos ha pelos menos duas letras com indices differentes, é impossivel aquella identidade.

No segundo quadro não ha dois termos identicos; porque, se o contrario tivesse lugar, haveria tambem dois termos identicos no primeiro, o que já se demonstrou não poder dar-se.

Os termos do primeiro quadro são distinctos dos do segundo; porque, se assim não fosse, a inversão dos indices em um termo d'aquelle poderia reproduzir um de seus outros termos, o que não pôde dar-se, pelas razões que se seguem.

Suppunhamos que $F^{(i)}$ reproduzia $D^{(j)}$, pela inversão dos indices. Evidentemente, tambem $F^{(i+1)}$ reproduziria $D^{(j+1)}$ e, continuando, concluiríamos que F reproduziria tambem um da columna dos D , o qual não podia ser senão $D^{(n-1)}$, que tem a letra a com o indice n ; por isso, sendo, por exemplo,

$$F = a_1 \ g_2 \ h_3 \ c_4 \ d_5 \ e_6 \ f_7 \ b_8 ,$$

deveríamos ter

$$D^{(n-1)} = a_8 \ g_7 \ h_6 \ c_5 \ d_4 \ e_3 \ f_2 \ b_1 ;$$

como, applicando o theorema I ao ultimo termo de qualquer columna, reproduzimos o primeiro (I), teremos

$$D = a_1 \ g_8 \ h_7 \ c_6 \ d_5 \ e_4 \ f_3 \ b_2 ,$$

que, postos os indices pela ordem natural, dá

$$D = a_1 \ b_2 \ f_3 \ e_4 \ d_5 \ c_6 \ h_7 \ d_8 .$$

..

Comparando F com D, concluir-se-ha que, pondo de parte a letra a , um se transforma no outro pela inversão da ordem das letras, e por isso (III) um não será termo primitivo, o que é contra a hypothese.

V

Sendo os termos precedentes todos distintos, em numero de $n!$ e todos pertencentes ao determinante, o desenvolvimento d'este é a sua somma algebrica.

Designando, pois, a somma algebrica d'um termo primitivo e dos que d'elle se derivam, por meio dos theoremas (I) e (II), pelo termo primitivo encerrado em colchetes, teremos

$$(a) \dots (a_1 b_2 \dots l_n) = \{a_1 b_2 \dots l_n\} - \{a_1 b_2 \dots k_{n-2} j_{n-1} l_n\} + \\ + \{a_1 b_2 \dots k_{n-2} l_{n-1} j_n\} \\ + \dots,$$

onde os signaes são os dos termos primitivos.

VI

Para achar rapidamente o desenvolvimento d'um colchete, procederemos do seguinte modo :

Escreva-se o termo primitivo e, applicando-lhe o theorema II, escreva-se á direita o resultado, e em seguida applique-se a cada um d'estes dois termos $n-1$ vezes successivamente o theorema I.

Assim teremos:

пага

$$n = 4p,$$

para

$$n = 4p + 1,$$

$$\begin{aligned} \{a_1 b_2 \dots k_{n-1} l_n\} &= a_1 b_2 \dots k_{n-1} l_n + a_n b_{n-1} \dots k_2 l_1 \\ &\quad + a_2 b_3 \dots k_n l_1 + a_1 b_n \dots k_3 l_2 \\ &\quad + a_3 b_4 \dots k_1 l_2 + a_2 b_1 \dots k_4 l_3 \\ &\quad \dots \dots \dots \\ &\quad + a_n b_1 \dots k_{n-2} l_{n-1} + a_{n-2} \dots k_1 l_n; \end{aligned}$$

para

$$n = 4p + 2,$$

$$\begin{aligned} \left\{ a_1 b_2 \dots k_{n-1} l_n \right\} &= a_1 b_2 \dots k_{n-1} l_n - a_n b_{n-1} \dots k_2 l_1 \\ &\quad - a_2 b_3 \dots k_n l_1 + a_1 b_n \dots k_3 l_2 \\ &\quad + a_3 b_4 \dots k_1 l_2 - a_2 b_1 \dots k_2 l_3 \\ &\quad \dots \dots \dots \\ &\quad - a_n b_1 \dots k_{n-2} l_{n-1} + a_{n-1} b_{n-2} \dots k_1 l_n ; \end{aligned}$$

para

$$n = 4p + 3,$$

$$\begin{aligned} \left\{ a_1 b_2 \dots k_{n-1} l_n \right\} &= a_1 b_2 \dots k_{n-1} l_n - a_n b_{n-1} \dots k_2 l_1 \\ &\quad + a_2 b_3 \dots k_n l_1 - a_1 b_n \dots k_3 l_3 \\ &\quad + a_3 b_4 \dots k_1 l_2 - a_2 b_1 \dots k_4 l_3 \\ &\quad \dots \dots \dots \dots \\ &\quad + a_n b_1 \dots k_{n-2} l_{n-1} - a_{n-1} b_{n-2} \dots k_1 l_n . \end{aligned}$$

Como exemplo tomaremos o determinante do quarto grau.
Temos

$$(a_1 b_2 c_3 d_4) = \left\{ a_1 b_2 c_3 d_4 \right\} - \left\{ a_1 c_2 b_3 d_4 \right\} + \left\{ a_1 c_2 d_3 b_4 \right\}.$$

$$\begin{aligned} \left\{ a_1 b_2 c_3 d_4 \right\} &= a_1 b_2 c_3 d_4 + a_4 b_3 c_2 d_1 \\ &\quad - a_2 b_3 c_4 d_1 - a_1 b_4 c_3 d_2 \\ &\quad + a_3 b_4 c_1 d_2 + a_2 b_1 c_4 d_3 \\ &\quad - a_4 b_1 c_2 d_3 - a_3 b_2 c_1 d_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \left\{ a_1 c_2 b_3 d_4 \right\} &= - a_1 c_2 b_3 d_4 - a_4 c_3 b_2 d_1 \\ &\quad + a_2 c_3 b_4 d_1 + a_1 c_4 b_3 d_2 \\ &\quad - a_3 c_4 b_1 d_2 - a_2 c_1 b_4 d_3 \\ &\quad + a_4 c_1 b_2 d_3 + a_3 c_2 b_1 d_4 \end{aligned}$$

$$\left\{ a_1 c_2 d_3 b_4 \right\} = + a_1 c_2 d_3 b_4 + a_4 c_3 d_2 b_1$$

$$\begin{aligned}
 & -a_2 c_3 d_4 b_1 - a_1 c_4 d_3 b_2 \\
 & + a_3 c_4 d_1 b_2 + a_2 c_1 d_4 b_3 \\
 & - a_4 c_1 d_2 b_3 - a_3 c_2 d_1 b_4 .
 \end{aligned}$$

VII

Tome-se, por exemplo, o primeiro colchete do determinante (*a*) e forme-se o quadro

a_1	b_1	c_1	\dots	j_1	k_1	l_1
a_2	b_2	c_2	\dots	j_2	k_2	l_2
a_3	b_3	c_3	\dots	j_3	k_3	l_3
(<i>b</i>).
a_{n-2}	b_{n-2}	c_{n-2}	\dots	j_{n-2}	k_{n-2}	l_{n-2}
a_{n-1}	b_{n-1}	c_{n-1}	\dots	j_{n-1}	k_{n-1}	l_{n-1}
a_n	b_n	c_n	\dots	j_n	k_n	l_n

Os elementos do termo primitivo acham-se na diagonal $a_1 l_n$ d'este schema, e os que resultam da applicação do theorema (I) acham-se respectivamente nas linhas $a_2 k_n$ e l_1 , $a_3 j_n$ e $k_1 l_2$, $a_4 i_n$ e $j_1 l_3$, . . . $a_n e b_1 l_{n-1}$, parallelas áquelle diagonal.

Os termos que resultam da applicação do theorema (II) acham-se na diagonal $a_n l_1$ e nas linhas $a_1 e b_n l_2$, $a_2 b_1$ e $c_n l_3$, $a_3 c_1$ e $d_n l_2$, . . . $a_{n-1} k_1$ e l_n parallelas a ella.

D'aqui e dos theoremas (I) e (II) resulta que :

Para achar o desenvolvimento d'um colchete da formula (a), forme-se o schema correspondente (b) e depois os productos dos elementos da diagonal $a_1 l_n$ e os dos elementos das linhas $a_2 k_n$ e l_1 , $a_3 j_n$ e $k_1 l_2$, $a_4 i_n$ e $j_1 l_3$ etc., a_n e $b_1 l_{n-1}$, tomando os resultados com o signal + ou com os signaes + e - alternativamente, conforme n for impar ou par; depois os productos dos elementos da diagonal $a_n l_1$ e os dos elementos das linhas a_1 e $b_n l_2$, $a_2 b_1$ e $c_n l_3$, $a_3 c_1$ e $d_n l_4$... $a_{n-1} k_1$ e l_n seguindo a mesma ordem dos signaes que precedentemente, se n for da forma $4n$ ou $4n+1$, e ordem contraria, se n for da forma $4n+2$ ou $4n+3$.

Por ordem contraria dos signaes intenda-se que, se os primeiros tiverem sido positivos, os ultimos serão negativos; se os primeiros tiverem sido alternadamente positivos e negativos, os ultimos serão alternadamente negativos e positivos.

Dado o determinante em a notação de Cauchy,

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & \dots & j_1 & k_1 & l_1 \\ a_2 & b_2 & \dots & \cdot & \cdot & \cdot \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_n & b_n & \dots & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix},$$

os schemas obtêm-se immediatamente precedendo com as colunas como no termo principal procedemos com as letras para formar os termos primitivos.

Tomemos, por exemplo, o determinante de quarta ordem.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 & d_3 \\ a_4 & c_4 & b_4 & d_4 \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} a_1 & c_1 & d_1 & b_1 \\ a_2 & c_2 & d_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 & d_3 & b_3 \\ a_4 & c_4 & d_4 & b_4 \end{vmatrix}$$

Tomando o primeiro schema, vem, visto que $n = 4p$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = \begin{cases} a_1 b_2 c_3 d_4 - a_2 b_3 c_4 d_1 + a_3 b_4 c_1 d_2 - a_4 b_1 c_2 d_3 \\ a_4 b_3 c_1 d_1 - a_1 b_4 c_3 d_2 + a_2 b_1 c_4 d_3 - a_3 b_2 c_1 d_4 \end{cases}$$

e do mesmo modo se obtém os desenvolvimentos dos outros.

Este processo é, pois, applicável tanto a determinantes numéricos como literaes.

Appliquemol-o ao determinante

$$- 5! B_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & 5 & 10 & 10 \end{vmatrix} = \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 3 & 10 & 10 \end{vmatrix}$$

que dá o segundo numero de Bernoulli (*).

(*) Vide o nosso artigo, *Sur les nombres bernoulliens*, apresentado à Academia Real das Sciencias e publicado no *Jornal de Mathematicas* de abril de 1893.

Temos

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 3 & 10 & 10 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 3 & 10 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & 4 & 2 \\ 0 & 10 & 10 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 1.1.6.10 - 1.3.2.10 + 1.3.4.3 - 1.10.4.1 = -4$$

e por isso

$$B_3 = \frac{1}{30}.$$

Porto, dezembro de 1893.

SOBRE UMA FORMULA DE ANALYSE

POR

JOÃO AREZ

A formula

$$(1) \quad \frac{F(x) + f(x+h) - f(x)}{F_1(x) + f_1(x+h) - f_1(x)} = \frac{F(x) + h f'(x + \theta h)}{F_1(x) + h f'_1(x + \theta h)},$$

que foi deduzida pelo sr. dr. J. B. de Cabedo do theorema dos accrescimos finitos (*), pôde ser tirada do theorema de Rolle e ser applicada depois para achar a formula dos accrescimos finitos.

Com efeito, pondo

$$A = \frac{F(x) + f(x+h) - f(x)}{F_1(x) + f_1(x+h) - f_1(x)},$$

a função

$$\begin{aligned} \varphi(z) = F(x) \frac{z-x}{h} + f(z) - f(x) - A \left[F_1(x) \cdot \frac{z-x}{h} \right. \\ \left. + f_1(z) - f(x) \right] \end{aligned}$$

(*) *Jornal de Sciencias math. e astr.* t. ix, pag. 429.

que se annulla para $z=x$ e $z=x+h$, dá, representando por θ uma quantidade positiva e menor que a unidade,

$$\begin{aligned}\varphi'(x+\theta h) = & F(x) \cdot \frac{1}{h} + f'(x+\theta h) - A \left[F_1(x) \frac{1}{h} \right. \\ & \left. + f'_1(x+\theta h) \right] = 0,\end{aligned}$$

equação d'onde se tira a formula (1), resolvendo-a em ordem a A .

Pondo na formula (1) $F(x)=0$ $F_1(x)=0$, (só com estas condições obtemos o theorema de Cauchy) e $f_1(z)=x+h-z$ a formula dá a dos accrescimentos finitos

$$f(x+h)-f(x)=hf'(x+\theta h).$$



BIBLIOGRAPHIA

A. Rebière. — Mathématiques et Mathématiciens, Paris, Nony, 1893.

Na pag. 56 do vol. IX d'este jornal deu-se noticia da 1.^a edição d'este livro. Uma nova edição vem de apparecer contendo o dobro das materias da edição anterior. É um livro interessante, em alguns pontos instructivo, que se lê com o maior prazer. Como dissemos a respeito da 1.^a edição, contém anecdotas relativas a mathematicas celebres, paradoxos interessantes a que levam as mathematicas, noticias sobre problemas curiosos e muitas informações historicas uteis.

Ed. Weyr.—Sur une fonction discontinue (M. da Acad. de Praga, t. II, 1893).

O auctor construe uma função da variavel real x , continua para todos os valores irrationaes de x , que, para os valores rationaes de x é contínua relativamente aos augmentos positivos de x e discontinua relativamente aos augmentos negativos.

G. Vivanti. — Sull'applicazione della funzione elitica $p(u)$ alla teoria dei poligoni di Poncelet (Rend. del Circolo mat. de Palermo, t. VII).

Deducción simples, por meio da consideração da função $p(u)$, dos resultados de Jacobi relativos aos polygones de Poucelet e

estudo dos casos particulares a que correspondem degenerações das funcções ellipticas.

A. Hurwitz. — Beweis der Trancendenz der Zahl e (Nach. von der k. Gesellschaft de Wis. zu Göttingen, 1893).

Contém esta nota uma demonstração, muito simples e fundada em considerações completamente elementares, da transcendencia do numero e .

L. C. e Almeida. — Novas regras para desinvolver os determinantes litteraes do terceiro e quarto gráo (Instituto, de Coimbra, 1893).

G. Vivanti. — Sulle serie di potense i cui coefficienti dipendono di una variable (Annali di Matematica, 1893).

P. Mansion. — Sur la loi des grands nombres de Poisson (Bull. de l'Acad. de Belgique, 1893).

J. Deruytza. — Sur les formes algébriques (Bull. de l'Acad. de Belgique, 1893).

— *Sur les relations qui existent entre certaines déterminants (Item).*

— *Sur la réduction la plus complete des fonctions invariantes (Item).*

-
- R. Marcolongo.* — *Risoluzione di due problemi relativi alla deformazione di una sfera omogenea isotropa* (*Rend. della R. Acad. dei Lincei*, 1892).
- *Intorno ad un punto della teoria della rotazione di un corpo* (*Rend. del Circolo mat. di Palermo*, 1893).
- *Sulla ricerca dei centri di curvatura delle traiettorie dei puncti di una figura mobile* (*Item*).
- *Alcune applicazioni delle funzioni ellittiche alla teoria dell'equilibrio dei fili flessibili* (*Rend. della R. Accad. de Napoli*, 1892).
-

G. Loria. — *L'odierno indirizzo e gli attuali problemis della storia delle scienze esatte*, (*Genova*, 1895).

Contém este opusculo um interessante discurso sobre os actuaes problemas da historia das sciencias mathematicas, pronunciado pelo auctor no Congresso historico italiano que teve logar em setembro de 1892.

G. Pirondini. — *Alcune formule relative alle linee tracciate sopra una superficie e loro applicazini* (*Annali di Matematica*, 1895).

E. Lemoine. — *Résultats et théorèmes concernant la Géométrie du triangle* (*Association française pour l'avancement des Sciences*, 1892).

M. Lerch. — *Z poctu integrálniho* (*M. da Acad. de Praga*, 1895).

A. Macfarlane. — *The fundamental theorems of Analysis generalised for space*, *Boston*, 1895.

G. T.

INDICE

- F. da Ponte Horta : Dois theoremas de geometria elementar, pag. 3.
Geminiano Pirondini : Sur la conique osculatrice des lignes planes, pag. 9.
Antonio Cabrera : Alguns theoremas de Mecanica, pag. 42.
Rodolpho Guimarães : Sobre a normal à ellipse, pag. 55.
Ch. Hermite : Sur l'addition des arguments dans les fonctions elliptiques, pag. 65.
J. Bruno de Cabédо : Demonstração do segundo theorema da media, pag. 67.
E. Lemoine : Résolution complète des équations indéterminées $x^2+1=2y^2$, $x^2-1=2y^2$, pag. 68.
Ch. de la Vallée Poussin : Note sur les séries dont les termes sont fonctions d'une variable complexe, pag. 77.
J. Pedro Teixeira : Processos expeditos para achar os desenvolvimentos de alguns determinantes, pag. 88.
A. Bassani : Sur une représentation des fonctions exponentielles par des produits infinis, pag. 93.
M. Lerch : Sur la differentiation des séries, pag. 107.
M. d'Ocagne : Extrait d'une lettre à Mr. E. Lemoine, pag. 115.
N. J. Lobatcheffsky, pag. 116.
J. Bruno de Cabédо : Definição analytica dos numeros complexos, pag. 117.
S. Pincherle : Sur les séries de fonctions, pag. 129.
J. Pedro Teixeira : Sobre a adição e as diferenciaes nas funcções ellipticas, pag. 136.
R. Marcolongo : Sur les lignes géodésiques des paraboloides, pag. 145.
Juan J Duran Loriga : Nota matematica, pag. 161.
G. Vivanti : Sur une équation aux différences finies et partielles, pag. 167.
J. Pedro Teixeira: Novo metodo de desenvolver os determinantes, pag. 173.
João Arez : Sobre uma formula de Analyse, pag. 187.
Bibliographia, pagg. 5, 59, 82, 119, 153, 189.
-